TRIGGERPONT ATLASZ

100+ vizuális kártya a kisugárzó fájdalomról

Fej · Váll · Hát · Medence · Láb

KEZDÉS ELŐTT

ÍGY HASZNÁLD AZ ATLASZT

FELÉPÍTÉS

102 kártya öt testtáj szerint rendezve. Minden kártya egy izmot mutat: funkció, eredés, tapadás, beidegzés, a triggerpont helye, a kisugárzó fájdalom mintázata, a tapintás módja és a kísérő tünetek.

GYORS KERESÉS

Használd a betűrendes indexet, a PDF oldalsó könyvjelzőit (minden izom egy kattintással elérhető), vagy a tünetkeresőt: válaszd ki, hol jelentkezik a fájdalom, és nézd meg, mely izmok jöhetnek szóba.

JELÖLÉSEK

Fehér kör fekete X-szel: triggerpont. Élénkpiros: fő fájdalomzóna. Világospiros pontozás: kiterjedt (spillover) zóna.

NYOMTATÁS

A4 formátum, 300 DPI-re optimalizálva. Nyomtatáskor válaszd a „tényleges méret” beállítást.

FONTOS

Az atlasz oktatási és referencia célú. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist. Mellkasi, hasi vagy neurológiai tüneteknél mindig zárd ki először az orvosi okokat.

TARTALOM

TESTTÁJAK SZERINT

FEJ, ARC ÉS NYAK

1. Trapezius – felső rostok · 2. Sternocleidomastoideus (SCM) · 3. Masseter (rágóizom) · 4. Temporalis (halántékizom) · 5. Pterygoideus lateralis · 6. Pterygoideus medialis · 7. Splenius capitis · 8. Splenius cervicis · 9. Suboccipitalis izmok · 10. Semispinalis capitis · 11. Levator scapulae (lapockaemelő) · 12. Scalenus izmok · 13. Digastricus · 14. Occipitofrontalis (homlok- és nyakszirtizom) · 15. Zygomaticus major · 16. Orbicularis oculi · 17. Platysma · 18. Longus colli

VÁLL, KAR ÉS KÉZ

19. Trapezius – középső rostok · 20. Trapezius – alsó rostok · 21. Supraspinatus · 22. Infraspinatus · 23. Teres minor · 24. Teres major · 25. Subscapularis · 26. Deltoideus · 27. Latissimus dorsi · 28. Rhomboideus izmok · 29. Pectoralis major (nagy mellizom) · 30. Pectoralis minor (kis mellizom) · 31. Serratus anterior · 32. Subclavius · 33. Coracobrachialis · 34. Biceps brachii · 35. Brachialis · 36. Triceps brachii · 37. Anconeus · 38. Supinator · 39. Brachioradialis · 40. Extensor carpi radialis · 41. Extensor digitorum · 42. Flexor carpi radialis és ulnaris · 43. Pronator teres · 44. Palmaris longus · 45. Adductor pollicis · 46. Opponens pollicis · 47. A kéz interosseus izmai

HÁT, GERINC ÉS TÖRZS

48. Serratus posterior superior · 49. Serratus posterior inferior · 50. Iliocostalis thoracis · 51. Iliocostalis lumborum · 52. Longissimus thoracis · 53. Multifidus · 54. Rotatores és interspinales · 55. Quadratus lumborum · 56. Rectus abdominis (egyenes hasizom) · 57. Obliquus externus abdominis · 58. Bordaközi izmok · 59. Rekeszizom · 60. Sternalis

MEDENCE, CSÍPŐ ÉS FARIZMOK

61. Gluteus maximus · 62. Gluteus medius · 63. Gluteus minimus · 64. Piriformis · 65. Mély rotátorok (gemelli és obturator internus) · 66. Quadratus femoris · 67. Tensor fasciae latae · 68. Iliopsoas · 69. Pectineus · 70. Adductor longus és brevis · 71. Adductor magnus · 72. Gracilis · 73. Sartorius (szabóizom) · 74. Medencefenék izmai

COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ

75. Rectus femoris · 76. Vastus medialis · 77. Vastus lateralis · 78. Vastus intermedius · 79. Biceps femoris · 80. Semitendinosus és semimembranosus · 81. Popliteus · 82. Gastrocnemius (kétfejű lábikraizom) · 83. Soleus (gázlóizom) · 84. Plantaris · 85. Tibialis anterior · 86. Tibialis posterior · 87. Peroneus longus · 88. Peroneus brevis · 89. Peroneus tertius · 90. Extensor digitorum longus · 91. Extensor hallucis longus · 92. Flexor digitorum longus · 93. Flexor hallucis longus · 94. Extensor digitorum brevis · 95. Abductor hallucis · 96. Flexor digitorum brevis · 97. Quadratus plantae · 98. Abductor digiti minimi (láb) · 99. A láb interosseus izmai · 100. Adductor hallucis · 101. Extensor hallucis brevis · 102. Flexor hallucis brevis

BETŰRENDES INDEX

47	A kéz interosseus izmai	Váll
99	A láb interosseus izmai	Comb
98	Abductor digiti minimi (láb)	Comb
95	Abductor hallucis	Comb
100	Adductor hallucis	Comb
70	Adductor longus és brevis	Medence
71	Adductor magnus	Medence
45	Adductor pollicis	Váll
37	Anconeus	Váll
34	Biceps brachii	Váll
79	Biceps femoris	Comb
58	Bordaközi izmok	Hát
35	Brachialis	Váll
39	Brachioradialis	Váll
33	Coracobrachialis	Váll
26	Deltoideus	Váll
13	Digastricus	Fej
40	Extensor carpi radialis	Váll
41	Extensor digitorum	Váll
94	Extensor digitorum brevis	Comb
90	Extensor digitorum longus	Comb
101	Extensor hallucis brevis	Comb
91	Extensor hallucis longus	Comb
42	Flexor carpi radialis és ulnaris	Váll
96	Flexor digitorum brevis	Comb
92	Flexor digitorum longus	Comb
102	Flexor hallucis brevis	Comb
93	Flexor hallucis longus	Comb
82	Gastrocnemius (kétfejű lábikraizom)	Comb
61	Gluteus maximus	Medence
62	Gluteus medius	Medence
63	Gluteus minimus	Medence
72	Gracilis	Medence
51	Iliocostalis lumborum	Hát
50	Iliocostalis thoracis	Hát
68	Iliopsoas	Medence
22	Infraspinatus	Váll
27	Latissimus dorsi	Váll
11	Levator scapulae (lapockaemelő)	Fej
52	Longissimus thoracis	Hát
18	Longus colli	Fej
3	Masseter (rágóizom)	Fej
74	Medencefenék izmai	Medence
65	Mély rotátorok (gemelli és obturator internus)	Medence
53	Multifidus	Hát
57	Obliquus externus abdominis	Hát
14	Occipitofrontalis (homlok- és nyakszirtizom)	Fej
46	Opponens pollicis	Váll
16	Orbicularis oculi	Fej
44	Palmaris longus	Váll
69	Pectineus	Medence
29	Pectoralis major (nagy mellizom)	Váll
30	Pectoralis minor (kis mellizom)	Váll
88	Peroneus brevis	Comb
87	Peroneus longus	Comb
89	Peroneus tertius	Comb

BETŰRENDES INDEX (FOLYT.)

64	Piriformis	Medence
84	Plantaris	Comb
17	Platysma	Fej
81	Popliteus	Comb
43	Pronator teres	Váll
5	Pterygoideus lateralis	Fej
6	Pterygoideus medialis	Fej
66	Quadratus femoris	Medence
55	Quadratus lumborum	Hát
97	Quadratus plantae	Comb
56	Rectus abdominis (egyenes hasizom)	Hát
75	Rectus femoris	Comb
59	Rekeszizom	Hát
28	Rhomboideus izmok	Váll
54	Rotatores és interspinales	Hát
73	Sartorius (szabóizom)	Medence
12	Scalenus izmok	Fej
10	Semispinalis capitis	Fej
80	Semitendinosus és semimembranosus	Comb
31	Serratus anterior	Váll
49	Serratus posterior inferior	Hát
48	Serratus posterior superior	Hát
83	Soleus (gázlóizom)	Comb
7	Splenius capitis	Fej
8	Splenius cervicis	Fej
60	Sternalis	Hát
2	Sternocleidomastoideus (SCM)	Fej
32	Subclavius	Váll
9	Suboccipitalis izmok	Fej
25	Subscapularis	Váll
38	Supinator	Váll
21	Supraspinatus	Váll
4	Temporalis (halántékizom)	Fej
67	Tensor fasciae latae	Medence
24	Teres major	Váll
23	Teres minor	Váll
85	Tibialis anterior	Comb
86	Tibialis posterior	Comb
20	Trapezius – alsó rostok	Váll
1	Trapezius – felső rostok	Fej
19	Trapezius – középső rostok	Váll
36	Triceps brachii	Váll
78	Vastus intermedius	Comb
77	Vastus lateralis	Comb
76	Vastus medialis	Comb
15	Zygomaticus major	Fej

TÜNETKERESŐ

HOL FÁJ?

Keresd meg, hol jelentkezik a fájdalom: a felsorolt izmok a leggyakoribb triggerpont-források.

Halántéktáji fejfájás
Trapezius – felső rostok (1), Temporalis (halántékizom) (4), Sternocleidomastoideus (SCM) (2), Suboccipitalis izmok (9), Semispinalis capitis (10)

Homlok- és szemkörnyéki fájdalom
Sternocleidomastoideus (SCM) (2), Occipitofrontalis (homlok- és nyakszirtizom) (14), Orbicularis oculi (16), Zygomaticus major (15), Splenius cervicis (8)

Fejtetői fájdalom
Splenius capitis (7), Sternocleidomastoideus (SCM) (2)

Állkapocs- és fogfájdalom
Masseter (rágóizom) (3), Temporalis (halántékizom) (4), Pterygoideus lateralis (5), Pterygoideus medialis (6), Digastricus (13)

Nyaki merevség
Levator scapulae (lapockaemelő) (11), Trapezius – felső rostok (1), Splenius capitis (7), Semispinalis capitis (10), Scalenus izmok (12)

Szédülés
Sternocleidomastoideus (SCM) (2), Suboccipitalis izmok (9)

Torok- és nyelési fájdalom
Pterygoideus medialis (6), Digastricus (13), Longus colli (18)

Lapockák közötti fájdalom
Rhomboideus izmok (28), Trapezius – középső rostok (19), Scalenus izmok (12), Serratus posterior superior (48), Levator scapulae (lapockaemelő) (11)

Vállfájdalom elöl
Infraspinatus (22), Biceps brachii (34), Pectoralis major (nagy mellizom) (29), Pectoralis minor (kis mellizom) (30), Deltoideus (26), Coracobrachialis (33)

Vállfájdalom hátul
Teres minor (23), Teres major (24), Subscapularis (25), Triceps brachii (36), Deltoideus (26), Latissimus dorsi (27)

Kar emelésekor jelentkező fájdalom
Supraspinatus (21), Infraspinatus (22), Deltoideus (26), Subscapularis (25)

Laterális könyökfájdalom (teniszkönyök)
Supinator (38), Extensor carpi radialis (40), Brachioradialis (39), Triceps brachii (36), Anconeus (37)

Mediális könyökfájdalom (golfkönyök)
Flexor carpi radialis és ulnaris (42), Pronator teres (43), Triceps brachii (36), Pectoralis major (nagy mellizom) (29)

Csukló- és kézfájdalom
Extensor digitorum (41), Flexor carpi radialis és ulnaris (42), Subscapularis (25), Scalenus izmok (12), Pronator teres (43)

Hüvelykujj-fájdalom
Brachialis (35), Adductor pollicis (45), Opponens pollicis (46), Supinator (38), Scalenus izmok (12)

Zsibbadás a kézben
Scalenus izmok (12), Pectoralis minor (kis mellizom) (30), Pronator teres (43), Subclavius (32), Coracobrachialis (33)

TÜNETKERESŐ

HOL FÁJ? (FOLYT.)

Keresd meg, hol jelentkezik a fájdalom: a felsorolt izmok a leggyakoribb triggerpont-források.

Mellkasi fájdalom (orvosi kizárás után)
Pectoralis major (nagy mellizom) (29), Pectoralis minor (kis mellizom) (30), Sternalis (60), Scalenus izmok (12), Bordaközi izmok (58)

Hasi fájdalom (orvosi kizárás után)
Rectus abdominis (egyenes hasizom) (56), Obliquus externus abdominis (57), Iliocostalis thoracis (50)

Derékfájás
Quadratus lumborum (55), Iliopsoas (68), Iliocostalis lumborum (51), Longissimus thoracis (52), Multifidus (53), Gluteus medius (62)

Farfájdalom
Gluteus maximus (61), Gluteus medius (62), Piriformis (64), Quadratus lumborum (55), Longissimus thoracis (52)

Isiászszerű fájdalom
Gluteus minimus (63), Piriformis (64), Mély rotátorok (gemelli és obturator internus) (65), Semitendinosus és semimembranosus (80), Biceps femoris (79)

Lágyékfájdalom
Iliopsoas (68), Pectineus (69), Adductor longus és brevis (70), Adductor magnus (71), Obliquus externus abdominis (57)

Csípő külső oldali fájdalma
Gluteus medius (62), Gluteus minimus (63), Tensor fasciae latae (67), Vastus lateralis (77), Quadratus lumborum (55)

Térdfájdalom elöl
Rectus femoris (75), Vastus medialis (76), Vastus lateralis (77), Vastus intermedius (78), Adductor longus és brevis (70)

Térdfájdalom hátul
Popliteus (81), Gastrocnemius (kétfejű lábikraizom) (82), Biceps femoris (79), Plantaris (84), Semitendinosus és semimembranosus (80)

Vádlifájdalom és görcs
Gastrocnemius (kétfejű lábikraizom) (82), Soleus (gázlóizom) (83), Tibialis posterior (86), Flexor digitorum longus (92)

Bokafájdalom
Peroneus longus (87), Peroneus brevis (88), Peroneus tertius (89), Tibialis anterior (85)

Sarokfájdalom
Soleus (gázlóizom) (83), Quadratus plantae (97), Abductor hallucis (95), Tibialis posterior (86)

Talpfájdalom
Flexor digitorum brevis (96), Adductor hallucis (100), Tibialis posterior (86), Gastrocnemius (kétfejű lábikraizom) (82), Flexor digitorum longus (92)

Nagylábujj-fájdalom
Tibialis anterior (85), Extensor hallucis longus (91), Flexor hallucis longus (93), Flexor hallucis brevis (102)

TESTTÁJ

FEJ, ARC ÉS NYAK

1–18. kártya · 18 izom

01. KÁRTYA · FEJ, ARC ÉS NYAK

TRAPEZIUS – FELSŐ ROSTOK

Musculus trapezius, pars descendens

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- Emeli és felfelé forgatja a lapockát
- A fej és a nyak azonos oldali hajlítása
- A fej ellenoldali forgatása
- Vállak megemelése (vállvonás)

EREDÉS

Linea nuchae superior, protuberantia occipitalis externa, ligamentum nuchae (C1–C6).

TAPADÁS

A kulcscsont laterális harmada (clavicula pars acromialis).

BEIDEGZÉS

N. accessorius (XI. agyideg); proprioceptív rostok C3–C4.

TRIGGERPONT

A felső szélen, a nyak–váll szögletben, a nyak és az acromion közötti távolság felénél; csipeszfogással jól tapintható.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A nyak posterolateralis oldala
- A fül mögötti terület (processus mastoideus)
- A halánték (temporális fejfájás)
- Néha az állkapocs szöglete

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Ülő vagy hanyatt fekvő helyzet, a fej enyhén az azonos oldalra hajlítva
- Csipeszfogás a felső szél mentén
- Görgesd a köteget az ujjaid között a feszes szalag kereséséhez
- A nyomás a halánték felé reprodukálja a fájdalmat

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Tenziós típusú fejfájás
- Nyaki merevség, korlátozott oldalra hajlítás
- Fájdalom hosszú ülés vagy telefonálás után
- Vállemelés stressz alatt

KLINIKAI TIPP Ellenőrizd a munkaállomást, a táska viselését és a légzési mintát: a felső trapezius gyakran a rossz ergonómia miatt terhelődik túl.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

02. KÁRTYA · FEJ, ARC ÉS NYAK

STERNOCLEIDOMASTOIDEUS (SCM)

Musculus sternocleidomastoideus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- Egyoldali működés: a fej azonos oldali hajlítása és ellenoldali forgatása
- Kétoldali működés: a nyak hajlítása
- Segédlégzőizom (a mellkas emelése)

EREDÉS

Sternalis fej: a manubrium sterni elülső felszíne.
Clavicularis fej: a kulcscsont mediális harmada.

TAPADÁS

Processus mastoideus és a linea nuchae superior laterális fele.

BEIDEGZÉS

N. accessorius (XI. agyideg); érző rostok C2–C3.

TRIGGERPONT

A sternalis és a clavicularis fej teljes hossza mentén; csipeszfogással vizsgáld, a fej enyhén az azonos oldalra fordítva.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Homlok és szemkörnyék (orbitális régió)
- Arc és fül, a fül mögötti terület
- A fejtető és a nyakszirt
- A szegycsont felső része

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, a fej az azonos oldalra hajlítva a lazításhoz
- Fogd meg a két fejet külön-külön csipeszfogással
- Haladj a kulcscsonttól a mastoid felé
- Kerüld a mély nyomást az a. carotis közelében

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Szédülés, egyensúlyzavar
- Szemkönnyezés, homályos látás
- Frontális vagy orbitális fejfájás
- Fülzúgás érzése az azonos oldalon

KLINIKAI TIPP A nyakat ért ostorcsapás-sérülés (whiplash) után az SCM gyakran érintett. Vizsgáld együtt a felső trapeziusszal.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

03. KÁRTYA · FEJ, ARC ÉS NYAK

MASSETER (RÁGÓIZOM)

Musculus masseter

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- Az állkapocs zárása (rágás, harapás)
- Az állkapocs előretolásának segítése

EREDÉS

Arcus zygomaticus és az arccsont (os zygomaticum).

TAPADÁS

Az állkapocs szöglete és a ramus mandibulae külső felszíne.

BEIDEGZÉS

N. massetericus (n. mandibularis, V/3).

TRIGGERPONT

A felületes rétegben a járomív alatt és az állkapocsszöglet felett; a mély rétegben a TMJ előtt.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Felső és alsó őrlőfogak
- Az állkapocs és az arc
- A szemöldök fölött
- Mélyen a fülben (TMJ régió)

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Ülő helyzet, a száj kissé nyitva
- Csipeszfogás: egyik ujj a szájban, a másik kívül
- Kérd meg, hogy harapjon össze: a feszes köteg kiemelkedik

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Korlátozott szájnyitás
- Fogérzékenység látható fogászati ok nélkül
- Fogcsikorgatás (bruxizmus)

KLINIKAI TIPP Mérd meg a szájnyitást (normál: kb. 3 ujjnyi). Bruxizmusnál gondolj éjszakai harapásemelőre és stresszkezelésre.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

TEMPORALIS (HALÁNTÉKIZOM)

Musculus temporalis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- Az állkapocs zárása
- Az állkapocs hátrahúzása (hátsó rostok)

EREDÉS

Fossa temporalis és fascia temporalis.

TAPADÁS

Processus coronoideus mandibulae.

BEIDEGZÉS

Nn. temporales profundi (n. mandibularis, V/3).

TRIGGERPONT

Négy területen a járomív felett: elülső, középső és két hátsó rostcsoport; rágás közben könnyen tapintható.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Halánték és a szemöldök
- A fej oldala ujjszerű kisugárzással
- A felső fogak
- Néha a szem mögött

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Ülő helyzet, a fogak enyhén összeszorítva
- Lapos tapintás a halántékon a járomív felett
- Keress érzékeny csomókat a rostokon át haladva

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Halántéktáji fejfájás
- Fogérzékenység meleg-hidegre
- Állkapocs-fáradtság rágáskor

KLINIKAI TIPP A temporalis és a masseter gyakran együtt érintett: kezeld mindkettőt, és kérdezz rá az éjszakai fogcsikorgatásra.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

PTERYGOIDEUS LATERALIS

Musculus pterygoideus lateralis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A száj nyitása és az állkapocs előretolása
- Oldalirányú őrlő mozgás

EREDÉS

Az ékcsont nagy szárnya és a lamina lateralis processus pterygoidei.

TAPADÁS

Az állkapocsízület porckorongja és a processus condylaris nyaka.

BEIDEGZÉS

N. pterygoideus lateralis (V/3).

TRIGGERPONT

Mélyen a járomív alatt; szájon belül a felső őrlőfogak mögött, a fej felé tapintható.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Az állkapocsízület (TMJ) mélyén
- Az arc a maxillaris sinus felett
- Néha a fül előtt

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Szájon belüli tapintás kesztyűvel, a felső őrlőfogak mögött
- A száj kissé nyitva
- Óvatos, lassú nyomás

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Kattogás az állkapocsízületben
- A harapás érzésének megváltozása
- Fájdalom rágáskor

KLINIKAI TIPP A TMJ-kattogás gyakori oka. A mély izmot csak kíméletesen kezeld, és vond be a fogorvost, ha a harapás eltér.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

PTERYGOIDEUS MEDIALIS

Musculus pterygoideus medialis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- Az állkapocs zárása
- Az állkapocs előretolása és oldalra mozgatása

EREDÉS

Fossa pterygoidea (lamina medialis processus pterygoidei).

TAPADÁS

Az állkapocs szögletének belső felszíne.

BEIDEGZÉS

N. pterygoideus medialis (V/3).

TRIGGERPONT

Az állkapocsszöglet belső oldalán; kívülről a szöglet alatt felfelé nyomva tapintható.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A torok és a nyelvgyök
- A fül alatt és előtt (TMJ)
- A garat hátsó fala

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Az állkapocsszöglet belső oldalán felfelé tapints
- A fej enyhén az azonos oldalra hajtva
- Nyeléskor a fájdalom fokozódhat

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Nyelési fájdalom
- Torokfájás-érzés fertőzés nélkül
- Korlátozott szájnyitás

KLINIKAI TIPP Ha a nyelés fáj, de a torok nem gyulladt, gondolj a pterygoideus medialisra.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

07. KÁRTYA · FEJ, ARC ÉS NYAK

SPLENIUS CAPITIS

Musculus splenius capitis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A fej és a nyak feszítése
- A fej azonos oldali forgatása és hajlítása

EREDÉS

Ligamentum nuchae alsó fele, C7–Th3 tövisnyúlványai.

TAPADÁS

Processus mastoideus és linea nuchae superior laterális harmada.

BEIDEGZÉS

A nyaki gerincvelői idegek hátsó ágai (C3–C5).

TRIGGERPONT

A trapezius és az SCM között, a processus mastoideus alatt mintegy 2–3 cm-rel.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A fejtető (vertex) azonos oldala
- Néha a nyakszirt

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, a fej kissé elfordítva
- Lapos tapintás a mastoid alatt
- A fej ellenállással szembeni forgatása kiemeli az izmot

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Fejtetői fájdalom
- Nyaki merevség forgatáskor
- Rossz alvási pozíció utáni fájdalom

KLINIKAI TIPP Kérdezd meg a párna magasságát és az alvási pozíciót: a hasonfekvés gyakran terheli a splenius izmokat.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

SPLENIUS CERVICIS

Musculus splenius cervicis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A nyak feszítése
- A nyak azonos oldali forgatása

EREDÉS

Th3–Th6 tövisnyúlványai.

TAPADÁS

C1–C3 harántnyúlványainak hátsó gümői.

BEIDEGZÉS

A nyaki gerincvelői idegek hátsó ágai (C4–C6).

TRIGGERPONT

A nyak alsó részén, a levator scapulae mellett, a nyak–váll szögletben.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Mélyen a szem mögött
- A nyakszirt felé kisugárzó fájdalom
- A nyak–váll szöglet

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés vagy ülő helyzet
- Mély tapintás a C7 magasságában laterálisan
- A fej forgatásával kövesd a köteget

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Szem mögötti fájdalom
- Homályos látás érzése
- Nyaki merevség

KLINIKAI TIPP A szem mögötti fájdalom nem mindig szemészeti eredetű; zárd ki az orvosi okokat, majd vizsgáld a nyaki izmokat.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

SUBOCCIPITALIS IZMOK

Mm. recti capitis posteriores et obliqui capitis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A fej finom hátrahajlítása és forgatása
- A fej helyzetének finomhangolása (propriocepció)

EREDÉS

Az atlas és az axis.

TAPADÁS

Os occipitale (linea nuchae inferior) és az atlas harántnyúlványa.

BEIDEGZÉS

N. suboccipitalis (C1).

TRIGGERPONT

Közvetlenül a koponyaalap alatt, a nyakszirtcsont és a C2 között, mélyen.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Sávszerű fájdalom a nyakszirttől a halántékig
- A szem mögött
- Néha a homlokig

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, a fej a terapeuta kezében
- Az ujjbegyek a koponyaalap alá kerülnek
- Engedd, hogy a fej súlya adja a nyomást

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Cervicogén fejfájás
- Képernyőmunka utáni fejfájás
- Korlátozott fejbólintás

KLINIKAI TIPP Az előretolt fejtartás a fő terhelő tényező: ellenőrizd a monitor magasságát és a szemüveg típusát.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

SEMISPINALIS CAPITIS

Musculus semispinalis capitis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A fej feszítése
- A nyaki lordózis megtartása

EREDÉS

C4–Th6 harántnyúlványai.

TAPADÁS

Os occipitale a linea nuchae superior és inferior között.

BEIDEGZÉS

A nyaki gerincvelői idegek hátsó ágai.

TRIGGERPONT

Három szinten: a koponyaalap alatt, a nyak közepén és a nyak alján, a tövisnyúlványok mellett.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Sáv a fej oldalán a halánték magasságában
- A nyakszirt
- A nyak hátsó része

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés, homlok alátámasztva
- Lapos tapintás a nyakszirt alatt 1–2 cm-re a középvonaltól
- Haladj lefelé szintenként

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Fejfájás a fej körül
- Nyaki fájdalom feszítéskor
- Zsibbadás a nyakszirten (n. occipitalis major)

KLINIKAI TIPP A n. occipitalis major áthalad az izmon: a feszes semispinalis zsibbadást és égő érzést okozhat a fejbőrön.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

LEVATOR SCAPULAE (LAPOCKAEMELŐ)

Musculus levator scapulae

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A lapocka emelése
- A lapocka lefelé forgatása
- A nyak azonos oldali hajlítása és forgatása

EREDÉS

C1–C4 harántnyúlványai.

TAPADÁS

A lapocka felső szöglete és a margo medialis felső része.

BEIDEGZÉS

N. dorsalis scapulae (C5) és C3–C4.

TRIGGERPONT

A nyak–váll szögletben, valamint a lapocka felső szöglete felett 1–2 cm-rel.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A nyak–váll szöglet
- A lapocka belső széle mentén
- A váll hátsó része

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Ülő helyzet, a fej ellenoldalra fordítva
- Tapints a trapezius alatt a lapocka felső szöglete felé
- A váll emelése kiemeli az izmot

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- „Merev nyak” (torticollis)
- Fájdalmas fejforgatás az azonos oldalra
- Fájdalom hosszú telefonálás után

KLINIKAI TIPP A „nem tudom elfordítani a fejem” tünet klasszikus oka. Kerüld a telefon vállal való tartását.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

SCALENUS IZMOK

Mm. scaleni anterior, medius et posterior

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A nyak oldalra hajlítása
- Segédlégzőizmok (az első két borda emelése)

EREDÉS

C2–C7 harántnyúlványai.

TAPADÁS

Az első borda (anterior, medius) és a második borda (posterior).

BEIDEGZÉS

A nyaki gerincvelői idegek elülső ágai (C3–C8).

TRIGGERPONT

A nyak oldalán, a kulcscsont felett, az SCM hátsó széle mögött.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A mellkas elülső része
- A felkar elülső és hátsó oldala
- Az alkar radialis oldala, a hüvelyk- és mutatóujj
- A lapocka belső széle

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, a fej kissé ellenoldalra fordítva
- Tapints az SCM mögött, a kulcscsont felett
- Óvatosan: a plexus brachialis itt halad

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Zsibbadás a kézben
- Fájdalom, ami a carpalis alagút szindrómára hasonlít
- Légzéskor fokozódó nyaki feszülés

KLINIKAI TIPP A scalenusok a „thoracic outlet” tüneteit utánozhatják. Vizsgáld a légzési mintát: a felső mellkasi légzés túlterheli őket.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

13. KÁRTYA · FEJ, ARC ÉS NYAK

DIGASTRICUS

Musculus digastricus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A száj nyitása
- A nyelvcsont emelése nyeléskor

EREDÉS

Hátsó has: incisura mastoidea; elülső has: fossa digastrica mandibulae.

TAPADÁS

Köztes ín a nyelvcsonthoz rögzítve.

BEIDEGZÉS

Hátsó has: n. facialis (VII.); elülső has: n. mylohyoideus (V/3).

TRIGGERPONT

A hátsó hason az állkapocsszöglet mögött, az elülső hason az áll alatt.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Az alsó metszőfogak és az áll
- A felső nyak az SCM elülső széle mentén
- A fül alatt és mögött

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, a fej enyhén hátrahajtva
- Gyengéd tapintás az áll alatt és az állkapocsszöglet mögött
- Nyeléskor az izom megfeszül

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Nyelési nehézség érzése
- Alsó fogak érzékenysége
- Gombóc érzése a torokban

KLINIKAI TIPP Az előretolt fejtartás és a szájlégzés terheli. Ellenőrizd a nyelv nyugalmi helyzetét (a szájpadláson).

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

OCCIPITOFRONTALIS (HOMLOK- ÉS NYAKSZIRTIZOM)

Musculus occipitofrontalis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A szemöldök emelése, a homlokráncolása
- A fejbőr mozgatása

EREDÉS

Frontalis: a szemöldök bőre; occipitalis: linea nuchae suprema.

TAPADÁS

Galea aponeurotica.

BEIDEGZÉS

N. facialis (VII.).

TRIGGERPONT

A frontalis hason a szemöldök felett, az occipitalis hason a nyakszirt felső részén.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A homlok
- A nyakszirt
- Mélyen a szem mögé is sugározhat

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés
- Lapos tapintás a szemöldök felett és a nyakszirten
- Kérd, hogy emelje meg a szemöldökét

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Homlokfájdalom
- Nyakszirti fejfájás, ami miatt nem tud a hátán feküdni
- Feszültség érzése a fejbőrön

KLINIKAI TIPP A homlok ráncolása stressz vagy rossz látás jele lehet: kérdezz rá a szemüvegre és a képernyőidőre.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

15. KÁRTYA · FEJ, ARC ÉS NYAK

ZYGOMATICUS MAJOR

Musculus zygomaticus major

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A szájzug felfelé és kifelé húzása (mosoly)

EREDÉS

Os zygomaticum.

TAPADÁS

A szájzug (modiolus).

BEIDEGZÉS

N. facialis (VII.).

TRIGGERPONT

Az izom középső részén, a szájzug és az arccsont között; csipeszfogással szájon belül és kívül.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Az orr oldala
- A szem belső zuga
- A homlok közepe

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Csipeszfogás: egyik ujj a szájban, a másik az arcon
- Haladj a szájzugtól az arccsont felé

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Arcfájdalom
- Orr melletti fájdalom
- Néha arcüreggyulladásra emlékeztető érzés

KLINIKAI TIPP Arcüreg-problémák kizárása után gondolj az arcizmokra is a középső arcfájdalomnál.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

ORBICULARIS OCULI

Musculus orbicularis oculi

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A szemhéjak zárása
- Hunyorítás

EREDÉS

A szemüreg mediális széle és a ligamentum palpebrale mediale.

TAPADÁS

A szemhéjak bőre és a szem körüli bőr.

BEIDEGZÉS

N. facialis (VII.).

TRIGGERPONT

A szemöldök alatt, a felső szemhéj felett; nagyon gyengéd csipeszfogással.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Az orrhát és az orr oldala
- A felső ajak
- A szem környéke

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Csukott szem, gyengéd csipeszfogás a szemöldök alatt
- Soha ne nyomd a szemgolyót

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Szemfáradtság
- Hunyorítás erős fényben
- Szemkörnyéki feszültség

KLINIKAI TIPP Képernyőmunka, olvasás és erős fény mellett terhelődik: javasolj rendszeres szünetet és megfelelő szemüveget.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

PLATYSMA

Platysma

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- Az alsó ajak és a szájzug lefelé húzása
- A nyak bőrének feszítése

EREDÉS

A mellkas felső része (fascia pectoralis és deltoidea).

TAPADÁS

Az állkapocs alsó széle és az arc alsó bőre.

BEIDEGZÉS

N. facialis (VII.), ramus colli.

TRIGGERPONT

A kulcscsont felett, az SCM felett futó vékony rétegben; csipeszfogással a bőrrel együtt.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Tüskeszerű fájdalom az állkapocson
- Az arc alsó része és az áll

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Csipeszfogás a bőrrel együtt
- Kérd, hogy húzza le a szájzugát: a lemez megfeszül

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Szúró érzés az állon
- Nyak elülső feszülése

KLINIKAI TIPP Gyakran SCM-pontokkal együtt aktív; a vékony izomnál a nyújtás és a bőr mobilizálása elegendő lehet.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

LONGUS COLLI

Musculus longus colli

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A nyak hajlítása és stabilizálása
- A nyaki lordózis kontrollja

EREDÉS

C3–Th3 csigolyatestek és harántnyúlványok.

TAPADÁS

Az atlas elülső gümője és C2–C6 csigolyatestek.

BEIDEGZÉS

A nyaki gerincvelői idegek elülső ágai (C2–C6).

TRIGGERPONT

Mélyen a légcső mellett, az SCM és a trachea között; csak óvatos, mély tapintással.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A torok elülső része
- Nyelési fájdalom
- A nyak elején

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, a fej alátámasztva
- Az SCM-et oldalra tolva, a légcső mellett óvatosan
- Érezd a carotis pulzust és kerüld el

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Gombóc érzése a torokban
- Nyaki instabilitás érzése whiplash után

KLINIKAI TIPP Whiplash után gyakran gátolt: a mély nyakhajlító-tréning (fejbólintás fekve) segít az aktiválásban.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

TESTTÁJ

VÁLL, KAR ÉS KÉZ

19–47. kártya · 29 izom

19. KÁRTYA · VÁLL, KAR ÉS KÉZ

TRAPEZIUS – KÖZÉPSŐ ROSTOK

Musculus trapezius, pars transversa

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A lapocka közelítése a gerinchez (retrakció)
- A lapocka stabilizálása

EREDÉS

C7–Th3 tövisnyúlványai.

TAPADÁS

Acromion és a spina scapulae felső széle.

BEIDEGZÉS

N. accessorius (XI.).

TRIGGERPONT

A lapocka belső széle és a gerinc között, a spina scapulae magasságában.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A lapocka és a gerinc között
- Égő érzés az acromion felett

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés, a kar a test mellett
- Lapos tapintás a rostokra merőlegesen

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Égő fájdalom a lapockák között
- Fáradtság ülőmunka közben

KLINIKAI TIPP Gyakran gyengült és túlnyúlt (előreeső vállak): az erősítés legalább annyira fontos, mint a kezelés.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

TRAPEZIUS – ALSÓ ROSTOK

Musculus trapezius, pars ascendens

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A lapocka lefelé húzása (depresszió)
- A lapocka felfelé forgatása

EREDÉS

Th4–Th12 tövisnyúlványai.

TAPADÁS

A spina scapulae mediális vége.

BEIDEGZÉS

N. accessorius (XI.).

TRIGGERPONT

A lapocka alsó-belső részén, ahol a rostok a spina scapulae felé futnak.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A nyak teteje a koponyaalap alatt
- A nyak hátsó része
- A lapocka felső része

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés
- Csipeszfogás a lapocka alsó szöglete mellett

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Nyaki fájdalom, ami a nyakból indul, de a háton kezdődik
- Lapocka körüli fájdalom

KLINIKAI TIPP A nyaki fájdalom forrása lehet a háton is: ha a nyak kezelése nem elég, vizsgáld az alsó trapeziust.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

SUPRASPINATUS

Musculus supraspinatus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A kar távolítása (abdukció) első szakasza
- A humerusfej stabilizálása az ízületi árokban

EREDÉS

Fossa supraspinata.

TAPADÁS

Tuberculum majus humeri felső része.

BEIDEGZÉS

N. suprascapularis (C5–C6).

TRIGGERPONT

A fossa supraspinatán, a trapezius alatt; a mediális és a laterális részen.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Mélyen a váll közepén (deltoid régió)
- A felkar külső oldala
- A könyök laterális része

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Ülő helyzet, a kar a test mellett
- Tapints a spina scapulae fölött, a trapeziuson át

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Fájdalom a kar emelésekor
- Éjszakai tompa vállfájdalom

KLINIKAI TIPP A rotátorköpeny-problémák „hamis” képét adhatja. Vizsgáld együtt az infraspinatusszal.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

INFRASPINATUS

Musculus infraspinatus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A kar kifelé forgatása
- A humerusfej stabilizálása

EREDÉS

Fossa infraspinata.

TAPADÁS

Tuberculum majus humeri középső része.

BEIDEGZÉS

N. suprascapularis (C5–C6).

TRIGGERPONT

A spina scapulae alatt, a fossa infraspinata felső részén.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Mélyen a váll elején
- A felkar elülső-külső oldala
- Az alkar és a kéz radialis oldala

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés vagy ülés
- Lapos tapintás a lapockán a spina alatt

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Nem tud a fájós oldalán aludni
- Nehéz hátranyúlni (pl. hajfésülés)

KLINIKAI TIPP A „vállfájdalom elöl” gyakori forrása hátul van: mindig vizsgáld az infraspinatust.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

TERES MINOR

Musculus teres minor

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A kar kifelé forgatása
- A humerusfej stabilizálása

EREDÉS

A lapocka laterális szélének felső kétharmada.

TAPADÁS

Tuberculum majus humeri alsó része.

BEIDEGZÉS

N. axillaris (C5–C6).

TRIGGERPONT

A lapocka laterális szélén, az infraspinatus alatt.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Mély, körülírt fájdalom a váll hátsó részén

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés, a kar enyhén távolítva
- Csipeszfogás a lapocka laterális széle mentén

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Pontszerű vállfájdalom hátul
- Zsibbadás a 4–5. ujjban (ritkán)

KLINIKAI TIPP Gyakran az infraspinatus kezelése után válik feltűnővé.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

TERES MAJOR

Musculus teres major

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A kar befelé forgatása, közelítése és hátrafeszítése

EREDÉS

A lapocka alsó szöglete.

TAPADÁS

Crista tuberculi minoris humeri.

BEIDEGZÉS

N. subscapularis inferior (C5–C7).

TRIGGERPONT

A hónalj hátsó redőjében, a lapocka alsó szöglete felett.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A váll hátsó része
- A felkar hátsó oldala
- Néha az alkar háti része

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, a kar emelve
- Csipeszfogás a hónalj hátsó redőjében

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Fájdalom fej feletti nyúláskor
- Vállmerevség

KLINIKAI TIPP A latissimus dorsival együtt vizsgáld: együtt alkotják a hónalj hátsó falát.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

SUBSCAPULARIS

Musculus subscapularis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A kar befelé forgatása
- A humerusfej elülső stabilizálása

EREDÉS

Fossa subscapularis.

TAPADÁS

Tuberculum minus humeri.

BEIDEGZÉS

Nn. subscapulares (C5–C6).

TRIGGERPONT

A hónaljban, a lapocka elülső felszínén, a laterális szél közelében.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A váll hátsó része
- A lapocka
- A felkar hátsó oldala
- Pántszerű fájdalom a csukló körül

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, a kar távolítva
- Tapints a hónaljba a lapocka elülső felszíne felé
- Lassan és óvatosan

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- „Befagyott váll” jellegű mozgáskorlátozottság
- Csuklófájdalom ok nélkül

KLINIKAI TIPP A befagyott váll (frozen shoulder) korai fázisában gyakran kulcsszerepű.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

DELTOIDEUS

Musculus deltoideus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A kar távolítása (középső rostok)
- Előre emelés (elülső rostok)
- Hátrafeszítés (hátsó rostok)

EREDÉS

Kulcscsont laterális harmada, acromion, spina scapulae.

TAPADÁS

Tuberositas deltoidea humeri.

BEIDEGZÉS

N. axillaris (C5–C6).

TRIGGERPONT

Az elülső, a középső és a hátsó rostokon, a felkar felső harmadában.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Helyi fájdalom a váll elején, oldalán vagy hátán
- A felkar felső része

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Ülő helyzet
- Csipeszfogás vagy lapos tapintás a rostokon

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Fájdalom a kar emelésekor
- Gyengeség érzése a vállban

KLINIKAI TIPP A deltoid fájdalma helyi; ha a fájdalom távolabbra sugároz, keresd a rotátorköpenyt.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

LATISSIMUS DORSI

Musculus latissimus dorsi

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A kar befelé forgatása, közelítése és hátrafeszítése
- Húzó mozgások (húzódzkodás)

EREDÉS

Th7–L5 tövisnyúlványai, fascia thoracolumbalis, csípőtaraj, alsó bordák.

TAPADÁS

Sulcus intertubercularis humeri.

BEIDEGZÉS

N. thoracodorsalis (C6–C8).

TRIGGERPONT

A hónalj hátsó redőjében, csipeszfogással.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A lapocka alsó szöglete körül
- A kar hátsó-belső oldala
- A 4. és 5. ujj

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, a kar a fej felett
- Csipeszfogás a hónalj hátsó redőjében

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Állandó tompa hátfájás a lapocka alatt
- Fájdalom fej feletti nyúláskor

KLINIKAI TIPP Úszóknál, evezősöknél és mászóknál gyakori. A tompa, „nem találom a helyét” hátfájásnál gondolj rá.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

RHOMBOIDEUS IZMOK

Mm. rhomboidei major et minor

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A lapocka közelítése a gerinchez és emelése

EREDÉS

C7–Th5 tövisnyúlványai.

TAPADÁS

A lapocka belső széle.

BEIDEGZÉS

N. dorsalis scapulae (C4–C5).

TRIGGERPONT

A lapocka belső széle mentén, a trapezius alatt.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A lapocka belső széle mentén
- Felületes, „sajgó” fájdalom

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés, a kar lelógatva
- Tapints a lapocka belső szélén, a trapeziuson át

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Lapockák közötti fájdalom
- Ropogás a lapocka mozgatásakor

KLINIKAI TIPP Gyakran a feszes pectoralis izmok húzzák túl: kezeld elöl is, ne csak hátul.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

PECTORALIS MAJOR (NAGY MELLIZOM)

Musculus pectoralis major

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



Triggerpont (X) · Fő fájdalomzóna · Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A kar közelítése és befelé forgatása
- Előre emelés (clavicularis rész)

EREDÉS

Kulcscsont mediális fele, szegycsont, 1–6. borda porcai.

TAPADÁS

Crista tuberculi majoris humeri.

BEIDEGZÉS

Nn. pectorales medialis et lateralis (C5–Th1).

TRIGGERPONT

A clavicularis, a sternalis és a costalis részen; a hónalj elülső redőjében csipeszfogással.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A váll eleje
- A mellkas elülső része
- A kar belső oldala, a mediális könyök
- A 4–5. ujj

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, a kar enyhén távolítva
- Csipeszfogás a hónalj elülső redőjében
- Lapos tapintás a szegycsont mellett

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Mellkasi fájdalom, ami a szívre hasonlít
- Előreeső vállak
- Fájdalom hátranyúláskor

KLINIKAI TIPP Mellkasi fájdalomnál mindig zárd ki az orvosi (szív) okokat, mielőtt izomeredetre gondolsz.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

30. KÁRTYA · VÁLL, KAR ÉS KÉZ

PECTORALIS MINOR (KIS MELLIZOM)

Musculus pectoralis minor

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A lapocka előre és lefelé húzása
- Segédlégzőizom

EREDÉS

3–5. borda.

TAPADÁS

Processus coracoideus.

BEIDEGZÉS

N. pectoralis medialis (C8–Th1).

TRIGGERPONT

A processus coracoideus alatt és a 3–5. borda felett, a pectoralis majoron át.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A váll eleje
- A mellkas
- A kar belső oldala és a kéz ulnaris oldala

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés
- Tapints a hónaljból a mellizom alá, a coracoid felé

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Előreeső váll
- Zsibbadás a kézben (neurovaszkuláris kompresszió)

KLINIKAI TIPP A feszes pectoralis minor szűkítheti a plexus brachialis útját: thoracic outlet tüneteknél vizsgáld.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

SERRATUS ANTERIOR

Musculus serratus anterior

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A lapocka előre húzása és a mellkashoz rögzítése
- A lapocka felfelé forgatása

EREDÉS

1–9. borda külső felszíne.

TAPADÁS

A lapocka belső széle (elülső felszín).

BEIDEGZÉS

N. thoracicus longus (C5–C7).

TRIGGERPONT

A középső hónaljvonalban az 5–6. borda magasságában.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A mellkas oldala
- A lapocka alsó szöglete
- A kar belső oldala

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Oldalfekvés, a kar előre nyújtva
- Tapints a bordák között a hónaljvonalban

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- „Oldalszúrás” futáskor
- Mély légzéskor fokozódó fájdalom

KLINIKAI TIPP Gyengesége szárnyas lapockát okoz; a fekvőtámasz-variációk segítenek az erősítésben.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

SUBCLAVIUS

Musculus subclavius

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A kulcscsont stabilizálása

EREDÉS

Az első borda és porca.

TAPADÁS

A kulcscsont alsó felszíne.

BEIDEGZÉS

N. subclavius (C5–C6).

TRIGGERPONT

A kulcscsont alatt, a középső harmadban, a pectoralis majoron át.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A felkar eleje
- Az alkar radialis oldala
- A hüvelyk- és mutatóujj

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés
- Tapints felfelé a kulcscsont alá

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Zsibbadás az ujjakban
- Vállfájdalom elöl

KLINIKAI TIPP A kulcscsont alatt halad a v. subclavia: tartós, erős nyomást ne alkalmazz.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

33. KÁRTYA · VÁLL, KAR ÉS KÉZ

CORACOBRACHIALIS

Musculus coracobrachialis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A kar előre emelése és közelítése

EREDÉS

Processus coracoideus.

TAPADÁS

A humerus mediális felszínének közepe.

BEIDEGZÉS

N. musculocutaneus (C6–C7).

TRIGGERPONT

A felkar belső oldalán, a hónalj közelében, a biceps rövid feje mögött.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A váll eleje
- A felkar és az alkar hátsó oldala
- A kézhát

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, a kar távolítva és kifelé forgatva
- Tapints a hónaljban a humerus mellett

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Fájdalom a kar hátranyúlásakor

KLINIKAI TIPP A n. musculocutaneus áthalad rajta: feszessége az alkar külső oldalán zsibbadást okozhat.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

34. KÁRTYA · VÁLL, KAR ÉS KÉZ

BICEPS BRACHII

Musculus biceps brachii

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A könyök hajlítása
- Az alkar kifelé forgatása (szupináció)

EREDÉS

Hosszú fej: tuberculum supraglenoidale; rövid fej: processus coracoideus.

TAPADÁS

Tuberositas radii és aponeurosis bicipitalis.

BEIDEGZÉS

N. musculocutaneus (C5–C6).

TRIGGERPONT

Az izom disztális harmadában, mindkét fejen.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A váll eleje
- A felkar eleje
- A könyökhajlat

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Ülő helyzet, a könyök enyhén hajlítva
- Csipeszfogás az izomhason

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Fájdalom fej feletti emeléskor
- Gyengeség a könyök hajlításában

KLINIKAI TIPP A „vállfájdalom elöl” mögött sokszor nem az ín, hanem a biceps triggerpontja áll.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

BRACHIALIS

Musculus brachialis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A könyök hajlítása (fő hajlító)

EREDÉS

A humerus elülső felszínének distalis fele.

TAPADÁS

Tuberositas ulnae és processus coronoideus.

BEIDEGZÉS

N. musculocutaneus (C5–C6), részben n. radialis.

TRIGGERPONT

A könyök felett néhány centiméterrel, a biceps alatt laterálisan.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A hüvelykujj töve (háti oldal)
- A könyökhajlat
- A felkar eleje

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Ülő helyzet, a könyök 90°-ban hajlítva
- Tolj a bicepsz mellé és tapints mélyen

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Hüvelykujj-fájdalom
- Fájdalom cipekedéskor

KLINIKAI TIPP Hüvelykujj-fájdalomnál ne csak a kézen keress: a brachialis is okozhatja.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

TRICEPS BRACHII

Musculus triceps brachii

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

Triggerpont (X) · Fő fájdalomzóna · Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A könyök feszítése
- A kar hátrafeszítése (hosszú fej)

EREDÉS

Hosszú fej: tuberculum infraglenoidale; laterális és mediális fej: a humerus hátsó felszíne.

TAPADÁS

Olecranon.

BEIDEGZÉS

N. radialis (C6–C8).

TRIGGERPONT

A hosszú fejben, a laterális fejben és a könyök felett.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A váll hátsó része
- A felkar hátsó oldala
- A könyök (epicondylusok)
- Az alkar háti része

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés vagy ülés, a kar lógva
- Csipeszfogás a hosszú fejen

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Könyökfájdalom „teniszkönyök”-szerűen
- Fájdalom a kar kinyújtásakor

KLINIKAI TIPP A laterális könyökfájdalom forrása nem mindig az alkar: vizsgáld a triceps laterális fejét is.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

ANCONEUS

Musculus anconeus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A könyök feszítésének segítése
- A könyökízület stabilizálása

EREDÉS

Epicondylus lateralis humeri.

TAPADÁS

Olecranon laterális felszíne és az ulna hátsó felszíne.

BEIDEGZÉS

N. radialis (C7–C8).

TRIGGERPONT

Az olecranon és a laterális epicondylus között.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A laterális epicondylus körül

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Ülő helyzet, a könyök hajlítva
- Lapos tapintás az olecranon mellett

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Helyi könyökfájdalom

KLINIKAI TIPP Teniszkönyöknél a pontos lokalizáció segít elkülöníteni az anconeust az extensoroktól.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

SUPINATOR

Musculus supinator

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- Az alkar kifelé forgatása (szupináció)

EREDÉS

Epicondylus lateralis humeri, ligamentum collaterale radiale, crista m. supinatoris ulnae.

TAPADÁS

A radius proximális harmada.

BEIDEGZÉS

N. radialis profundus (C6–C7).

TRIGGERPONT

A könyökhajlat alatt laterálisan, a radius feje körül.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A laterális epicondylus
- A hüvelyk- és mutatóujj közötti kézhát

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Ülő helyzet, az alkar szupinált
- Tapints a radius feje alatt

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Teniszkönyök
- Fájdalom csavarhúzózáskor, kilincs fordításakor

KLINIKAI TIPP A n. radialis profundus áthalad rajta: a feszes supinator az alkarban gyengeséget okozhat.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

BRACHIORADIALIS

Musculus brachioradialis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A könyök hajlítása semleges alkarhelyzetben

EREDÉS

A humerus laterális szupracondylaris éle.

TAPADÁS

Processus styloideus radii.

BEIDEGZÉS

N. radialis (C5–C6).

TRIGGERPONT

A könyök alatt 1–2 cm-rel, az alkar radialis oldalán.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A laterális epicondylus
- A csukló háti oldala
- A hüvelyk- és mutatóujj közötti terület

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Ülő helyzet, az alkar semleges
- Csipeszfogás az alkar radialis szélén

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Fogáskor jelentkező könyökfájdalom
- Kézhát-fájdalom

KLINIKAI TIPP Csipeszfogással jól elválasztható az extensor carpi radialistól.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

EXTENSOR CARPI RADIALIS

Mm. extensores carpi radiales longus et brevis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A csukló feszítése és radialis irányú elhajlítása
- Fogás stabilizálása

EREDÉS

A humerus laterális szupracondylaris éle és az epicondylus lateralis.

TAPADÁS

A II. és III. kézközépcsont bázisa.

BEIDEGZÉS

N. radialis (C6–C7).

TRIGGERPONT

Az alkar felső harmadában, a háti-radialis oldalon.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A laterális epicondylus
- A kézhát és a csukló

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Ülő helyzet, az alkar pronált
- Tapints a könyök alatt a háti oldalon

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Teniszkönyök
- Gyengeség fogáskor

KLINIKAI TIPP Egérhasználat és billentyűzés gyakori terhelés: ellenőrizd a csukló helyzetét munka közben.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

41. KÁRTYA · VÁLL, KAR ÉS KÉZ

EXTENSOR DIGITORUM

Musculus extensor digitorum

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- Az ujjak feszítése
- A csukló feszítésének segítése

EREDÉS

Epicondylus lateralis humeri (közös feszítőín).

TAPADÁS

A 2–5. ujj háti aponeurosisa.

BEIDEGZÉS

N. radialis profundus (C7–C8).

TRIGGERPONT

Az alkar háti oldalán, a könyök alatt 3–4 cm-rel.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Az alkar háti oldala
- A kézhát
- A középső és a gyűrűsujj

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Ülő helyzet, az alkar pronált
- Kérd, hogy egyenként emelje az ujjait: a köteg kitapintható

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Ujjmerevség
- Gyengeség fogáskor

KLINIKAI TIPP Zenészeknél és billentyűzőknél gyakori; a szünetek és az ujjnyújtás segítenek.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

FLEXOR CARPI RADIALIS ÉS ULNARIS

Mm. flexores carpi radialis et ulnaris

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A csukló hajlítása
- Radialis, illetve ulnaris irányú elhajlítás

EREDÉS

Epicondylus medialis humeri (közös hajlítóín).

TAPADÁS

Radialis: II. kézközépcsont bázisa; ulnaris: os pisiforme, V. kézközépcsont.

BEIDEGZÉS

N. medianus (FCR), n. ulnaris (FCU).

TRIGGERPONT

Az alkar tenyéri oldalán, a felső harmadban.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A csukló tenyéri oldala (radialis és ulnaris)

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Ülő helyzet, az alkar szupinált
- Kérd a csukló hajlítását ellenállással szemben

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Golfkönyök
- Csuklófájdalom fogáskor

KLINIKAI TIPP Golfkönyöknél (mediális epicondylitis) vizsgáld együtt a pronator teresszel.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

PRONATOR TERES

Musculus pronator teres

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- Az alkar befelé forgatása (pronáció)
- A könyök hajlításának segítése

EREDÉS

Epicondylus medialis humeri és processus coronoideus ulnae.

TAPADÁS

A radius laterális felszínének közepe.

BEIDEGZÉS

N. medianus (C6–C7).

TRIGGERPONT

A könyökhajlat alatt mediálisan, a medialis epicondylus közelében.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A csukló és az alkar tenyéri-radialis oldala

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Ülő helyzet, az alkar szupinált
- Tapints a könyökhajlat alatt ferdén

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Fájdalom csavaráskor
- Zsibbadás a hüvelyk- és mutatóujjban (n. medianus)

KLINIKAI TIPP A n. medianus áthalad rajta: a pronator szindróma a carpalis alagút szindrómát utánozhatja.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

PALMARIS LONGUS

Musculus palmaris longus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A tenyéri bőnye feszítése
- A csukló hajlításának segítése

EREDÉS

Epicondylus medialis humeri.

TAPADÁS

Aponeurosis palmaris.

BEIDEGZÉS

N. medianus (C7–C8).

TRIGGERPONT

Az alkar tenyéri oldalán, a felső harmadban.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Szúró, tűszerű fájdalom a tenyérben

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Ülő helyzet
- Kérd, hogy érintse össze a hüvelyk- és a kisujját: az ín kiemelkedik

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Tenyérfájdalom szerszámfogáskor

KLINIKAI TIPP Az emberek kb. 15%-ánál hiányzik; ha nincs, a tenyérfájdalom más forrását keresd.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

ADDUCTOR POLLICIS

Musculus adductor pollicis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A hüvelykujj közelítése (csípőfogás)

EREDÉS

A III. kézközépcsont és a kéztőcsontok.

TAPADÁS

A hüvelykujj alapperce (ulnaris oldal).

BEIDEGZÉS

N. ulnaris (C8–Th1).

TRIGGERPONT

A hüvelyk- és mutatóujj közötti bőrredőben (első interdigitális tér).

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A hüvelykujj külső oldala
- A hüvelykujj töve

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Csipeszfogás a hüvelykujj és a mutatóujj között

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Ügyetlenség finom mozgásnál
- Fájdalom írás vagy csípőfogás közben

KLINIKAI TIPP Telefonozás, írás és varrás után gyakori. Javasolj ujjnyújtást a munka szüneteiben.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

OPPONENS POLLICIS

Musculus opponens pollicis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A hüvelykujj szembefordítása (oppozíció)

EREDÉS

Os trapezium és retinaculum flexorum.

TAPADÁS

Az I. kézközépcsont radialis széle.

BEIDEGZÉS

N. medianus (C8–Th1).

TRIGGERPONT

A hüvelykujj-párnában (thenar), a tenyér radialis oldalán.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A hüvelykujj tenyéri oldala
- A csukló tenyéri-radialis része

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Lapos tapintás a thenar párnán
- Kérd az oppozíciót: a hüvelykujj a kisujjhoz ér

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Gyengeség fogáskor
- Fájdalom üvegnyitáskor

KLINIKAI TIPP Carpalis alagút szindrómánál a thenar izmok gyengülhetnek: vizsgáld az erőt is.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

A KÉZ INTEROSSEUS IZMAI

Mm. interossei dorsales et palmares manus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- Az ujjak terpesztése és közelítése
- Az alapízületek hajlítása, az ujjízületek feszítése

EREDÉS

A kézközépcsontok egymás felé néző oldala.

TAPADÁS

Az ujjak alapperce és háti aponeurosisa.

BEIDEGZÉS

N. ulnaris (C8–Th1).

TRIGGERPONT

A kézközépcsontok között, a háti és a tenyéri oldalon.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Az ujjak oldala a végpercekig
- A Heberden-csomók környéke

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Csipeszfogás a kézközépcsontok között

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Ujjmerevség
- Fájdalom az ujjak oldalán

KLINIKAI TIPP Az ujjfájdalom gyakran ízületinek tűnik, de lehet izomeredetű: tapintsd ki a kézközépcsontok közötti teret.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

TESTTÁJ

HÁT, GERINC ÉS TÖRZS

48–60. kártya · 13 izom

SERRATUS POSTERIOR SUPERIOR

Musculus serratus posterior superior

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A felső bordák emelése belégzéskor

EREDÉS

C7–Th3 tövisnyúlványai.

TAPADÁS

2–5. borda.

BEIDEGZÉS

Nn. intercostales (Th2–Th5).

TRIGGERPONT

A lapocka felső része alatt; csak úgy érhető el, ha a lapocka előre van húzva.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Mélyen a lapocka alatt
- A kar hátsó oldala
- A kisujj

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Ülő helyzet, a karok keresztben a mellkas előtt
- Tapints a lapocka belső széle alatt

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Mély, folyamatos fájdalom a lapocka alatt
- Zsibbadás a kisujjban

KLINIKAI TIPP A lapocka elhúzása nélkül nem tapintható: a karok keresztezése szabaddá teszi az izmot.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

SERRATUS POSTERIOR INFERIOR

Musculus serratus posterior inferior

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- Az alsó bordák lefelé és hátrafelé húzása

EREDÉS

Th11–L2 tövisnyúlványai.

TAPADÁS

9–12. borda.

BEIDEGZÉS

Nn. intercostales (Th9–Th12).

TRIGGERPONT

Az alsó bordák felett, a gerinc mellett laterálisan.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Helyi, sajgó fájdalom az alsó bordák felett

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés
- Lapos tapintás az alsó bordákon

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Bordák feletti tompa fájdalom
- Fájdalom forgatáskor

KLINIKAI TIPP Akkor is fájhat, ha a lumbális vizsgálat negatív: tapints a bordák felett.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

ILIOCOSTALIS THORACIS

Musculus iliocostalis thoracis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A gerinc feszítése
- Azonos oldali hajlítás

EREDÉS

Az alsó 6 borda szöglete.

TAPADÁS

A felső 6 borda szöglete és C7 harántnyúlványa.

BEIDEGZÉS

A gerincvelői idegek hátsó ágai.

TRIGGERPONT

A középső és az alsó háti szakaszon, a gerinc mellett laterálisan.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A lapocka felé
- Elöl a has azonos oldalára

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés
- Lapos tapintás a bordaszögletek mentén

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Háti fájdalom
- Hasi fájdalom, ami belszervi eredetűnek tűnik

KLINIKAI TIPP Hasi fájdalomnál, ha a belgyógyászati vizsgálat negatív, gondolj a hátizmokra is.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

51. KÁRTYA · HÁT, GERINC ÉS TÖRZS

ILIOCOSTALIS LUMBORUM

Musculus iliocostalis lumborum

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



Triggerpont (X) · Fő fájdalomzóna · Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- Az ágyéki gerinc feszítése és oldalra hajlítása

EREDÉS

Crista iliaca és os sacrum.

TAPADÁS

Az alsó 6 borda szöglete.

BEIDEGZÉS

A gerincvelői idegek hátsó ágai (lumbális).

TRIGGERPONT

Az L1 magasságában, a gerinc mellett laterálisan.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A farizom közepe felé
- Az alsó hát

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés, párna a has alatt
- Lapos tapintás az ágyéki szakaszon

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Derékfájás, ami a farba sugároz
- Fájdalom felálláskor

KLINIKAI TIPP Az ágyéki fájdalom egy része a farba sugározhat anélkül, hogy isiászról lenne szó.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

52. KÁRTYA · HÁT, GERINC ÉS TÖRZS

LONGISSIMUS THORACIS

Musculus longissimus thoracis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A gerinc feszítése
- Azonos oldali hajlítás

EREDÉS

Os sacrum, crista iliaca, ágyéki tövisnyúlványok.

TAPADÁS

A háti csigolyák harántnyúlványai és a bordák.

BEIDEGZÉS

A gerincvelői idegek hátsó ágai.

TRIGGERPONT

A Th10–L1 szinten, a középvonaltól 2–4 cm-re.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Lejjebb, a farizom felett
- A sacroiliacalis régió

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés
- Mély lapos tapintás a középvonal mellett

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Alsó hát- és farfájdalom
- Merevség hosszú állás után

KLINIKAI TIPP A fájdalom több szegmenssel lejjebb jelentkezik, mint a triggerpont: keress magasabban.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

MULTIFIDUS

Musculus multifidus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A csigolyák szegmentális stabilizálása
- A gerinc feszítése és forgatása

EREDÉS

Os sacrum, a csípőtövis, a harántnyúlványok.

TAPADÁS

A 2–4 szinttel feljebb lévő tövisnyúlványok.

BEIDEGZÉS

A gerincvelői idegek hátsó ágai.

TRIGGERPONT

Közvetlenül a tövisnyúlványok mellett, mélyen.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Helyi fájdalom a gerinc mellett
- A keresztcsont és a farokcsont

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés
- Mély tapintás közvetlenül a tövisnyúlvány mellett

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Szegmentális, pontszerű hátfájás
- Farokcsont-fájdalom

KLINIKAI TIPP Krónikus derékfájásnál gyakran sorvad: a stabilizáló gyakorlatok kulcsfontosságúak.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

ROTATORES ÉS INTERSPINALES

Mm. rotatores et interspinales

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A csigolyák finom forgatása és feszítése
- Propriocepció

EREDÉS

A csigolyák harántnyúlványai (rotatores), tövisnyúlványai (interspinales).

TAPADÁS

A szomszédos csigolya tövisnyúlványa.

BEIDEGZÉS

A gerincvelői idegek hátsó ágai.

TRIGGERPONT

Mélyen a tövisnyúlványok között.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A gerinc középvonala az adott szinten

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés
- Nyomás a tövisnyúlványok között és mellett

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Középvonali gerincfájdalom
- Kopogtatásra érzékeny csigolya

KLINIKAI TIPP A középvonali, kopogtatásra érzékeny fájdalom csontos okát (pl. törés) mindig zárd ki.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

QUADRATUS LUMBORUM

Musculus quadratus lumborum

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- Az ágyéki gerinc azonos oldali hajlítása
- A medence emelése
- A 12. borda rögzítése belégzéskor

EREDÉS

Crista iliaca és ligamentum iliolumbale.

TAPADÁS

A 12. borda és az L1–L4 harántnyúlványok.

BEIDEGZÉS

Th12–L3 elülső ágai.

TRIGGERPONT

A 12. borda és a csípőtaraj között, az erector spinae mellett laterálisan.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A sacroiliacalis ízület
- A farizom alsó része
- A csípőtaraj
- A nagy tompor (trochanter major)

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Oldalfekvés, a felső kar a fej felett
- Tapints az erector spinae laterális széle alatt

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Erős derékfájás felálláskor
- Fájdalom köhögéskor
- Nem tud oldalfekvésben aludni

KLINIKAI TIPP Az akut „derékbecsípődés” gyakori oka. Ellenőrizd a lábhossz-különbséget és a medence állását.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

RECTUS ABDOMINIS (EGYENES HASIZOM)

Musculus rectus abdominis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A törzs hajlítása
- A hasprés
- A medence megtartása

EREDÉS

Symphysis pubica és crista pubica.

TAPADÁS

5–7. borda porca és a processus xiphoideus.

BEIDEGZÉS

Nn. intercostales (Th7–Th12).

TRIGGERPONT

A köldök felett, a köldök mellett és a szeméremcsont felett.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Vízszintes sáv a háton
- A köldök körül
- Az alhas és a derék

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, térd hajlítva
- Csipeszfogás a hasizom szélén
- A fej emelése megfeszíti az izmot

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Puffadásérzés
- Hasi görcsre emlékeztető fájdalom
- Derékfájás elöl induló forrással

KLINIKAI TIPP Hasi fájdalomnál mindig zárd ki a belgyógyászati okokat; ezután vizsgáld a hasfalat.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

57. KÁRTYA · HÁT, GERINC ÉS TÖRZS

OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS

Musculus obliquus externus abdominis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A törzs ellenoldali forgatása
- A törzs hajlítása
- A hasprés

EREDÉS

Az 5–12. borda külső felszíne.

TAPADÁS

Crista iliaca, ligamentum inguinale, linea alba.

BEIDEGZÉS

Nn. intercostales (Th7–Th12), n. iliohypogastricus.

TRIGGERPONT

Az alsó bordák mentén és a lágyékhajlat közelében.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A felhas („gyomorégés”-szerű)
- A lágyék és az alhas

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés
- Csipeszfogás az oldalsó hasfalon

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Gyomorégésre emlékeztető fájdalom
- Lágyékfájdalom

KLINIKAI TIPP Sportolóknál (forgató mozgások) gyakori. Belgyógyászati okokat zárj ki.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

58. KÁRTYA · HÁT, GERINC ÉS TÖRZS

BORDAKÖZI IZMOK

Mm. intercostales externi et interni

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A bordák emelése és süllyesztése légzéskor
- A mellkasfal stabilizálása

EREDÉS

A felső borda alsó széle.

TAPADÁS

Az alatta lévő borda felső széle.

BEIDEGZÉS

Nn. intercostales.

TRIGGERPONT

A bordaközökben, a fájdalmas szinten.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Helyi fájdalom a bordaköz mentén

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Lapos tapintás a bordaközben
- Mély belégzés fokozza az érzékenységet

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Szúró fájdalom belégzéskor
- Fájdalom köhögés után

KLINIKAI TIPP Bordatörést és a herpes zoster korai szakaszát zárd ki, ha a fájdalom erős és körülírt.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

REKESZIZOM

Diaphragma

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A fő belégző izom

EREDÉS

Processus xiphoideus, alsó 6 borda, ágyéki csigolyák.

TAPADÁS

Centrum tendineum.

BEIDEGZÉS

N. phrenicus (C3–C5).

TRIGGERPONT

A bordaív alatt elöl, óvatos tapintással kilégzéskor.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A bordaív mentén
- A váll teteje

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, térd hajlítva
- Kilégzéskor tapints a bordaív alá felfelé

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Oldalszúrás
- Fájdalom mély belégzéskor

KLINIKAI TIPP A felső mellkasi légzés a rekeszizom alulműködését jelzi: tanítsd meg a hasi (rekeszizom-) légzést.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

STERNALIS

Musculus sternalis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



Triggerpont (X) · Fő fájdalomzóna · Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- Nincs jelentős funkciója

EREDÉS

A szegycsont és a bordaporcok elülső felszíne.

TAPADÁS

A pectoralis fascia, változó.

BEIDEGZÉS

Nn. pectorales vagy intercostales.

TRIGGERPONT

A szegycsont felett, a középvonalban.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A teljes szegycsont
- A felső mellkas
- A kar belső oldala

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Lapos tapintás a szegycsonton

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Szegycsont alatti fájdalom
- Mellkasi szorítás érzése

KLINIKAI TIPP Mellkasi szorításnál ELŐBB orvosi kivizsgálás (szív). Az izmot csak ezután vizsgáld.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

TESTTÁJ

MEDENCE, CSÍPŐ ÉS FARIZMOK

61–74. kártya · 14 izom

GLUTEUS MAXIMUS

Musculus gluteus maximus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



Triggerpont (X) · Fő fájdalomzóna · Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A csípő feszítése
- A comb kifelé forgatása
- A medence stabilizálása

EREDÉS

Os ilium hátsó része, os sacrum, os coccygis.

TAPADÁS

Tuberositas glutea femoris és tractus iliotibialis.

BEIDEGZÉS

N. gluteus inferior (L5–S2).

TRIGGERPONT

A keresztcsont mellett, az ülőgumó felett és az alsó-belső részen.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A keresztcsont és a SI-ízület
- Az egész farizom
- A farokcsont

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Oldal- vagy hasonfekvés
- Lapos vagy csipeszfogással

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Ülési fájdalom
- Fájdalom emelkedőn járáskor

KLINIKAI TIPP Hosszú ülés után gyakori; az ülési szünetek és a csípőfeszítők aktiválása segít.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

GLUTEUS MEDIUS

Musculus gluteus medius

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A csípő távolítása
- A medence vízszintben tartása járáskor

EREDÉS

Az os ilium külső felszíne.

TAPADÁS

Trochanter major.

BEIDEGZÉS

N. gluteus superior (L4–S1).

TRIGGERPONT

Közvetlenül a csípőtaraj alatt, három ponton elölről hátra.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A csípőtaraj mentén
- A SI-ízület
- A farizom közepe és oldala

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Oldalfekvés
- Lapos tapintás a csípőtaraj alatt

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Derékfájás járáskor
- Nem tud az érintett oldalon feküdni

KLINIKAI TIPP Trendelenburg-jelnél (lebillenő medence) gyengült: erősítsd oldalfekvéses emelésekkel.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

GLUTEUS MINIMUS

Musculus gluteus minimus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A csípő távolítása és befelé forgatása

EREDÉS

Az os ilium külső felszíne (elülső rész).

TAPADÁS

Trochanter major elülső széle.

BEIDEGZÉS

N. gluteus superior (L4–S1).

TRIGGERPONT

Mélyen a gluteus medius alatt, az elülső és a hátsó részen.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A comb és a lábszár külső oldala a bokáig
- A comb és a vádli hátsó oldala

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Oldalfekvés
- Mély tapintás a medius alatt

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Isiászra emlékeztető fájdalom
- Fájdalom felálláskor és sántítás

KLINIKAI TIPP Az „álisiász” leggyakoribb izmos oka. Neurológiai tünetek (zsibbadás, reflexkiesés) esetén orvosi vizsgálat kell.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

PIRIFORMIS

Musculus piriformis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A comb kifelé forgatása
- Hajlított csípőnél távolítás

EREDÉS

Os sacrum elülső felszíne.

TAPADÁS

Trochanter major felső széle.

BEIDEGZÉS

N. ad m. piriformem (S1–S2).

TRIGGERPONT

A keresztcsont és a trochanter major közötti vonal mediális és laterális harmadában.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A SI-ízület régiója
- Az egész farizom
- A comb hátsó oldala

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Oldalfekvés, a felső láb hajlítva
- Mély tapintás a farizmon át

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Ülési fájdalom
- Zsibbadás a láb hátsó oldalán (piriformis-szindróma)

KLINIKAI TIPP Az ülőideg (n. ischiadicus) alatta vagy rajta át halad: kompresszió esetén isiászszerű tünetek lehetnek.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

MÉLY ROTÁTOROK (GEMELLI ÉS OBTURATOR INTERNUS)

Mm. gemelli et obturator internus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

Triggerpont (X) · Fő fájdalomzóna · Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A comb kifelé forgatása
- A csípőfej stabilizálása

EREDÉS

Spina ischiadica, a membrana obturatoria belső felszíne, tuber ischiadicum.

TAPADÁS

A trochanter major mediális felszíne.

BEIDEGZÉS

N. ad m. obturatorium internum (L5–S2).

TRIGGERPONT

A piriformis alatt, a trochanter major mögött.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Mélyen az alsó farizomban
- A csípő hátsó része

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés, a térd hajlítva
- Mély tapintás a trochanter mögött

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Mély farfájdalom
- Kellemetlenség ülésben

KLINIKAI TIPP Gyakran a piriformisszal együtt érintett; ugyanazzal a nyújtással kezelhető.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

QUADRATUS FEMORIS

Musculus quadratus femoris

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A comb kifelé forgatása

EREDÉS

Tuber ischiadicum.

TAPADÁS

Crista intertrochanterica.

BEIDEGZÉS

N. ad m. quadratum femoris (L4–S1).

TRIGGERPONT

Az ülőgumó és a trochanter major között.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Az ülőgumó körül
- A csípő hátsó része

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés
- Mély tapintás az ülőgumó mellett laterálisan

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Ülési fájdalom az ülőgumón

KLINIKAI TIPP Az ülőgumó körüli fájdalomnál különítsd el a hamstring-ín problémájától.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

TENSOR FASCIAE LATAE

Musculus tensor fasciae latae

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A csípő hajlítása, távolítása és befelé forgatása
- A tractus iliotibialis feszítése

EREDÉS

Spina iliaca anterior superior.

TAPADÁS

Tractus iliotibialis.

BEIDEGZÉS

N. gluteus superior (L4–S1).

TRIGGERPONT

A spina iliaca anterior superior alatt és mögött.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A csípő külső oldala
- A comb külső oldala a térdig

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt vagy oldalfekvés
- Lapos tapintás a SIAS alatt

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Csípőfájdalom
- Fájdalom gyors járáskor

KLINIKAI TIPP Futóknál a tractus iliotibialis-szindrómával együtt vizsgáld.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

ILIOPSOAS

Musculus iliopsoas

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A csípő hajlítása
- Az ágyéki gerinc stabilizálása

EREDÉS

Psoas: Th12–L4 csigolyák; iliacus: fossa iliaca.

TAPADÁS

Trochanter minor.

BEIDEGZÉS

Plexus lumbalis (L1–L3), n. femoralis.

TRIGGERPONT

A lágyékban a ligamentum inguinale alatt, valamint a hasfalon át a psoason.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Függőleges sáv a gerinc mentén
- A keresztcsont
- A comb eleje

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, térd hajlítva
- Lassan, kilégzéskor tapints mélyen a hasfalon át
- Kerüld a hasi aortát (pulzus)

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Derékfájás állva, ami fekve enyhül
- Nehéz felegyenesedni ülésből

KLINIKAI TIPP Hosszú ülés rövidíti: tanítsd meg a csípőhajlító nyújtását kitörés-helyzetben.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

PECTINEUS

Musculus pectineus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A comb közelítése és hajlítása

EREDÉS

Pecten ossis pubis.

TAPADÁS

Linea pectinea femoris.

BEIDEGZÉS

N. femoralis (L2–L3), néha n. obturatorius.

TRIGGERPONT

A lágyékhajlat alatt, a comb belső felső részén.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Mélyen a lágyékban

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, a láb kissé távolítva
- Tapints az a. femoralis mellett mediálisan

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Lágyékfájdalom
- Fájdalom keresztbe tett lábbal

KLINIKAI TIPP A lágyékfájdalmat sérv és csípőízületi ok kizárása után vizsgáld izmos eredetre.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

ADDUCTOR LONGUS ÉS BREVIS

Mm. adductores longus et brevis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A comb közelítése
- A csípő hajlításának segítése

EREDÉS

Os pubis.

TAPADÁS

Linea aspera femoris.

BEIDEGZÉS

N. obturatorius (L2–L4).

TRIGGERPONT

A comb belső oldalának felső harmadában.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A lágyék
- A comb belső oldala
- A térd belső oldala és a sípcsont

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, a térd hajlítva és kifelé ejtve
- Csipeszfogás a comb belső oldalán

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Lágyékhúzódás érzése
- Fájdalom lépcsőzéskor

KLINIKAI TIPP Labdarúgóknál gyakori: a fokozatos terhelés és az adduktor-erősítés megelőzi.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

ADDUCTOR MAGNUS

Musculus adductor magnus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A comb közelítése
- A csípő feszítése (hátsó rostok)

EREDÉS

Os pubis ramus inferior és tuber ischiadicum.

TAPADÁS

Linea aspera és tuberculum adductorium.

BEIDEGZÉS

N. obturatorius és n. ischiadicus (L2–L4).

TRIGGERPONT

A comb belső oldalán, középen és fent.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A lágyék
- A comb belső oldala
- Mélyen a medencében

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, a láb távolítva
- Tapints a comb belső-hátsó oldalán

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Belső combfájdalom
- Medencei kellemetlenség

KLINIKAI TIPP A medencén belüli fájdalomnál nőgyógyászati és urológiai okokat zárj ki.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

GRACILIS

Musculus gracilis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A comb közelítése
- A térd hajlítása és befelé forgatása

EREDÉS

Os pubis ramus inferior.

TAPADÁS

Pes anserinus (tibia mediális felszíne).

BEIDEGZÉS

N. obturatorius (L2–L3).

TRIGGERPONT

A comb belső oldalának középső részén.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Égető, felszínes fájdalom a comb belső oldalán

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, a láb távolítva
- Csipeszfogás

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Égő érzés a comb belső oldalán

KLINIKAI TIPP A pes anserinus-bursitistől elkülönítendő: a gracilis fájdalma a combon húzódik végig.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

SARTORIUS (SZABÓIZOM)

Musculus sartorius

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A csípő hajlítása, távolítása és kifelé forgatása
- A térd hajlítása

EREDÉS

Spina iliaca anterior superior.

TAPADÁS

Pes anserinus.

BEIDEGZÉS

N. femoralis (L2–L3).

TRIGGERPONT

Az izom lefutása mentén több helyen.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Szúró, felszínes fájdalom a comb elején ferdén

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés
- Csipeszfogás a ferde lefutás mentén

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Szúró combfájdalom
- Zsibbadás a comb külső oldalán (n. cutaneus femoris lat.)

KLINIKAI TIPP A n. cutaneus femoris lateralis a SIAS közelében halad: a meralgia paraesthetica tüneteit utánozhatja.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

74. KÁRTYA · MEDENCE, CSÍPŐ ÉS FARIZMOK

MEDENCEFENÉK IZMAI

Mm. levator ani et coccygeus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A medencei szervek megtartása
- A kontinencia segítése

EREDÉS

Os pubis, arcus tendineus, spina ischiadica.

TAPADÁS

Os coccygis és ligamentum anococcygeum.

BEIDEGZÉS

Plexus sacralis (S3–S4).

TRIGGERPONT

A farokcsont mellett és a medence belső falán; belső tapintást csak erre képzett szakember végezhet.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A farokcsont
- A keresztcsont alsó része
- Mélyen a medencében

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Külső tapintás a farokcsont mellett
- A belső vizsgálat szakképzett terapeuta feladata

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Farokcsont-fájdalom ülésben
- Medencei nyomásérzés

KLINIKAI TIPP Belső kezelés csak erre képzett medencefenék-terapeuta által. Szakorvosi kivizsgálás javasolt.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

TESTTÁJ

COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ

75–102. kártya · 28 izom

RECTUS FEMORIS

Musculus rectus femoris

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A térd feszítése
- A csípő hajlítása

EREDÉS

Spina iliaca anterior inferior.

TAPADÁS

Patella és tuberositas tibiae (ligamentum patellae).

BEIDEGZÉS

N. femoralis (L2–L4).

TRIGGERPONT

A comb felső részén, a csípőhajlat alatt.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A térdkalács körül és mélyen a térdben

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés
- Lapos tapintás a comb felső elülső részén

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Térdfájdalom lépcsőn lefelé
- Éjszakai térdfájdalom

KLINIKAI TIPP A térd elülső fájdalmánál a forrás gyakran a comb tetején van: tapints feljebb.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

VASTUS MEDIALIS

Musculus vastus medialis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A térd feszítése
- A térdkalács mediális stabilizálása

EREDÉS

Linea aspera mediális ajka.

TAPADÁS

Patella mediális széle és ligamentum patellae.

BEIDEGZÉS

N. femoralis (L2–L4).

TRIGGERPONT

A térdkalács felett mediálisan és a comb középső részén.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A térd belső oldala
- A comb belső-elülső része

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, a térd kissé hajlítva
- Lapos tapintás a térd felett mediálisan

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Térd „kibicsaklása” (buckling)
- Térdfájdalom guggoláskor

KLINIKAI TIPP A „térdbicsaklás” gyakran a vastus medialis triggerpontja miatt alakul ki, nem szalagsérülés miatt.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

77. KÁRTYA · COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ

VASTUS LATERALIS

Musculus vastus lateralis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



Triggerpont (X) · Fő fájdalomzóna · Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A térd feszítése

EREDÉS

Trochanter major, linea aspera laterális ajka.

TAPADÁS

Patella laterális széle és ligamentum patellae.

BEIDEGZÉS

N. femoralis (L2–L4).

TRIGGERPONT

Az izom teljes hosszában a comb külső oldalán.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A comb külső oldala
- A térd külső oldala
- A térdkalács laterális széle

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Oldalfekvés
- Lapos tapintás a comb külső oldalán

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Nem tud az érintett oldalon feküdni
- Térdkalács „beragadása”

KLINIKAI TIPP A térdkalács laterális húzását okozhatja: kezeld a mediális erősítéssel együtt.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

78. KÁRTYA · COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ

VASTUS INTERMEDIUS

Musculus vastus intermedius

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A térd feszítése

EREDÉS

A femur elülső és laterális felszíne.

TAPADÁS

Patella felső széle.

BEIDEGZÉS

N. femoralis (L2–L4).

TRIGGERPONT

Mélyen a rectus femoris alatt, a comb felső részén.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A comb elülső középső része

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés
- A rectus femorist oldalra tolva, mély tapintás

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Nehéz a térd teljes kinyújtása
- Fájdalom felálláskor

KLINIKAI TIPP Mély elhelyezkedése miatt gyakran kimarad a vizsgálatból.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

BICEPS FEMORIS

Musculus biceps femoris

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



Triggerpont (X) · Fő fájdalomzóna · Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A térd hajlítása
- A csípő feszítése (hosszú fej)

EREDÉS

Hosszú fej: tuber ischiadicum; rövid fej: linea aspera.

TAPADÁS

Caput fibulae.

BEIDEGZÉS

N. ischiadicus (L5–S2).

TRIGGERPONT

A comb hátsó-külső oldalának alsó felében.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A térd mögött
- A comb hátsó oldala

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés
- Csipeszfogás a comb hátsó-külső oldalán

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Fájdalom a térd mögött járáskor
- Fájdalom ülés után

KLINIKAI TIPP Hosszú ülésnél a szék széle nyomhatja: ellenőrizd az ülésmagasságot.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

SEMITENDINOSUS ÉS SEMIMEMBRANOSUS

Mm. semitendinosus et semimembranosus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



Triggerpont (X) · Fő fájdalomzóna · Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A térd hajlítása és befelé forgatása
- A csípő feszítése

EREDÉS

Tuber ischiadicum.

TAPADÁS

A tibia mediális felszíne (pes anserinus) és condylus medialis.

BEIDEGZÉS

N. ischiadicus (L5–S2).

TRIGGERPONT

A comb hátsó-belső oldalának alsó felében.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Az alsó farizom
- A comb hátsó oldala
- A térd és a vádli belső oldala

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés
- Csipeszfogás a comb hátsó-belső oldalán

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Ülési fájdalom
- Fájdalom járás közben

KLINIKAI TIPP A combhajlítók gyakran feszesek; a nyújtás mellett az excentrikus erősítés véd a sérüléstől.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

POPLITEUS

Musculus popliteus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A térd „kioldása” a teljes feszítésből (befelé forgatás)
- A térd hátsó stabilizálása

EREDÉS

Condylus lateralis femoris.

TAPADÁS

A tibia hátsó felszíne.

BEIDEGZÉS

N. tibialis (L4–S1).

TRIGGERPONT

A térdhajlat alsó részén, mediálisan a gastrocnemius fejei között.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A térd mögött

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés, a térd kissé hajlítva
- Mély tapintás a térdhajlatban (kerüld az erek nyomását)

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Fájdalom lefelé járáskor
- Fájdalom guggoláskor

KLINIKAI TIPP Baker-cisztát és mélyvénás trombózist zárj ki, ha a térdhajlat duzzadt vagy meleg.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

GASTROCNEMIUS (KÉTFEJŰ LÁBIKRAIZOM)

Musculus gastrocnemius

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



Triggerpont (X) · Fő fájdalomzóna · Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A boka talpi hajlítása
- A térd hajlításának segítése

EREDÉS

Condylus medialis és lateralis femoris.

TAPADÁS

Tuber calcanei (Achilles-ín).

BEIDEGZÉS

N. tibialis (S1–S2).

TRIGGERPONT

Mindkét fejben, a vádli felső részén.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A lábboltozat belső oldala
- A térd mögött
- A vádli

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés
- Csipeszfogás a vádli fejein

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Éjszakai lábikragörcs
- Fájdalom emelkedőn

KLINIKAI TIPP Az éjszakai lábikragörcsök hátterében gyakran triggerpont áll: esti nyújtás javasolt.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

SOLEUS (GÁZLÓIZOM)

Musculus soleus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



Triggerpont (X) · Fő fájdalomzóna · Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A boka talpi hajlítása (különösen hajlított térddel)
- Vénás pumpa

EREDÉS

A fibula feje és a tibia hátsó felszíne.

TAPADÁS

Tuber calcanei (Achilles-ín).

BEIDEGZÉS

N. tibialis (S1–S2).

TRIGGERPONT

A vádli alsó részén az Achilles-ín felett, és magasabban.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A sarok
- A vádli
- Ritkán a SI-ízület

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés, a térd 90°-ban hajlítva
- Csipeszfogás a gastrocnemius alatt

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Sarokfájdalom
- Fájdalom lépcsőzéskor

KLINIKAI TIPP A sarokfájdalom forrása nem mindig a talp: vizsgáld a soleust is.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

PLANTARIS

Musculus plantaris

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A boka talpi hajlításának segítése

EREDÉS

Linea supracondylaris lateralis femoris.

TAPADÁS

Tuber calcanei.

BEIDEGZÉS

N. tibialis (S1–S2).

TRIGGERPONT

A térdhajlatban laterálisan, a gastrocnemius laterális feje mellett.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A térd mögött
- A felső vádli

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés
- Tapints a térdhajlat laterális részén

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Fájdalom a térd mögött

KLINIKAI TIPP Gyakran hiányzik; a térdhajlati fájdalom többi forrását is vizsgáld.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

TIBIALIS ANTERIOR

Musculus tibialis anterior

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A boka háti hajlítása
- A lábfej befelé fordítása (inverzió)

EREDÉS

A tibia laterális felszíne.

TAPADÁS

Os cuneiforme mediale és az I. lábközépcsont.

BEIDEGZÉS

N. peroneus profundus (L4–L5).

TRIGGERPONT

A lábszár elülső felső harmadában, a sípcsont mellett laterálisan.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A boka eleje
- A nagylábujj
- A sípcsont

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés
- Lapos tapintás a sípcsont mellett

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Botlás, „lógó lábfej” érzés
- Sípcsontfájdalom futás után

KLINIKAI TIPP „Shin splints”-nél vizsgáld a tibialis anteriort és a futócipőt is.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

TIBIALIS POSTERIOR

Musculus tibialis posterior

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A lábboltozat megtartása
- A lábfej befelé fordítása

EREDÉS

A tibia és a fibula hátsó felszíne, membrana interossea.

TAPADÁS

Tuberositas ossis navicularis és a talp csontjai.

BEIDEGZÉS

N. tibialis (L4–L5).

TRIGGERPONT

Mélyen a vádli alatt; csak indirekt tapintható.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Az Achilles-ín
- Az egész talp
- A vádli

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés
- Mély, indirekt tapintás a tibia hátsó széle mentén

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Talpfájdalom járáskor
- Lúdtalp

KLINIKAI TIPP Lúdtalp esetén gyakran túlterhelt: a megfelelő cipő és talpbetét fontos.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

PERONEUS LONGUS

Musculus fibularis (peroneus) longus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A lábfej kifelé fordítása (everzió)
- A boka talpi hajlítása
- A lábboltozat megtartása

EREDÉS

Caput fibulae és a fibula laterális felszíne.

TAPADÁS

Az I. lábközépcsont és az os cuneiforme mediale.

BEIDEGZÉS

N. peroneus superficialis (L5–S1).

TRIGGERPONT

A fibula feje alatt 2–3 cm-rel.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A külboka körül és mögött
- A lábfej külső oldala

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Oldalfekvés
- Lapos tapintás a fibula mentén

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Bokainstabilitás érzése
- Bokaficamok után visszatérő fájdalom

KLINIKAI TIPP A n. peroneus a fibula feje körül halad: erős, tartós nyomást ott ne alkalmazz.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

PERONEUS BREVIS

Musculus fibularis (peroneus) brevis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT



○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A lábfej kifelé fordítása
- A boka talpi hajlítása

EREDÉS

A fibula alsó kétharmada.

TAPADÁS

Az V. lábközépcsont tuberositasa.

BEIDEGZÉS

N. peroneus superficialis (L5–S1).

TRIGGERPONT

A lábszár külső oldalának alsó harmadában.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A külboka
- A lábfej külső oldala

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Oldalfekvés
- Lapos tapintás a fibula alsó része mentén

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Bokainstabilitás
- Fájdalom egyenetlen talajon

KLINIKAI TIPP Bokaficam után az erősítés és az egyensúlytréning kulcsfontosságú.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

PERONEUS TERTIUS

Musculus fibularis (peroneus) tertius

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A boka háti hajlítása
- A lábfej kifelé fordítása

EREDÉS

A fibula alsó harmada.

TAPADÁS

Az V. lábközépcsont bázisa (háti oldal).

BEIDEGZÉS

N. peroneus profundus (L5–S1).

TRIGGERPONT

A lábszár elülső-külső oldalának alsó harmadában.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A boka eleje
- A sarok külső oldala

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés
- Lapos tapintás az extensor digitorum longus mellett

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Bokafájdalom elöl

KLINIKAI TIPP Az extensor digitorum longusszal együtt vizsgáld.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

EXTENSOR DIGITORUM LONGUS

Musculus extensor digitorum longus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A 2–5. lábujj feszítése
- A boka háti hajlítása

EREDÉS

Condylus lateralis tibiae, a fibula elülső felszíne.

TAPADÁS

A 2–5. lábujj háti aponeurosisa.

BEIDEGZÉS

N. peroneus profundus (L5–S1).

TRIGGERPONT

A lábszár elülső-külső oldalán, a térd alatt 8 cm-rel.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A lábfej háti oldala
- A középső lábujjak

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés
- Kérd a lábujjak emelését: a köteg kitapintható

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Lábhát-fájdalom
- Lábikragörcsre emlékeztető érzés elöl

KLINIKAI TIPP Szűk cipő és erős fűzés irritálhatja: ellenőrizd a lábbelit.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

EXTENSOR HALLUCIS LONGUS

Musculus extensor hallucis longus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A nagylábujj feszítése
- A boka háti hajlítása

EREDÉS

A fibula középső része.

TAPADÁS

A nagylábujj végperce.

BEIDEGZÉS

N. peroneus profundus (L5–S1).

TRIGGERPONT

A lábszár elülső oldalának középső-alsó részén.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A lábhát
- A nagylábujj

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés
- Kérd a nagylábujj emelését

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Nagylábujj-fájdalom
- Fájdalom futás után

KLINIKAI TIPP A hallux rigidus ízületi okát zárd ki.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

FLEXOR DIGITORUM LONGUS

Musculus flexor digitorum longus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A 2–5. lábujj hajlítása
- A boka talpi hajlítása

EREDÉS

A tibia hátsó felszíne.

TAPADÁS

A 2–5. lábujj végperce.

BEIDEGZÉS

N. tibialis (L5–S2).

TRIGGERPONT

Mélyen a vádli belső oldalán, a tibia mögött.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A talp középső része
- A kisebb lábujjak

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés
- Tapints a tibia mediális széle mögött

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Talpfájdalom járáskor
- Lábujjgörcs

KLINIKAI TIPP Lúdtalpnál gyakran túlterhelt.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

FLEXOR HALLUCIS LONGUS

Musculus flexor hallucis longus

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

Triggerpont (X) · Fő fájdalomzóna · Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A nagylábujj hajlítása
- A lábboltozat megtartása

EREDÉS

A fibula hátsó felszíne.

TAPADÁS

A nagylábujj végperce.

BEIDEGZÉS

N. tibialis (L5–S2).

TRIGGERPONT

Mélyen a vádli alsó részén, laterálisan.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A nagylábujj talpi oldala
- A nagylábujj töve

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés
- Mély tapintás a vádli alsó részén

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Nagylábujj-fájdalom a talpon
- Fájdalom lábujjhegyen

KLINIKAI TIPP Táncosoknál és futóknál gyakran túlterhelt.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

EXTENSOR DIGITORUM BREVIS

Musculus extensor digitorum brevis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A 2–4. lábujj feszítésének segítése

EREDÉS

Calcaneus háti felszíne.

TAPADÁS

A 2–4. lábujj extensor ínjai.

BEIDEGZÉS

N. peroneus profundus (L5–S1).

TRIGGERPONT

A lábháton, a külboka előtt.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Helyi fájdalom a lábháton

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés
- Lapos tapintás a külboka előtt

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Lábhát-fájdalom cipőben

KLINIKAI TIPP Szoros cipőnyelv nyomhatja: lazább fűzés segíthet.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

ABDUCTOR HALLUCIS

Musculus abductor hallucis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A nagylábujj távolítása
- A belső lábboltozat megtartása

EREDÉS

Tuber calcanei (mediális nyúlvány).

TAPADÁS

A nagylábujj alapperce (mediális).

BEIDEGZÉS

N. plantaris medialis (S1–S2).

TRIGGERPONT

A lábfej belső szélén, a sarok előtt.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A sarok belső oldala
- A belső lábboltozat

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés, a láb kifelé fordítva
- Lapos tapintás a belső talpszélen

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Fájdalom járáskor a talp belső oldalán

KLINIKAI TIPP A tarsalis alagút közelében halad: zsibbadásnál vizsgáld a n. tibialist is.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

FLEXOR DIGITORUM BREVIS

Musculus flexor digitorum brevis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A 2–5. lábujj hajlítása
- A lábboltozat megtartása

EREDÉS

Tuber calcanei.

TAPADÁS

A 2–5. lábujj középperce.

BEIDEGZÉS

N. plantaris medialis (S1–S2).

TRIGGERPONT

A talp közepén, a plantaris fascia alatt.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A lábközépcsontok fejei (talppárna)

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés
- Mély tapintás a talp közepén

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Talppárna-fájdalom
- Fájdalom hosszú állás után

KLINIKAI TIPP A talpi fascia gyulladásától különítsd el.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

QUADRATUS PLANTAE

Musculus quadratus plantae

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A flexor digitorum longus húzásirányának korrigálása

EREDÉS

Calcaneus talpi felszíne.

TAPADÁS

A flexor digitorum longus ínja.

BEIDEGZÉS

N. plantaris lateralis (S1–S2).

TRIGGERPONT

Mélyen a sarok előtt, a talp közepén.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A sarok talpi oldala

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés
- Mély tapintás a sarok előtt

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Sarokfájdalom reggel

KLINIKAI TIPP Sarokfájdalomnál (sarkantyú) a quadratus plantae is hozzájárulhat a tünetekhez.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

ABDUCTOR DIGITI MINIMI (LÁB)

Musculus abductor digiti minimi pedis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A kislábujj távolítása és hajlítása

EREDÉS

Tuber calcanei.

TAPADÁS

A kislábujj alapperce.

BEIDEGZÉS

N. plantaris lateralis (S1–S2).

TRIGGERPONT

A talp külső szélén.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A talp külső széle
- Az V. lábközépcsont feje

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Oldalfekvés
- Csipeszfogás a talp külső szélén

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Fájdalom a talp külső oldalán

KLINIKAI TIPP Szűk cipő a külső talpszélt nyomhatja.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

99. KÁRTYA · COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ

A LÁB INTEROSSEUS IZMAI

Mm. interossei pedis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A lábujjak terpesztése és közelítése
- Az alapízületek stabilizálása

EREDÉS

A lábközépcsontok oldalfelszíne.

TAPADÁS

A lábujjak alapperce.

BEIDEGZÉS

N. plantaris lateralis (S1–S2).

TRIGGERPONT

A lábközépcsontok között, a háti és a talpi oldalon.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A lábujjak oldala
- A lábközépcsontok környéke

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Tapints a lábközépcsontok között

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Lábujjfájdalom
- Zsibbadás az ujjak között

KLINIKAI TIPP A Morton-neuromától (zsibbadás az ujjak között) különítsd el.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

ADDUCTOR HALLUCIS

Musculus adductor hallucis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A nagylábujj közelítése
- A harántboltozat megtartása

EREDÉS

A 2–4. lábközépcsont bázisa és a lábujjak ízületi tokjai.

TAPADÁS

A nagylábujj alapperce (laterális).

BEIDEGZÉS

N. plantaris lateralis (S1–S2).

TRIGGERPONT

Mélyen a talppárna alatt.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A talppárna a lábközépcsontok fejei alatt

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés
- Mély tapintás a talppárnán

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Talppárna-fájdalom
- Fájdalom magas sarkú cipőben

KLINIKAI TIPP Harántsüllyedésnél gyakran túlterhelt; a lábujjtorna (törölközőgyűrés) segít.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

EXTENSOR HALLUCIS BREVIS

Musculus extensor hallucis brevis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A nagylábujj alapízületének feszítése

EREDÉS

Calcaneus háti felszíne.

TAPADÁS

A nagylábujj alapperce.

BEIDEGZÉS

N. peroneus profundus (L5–S1).

TRIGGERPONT

A lábháton, az extensor digitorum brevis mellett mediálisan.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- A lábhát a nagylábujj töve felett

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hanyatt fekvés
- Lapos tapintás a lábháton

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Lábhát-fájdalom a nagylábujj felett

KLINIKAI TIPP Gyakran az extensor digitorum brevisszel együtt érintett.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.

FLEXOR HALLUCIS BREVIS

Musculus flexor hallucis brevis

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM ÉS TRIGGERPONT

○ Triggerpont (X) ● Fő fájdalomzóna ● Kiterjedt zóna

FUNKCIÓ

- A nagylábujj alapízületének hajlítása
- A belső boltozat megtartása

EREDÉS

Os cuboideum és os cuneiforme laterale.

TAPADÁS

A nagylábujj alapperce (szezámcsontokon át).

BEIDEGZÉS

N. plantaris medialis (S1–S2).

TRIGGERPONT

A talp belső oldalán, az I. lábközépcsont alatt.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM

- Az I. lábközépcsont feje
- A nagylábujj

A TRIGGERPONT TAPINTÁSA

- Hasonfekvés
- Tapints az I. lábközépcsont alatt

KÍSÉRŐ JELEK ÉS TÜNETEK

- Fájdalom elrugaszkodáskor

KLINIKAI TIPP A szezámcsontok gyulladásától (sesamoiditis) különítsd el.

Oktatási célú referenciaanyag. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szakképzett terapeuta személyes vizsgálatát.