YANSIYAN AĞRI · BAŞIN ARKASI VE BOYUN

Enseniz veya boynunuz mu ağrıyor?

> *Ağrının kaynağı çoğu zaman onu hissettiğiniz yerde değildir. Bu kaslar ağrıyı buraya yansıtabilir:*

Trapezius – üst lifler

Nerede: Omuz kuşağının üstünde, boyun ile akromion arasındaki mesafenin ortasında, üst serbest kenarda.

Sternocleidomastoideus (SCM)

Nerede: Kas karnı boyunca, özellikle sternal ve klaviküler bölümlerde; en hassas yer orta üçte birdir.

Splenius cervicis

Nerede: Boynun alt kısmında, kürek kemiğinin üst açısının üstünde, levator scapulaenin yanında.

Suboksipital kaslar

Nerede: Doğrudan oksiput kemiğinin altında, orta hattın iki yanında, derinde.

Semispinalis capitis

Nerede: Ensede, orta hattan 2–3 cm uzakta, oksiputun altında ve boynun ortasında.

Sizin şikâyetinize hangi kasın yol açtığını terapistinize sorun. Tetik Nokta Atlası · eğitim amaçlı görseldir, tıbbi muayenenin yerini tutmaz.

YANSIYAN AĞRI · BAŞ: ALIN, ŞAKAK, TEPE

Başınız mı ağrıyor?

> *Ağrının kaynağı çoğu zaman onu hissettiğiniz yerde değildir. Bu kaslar ağrıyı buraya yansıtabilir:*

Trapezius – üst lifler

Nerede: Omuz kuşağının üstünde, boyun ile akromion arasındaki mesafenin ortasında, üst serbest kenarda.

Sternocleidomastoideus (SCM)

Nerede: Kas karnı boyunca, özellikle sternal ve klaviküler bölümlerde; en hassas yer orta üçte birdir.

Masseter (çiğneme kası)

Nerede: Yüzeyel tabakada arcus zygomaticusun altında ve alt çene açısının üstünde; derin tabakada çene ekleminin önünde.

Temporalis (şakak kası)

Nerede: Arcus zygomaticusun üstünde dört bölgede, önden arkaya; çiğneme sırasında kolayca palpe edilir.

Splenius capitis

Nerede: Boynun arka yan kısmında, SCM ile trapezius arasında, oksiputun yaklaşık 2–3 parmak altında.

Sizin şikâyetinize hangi kasın yol açtığını terapistinize sorun. Tetik Nokta Atlası · eğitim amaçlı görseldir, tıbbi muayenenin yerini tutmaz.

YANSIYAN AĞRI · YÜZ, DİŞLER VE ÇENE

Dişleriniz veya çeneniz mi ağrıyor?

> *Ağrının kaynağı çoğu zaman onu hissettiğiniz yerde değildir. Bu kaslar ağrıyı buraya yansıtabilir:*

Trapezius – üst lifler

Nerede: Omuz kuşağının üstünde, boyun ile akromion arasındaki mesafenin ortasında, üst serbest kenarda.

Sternocleidomastoideus (SCM)

Nerede: Kas karnı boyunca, özellikle sternal ve klaviküler bölümlerde; en hassas yer orta üçte birdir.

Masseter (çiğneme kası)

Nerede: Yüzeyel tabakada arcus zygomaticusun altında ve alt çene açısının üstünde; derin tabakada çene ekleminin önünde.

Temporalis (şakak kası)

Nerede: Arcus zygomaticusun üstünde dört bölgede, önden arkaya; çiğneme sırasında kolayca palpe edilir.

Pterygoideus lateralis

Nerede: Arcus zygomaticusun derininde; ağız içinden üst azı dişlerinin arkasında, yukarı ve geriye doğru.

Sizin şikâyetinize hangi kasın yol açtığını terapistinize sorun. Tetik Nokta Atlası · eğitim amaçlı görseldir, tıbbi muayenenin yerini tutmaz.

YANSIYAN AĞRI · OMZUN ÖNÜ VE GÖĞÜS

Omzunuzun önü mü ağrıyor?

> *Ağrının kaynağı çoğu zaman onu hissettiğiniz yerde değildir. Bu kaslar ağrıyı buraya yansıtabilir:*

Skalen kaslar

Nerede: Boynun yanında, SCM'nin arkasında ve altında, köprücük kemiğinin üstünde.

Infraspinatus

Nerede: Kürek kemiğinin arka yüzünde, spina scapulaenin altında, fossa infraspinatanın orta ve üst kısmında.

Pectoralis major (büyük göğüs kası)

Nerede: Göğüs kasının dış kenarında (ön koltuk altı kıvrımı), köprücük kemiğinin altında ve göğüs kemiğinin yanında.

Pectoralis minor (küçük göğüs kası)

Nerede: Processus coracoideusun altında, 3.–5. kaburgaların üstünde, pectoralis majorun derininde.

Biceps brachii

Nerede: Kolun ön yüzünün orta üçte birinde, her iki başta.

Sizin şikâyetinize hangi kasın yol açtığını terapistinize sorun. Tetik Nokta Atlası · eğitim amaçlı görseldir, tıbbi muayenenin yerini tutmaz.

YANSIYAN AĞRI · OMZUN ARKASI VE KÜREK KEMİĞİ

Kürek kemiğiniz veya omzunuzun arkası mı ağrıyor?

> *Ağrının kaynağı çoğu zaman onu hissettiğiniz yerde değildir. Bu kaslar ağrıyı buraya yansıtabilir:*

Levator scapulae (kürek kemiği kaldırıcı kas)

Nerede: Kürek kemiğinin üst açısının hafifçe içinde ve üstünde; boynun yanında trapeziusun üst kenarının altında derinde.

Skalen kaslar

Nerede: Boynun yanında, SCM'nin arkasında ve altında, köprücük kemiğinin üstünde.

Supraspinatus

Nerede: Spina scapulaenin üstünde, fossa supraspinatanın iç kısmında ve dışta akromionun altında.

Teres minor

Nerede: Kürek kemiğinin dış kenarında, infraspinatusun altında, arka koltuk altı kıvrımının üstünde.

Subscapularis

Nerede: Kürek kemiğinin ön yüzünde, koltuk altından, kürek kemiğinin dış kenarı boyunca ulaşılır.

Sizin şikâyetinize hangi kasın yol açtığını terapistinize sorun. Tetik Nokta Atlası · eğitim amaçlı görseldir, tıbbi muayenenin yerini tutmaz.

YANSIYAN AĞRI · KOL VE DİRSEK

Dirseğiniz veya kolunuz mu ağrıyor?

> *Ağrının kaynağı çoğu zaman onu hissettiğiniz yerde değildir. Bu kaslar ağrıyı buraya yansıtabilir:*

Skalen kaslar

Nerede: Boynun yanında, SCM'nin arkasında ve altında, köprücük kemiğinin üstünde.

Infraspinatus

Nerede: Kürek kemiğinin arka yüzünde, spina scapulaenin altında, fossa infraspinatanın orta ve üst kısmında.

Supraspinatus

Nerede: Spina scapulaenin üstünde, fossa supraspinatanın iç kısmında ve dışta akromionun altında.

Teres minor

Nerede: Kürek kemiğinin dış kenarında, infraspinatusun altında, arka koltuk altı kıvrımının üstünde.

Subscapularis

Nerede: Kürek kemiğinin ön yüzünde, koltuk altından, kürek kemiğinin dış kenarı boyunca ulaşılır.

Sizin şikâyetinize hangi kasın yol açtığını terapistinize sorun. Tetik Nokta Atlası · eğitim amaçlı görseldir, tıbbi muayenenin yerini tutmaz.

YANSIYAN AĞRI · ÖN KOL, EL BİLEĞİ VE EL

El bileğiniz veya eliniz mi ağrıyor?

> *Ağrının kaynağı çoğu zaman onu hissettiğiniz yerde değildir. Bu kaslar ağrıyı buraya yansıtabilir:*

Skalen kaslar

Nerede: Boynun yanında, SCM'nin arkasında ve altında, köprücük kemiğinin üstünde.

Infraspinatus

Nerede: Kürek kemiğinin arka yüzünde, spina scapulaenin altında, fossa infraspinatanın orta ve üst kısmında.

Subscapularis

Nerede: Kürek kemiğinin ön yüzünde, koltuk altından, kürek kemiğinin dış kenarı boyunca ulaşılır.

Pectoralis minor (küçük göğüs kası)

Nerede: Processus coracoideusun altında, 3.–5. kaburgaların üstünde, pectoralis majorun derininde.

Latissimus dorsi

Nerede: Arka koltuk altı kıvrımında, kürek kemiğinin alt açısı hizasında.

Sizin şikâyetinize hangi kasın yol açtığını terapistinize sorun. Tetik Nokta Atlası · eğitim amaçlı görseldir, tıbbi muayenenin yerini tutmaz.

YANSIYAN AĞRI · SIRTIN ORTASI VE KARIN

Sırtınızın ortası mı ağrıyor?

> *Ağrının kaynağı çoğu zaman onu hissettiğiniz yerde değildir. Bu kaslar ağrıyı buraya yansıtabilir:*

Serratus anterior

Nerede: Göğsün yanında, koltuk altının altında, 5.–6. kaburga hizasında.

Trapezius – orta lifler

Nerede: Kürek kemiğinin iç kenarı ile omurga arasında, spina scapulae hizasında, yüzeyde.

Iliocostalis thoracis

Nerede: Omurgadan yaklaşık 5–8 cm uzakta, orta ve alt torakal bölgede.

Iliocostalis lumborum

Nerede: Bel bölgesinde, omurgadan yaklaşık 5–7 cm uzakta, alt kaburgaların altında.

Multifidus

Nerede: Dikensi çıkıntıların hemen yanında, derinde, omurganın herhangi bir bölgesinde (en sık lomber).

Sizin şikâyetinize hangi kasın yol açtığını terapistinize sorun. Tetik Nokta Atlası · eğitim amaçlı görseldir, tıbbi muayenenin yerini tutmaz.

YANSIYAN AĞRI · GLUTEAL BÖLGE, KALÇA VE KASIK

Kalçanız mı ağrıyor?

> *Ağrının kaynağı çoğu zaman onu hissettiğiniz yerde değildir. Bu kaslar ağrıyı buraya yansıtabilir:*

Iliocostalis lumborum

Nerede: Bel bölgesinde, omurgadan yaklaşık 5–7 cm uzakta, alt kaburgaların altında.

Longissimus thoracis

Nerede: Omurgadan 2–4 cm uzakta, alt torakal ve üst lomber bölgede.

Quadratus lumborum

Nerede: Son kaburga ile iliak kanat arasında, erector spinaenin dış kenarında, derinde.

Gluteus maximus

Nerede: Gluteal bölgenin alt iç kısmında, sakrumun yanında ve oturma kemiğinin (tuber ischiadicum) üstünde.

Gluteus medius

Nerede: İliak kanadın 2–5 cm altında, gluteal bölgenin üst dış kısmında.

Sizin şikâyetinize hangi kasın yol açtığını terapistinize sorun. Tetik Nokta Atlası · eğitim amaçlı görseldir, tıbbi muayenenin yerini tutmaz.

YANSIYAN AĞRI · BEL VE SAKRUM

Beliniz mi ağrıyor?

> *Ağrının kaynağı çoğu zaman onu hissettiğiniz yerde değildir. Bu kaslar ağrıyı buraya yansıtabilir:*

Iliocostalis lumborum

Nerede: Bel bölgesinde, omurgadan yaklaşık 5–7 cm uzakta, alt kaburgaların altında.

Longissimus thoracis

Nerede: Omurgadan 2–4 cm uzakta, alt torakal ve üst lomber bölgede.

Multifidus

Nerede: Dikensi çıkıntıların hemen yanında, derinde, omurganın herhangi bir bölgesinde (en sık lomber).

Quadratus lumborum

Nerede: Son kaburga ile iliak kanat arasında, erector spinaenin dış kenarında, derinde.

Rectus abdominis (düz karın kası)

Nerede: Göbeğin üstünde ve altında, orta hattan 2–4 cm uzakta.

Sizin şikâyetinize hangi kasın yol açtığını terapistinize sorun. Tetik Nokta Atlası · eğitim amaçlı görseldir, tıbbi muayenenin yerini tutmaz.

YANSIYAN AĞRI · UYLUK VE DİZ

Diziniz veya uyluğunuz mu ağrıyor?

> *Ağrının kaynağı çoğu zaman onu hissettiğiniz yerde değildir. Bu kaslar ağrıyı buraya yansıtabilir:*

Gluteus minimus

Nerede: Gluteus mediusun derininde, iliak kanat ile trochanter major arasında.

Piriformis

Nerede: Sakrumun dış kenarı ile trochanter majorun tepesi arasındaki çizginin orta ve dış üçte birinde.

Iliopsoas

Nerede: Uyluğun ön yüzünde kasık bağının altında (a. femoralisin dışında) ve karında iliak kemiğin iç yüzünde.

Tensor fasciae latae

Nerede: Kalçanın ön dış kısmında, spina iliaca anterior superiorun altında.

Adductor longus ve brevis

Nerede: Uyluğun iç yüzünde, üst üçte birde.

Sizin şikâyetinize hangi kasın yol açtığını terapistinize sorun. Tetik Nokta Atlası · eğitim amaçlı görseldir, tıbbi muayenenin yerini tutmaz.

YANSIYAN AĞRI · BACAK, AYAK BİLEĞİ VE AYAK

Topuğunuz veya ayak tabanınız mı ağrıyor?

> *Ağrının kaynağı çoğu zaman onu hissettiğiniz yerde değildir. Bu kaslar ağrıyı buraya yansıtabilir:*

Gluteus minimus

Nerede: Gluteus mediusun derininde, iliak kanat ile trochanter major arasında.

Gastrocnemius (baldır kası)

Nerede: Baldırın üst kısmında, iç ve dış başta, diz arkası çukurunun altında.

Soleus

Nerede: Baldırın alt kısmında, gastrocnemiusun derininde, Aşil tendonunun üstünde.

Tibialis anterior

Nerede: Kaval kemiğinin hemen dışında, bacağın üst üçte birinde.

Peroneus longus

Nerede: Bacağın dış yüzünde, üst üçte birde, fibula başının 2–4 cm altında.

Sizin şikâyetinize hangi kasın yol açtığını terapistinize sorun. Tetik Nokta Atlası · eğitim amaçlı görseldir, tıbbi muayenenin yerini tutmaz.