HASTA EVDE DE DEVAM EDİYOR™

Şikâyete Göre 4 Haftalık Öz Bakım Planları

Sık görülen 10 şikâyetin her biri için, seansın sonunda hastanın eline verebileceğiniz dört haftalık bir ev planı.

Tetik Nokta Atlası · Sağlık profesyonelleri ve öğrenciler için eğitim materyalidir. Tıbbi teşhisin yerini tutmaz.

İçindekiler

1 · Hasta için

2 · 10 plan

Sonraki adım

BÖLÜM 1

Hasta için

Plan nasıl kullanılır.

Önemli

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

BÖLÜM 2

10 plan

Üç egzersiz, dört hafta, her gün için bir öneri.

Gerilim tipi baş ağrısı

1. **Trapezius – üst lifler:** Dik oturun, ağrıyan taraftaki elinizle sandalyenin altından tutunun ve boynunuzun yanında hafif bir gerilme hissedene kadar başınızı yavaşça diğer tarafa eğin. 30 saniye tutun, 3 kez, günde iki kez.

2. **Suboksipital kaslar:** Sırtüstü uzanın, ensenizin altına bir çorabın içinde iki tenis topu koyun ve 2 dakika üzerlerinde dinlenin. Ardından çenenizi yavaşça 10 kez geriye çekin.

3. **Temporalis (şakak kası):** Baş ağrısının başladığını hissettiğinizde, derin nefes alarak iki taraftaki şakaklarınıza 1 dakika boyunca yavaş dairesel hareketlerle masaj yapın.

HAFTA	NE YAPMALI
1. hafta · Tanışma	Günde 1 kez ilk egzersiz. Ağrının ne zaman arttığını gözlemleyin.
2. hafta · Düzenlilik	Günde 2 kez ilk iki egzersiz ve günlük önerinin hayata geçirilmesi.
3. hafta · Tam program	Günde 2 kez üç egzersizin tamamı.
4. hafta · Sürdürme	Günde 1 kez üç egzersizin tamamı ve en çok neyin yardımcı olduğunu not edin.

> **Her gün**
>
> Ekran göz hizasında, her saat 1 dakika mola, akşam gevşeme.

Boyun ağrısı ve tutulması

1. **Levator scapulae (kürek kemiği kaldırıcı kas):** Başınızı diğer tarafa çevirin ve aşağıya, koltuk altınıza doğru bakın. Ağrıyan taraftaki elinizi ensenize koyun. 30 saniye tutun, 3 kez, günde iki kez.

2. **Trapezius – üst lifler:** Dik oturun, ağrıyan taraftaki elinizle sandalyenin altından tutunun ve boynunuzun yanında hafif bir gerilme hissedene kadar başınızı yavaşça diğer tarafa eğin. 30 saniye tutun, 3 kez, günde iki kez.

3. **Splenius cervicis:** Saatte bir kez çenenizi düz bir şekilde geriye çekin (çift çene yapar gibi) ve 5 saniye tutun. 5 kez.

HAFTA	NE YAPMALI
1. hafta · Tanışma	Günde 1 kez ilk egzersiz. Ağrının ne zaman arttığını gözlemleyin.
2. hafta · Düzenlilik	Günde 2 kez ilk iki egzersiz ve günlük önerinin hayata geçirilmesi.
3. hafta · Tam program	Günde 2 kez üç egzersizin tamamı.
4. hafta · Sürdürme	Günde 1 kez üç egzersizin tamamı ve en çok neyin yardımcı olduğunu not edin.

> **Her gün**
> Daha alçak yastık, telefonu omuz ile kulak arasında tutmamak.

Çene ve yüz ağrısı

1. **Masseter (çiğneme kası):** Parmak uçlarınızla kulak memesinin önündeki ve altındaki yanak bölgesine 1 dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yapın. Gün içinde dikkat edin: dişlerinizi sıkıyorsanız gevşetin, diliniz damağınızda dinlensin.
2. **Temporalis (şakak kası):** Baş ağrısının başladığını hissettiğinizde, derin nefes alarak iki taraftaki şakaklarınıza 1 dakika boyunca yavaş dairesel hareketlerle masaj yapın.
3. **Pterygoideus medialis:** Gün içinde birkaç kez kontrol edin: dişleriniz birbirine değmiyor, dudaklarınız kapalı, çeneniz serbest.

HAFTA	NE YAPMALI
1. hafta · Tanışma	Günde 1 kez ilk egzersiz. Ağrının ne zaman arttığını gözlemleyin.
2. hafta · Düzenlilik	Günde 2 kez ilk iki egzersiz ve günlük önerinin hayata geçirilmesi.
3. hafta · Tam program	Günde 2 kez üç egzersizin tamamı.
4. hafta · Sürdürme	Günde 1 kez üç egzersizin tamamı ve en çok neyin yardımcı olduğunu not edin.

> **Her gün**
> Diş sıkmayı fark etmek, sakızdan kaçınmak.

Omuz ağrısı

1. **Infraspinatus:** Ağrıyan kolunuzu göğsünüzün önünden diğer omzunuza doğru uzatın, diğer elinizle dirseğinizden tutup nazikçe çekin. 30 saniye, 3 kez.
2. **Supraspinatus:** Kolunuzu serbestçe sarkıtın ve sarkaç gibi öne ve arkaya küçük daireler çizin, 1 dakika. Günde iki kez.
3. **Pectoralis minor (küçük göğüs kası):** Oturarak kürek kemiklerinizi, arka cebinize sokmak ister gibi geriye ve aşağıya çekin. 5 saniye tutun, 10 kez.

HAFTA	NE YAPMALI
1. hafta · Tanışma	Günde 1 kez ilk egzersiz. Ağrının ne zaman arttığını gözlemleyin.
2. hafta · Düzenlilik	Günde 2 kez ilk iki egzersiz ve günlük önerinin hayata geçirilmesi.
3. hafta · Tam program	Günde 2 kez üç egzersizin tamamı.
4. hafta · Sürdürme	Günde 1 kez üç egzersizin tamamı ve en çok neyin yardımcı olduğunu not edin.

> **Her gün**
> Ağrıyan tarafın üzerine yatmayın, kolun altına yastık.

Dirsek ve ön kol ağrısı

1. **Ön kol ekstansörleri (ECRL, ECRB, extensor digitorum):** Kolunuzu avucunuz aşağı bakacak şekilde öne uzatın ve diğer elinizle bileğinizi ve parmaklarınızı aşağı doğru bükün. 30 saniye, 3 kez.
2. **Ön kol fleksörleri:** Kolunuzu avucunuz yukarı bakacak şekilde uzatın ve diğer elinizle parmaklarınızı aşağıya ve geriye çekin. 30 saniye, 3 kez.
3. **Triceps brachii:** Kolunuzu başınızın üstüne kaldırın, dirseğinizi bükün ve diğer elinizle nazikçe geriye itin. 30 saniye, 3 kez.

HAFTA	NE YAPMALI
1. hafta · Tanışma	Günde 1 kez ilk egzersiz. Ağrının ne zaman arttığını gözlemleyin.
2. hafta · Düzenlilik	Günde 2 kez ilk iki egzersiz ve günlük önerinin hayata geçirilmesi.
3. hafta · Tam program	Günde 2 kez üç egzersizin tamamı.

HAFTA	NE YAPMALI
4. hafta · Sürdürme	Günde 1 kez üç egzersizin tamamı ve en çok neyin yardımcı olduğunu not edin.

> **Her gün**
> Çalışırken her saat ön kol germesi, daha gevşek kavrayış.

Kürek kemikleri arasında ağrı

1. **Rhomboid kaslar:** Üşüyormuş gibi kendinize sarılın ve kürek kemiklerinizin arasında gerilme hissedene kadar sırtınızı kamburlaştırın. 30 saniye, 3 kez.
2. **Trapezius – orta lifler:** Kendinize sarılın ve sırtınızı kamburlaştırın. 30 saniye, 3 kez. Ardından kürek kemiklerinizi 10 kez geriye çekin.
3. **Pectoralis major (büyük göğüs kası):** Kapı aralığında durun, ön kolunuzu omuz hizasında kapı kasasına dayayın ve göğsünüzde gerilme hissedene kadar yavaşça öne adım atın. 30 saniye, 3 kez.

HAFTA	NE YAPMALI
1. hafta · Tanışma	Günde 1 kez ilk egzersiz. Ağrının ne zaman arttığını gözlemleyin.
2. hafta · Düzenlilik	Günde 2 kez ilk iki egzersiz ve günlük önerinin hayata geçirilmesi.
3. hafta · Tam program	Günde 2 kez üç egzersizin tamamı.
4. hafta · Sürdürme	Günde 1 kez üç egzersizin tamamı ve en çok neyin yardımcı olduğunu not edin.

> **Her gün**
> Dik oturuş, her saat kürek kemiklerini geriye çekme.

Bel ağrısı

1. **Quadratus lumborum:** Ayakta kolunuzu başınızın üstüne kaldırın ve leğeniniz yerinde kalırken yavaşça diğer tarafa eğilin. 30 saniye, 3 kez.
2. **Iliopsoas:** Bir dizinizin üzerine çökün, diğer ayağınız önünüzde. Arkadaki uyluğunuzun ön yüzünde gerilme hissedene kadar leğeninizi yavaşça öne itin. 30 saniye, 3 kez.

3. **Multifidus:** Dört ayak üzerinde bir kolunuzu öne, karşı bacağınızı geriye uzatın ve 5 saniye tutun. Her tarafa 10 kez.

HAFTA	NE YAPMALI
1. hafta · Tanışma	Günde 1 kez ilk egzersiz. Ağrının ne zaman arttığını gözlemleyin.
2. hafta · Düzenlilik	Günde 2 kez ilk iki egzersiz ve günlük önerinin hayata geçirilmesi.
3. hafta · Tam program	Günde 2 kez üç egzersizin tamamı.
4. hafta · Sürdürme	Günde 1 kez üç egzersizin tamamı ve en çok neyin yardımcı olduğunu not edin.

> **Her gün**
> Her saat ayağa kalkın, dizlerden kaldırın.

Gluteal bölgeden uyluğa yayılan ağrı

1. **Piriformis:** Sırtüstü uzanın, ağrıyan bacağınızın ayak bileğini diğer dizinizin üstüne koyun ve diğer uyluğunuzu göğsünüze çekin. 30 saniye, 3 kez.
2. **Gluteus minimus:** Sırtüstü uzanın, ağrıyan bacağınızın ayak bileğini diğer dizinizin üstüne koyun ve diğer uyluğunuzu göğsünüze çekin. 30 saniye, 3 kez.
3. **Gluteus medius:** Ayakta ağrıyan bacağınızı diğerinin arkasından çaprazlayın ve gerilme hissedene kadar leğeninizi yana itin. 30 saniye, 3 kez.

HAFTA	NE YAPMALI
1. hafta · Tanışma	Günde 1 kez ilk egzersiz. Ağrının ne zaman arttığını gözlemleyin.
2. hafta · Düzenlilik	Günde 2 kez ilk iki egzersiz ve günlük önerinin hayata geçirilmesi.
3. hafta · Tam program	Günde 2 kez üç egzersizin tamamı.
4. hafta · Sürdürme	Günde 1 kez üç egzersizin tamamı ve en çok neyin yardımcı olduğunu not edin.

> **Her gün**
> Cüzdanı arka cepte taşımayın, bacak bacak üstüne atmayın.

Diz ağrısı

1. **Rectus femoris:** Ayakta bir yere tutunun, ayak bileğinizden tutup topuğunuzu kalçanıza çekin, dizleriniz yan yana. 30 saniye, 3 kez.
2. **Vastus medialis:** Bir sandalyeye oturun, dizinizi yavaşça düzleştirin, 5 saniye tutun ve indirin. Her bacağa 10 kez.
3. **Vastus lateralis:** Ayakta ayak bileğinizden tutun ve topuğunuzu kalçanıza çekin. 30 saniye, 3 kez.

HAFTA	NE YAPMALI
1. hafta · Tanışma	Günde 1 kez ilk egzersiz. Ağrının ne zaman arttığını gözlemleyin.
2. hafta · Düzenlilik	Günde 2 kez ilk iki egzersiz ve günlük önerinin hayata geçirilmesi.
3. hafta · Tam program	Günde 2 kez üç egzersizin tamamı.
4. hafta · Sürdürme	Günde 1 kez üç egzersizin tamamı ve en çok neyin yardımcı olduğunu not edin.

> **Her gün**
> Merdivenlerde yavaş, yükü kademeli artırmak.

Topuk ve ayak tabanı ağrısı

1. **Soleus:** Duvarın önünde durun, ağrıyan bacağınızı geriye alın, dizinizi hafifçe bükün, topuğunuz yerde kalsın. 30 saniye, 3 kez.
2. **Gastrocnemius (baldır kası):** Duvarın önünde durun, ağrıyan bacağınızı dizi düz ve topuğu yerde olacak şekilde geriye alın ve duvara yaslanın. 30 saniye, 3 kez.
3. **Flexor digitorum brevis:** Oturarak ayak tabanınızın altında bir tenis topunu 2 dakika boyunca yavaşça ileri geri yuvarlayın. Günde bir kez.

HAFTA	NE YAPMALI
1. hafta · Tanışma	Günde 1 kez ilk egzersiz. Ağrının ne zaman arttığını gözlemleyin.
2. hafta · Düzenlilik	Günde 2 kez ilk iki egzersiz ve günlük önerinin hayata geçirilmesi.
3. hafta · Tam program	Günde 2 kez üç egzersizin tamamı.
4. hafta · Sürdürme	Günde 1 kez üç egzersizin tamamı ve en çok neyin yardımcı olduğunu not edin.

Her gün

Rahat ayakkabı, akşam ayak tabanına topla masaj.

Sonraki adım

Terapist için: bir sonraki hastanızda şikâyetine uyan planı yazdırın ve 4. haftanın sonuna bir kontrol planlayın.