Ev Egzersizi

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Trapezius – üst lifler**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: şakak, başın yanı, boynun yanı, kulak arkası, alt çene açısı.

Egzersiz

Dik oturun, ağrıyan taraftaki elinizle sandalyenin altından tutunun ve boynunuzun yanında hafif bir gerilme hissedene kadar başınızı yavaşça diğer tarafa eğin. 30 saniye tutun, 3 kez, günde iki kez.

Günlük hayatta

Günde iki kez yana eğme germesi; ekran göz hizasında; telefonu kulak ile omuz arasında tutmamak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Sternocleidomastoideus (SCM)**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: alın, göz çevresi, yanak, kulağın derini, başın tepesi, başın arkası.

Egzersiz

Oturarak omuzlarınızı gevşetin ve başınızı rahat ettiğiniz kadar yavaşça sağa, sonra sola çevirin. Her yöne 10 kez, günde iki kez. Başınız dönerse durun.

Günlük hayatta

Başın yavaşça sallanması ve döndürülmesi; yatarak televizyon izlemekten ve başı yükseltilmiş hâlde okumaktan kaçınmak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

BAŞ, YÜZ VE BOYUN · MASSETER (ÇİĞNEME KASI)

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Masseter (çiğneme kası)**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: üst ve alt azı dişleri, alt çene, kaş, kulağın derini.

Egzersiz

Parmak uçlarınızla kulak memesinin önündeki ve altındaki yanak bölgesine 1 dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yapın. Gün içinde dikkat edin: dişlerinizi sıkıyorsanız gevşetin, diliniz damağınızda dinlensin.

Günlük hayatta

Günlük dairesel hareketlerle öz masaj; sakızdan kaçınmak; gün içinde diş sıkmayı fark etmek.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

BAŞ, YÜZ VE BOYUN · TEMPORALİS (ŞAKAK KASI)

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Temporalis (şakak kası)**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: şakak, kaş, göz arkası, üst dişler, başın yanı.

Egzersiz

Baş ağrısının başladığını hissettiğinizde, derin nefes alarak iki taraftaki şakaklarınıza 1 dakika boyunca yavaş dairesel hareketlerle masaj yapın.

Günlük hayatta

Baş ağrısının başında şakaklara öz masaj; gece diş gıcırdatmayı takip etmek.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Pterygoideus lateralis**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: çene eklemi, yanak (sinüs üstü).

Egzersiz

Aynanın karşısında ağzınızı yavaşça ve düz bir çizgide açın, çeneniz yana kaymasın. 10 kez, günde iki kez.

Günlük hayatta

Sert ve büyük lokmalardan kaçınmak; ağzı bilinçli olarak yavaşça ve düz bir çizgide açmak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Pterygoideus medialis**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: dil kökü, boğaz, kulak altı, çene eklemi.

Egzersiz

Gün içinde birkaç kez kontrol edin: dişleriniz birbirine değmiyor, dudaklarınız kapalı, çeneniz serbest.

Günlük hayatta

Sıkılı dişleri bilinçli olarak gevşetmek; ağrılı günlerde yumuşak gıdalar.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

BAŞ, YÜZ VE BOYUN · SPLENİUS CAPİTİS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Splenius capitis**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: başın tepesi.

Egzersiz

Oturarak çenenizi göğsünüze doğru eğin ve ensenizde hafif bir gerilme hissedene kadar hafifçe diğer tarafa çevirin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Uzun süre yukarı bakmaktan kaçınmak (boya yapmak, rafa dizmek); uygun yükseklikte yastık.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

BAŞ, YÜZ VE BOYUN · SPLENİUS CERVİCİS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Splenius cervicis**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: göz arkası, başın arkası, boyun-omuz geçişi.

Egzersiz

Saatte bir kez çenenizi düz bir şekilde geriye çekin (çift çene yapar gibi) ve 5 saniye tutun. 5 kez.

Günlük hayatta

Öne kaymış baş duruşunun düzeltilmesi; her saat hareket molası.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

BAŞ, YÜZ VE BOYUN · SUBOKSİPİTAL KASLAR

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Suboksipital kaslar**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: başın yanı, göz arkası, alın, başın arkası.

Egzersiz

Sırtüstü uzanın, ensenizin altına bir çorabın içinde iki tenis topu koyun ve 2 dakika üzerlerinde dinlenin. Ardından çenenizi yavaşça 10 kez geriye çekin.

Günlük hayatta

Günde 10 kez çene geri çekme; ekran göz hizasında; her saat kısa mola.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

BAŞ, YÜZ VE BOYUN · SEMİSPİNALİS CAPİTİS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Semispinalis capitis**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: başın yanı, şakak, alın, başın arkası.

Egzersiz

Oturarak ellerinizi ensenize koyun ve kollarınızın ağırlığının başınızı yavaşça öne eğmesine izin verin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Öne kaymış baş duruşundan kaçınmak; okurken kitap göz hizasında.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

BAŞ, YÜZ VE BOYUN · LEVATOR SCAPULAE (KÜREK KEMİĞİ KALDIRICI KAS)

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Levator scapulae (kürek kemiği kaldırıcı kas)**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: boyun-omuz geçişi, kürek kemiğinin iç kenarı, omzun arkası.

Egzersiz

Başınızı diğer tarafa çevirin ve aşağıya, koltuk altınıza doğru bakın. Ağrıyan taraftaki elinizi ensenize koyun. 30 saniye tutun, 3 kez, günde iki kez.

Günlük hayatta

Aynı germe günde iki kez; yüksek yastıktan ve çalışırken başı yana çevirmekten kaçınmak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Skalen kaslar**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: göğsün önü, kol, kürek kemiğinin iç kenarı, el (başparmak ve işaret parmağı).

Egzersiz

Sırtüstü uzanın, elinizi karnınıza koyun ve nefes alırken omuzlarınız değil karnınız yükselecek şekilde nefes alın. Günde 5 dakika.

Günlük hayatta

Karın (diyafram) nefesi alıştırması; ağır çantayı omuzda taşımamak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL · INFRASPİNATUS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Infraspinatus**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: omzun önü (derinde), kolun ön dış yüzü, ön kol, elin başparmak tarafı.

Egzersiz

Ağrıyan kolunuzu göğsünüzün önünden diğer omzunuza doğru uzatın, diğer elinizle dirseğinizden tutup nazikçe çekin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Ağrıyan tarafın üzerine yatmamak; yan yatarken kolun altına yastık koymak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Supraspinatus**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: omzun yanı (deltoid bölgesi), kolun dış yüzü, dirseğin dış yüzü.

Egzersiz

Kolunuzu serbestçe sarkıtın ve sarkaç gibi öne ve arkaya küçük daireler çizin, 1 dakika. Günde iki kez.

Günlük hayatta

Ağır nesneleri baş üstüne kaldırmaktan kaçınmak; her gün omuz çevirme.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL · TERES MİNOR

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Teres minor**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: omzun arkası (nokta şeklinde), kolun arka yüzü.

Egzersiz

Ağrıyan kolunuzu göğsünüzün önünden uzatın, diğer elinizle dirseğinden nazikçe tutun. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Infraspinatusta olduğu gibi; kol baş üstündeyken uyumamak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL · SUBSCAPULARİS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Subscapularis**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: omzun arkası, kürek kemiği, kolun arka yüzü, el bileği.

Egzersiz

Kapı aralığında durun, dirseğiniz bükülü, avucunuz kapı kasasında. Omzunuzun önünde hafif bir gerilme hissedene kadar yavaşça kolunuzdan uzağa dönün. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Dış rotasyon alıştırması; kol uzun süre gövdeye yapışık kalmamalı.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL · DELTOİDEUS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Deltoideus**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: omuz (noktanın çevresi), kol.

Egzersiz

Omzunuzun dış kısmına parmaklarınızla 1 dakika dairesel masaj yapın, ardından kolunuzu 30 saniye göğsünüzün önünden çaprazlayın.

Günlük hayatta

Tekrarlayan kaldırma işlerinde molalar.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL · PECTORALİS MAJOR (BÜYÜK GÖĞÜS KASI)

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Pectoralis major (büyük göğüs kası)**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: göğsün önü, omzun önü, kolun iç yüzü, meme bölgesi.

Egzersiz

Kapı aralığında durun, ön kolunuzu omuz hizasında kapı kasasına dayayın ve göğsünüzde gerilme hissedene kadar yavaşça öne adım atın. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Kambur duruşun düzeltilmesi; omuzlar geriye ve aşağıya.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL · PECTORALİS MİNOR (KÜÇÜK GÖĞÜS KASI)

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Pectoralis minor (küçük göğüs kası)**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: omzun önü, göğüs, kolun iç yüzü, elin serçe parmak tarafı.

Egzersiz

Oturarak kürek kemiklerinizi, arka cebinize sokmak ister gibi geriye ve aşağıya çekin. 5 saniye tutun, 10 kez.

Günlük hayatta

Öne kaymış omzun düzeltilmesi; sırt kaslarının güçlendirilmesi.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL · RHOMBOİD KASLAR

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Rhomboid kaslar**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: kürek kemiğinin iç kenarı, kürek kemikleri arası.

Egzersiz

Üşüyormuş gibi kendinize sarılın ve kürek kemiklerinizin arasında gerilme hissedene kadar sırtınızı kamburlaştırın. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Göğüs kasının gerilmesi (rhomboidler çoğu zaman uzamış ve zayıftır).

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL · SERRATUS ANTERİOR

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Serratus anterior**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: göğsün yanı, kürek kemiğinin alt açısı, kolun iç yüzü.

Egzersiz

Sırtüstü uzanın, kolunuzu başınızın üstüne kaldırın ve kaburgalarınızın arasına doğru beş kez yavaş ve derin nefes alın.

Günlük hayatta

Öksürük ve yoğun koşu sonrasında sık görülür: yükü kademeli artırmak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL · LATİSSİMUS DORSİ

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Latissimus dorsi**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: kürek kemiğinin alt açısı, kolun arka iç yüzü, yüzük ve serçe parmak.

Egzersiz

Ayakta kolunuzu başınızın üstüne kaldırın ve yanınızda gerilme hissedene kadar yavaşça diğer tarafa eğilin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Barfiks ve çekme hareketlerinden sonra germe.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL · BİCEPS BRACHİİ

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Biceps brachii**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: omzun önü, dirsek çukuru.

Egzersiz

Dirseğiniz düz olacak şekilde avucunuzu arkanızdaki masanın kenarına koyun ve kolunuzun ön yüzünde gerilme hissedene kadar yavaşça dönün. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Bükülü dirsekle ağır nesne taşımaktan kaçınmak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL · TRİCEPS BRACHİİ

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Triceps brachii**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: omzun arkası, dirseğin dış yüzü, ön kolun arka yüzü.

Egzersiz

Kolunuzu başınızın üstüne kaldırın, dirseğinizi bükün ve diğer elinizle nazikçe geriye itin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Koltuk değneğiyle yürürken ve şınav çekerken molalar.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL · ÖN KOL EKSTANSÖRLERİ (ECRL, ECRB, EXTENSOR DİGİTORUM)

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Ön kol ekstansörleri (ECRL, ECRB, extensor digitorum)**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: dirseğin dış yüzü, ön kolun arka yüzü, el sırtı, parmaklar.

Egzersiz

Kolunuzu avucunuz aşağı bakacak şekilde öne uzatın ve diğer elinizle bileğinizi ve parmaklarınızı aşağı doğru bükün. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Fare kullanırken ve vida sıkarken molalar; kavrayışı gevşetmek.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Ön kol fleksörleri**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: el bileğinin avuç tarafı, avuç içi, parmakların avuç tarafı.

Egzersiz

Kolunuzu avucunuz yukarı bakacak şekilde uzatın ve diğer elinizle parmaklarınızı aşağıya ve geriye çekin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

El işlerinde (bahçe, montaj) molalar; kavrayışı gevşetmek.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Trapezius – orta lifler**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: kürek kemikleri arası, omurganın yanında yanma.

Egzersiz

Kendinize sarılın ve sırtınızı kamburlaştırın. 30 saniye, 3 kez. Ardından kürek kemiklerinizi 10 kez geriye çekin.

Günlük hayatta

Kambur oturuşun düzeltilmesi; göğüs kasının gerilmesi.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

SIRT, OMURGA VE GÖVDE · TRAPEZİUS – ALT LİFLER

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Trapezius – alt lifler**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: boynun arkası, akromion, kürek kemikleri arası.

Egzersiz

Yüzüstü uzanın, alnınız bir havlunun üzerinde. Kollarınızı yavaşça Y şeklinde kaldırın ve 3 saniye tutun. 10 kez.

Günlük hayatta

Güçlendirme: yüzüstü yatarak kolları Y şeklinde kaldırma.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

SIRT, OMURGA VE GÖVDE · SERRATUS POSTERİOR SUPERİOR

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Serratus posterior superior**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: kürek kemiğinin altında derinde, omzun arkası, kolun arka yüzü, serçe parmak.

Egzersiz

Oturarak elinizi karnınıza koyun ve karnınız yükselecek şekilde yavaşça nefes alın. Günde 5 dakika.

Günlük hayatta

Üst göğüs (hızlı) nefesi yerine karın nefesi.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

SIRT, OMURGA VE GÖVDE · ILİOCOSTALİS THORACİS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Iliocostalis thoracis**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: sırtın ortası, karın (bazen), kürek kemiğinin altı.

Egzersiz

Sandalyenin kenarına oturun ve kollarınız bacaklarınızın arasında sarkacak şekilde yavaşça öne eğilin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Uzun oturmalarda hareket molaları.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

SIRT, OMURGA VE GÖVDE · İLİOCOSTALİS LUMBORUM

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Iliocostalis lumborum**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: bel, gluteal bölge, alt karın.

Egzersiz

Sırtüstü uzanın, iki dizinizi göğsünüze çekin ve onlara sarılın. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Dizlerden ve düz sırtla kaldırmak; uzun oturmaları bölmek.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

SIRT, OMURGA VE GÖVDE · LONGİSSİMUS THORACİS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Longissimus thoracis**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: gluteal bölge, bel, iliak kanat.

Egzersiz

Dört ayak üzerinde sırtınızı kamburlaştırın (kedi) ve ardından yavaşça çukurlaştırın (inek). 10 kez.

Günlük hayatta

Masa başı işi her saat bölmek.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

SIRT, OMURGA VE GÖVDE · MULTİFİDUS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Multifidus**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: omurganın yanında nokta şeklinde, sakrum, karın (nadiren).

Egzersiz

Dört ayak üzerinde bir kolunuzu öne, karşı bacağınızı geriye uzatın ve 5 saniye tutun. Her tarafa 10 kez.

Günlük hayatta

Derin stabilizasyon sisteminin aktivasyonu (karın kaslarını kasmadan karnı içe çekmek).

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

SIRT, OMURGA VE GÖVDE · QUADRATUS LUMBORUM

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Quadratus lumborum**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: iliak kanat, gluteal bölge, kalçanın yanı, bel.

Egzersiz

Ayakta kolunuzu başınızın üstüne kaldırın ve leğeniniz yerinde kalırken yavaşça diğer tarafa eğilin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Tek ayak üzerinde durmaktan ve çantayı tek tarafta taşımaktan kaçınmak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

SIRT, OMURGA VE GÖVDE · RECTUS ABDOMİNİS (DÜZ KARIN KASI)

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Rectus abdominis (düz karın kası)**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: sırtın ortasında yatay bant, karın, bel.

Egzersiz

Yüzüstü uzanın, dirseklerinize dayanın ve karnınızın serbestçe gerilmesine izin verin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Aşırı karın kası çalışmasından sonra germe.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

SIRT, OMURGA VE GÖVDE · OBLİQUUS EXTERNUS ABDOMİNİS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Obliquus externus abdominis**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: karnın yanı, bel, göğsün alt kısmı.

Egzersiz

Sırtüstü uzanın, dizlerinizi bükün ve omuzlarınız yerde kalırken ikisini birden yavaşça bir yana indirin. Her tarafa 30 saniye.

Günlük hayatta

Rotasyon hareketlerinde yükü kademeli artırmak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

PELVİS, KALÇA VE GLUTEAL BÖLGE · GLUTEUS MAXİMUS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Gluteus maximus**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: gluteal bölge, sakrum, kuyruk sokumu çevresi.

Egzersiz

Sırtüstü uzanın ve iki elinizle bir dizinizi karşı omzunuza doğru çekin. Her tarafa 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Uzun oturmaları bölmek; sert sandalyede minder kullanmak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Gluteus medius**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: belin alt kısmı, sakrum, kalçanın yanı, gluteal bölge.

Egzersiz

Ayakta ağrıyan bacağınızı diğerinin arkasından çaprazlayın ve gerilme hissedene kadar leğeninizi yana itin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Tek ayak üzerinde durmaktan ve bacak bacak üstüne atmaktan kaçınmak; kalça abdüktörlerini güçlendirmek.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

PELVİS, KALÇA VE GLUTEAL BÖLGE · GLUTEUS MİNİMUS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Gluteus minimus**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: uyluğun dış yüzü, bacağın dış yüzü, uyluğun arka yüzü, ayak bileği.

Egzersiz

Sırtüstü uzanın, ağrıyan bacağınızın ayak bileğini diğer dizinizin üstüne koyun ve diğer uyluğunuzu göğsünüze çekin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Uzun araba yolculuklarını ve oturmaları bölmek.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Piriformis**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: gluteal bölge, sakrum, uyluğun arka yüzü, kalça ekleminin arkası.

Egzersiz

Sırtüstü uzanın, ağrıyan bacağınızın ayak bileğini diğer dizinizin üstüne koyun ve diğer uyluğunuzu göğsünüze çekin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Cüzdanın üzerine oturmamak; bacak bacak üstüne atmaktan kaçınmak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Iliopsoas**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: omurganın yanında bel, sakrum, uyluğun ön yüzü.

Egzersiz

Bir dizinizin üzerine çökün, diğer ayağınız önünüzde. Arkadaki uyluğunuzun ön yüzünde gerilme hissedene kadar leğeninizi yavaşça öne itin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Uzun oturmadan sonra hamle pozisyonunda germe.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

PELVİS, KALÇA VE GLUTEAL BÖLGE · TENSOR FASCİAE LATAE

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Tensor fasciae latae**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: uyluğun dış yüzü, dizin dış yüzü.

Egzersiz

Ayakta ağrıyan bacağınızı diğerinin arkasından çaprazlayın ve diğer tarafa eğilin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Otururken uylukları çok fazla bükmemek.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

PELVİS, KALÇA VE GLUTEAL BÖLGE · ADDUCTOR LONGUS VE BREVİS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Adductor longus ve brevis**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: kasık, uyluğun iç yüzü, dizin iç yüzü.

Egzersiz

Oturun, ayak tabanlarınızı birleştirin ve dizlerinizi yavaşça aşağıya indirin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Ani yana hareketlerden önce ısınma.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

PELVİS, KALÇA VE GLUTEAL BÖLGE · ADDUCTOR MAGNUS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Adductor magnus**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: kasık, uyluğun iç yüzü, pelvisin derini.

Egzersiz

Bacaklarınızı açarak oturun ve sırtınız düz olacak şekilde yavaşça öne eğilin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Yükü kademeli artırmak, ısınmak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Pectineus**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: kasığın derini, uyluğun iç ön yüzü.

Egzersiz

Oturun, ayak tabanlarınızı birleştirin ve dizlerinizi yavaşça aşağıya indirin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Otururken uylukları birbirine bastırmamak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

PELVİS, KALÇA VE GLUTEAL BÖLGE · SARTORİUS (TERZİ KASI)

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Sartorius (terzi kası)**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: uyluğun ön yüzü (yanma, batma hissi), dizin iç yüzü.

Egzersiz

Bir dizinizin üzerine çökün ve leğeninizi yavaşça öne itin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Uzun süre bağdaş kurarak oturmaktan kaçınmak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Rectus femoris**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: dizin önü, diz kapağı çevresi.

Egzersiz

Ayakta bir yere tutunun, ayak bileğinizden tutup topuğunuzu kalçanıza çekin, dizleriniz yan yana. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Merdiven çıkarken ve çömelirken yükü kademeli artırmak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

UYLUK, BACAK VE AYAK · VASTUS MEDİALİS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Vastus medialis**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: dizin iç yüzü, dizin önü.

Egzersiz

Bir sandalyeye oturun, dizinizi yavaşça düzleştirin, 5 saniye tutun ve indirin. Her bacağa 10 kez.

Günlük hayatta

Güçlendirme: otururak dizi düzleştirip bekletme.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

UYLUK, BACAK VE AYAK · VASTUS LATERALİS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Vastus lateralis**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: uyluğun dış yüzü, dizin dış yüzü, diz kapağının arkası.

Egzersiz

Ayakta ayak bileğinizden tutun ve topuğunuzu kalçanıza çekin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Ağrıyan tarafın üzerine yan yatmamak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

UYLUK, BACAK VE AYAK · BİCEPS FEMORİS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Biceps femoris**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: diz arkası çukuru, uyluğun arka yüzü.

Egzersiz

Sandalyenin kenarına oturun, bir bacağınızı topuğunuz yerde olacak şekilde uzatın ve sırtınız düz olarak öne eğilin. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Uzun oturmalarda sandalyenin kenarı uyluğa baskı yapmamalı.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Semitendinosus ve semimembranosus**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: gluteal bölgenin alt kısmı, uyluğun arka yüzü, diz arkası çukurunun iç tarafı.

Egzersiz

Sırtüstü uzanın, ayak tabanınızın altına bir havlu koyun ve uyluğunuzun arkasında gerilme hissedene kadar düz bacağınızı yavaşça kaldırın. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Koşudan önce ısınma.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

UYLUK, BACAK VE AYAK · GASTROCNEMİUS (BALDIR KASI)

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Gastrocnemius (baldır kası)**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: ayak kemeri, baldır, diz arkası çukuru.

Egzersiz

Duvarın önünde durun, ağrıyan bacağınızı dizi düz ve topuğu yerde olacak şekilde geriye alın ve duvara yaslanın. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Gece kramplarında akşam germesi; yeterli sıvı.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

UYLUK, BACAK VE AYAK · SOLEUS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Soleus**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: topuk, baldır, sakrum (nadiren).

Egzersiz

Duvarın önünde durun, ağrıyan bacağınızı geriye alın, dizinizi hafifçe bükün, topuğunuz yerde kalsın. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Yüksek topuklu ayakkabılardan kaçınmak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

UYLUK, BACAK VE AYAK · TİBİALİS ANTERİOR

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Tibialis anterior**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: ayak bileğinin önü, ayak başparmağı.

Egzersiz

Oturarak ayağınızı, ayak sırtınız yere değecek şekilde kalçanızın altına alın. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Koşu yükünü kademeli artırmak; sert zeminde daha az koşmak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

UYLUK, BACAK VE AYAK · PERONEUS LONGUS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Peroneus longus**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: dış malleol, ayağın dış yüzü.

Egzersiz

Tek ayak üzerinde 30 saniye durun, gerekirse bir yere tutunun. Her ayağa günde 3 kez.

Günlük hayatta

Tek ayak üzerinde ayak bileği stabilizasyon egzersizleri.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

UYLUK, BACAK VE AYAK · TİBİALİS POSTERİOR

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Tibialis posterior**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: Aşil tendonu, topuk, ayak tabanı.

Egzersiz

Oturarak ayağınızın altına bir havlu koyun ve parmaklarınızla onu kademeli olarak kendinize doğru çekin. 1 dakika.

Günlük hayatta

Uygun kemer desteği; düz tabanlıkta uzman.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

UYLUK, BACAK VE AYAK · EXTENSOR DİGİTORUM LONGUS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Extensor digitorum longus**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: ayak sırtı, orta ayak parmakları.

Egzersiz

Oturarak ayak sırtınızda gerilme hissedene kadar parmaklarınızı ve ayağınızı aşağıya bükün. 30 saniye, 3 kez.

Günlük hayatta

Dar ayakkabılardan kaçınmak.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

UYLUK, BACAK VE AYAK · FLEXOR DİGİTORUM BREVİS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Flexor digitorum brevis**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: ayak tabanının ortası, ayak parmaklarının kökü.

Egzersiz

Oturarak ayak tabanınızın altında bir tenis topunu 2 dakika boyunca yavaşça ileri geri yuvarlayın. Günde bir kez.

Günlük hayatta

Uygun ayakkabı; ayak tabanına topla masaj.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

UYLUK, BACAK VE AYAK · ABDUCTOR HALLUCİS

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Abductor hallucis**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: topuğun iç yüzü, kemerin iç kenarı.

Egzersiz

Oturarak ayak başparmağınızı diğer parmaklardan uzaklaştırmaya çalışın ve 5 saniye tutun. 10 kez.

Günlük hayatta

Burnu daha geniş ayakkabı; ayak başparmağını güçlendirme.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.

Ev Egzersizi

UYLUK, BACAK VE AYAK · QUADRATUS PLANTAE

Bu sayfayı neden aldınız?

Ağrınızın bir kısmı şu kastan kaynaklanıyor olabilir: **Quadratus plantae**. Bu kas ağrıyı çoğu zaman şuraya yansıtır: topuğun taban yüzü.

Egzersiz

Oturarak ayak tabanınızın altında donmuş bir su şişesini 2 dakika, özellikle topuğun önünde yuvarlayın.

Günlük hayatta

Ayak tabanına topla masaj, rahat ayakkabı.

Egzersizi yaptığınızda işaretleyin

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hafta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terapistinizin notu

Bu sayfayı size terapistiniz verdi. Tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Ağrı artarsa ya da uyuşma veya güçsüzlük olursa egzersizi bırakın ve terapistinize ya da doktorunuza haber verin.