BULURSUNUZ, NE YAPACAĞINIZI BİLİRSİNİZ™

En Sık Görülen 10 Şikâyet İçin Protokoller

Hastaların çoğunun geldiği şikâyetler ve başlamak için uygun kas sırası. Ayrıntılı teknik 60 protokolde.

Tetik Nokta Atlası · Sağlık profesyonelleri ve öğrenciler için eğitim materyalidir. Tıbbi teşhisin yerini tutmaz.

İçindekiler

1 · Nasıl kullanılır

2 · 10 şikâyet

Sonraki adım

BÖLÜM 1

Nasıl kullanılır

Şikâyet → sıralı kaslar → protokol.

1. Sorun ve hastanın ağrıyan yeri işaretlemesini isteyin (Hızlı Kas Değerlendirme Formlarını kullanın).
2. «Önce dışlayın» bölümünde yazanları dışlayın.
3. Kasları verilen sırayla değerlendirin ve şikâyeti yeniden üreten kası tedavi edin.
4. Ev germesi verin ve bir sonraki seansta değişikliği kontrol edin.

BÖLÜM 2

10 şikâyet

Her biri için: sıralı kaslar ve önce dışlanması gerekenler.

1. Gerilim tipi baş ağrısı

SIRA	KAS	NEREDE ARANIR
1	Trapezius – üst lifler	Omuz kuşağının üstünde, boyun ile akromion arasındaki mesafenin ortasında, üst serbest kenarda.
2	Suboksipital kaslar	Doğrudan oksiput kemiğinin altında, orta hattın iki yanında, derinde.
3	Sternocleidomastoideus (SCM)	Kas karnı boyunca, özellikle sternal ve klaviküler bölümlerde; en hassas yer orta üçte birdir.
4	Temporalis (şakak kası)	Arcus zygomaticusun üstünde dört bölgede, önden arkaya; çiğneme sırasında kolayca palpe edilir.
5	Semispinalis capitis	Ensede, orta hattan 2–3 cm uzakta, oksiputun altında ve boynun ortasında.

Önce dışlayın

Ani, hayatının en şiddetli baş ağrısı, ateş ve ense sertliği, görme bozukluğu, konuşma bozukluğu, güçsüzlük: hemen doktora.

2. Boyun ağrısı ve tutulması

SIRA	KAS	NEREDE ARANIR
1	Levator scapulae (kürek kemiği kaldırıcı kas)	Kürek kemiğinin üst açısının hafifçe içinde ve üstünde; boynun yanında trapeziusun üst kenarının altında derinde.
2	Trapezius – üst lifler	Omuz kuşağının üstünde, boyun ile akromion arasındaki mesafenin ortasında, üst serbest kenarda.
3	Splenius cervicis	Boynun alt kısmında, kürek kemiğinin üst açısının üstünde, levator scapulaenin yanında.

SIRA	KAS	NEREDE ARANIR
4	Skalen kaslar	Boynun yanında, SCM'nin arkasında ve altında, köprücük kemiğinin üstünde.
5	Semispinalis capitis	Ensede, orta hattan 2–3 cm uzakta, oksiputun altında ve boynun ortasında.

> **Önce dışlayın**
> Travma sonrası boyun ağrısı, kola yayılan uyuşma veya güçsüzlük: tıbbi muayene.

3. Çene ve yüz ağrısı

SIRA	KAS	NEREDE ARANIR
1	Masseter (çiğneme kası)	Yüzeyel tabakada arcus zygomaticusun altında ve alt çene açısının üstünde; derin tabakada çene ekleminin önünde.
2	Temporalis (şakak kası)	Arcus zygomaticusun üstünde dört bölgede, önden arkaya; çiğneme sırasında kolayca palpe edilir.
3	Pterygoideus lateralis	Arcus zygomaticusun derininde; ağız içinden üst azı dişlerinin arkasında, yukarı ve geriye doğru.
4	Pterygoideus medialis	Alt çene açısının iç yüzünde, aşağıdan palpasyon; ağız içinden son azı dişinin arkasında.
5	Sternocleidomastoideus (SCM)	Kas karnı boyunca, özellikle sternal ve klaviküler bölümlerde; en hassas yer orta üçte birdir.

> **Önce dışlayın**
> Dişsel neden, iltihap, takılan çene: diş hekimi veya çene cerrahı.

4. Kolu kaldırırken omuz ağrısı

SIRA	KAS	NEREDE ARANIR
1	Infraspinatus	Kürek kemiğinin arka yüzünde, spina scapulaenin altında, fossa infraspinatanın orta ve üst kısmında.
2	Supraspinatus	Spina scapulaenin üstünde, fossa supraspinatanın iç kısmında ve dışta akromionun altında.

SIRA	KAS	NEREDE ARANIR
3	Subscapularis	Kürek kemiğinin ön yüzünde, koltuk altından, kürek kemiğinin dış kenarı boyunca ulaşılır.
4	Deltoideus	Ön, orta ve arka liflerde, akromionun 2–5 cm altında.
5	Pectoralis minor (küçük göğüs kası)	Processus coracoideusun altında, 3.–5. kaburgaların üstünde, pectoralis majorun derininde.

> **Önce dışlayın**
> Travma sonrası güçsüz kol, geçmeyen gece ağrısı: tıbbi muayene (rotator manşet).

5. Tenisçi dirseğine benzer şikâyetler

SIRA	KAS	NEREDE ARANIR
1	Ön kol ekstansörleri (ECRL, ECRB, extensor digitorum)	Ön kolun arka dış yüzünde, dirseğin 3–6 cm altında.
2	Triceps brachii	Kolun arka yüzünde, uzun başta koltuk altının altında ve dirseğin 4–6 cm üstünde.
3	Supraspinatus	Spina scapulaenin üstünde, fossa supraspinatanın iç kısmında ve dışta akromionun altında.
4	Skalen kaslar	Boynun yanında, SCM'nin arkasında ve altında, köprücük kemiğinin üstünde.

> **Önce dışlayın**
> Şişlik, ısı artışı, parmaklarda gece uyuşması: tıbbi muayene.

6. Kürek kemikleri arasında ağrı

SIRA	KAS	NEREDE ARANIR
1	Rhomboid kaslar	Kürek kemiğinin iç kenarı ile omurga arasında, trapeziusun altında.
2	Trapezius – orta lifler	Kürek kemiğinin iç kenarı ile omurga arasında, spina scapulae hizasında, yüzeyde.

SIRA	KAS	NEREDE ARANIR
3	Serratus posterior superior	Kürek kemiğinin üst kısmının altında, omurganın yanında; kürek kemiği yana çekildiğinde ulaşılır.
4	Skalen kaslar	Boynun yanında, SCM'nin arkasında ve altında, köprücük kemiğinin üstünde.
5	Levator scapulae (kürek kemiği kaldırıcı kas)	Kürek kemiğinin üst açısının hafifçe içinde ve üstünde; boynun yanında trapeziusun üst kenarının altında derinde.

> **Önce dışlayın**
>
> Eforla gelen göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme: hemen doktora (kalp).

7. Bel ağrısı

SIRA	KAS	NEREDE ARANIR
1	Quadratus lumborum	Son kaburga ile iliak kanat arasında, erector spinaenin dış kenarında, derinde.
2	Iliocostalis lumborum	Bel bölgesinde, omurgadan yaklaşık 5–7 cm uzakta, alt kaburgaların altında.
3	Multifidus	Dikensi çıkıntıların hemen yanında, derinde, omurganın herhangi bir bölgesinde (en sık lomber).
4	Iliopsoas	Uyluğun ön yüzünde kasık bağının altında (a. femoralisin dışında) ve karında iliak kemiğin iç yüzünde.
5	Gluteus medius	İliak kanadın 2–5 cm altında, gluteal bölgenin üst dış kısmında.

> **Önce dışlayın**
>
> Bacağa yayılan uyuşma veya güçsüzlük, idrar veya dışkılama bozukluğu, ateş, kilo kaybı: hemen doktora.

8. Gluteal bölgeden uyluğa yayılan ağrı

SIRA	KAS	NEREDE ARANIR
1	Gluteus minimus	Gluteus mediusun derininde, iliak kanat ile trochanter major arasında.

SIRA	KAS	NEREDE ARANIR
2	Piriformis	Sakrumun dış kenarı ile trochanter majorun tepesi arasındaki çizginin orta ve dış üçte birinde.
3	Gluteus medius	İliak kanadın 2–5 cm altında, gluteal bölgenin üst dış kısmında.
4	Quadratus lumborum	Son kaburga ile iliak kanat arasında, erector spinaenin dış kenarında, derinde.

> **Önce dışlayın**
>
> Uyuşma, güçsüzlük, refleks değişikliği (sinir kökü kaynaklı): tıbbi muayene.

9. Diz ağrısı

SIRA	KAS	NEREDE ARANIR
1	Rectus femoris	Uyluğun ön yüzünde, kalçanın hemen altında, spina iliaca anterior inferiorun yakınında.
2	Vastus medialis	Uyluğun iç ön yüzünde, dizin 5–10 cm üstünde.
3	Vastus lateralis	Uyluğun dış yüzünde, kalça ile diz arasındaki birkaç noktada.
4	Biceps femoris	Uyluğun arka dış yüzünde, orta ve alt üçte birde.
5	Adductor longus ve brevis	Uyluğun iç yüzünde, üst üçte birde.

> **Önce dışlayın**
>
> Şişlik, ısı artışı, takılma, boşalma, travma: tıbbi muayene.

10. Topuk ve ayak tabanı ağrısı

SIRA	KAS	NEREDE ARANIR
1	Soleus	Baldırın alt kısmında, gastrocnemiusun derininde, Aşil tendonunun üstünde.
2	Gastrocnemius (baldır kası)	Baldırın üst kısmında, iç ve dış başta, diz arkası çukurunun altında.

SIRA	KAS	NEREDE ARANIR
3	Quadratus plantae	Ayak tabanının arka kısmında, derinde, topuk kemiğinin hemen önünde.
4	Flexor digitorum brevis	Ayak tabanının ortasında, topuğun önünde.
5	Abductor hallucis	Ayak tabanının iç kenarında, topuk ile başparmak kökü arasında.
6	Tibialis posterior	Baldırın derininde, kaval kemiğinin iç arka kenarının arkasında.

Önce dışlayın

Baldırda tek taraflı şişlik (tromboz), gece ağrısı, uyuşma: tıbbi muayene.

Sonraki adım

Bu hafta: sonraki üç hastanızın hangi şikâyete girdiğini belirleyin ve sırayı izleyin.