BULURSUNUZ, NE YAPACAĞINIZI BİLİRSİNİZ™

Vücut Bölgelerine Göre Germe Rehberi

60 kasın tamamının germesi tek yerde, vücut bölgelerine göre, atlas ve protokollerle aynı sırada.

Tetik Nokta Atlası · Sağlık profesyonelleri ve öğrenciler için eğitim materyalidir. Tıbbi teşhisin yerini tutmaz.

İçindekiler

1 · Nasıl germe yapılır

2 · Baş, yüz ve boyun

3 · Omuz, kol, ön kol ve el

4 · Sırt, omurga ve gövde

5 · Pelvis, kalça ve gluteal bölge

6 · Uyluk, bacak ve ayak

Sonraki adım

BÖLÜM 1

Nasıl germe yapılır

Her germe için üç kural.

Kurallar

- [ ] Germeye yavaşça, nefes verirken ve yaylanmadan girin.
- [ ] Hafif bir gerilme olmalı, asla ağrı değil: ağrıyorsa gevşetin.
- [ ] 20–30 saniye tutun, 3 tekrar; uygulamadan sonra her zaman germe yapın.

BÖLÜM 2

Baş, yüz ve boyun

Terapist ve hasta için.

Trapezius – üst lifler

Baş hafif fleksiyonla karşı tarafa eğilir; oturur pozisyonda hasta aynı taraftaki eliyle sandalyenin altından tutunur.

3 × 20–30 sn

Sternocleidomastoideus (SCM)

Baş karşı tarafa eğilir, ardından çene yavaşça tedavi edilen tarafa döndürülür; hafif ekstansiyon yalnızca baş dönmesi yapmıyorsa.

3 × 20–30 sn

Masseter (çiğneme kası)

Dil ucu damakta iken ağzın yavaşça açılması; terapistin iki parmağı çeneyi nazikçe aşağı doğru yönlendirir.

3 × 20–30 sn

Temporalis (şakak kası)

Terapistin parmakları şakakta yukarı doğru kayarken ağzın yavaşça açılması.

3 × 20–30 sn

Pterygoideus lateralis

Alt çenenin yavaş retraksiyonu (hasta çenesini hafifçe geriye çeker), ardından ağzın yavaşça kapanması.

3 × 20–30 sn

Pterygoideus medialis

Çene hafifçe karşı tarafa kaydırılmışken ağzın yavaşça açılması.

3 × 20–30 sn

Splenius capitis

Baş fleksiyonda ve karşı tarafa dönük.

3 × 20–30 sn

Splenius cervicis

Baş fleksiyonda, karşı tarafa yana eğik ve dönük.

3 × 20–30 sn

Suboksipital kaslar

Çene geri çekme (baş düz olarak geriye kayar), ardından hafif öne baş sallama.

3 × 20–30 sn

Semispinalis capitis

Baş hafif yana rotasyonla fleksiyonda.

3 × 20–30 sn

Levator scapulae (kürek kemiği kaldırıcı kas)

Baş fleksiyonda ve karşı tarafa dönük (burun koltuk altına doğru), tedavi edilen taraftaki el ensede.

3 × 20–30 sn

Skalen kaslar

Baş hafif ekstansiyonla karşı tarafa eğik; terapist tedavi edilen taraftaki köprücük kemiğini aşağı doğru sabitler.

3 × 20–30 sn

BÖLÜM 3

Omuz, kol, ön kol ve el

Terapist ve hasta için.

Infraspinatus

Tedavi edilen taraftaki kol göğsün önünden çaprazlanır, diğer el dirseği göğse doğru çeker; ya da el sırtta.

3 × 20–30 sn

Supraspinatus

Tedavi edilen taraftaki el sırtta, diğer el bileği nazikçe karşı tarafa çeker.

3 × 20–30 sn

Teres minor

Kol göğsün önünden çaprazlanır, dirsek göğse doğru çekilir.

3 × 20–30 sn

Subscapularis

Kol dış rotasyonda, dirsek 90°'de, el nazikçe geriye gider (kapı kasasında).

3 × 20–30 sn

Deltoideus

Ön lifler: kol geriye; arka lifler: kol göğsün önünden çaprazlanır.

3 × 20–30 sn

Pectoralis major (büyük göğüs kası)

Kapı germesi: ön kol kapı kasasında, dirsek omuz hizasında, gövde yavaşça öne adım atar.

3 × 20–30 sn

Pectoralis minor (küçük göğüs kası)

Omuzlar geriye ve aşağıya; kapı kasasında dirsek omuz hizasının üstünde.

3 × 20–30 sn

Rhomboid kaslar

Kollar önde çaprazlanır (kendine sarılma), sırt hafifçe kamburlaşır.

3 × 20–30 sn

Serratus anterior

Kol geriye ve kürek kemiği omurgaya doğru çekili; derin nefes alırken.

3 × 20–30 sn

Latissimus dorsi

Kol baş üstünde, gövde karşı tarafa yana eğik.

3 × 20–30 sn

Biceps brachii

Dirsek düz, ön kol pronasyonda, kol geriye.

3 × 20–30 sn

Triceps brachii

Kol baş üstünde, dirsek tam bükülü, diğer el onu nazikçe geriye iter.

3 × 20–30 sn

Ön kol ekstansörleri (ECRL, ECRB, extensor digitorum)

Dirsek düz, el bileği ve parmaklar fleksiyonda, diğer el nazikçe aşağı çeker.

3 × 20–30 sn

Ön kol fleksörleri

Dirsek düz, avuç yukarıda, parmaklar geriye çekili.

3 × 20–30 sn

BÖLÜM 4

Sırt, omurga ve gövde

Terapist ve hasta için.

Trapezius – orta lifler

Kollar önde çaprazlanır, sırt kamburlaşır.

3 × 20–30 sn

Trapezius – alt lifler

Kollar öne ve yukarıya, sırt kamburlaşmış.

3 × 20–30 sn

Serratus posterior superior

Kol önde çaprazlanmış, sırt kamburlaşmış.

3 × 20–30 sn

Iliocostalis thoracis

Oturarak öne eğilme, gövde hafifçe karşı tarafa dönük.

3 × 20–30 sn

Iliocostalis lumborum

Sırtüstü yatarak dizler göğse çekili.

3 × 20–30 sn

Longissimus thoracis

Oturarak öne eğilme ya da sırtüstü yatarak dizler göğse.

3 × 20–30 sn

Multifidus

Sırtüstü yatarak dizler göğse, hafif yana rotasyonla.

3 × 20–30 sn

Quadratus lumborum

Ayakta ya da yan yatarak yana eğilme, üstteki kol baş üstünde.

3 × 20–30 sn

Rectus abdominis (düz karın kası)

Sırtüstü yatarak belin altında yastık, kollar baş üstünde.

3 × 20–30 sn

Obliquus externus abdominis

Sırtüstü yatarak dizler karşı tarafa indirilmiş, omuzlar yerde.

3 × 20–30 sn

BÖLÜM 5

Pelvis, kalça ve gluteal bölge

Terapist ve hasta için.

Gluteus maximus

Sırtüstü yatarak diz karşı omza doğru çekilir.

3 × 20–30 sn

Gluteus medius

Yan yatarak üstteki bacak sedyenin kenarından gövdenin arkasına sarkar; ya da ayakta bacaklar çapraz, yana eğilme.

3 × 20–30 sn

Gluteus minimus

Sırtüstü yatarak bacak karşı tarafa çaprazlanır.

3 × 20–30 sn

Piriformis

Sırtüstü yatarak tedavi edilen bacağın ayak bileği diğer dizin üstünde, diğer uyluk göğse çekili («4» germesi).

3 × 20–30 sn

Iliopsoas

Hamle (lunge) pozisyonu: arkadaki diz yerde, leğen öne itilir.

3 × 20–30 sn

Tensor fasciae latae

Yan yatarak üstteki bacak düz, geriye ve aşağıya sarkıtılmış.

3 × 20–30 sn

Adductor longus ve brevis

Oturarak ayak tabanları birleşik (kelebek), dizler aşağıya indirilmiş.

3 × 20–30 sn

Adductor magnus

Bacaklar açık oturarak öne eğilme.

3 × 20–30 sn

Pectineus

Bacak abdüksiyonda ve düz, hafifçe geriye.

3 × 20–30 sn

Sartorius (terzi kası)

Kalça ekstansiyonda, hafif iç rotasyonda (hamle pozisyonu).

3 × 20–30 sn

BÖLÜM 6

Uyluk, bacak ve ayak

Terapist ve hasta için.

Rectus femoris

Yüzüstü yatarak ya da ayakta topuk kalçaya çekili, kalça ekstansiyonda.

3 × 20–30 sn

Vastus medialis

Diz tam bükülü (topuk kalçaya).

3 × 20–30 sn

Vastus lateralis

Diz tam bükülü, bacak hafif iç rotasyonda.

3 × 20–30 sn

Biceps femoris

Sırtüstü yatarak düz bacağı kaldırma, ayak bileği çekili.

3 × 20–30 sn

Semitendinosus ve semimembranosus

Sırtüstü yatarak düz bacağı kaldırma, hafifçe yana.

3 × 20–30 sn

Gastrocnemius (baldır kası)

Duvarın önünde ayakta, arkadaki bacak düz, topuk yerde.

3 × 20–30 sn

Soleus

Duvarın önünde ayakta, arkadaki diz hafif bükülü, topuk yerde.

3 × 20–30 sn

Tibialis anterior

Ayak bileği ve parmaklar plantar fleksiyonda (oturarak ayak sırtı altta).

3 × 20–30 sn

Peroneus longus

Ayak içe dönük ve plantar fleksiyonda.

3 × 20–30 sn

Tibialis posterior

Ayak dışa dönük ve dorsal fleksiyonda.

3 × 20–30 sn

Extensor digitorum longus

Parmaklar ve ayak bileği plantar fleksiyonda.

3 × 20–30 sn

Flexor digitorum brevis

Ayak parmakları yukarı çekili, ayak bileği dorsal fleksiyonda.

3 × 20–30 sn

Abductor hallucis

Ayak başparmağı içe (diğer parmaklara doğru) çekili, ayak bileği dorsal fleksiyonda.

3 × 20–30 sn

Quadratus plantae

Parmaklar ve ayak bileği dorsal fleksiyonda.

3 × 20–30 sn

Sonraki adım

Bugün: boyun ve omuz germelerini kendi üzerinizde deneyin, böylece hastanıza tam olarak anlatabilirsiniz.