INCLUS ÎN OFERTĂ

# Atlas de Taping · versiune A4 alb-negru

Toate cele 72 de hărți, câte una pe pagină A4, în alb-negru: consumă mult mai puțină cerneală. Codul culorilor se vede ca nuanțe de gri; tipul tăieturii este scris pe fiecare hartă.

HARTA 01

# TĂIETURĂ ÎN I

# UMĂR — SUPRASPINOS

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Deasupra spinei scapulei, spre umăr.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Mușchiul supraspinos.

**MUȘCHI / ȚINTĂ: MUȘCHIUL SUPRASPINOS**




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BANDĂ | → | 15–25% |

**Poziție:** Braț în adducție la spate, gât înclinat lateral opus.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora pe tuberculul mare al humerusului; banda urcă pe fosa supraspinoasă spre marginea medială.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · bandă 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu aplica peste iritații ale pielii.

HARTA 02

# TĂIETURĂ ÎN Y
# UMĂR — INFRASPINOS

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în Y.

### 02 ZONA DE APLICARE



Fața posterioară a scapulei.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Mușchiul infraspinos.

MUȘCHI / ȚINTĂ: MUȘCHIUL INFRASPINOS




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| COZI | → | 15–25% |

**Poziție:** Braț adus pe pieptul opus (adducție orizontală).

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora pe humerusul posterior; cozile se deschid pe fosa infraspinoasă spre marginea medială.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · cozi 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Rotunjește colțurile benzii.

HARTA 03

# TĂIETURĂ ÎN Y
# UMĂR — DELTOID

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: DELTOID ANTERIOR ȘI POSTERIOR**

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în Y: o bază și două brațe.

### 02 ZONA DE APLICARE

Umăr, fața laterală a brațului.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Deltoidul anterior și posterior.




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | |
|---|---|
| ANCORĂ | 0% |
| BENZI | 15–25% |

**Poziție:** braț relaxat pe partea corpului.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora la baza deltoidului. Capetele se îndreaptă către mușchi.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0%.
Benzi 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Puncte de ancorare rotunjite și fără tensiune. Observă pielea.

HARTA 04

# TĂIETURĂ ÎN I

## UMĂR — BICEPS (PORȚIUNEA LUNGĂ)

### APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: TENDONUL LUNG AL BICEPSULUI**




**01 TĂIETURĂ**

Tăietură în I.

**02 ZONA DE APLICARE**

Fața anterioară a umărului și brațului.

**03 MUȘCHI / ȚINTĂ**

Tendonul lung al bicepsului.

**04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE**

Ancora deasupra cotului; banda urcă pe biceps până la fața anterioară a umărului.

**05 TENSIUNE**

Ancoră 0% · bandă 15–25%.

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Evită plica cotului.

**TENSIUNE ȘI POZIȚIE**

| | |
|---|---|
| ANCORĂ → | 0% |
| BANDĂ → | 15–25% |

**Poziție:** Cot extins, umăr în extensie ușoară.

HARTA 05

# TĂIETURĂ ÎN Y + I

# UMĂR — STABILIZARE (Y + I)

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în Y + I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Umăr, lateral și anterior.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Capsula umărului și deltoidul.

**MUȘCHI / ȚINTĂ: CAPSULA UMĂRULUI ȘI DELTOIDUL**




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| Y | → | 15–25% |
| I | → | în centru 50% |

**Poziție:** Braț relaxat, umăr ușor rotit extern.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

- Y pe deltoid cu ancora pe inserție; I de corecție peste fața anterioară a umărului, centrul pe articulație.

### 05 TENSIUNE

Y 15–25% · I în centru 50%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu înlocuiește evaluarea instabilității.

HARTA 06

# TĂIETURĂ ÎN I CERVICALĂ — TRAPEZ SUPERIOR

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Între gât și acromion.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Trapezul superior.

MUȘCHI / ȚINTĂ: TRAPEZUL SUPERIOR




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BANDĂ | → | 15–25% |

**Poziție:** Cap înclinat spre partea opusă.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora pe acromion; banda urcă pe trapez până la linia părului.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · bandă 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu acoperi zona sub linia părului.

HARTA 07

# Y INVERSAT
## CERVICALĂ ȘI TRAPEZ
### APLICARE VIZUALĂ

MUȘCHI / ȚINTĂ: EXTENSORII CERVICALI ȘI TRAPEZUL SUPERIOR

**01 TĂIETURĂ**

Tăietură în Y inversat, cozile în sus.

**02 ZONA DE APLICARE**

Regiunea cervicală posterioară.

**03 MUȘCHI / ȚINTĂ**

Extensori cervicali și trapez superior.




**TENSIUNE ȘI POZIȚIE**

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| COZI | → | 15–25% |

**Poziție:** gâtul în flexie în timpul aplicării.

**04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE**

Ancoră la baza cervicală. Cozi în sus de-a lungul coloanei.

**05 TENSIUNE**

Ancoră 0%.
Cozi 15–25%.

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Nu aplica peste păr.
Capete rotunjite.

HARTA 08

# TĂIETURĂ ÎN I
# CERVICALĂ — RIDICĂTORUL SCAPULEI

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Unghiul superior al scapulei spre gât.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Ridicătorul scapulei.

**MUȘCHI / ȚINTĂ: RIDICĂTORUL SCAPULEI**




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BANDĂ | → | 15–25% |

**Poziție:** Cap flectat și rotit spre partea opusă.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora pe unghiul superior al scapulei; banda urcă spre vertebrele cervicale superioare.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · bandă 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Verifică pielea după 24 de ore.

HARTA 09

# DOUĂ TĂIETURI ÎN I

## CERVICALĂ — POSTURĂ (DOUĂ BENZI ÎN I)

### APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: PARAVERTEBRALI CERVICO-TORACICI**

**01 TĂIETURĂ**

Două tăieturi în I

**02 ZONA DE APLICARE**



Ceafă și zona dintre omoplați.

**03 MUȘCHI / ȚINTĂ**

Paravertebrali cervico-toracici.




**TENSIUNE ȘI POZIȚIE**

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BENZI | → | 15–25% |

**Poziție:** Gât în flexie, umeri relaxați.

**04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE**

Două benzi paralele de la linia părului până la T6, câte una de fiecare parte a coloanei.

**05 TENSIUNE**

Ancore 0% · benzi 15–25%

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Nu aplica pe coloană, ci lateral.

HARTA 10

# TĂIETURĂ ÎN EVANTAI CERVICALĂ — ȘTERGERE LIMFATICĂ

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în evantai.

### 02 ZONA DE APLICARE

Partea laterală a gâtului.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Edem și tensiune laterală a gâtului.

**MUȘCHI / ȚINTĂ: EDEM ȘI TENSIUNE LATERALĂ A GÂTULUI**




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BENZI | → | 0–20% |

**Poziție:** Cap înclinat spre partea opusă.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora deasupra claviculei; benzile înguste se deschid în evantai spre ceafă.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · benzi 0–20%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Atenție la pielea sensibilă a gâtului.

HARTA 11

# STEA DIN BENZI ÎN I

## LOMBAR — STEA (DURERE LOCALĂ)

### APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: ZONA DUREROASĂ LOMBARĂ**




**01 TĂIETURĂ**

Stea din benzi în I.

**02 ZONA DE APLICARE**

Centrat pe punctul dureros.

**03 MUȘCHI / ȚINTĂ**

Zona dureroasă lombară.

**04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE**

Două sau trei benzi în I încrucișate peste punctul dureros, centrul pe durere.

**05 TENSIUNE**

Centru 25–50% · capete 0%.

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Marchează punctul dureros înainte.

**TENSIUNE ȘI POZIȚIE**

| | |
|---|---|
| CENTRU → | 25–50% |
| CAPETE → | 0% |

**Poziție:** Trunchi în flexie ușoară.

HARTA 12

# DOUĂ TĂIETURI ÎN I

## REGIUNEA LOMBARĂ

### APLICARE VIZUALĂ

**01 TĂIETURĂ**

Două tăieturi în I, paralele, la coloană.

**02 ZONA DE APLICARE**



Lombar, pe ambele părți ale coloanei.

**03 MUȘCHI / ȚINTĂ**

Mușchi paravertebrali lombari.

MUȘCHI / ȚINTĂ: PARAVERTEBRALI LOMBARI




**TENSIUNE ȘI POZIȚIE**

| | | |
|---|---|---|
| ANCORE | → | 0% |
| BENZI | → | 15–25% |

**Poziție:** trunchiul aplecat în față.

**04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE**

Ancoră pe sacru. Fâșiile sunt orientate spre capătul lombar.

**05 TENSIUNE**

Ancoră 0%. Corpul benzii 15–25%.

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Nu aplicați pe linia coloanei.

HARTA 13

# TĂIETURĂ ÎN I

# LOMBAR — PĂTRATUL LOMBAR

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Între coasta 12 şi creasta iliacă.

### 03 MUŞCHI / ȚINTĂ

Pătratul lombar.

**MUŞCHI / ȚINTĂ: PĂTRATUL LOMBAR**




### TENSIUNE ŞI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BANDĂ | → | 15–25% |

**Poziție:** Pacient în decubit lateral, trunchi înclinat spre partea opusă.

### 04 ANCORARE ŞI DIRECȚIE

Ancora pe creasta iliacă; banda urcă oblic spre coasta 12.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · bandă 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu acoperi rinichiul cu tensiune.

HARTA 14

# TĂIETURĂ ÎN X

# SACRU — ARTICULAȚIA SACROILIACĂ

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: ARTICULAȚIA SACROILIACĂ**




### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în X.

### 02 ZONA DE APLICARE

Peste articulația sacroiliacă.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Articulația sacroiliacă.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

X centrat pe articulație, brațele spre sacru și fesier.

### 05 TENSIUNE

Centru 25–50% · capete 0%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Evită pliul interfesier.

### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | |
|---|---|
| CENTRU → | 25–50% |
| CAPETE → | 0% |

**Poziție:** Ușoară flexie a trunchiului.

HARTA 15

# TĂIETURĂ ÎN Y

# LOMBAR — FASCIA TORACOLOMBARĂ

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: FASCIA TORACOLOMBARĂ**

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în Y.

### 02 ZONA DE APLICARE

Zona lombară largă.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Fascia toracolombară.




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| COZI | → | 10–25% |

**Poziție:** Trunchi în flexie.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora pe sacru; cozile urcă în V spre coastele inferioare.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · cozi 10–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Rotunjește capetele.

HARTA 16

# TĂIETURĂ ÎN I

# ABDOMEN — DREPTUL ABDOMINAL

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Vertical, de la pubis la coaste.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Dreptul abdominal.

MUȘCHI / ȚINTĂ: DREPTUL ABDOMINAL




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | |
|---|---|
| ANCORĂ → | 0% |
| BANDĂ → | 25–35% |

**Poziție:** Trunchi în extensie ușoară.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora deasupra pubisului; banda urcă paralel cu linia mediană.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · bandă 25–35%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu în sarcină fără indicație.

HARTA 17

# TĂIETURĂ ÎN I

# ABDOMEN — OBLICI

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Diagonal pe flanc.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Oblicul extern.

MUȘCHI / ȚINTĂ: OBLICUL EXTERN




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BANDĂ | → | 15–25% |

**Poziție:** Rotație ușoară a trunchiului spre partea opusă.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora pe creasta iliacă; banda urcă diagonal spre coastele opuse.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · bandă 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Evită ombilicul.

HARTA 18

# TĂIETURĂ ÎN I

# ABDOMEN — DIASTAZĂ (SUPORT)

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Benzi orizontale peste linia mediană.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Linia albă.

**MUȘCHI / ȚINTĂ: LINIA ALBĂ**




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| CENTRU | → | 25–35% |
| CAPETE | → | 0% |

**Poziție:** Decubit dorsal, genunchii flectați.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Trei benzi orizontale, centrul pe linia mediană, cu apropiere manuală a marginilor.

### 05 TENSIUNE

Centru 25–35% · capete 0%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Suport, nu tratament: evaluare de specialitate.

HARTA 19

# TĂIETURĂ ÎN EVANTAI

# ABDOMEN — DRENAJ LIMFATIC

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în evantai.

### 02 ZONA DE APLICARE

Abdomen inferior.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Edem abdominal.

**MUȘCHI / ȚINTĂ: EDEM ABDOMINAL**




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BENZI | → | 0–20% |

**Poziție:** Decubit dorsal, abdomen relaxat.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancorele lângă ganglionii inghinali; benzile înguste urcă în evantai.

### 05 TENSIUNE

Ancore 0% ·
Benzi 0–20%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu pe cicatrice recente.

HARTA 20

# TĂIETURĂ ÎN X

## ABDOMEN — DISCONFORT MENSTRUAL

### APLICARE VIZUALĂ

**01 TĂIETURĂ**

Tăietură în X.

**02 ZONA DE APLICARE**

Sub ombilic.

**03 MUȘCHI / ȚINTĂ**

Zona suprapubiană.

MUȘCHI / ȚINTĂ: ZONA SUPRAPUBIANĂ




**TENSIUNE ȘI POZIȚIE**

| | | |
|---|---|---|
| CENTRU | → | 25% |
| CAPETE | → | 0% |

**Poziție:** Decubit dorsal.

**04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE**

Două benzi în I încrucișate sub ombilic, centrul pe zona dureroasă.

**05 TENSIUNE**

Centru 25% · capete 0%.

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Nu înlocuiește consultul ginecologic.

HARTA 21

# TĂIETURĂ ÎN Y + I

# GENUNCHI — ROTULĂ

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în Y cu o bandă în I de întărire.

### 02 ZONA DE APLICARE

Genunchiul, regiunea anterioară.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Rotulă și tendon patelar.

MUȘCHI / ȚINTĂ: CVADRICEPS ȘI TENDON ROTULIAN




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| Y | → | 15–25% |
| I | → | 50% |

**Poziție:** genunchiul flexionat în timpul aplicării.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Y-ul coboară de pe coapsă și conturează rotula. Banda în I trece pe sub ea.

### 05 TENSIUNE

Y 15–25%.
I 50% în centru.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Capete fără tensiune. Nu acoperi pliul din spatele genunchiului.

HARTA 22

# TĂIETURĂ ÎN I

## GENUNCHI — LIGAMENT COLATERAL LATERAL

### APLICARE VIZUALĂ

**MUŞCHI / ȚINTĂ: LIGAMENTUL COLATERAL LATERAL**




**01 TĂIETURĂ**

Tăietură în I.

**02 ZONA DE APLICARE**

Fața laterală a genunchiului.

**03 MUŞCHI / ȚINTĂ**

Ligamentul colateral lateral.

**04 ANCORARE ŞI DIRECȚIE**

Bandă verticală, centrul pe linia articulară laterală.

**05 TENSIUNE**

Centru 50–75% · capete 0%.

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Nu înlocuieşte evaluarea ligamentară.

**TENSIUNE ȘI POZIȚIE**

| | |
|---|---|
| CENTRU | 50–75% |
| CAPETE | 0% |

**Poziție:** Genunchi în uşoară flexie.

HARTA 23

# TĂIETURĂ ÎN I

# GENUNCHI — TENDON ROTULIAN

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: TENDONUL ROTULIAN**




### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Sub rotulă.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Tendonul rotulian.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Bandă orizontală scurtă, centrul pe tendon.

### 05 TENSIUNE

Centru 50–75% · capete 0%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Tensiunea mare doar în centru.

### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| CENTRU | → | 50–75% |
| CAPETE | → | 0% |

**Poziție:** Genunchi flectat.

HARTA 24

# TĂIETURĂ ÎN I

# GENUNCHI — LIGAMENT COLATERAL MEDIAL

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: LIGAMENTUL COLATERAL MEDIAL**




### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Fața medială a genunchiului.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Ligamentul colateral medial.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Bandă verticală, centrul pe linia articulară medială.

### 05 TENSIUNE

Centru 50–75% · capete 0%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu înlocuiește evaluarea ligamentară.

### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | |
|---|---|
| CENTRU → | 50–75% |
| CAPETE → | 0% |

**Poziție:** Genunchi în ușoară flexie.

HARTA 25

# TĂIETURĂ ÎN EVANTAI

# GENUNCHI — EDEM

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în evantai.

### 02 ZONA DE APLICARE

În jurul genunchiului.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Edem articular.

**MUȘCHI / ȚINTĂ: EDEM ARTICULAR**




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | |
|---|---|
| ANCORĂ | 0% |
| BENZI | 0–20% |

**Poziție:** Genunchi flectat.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Două evantaie încrucișate, ancorele spre fosa poplitee.

### 05 TENSIUNE

Ancore 0% · benzi 0–20%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu pe piele lezată.

HARTA 26

# TĂIETURĂ ÎN Y
# COAPSĂ — ISCHIOGAMBIERI

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în Y

### 02 ZONA DE APLICARE

Fața posterioară a coapsei.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Ischiogambierii.

**MUȘCHI / ȚINTĂ: ISCHIOGAMBIERII**




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | |
|---|---|
| ANCORĂ → | 0% |
| COZI → | 15–25% |

**Poziție:** Decubit ventral, genunchi extins, șold flectat dacă e posibil.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora sub genunchi; cozile urcă de o parte și de alta a coapsei până la ischion.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · cozi 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Evită fosa poplitee.

HARTA 27

# TĂIETURĂ ÎN EVANTAI
# COAPSĂ ANTERIOARĂ

## APLICARE VIZUALĂ

MUȘCHI / ȚINTĂ: REGIUNEA ANTERIOARĂ A COAPSEI

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în evantai cu patru benzi subțiri.

### 02 ZONA DE APLICARE

Coapsă, fața anterioară.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Regiunea anterioară a coapsei.




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BENZI | → | 0–15% |

Poziție: șoldul în ușoară extensie.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancorați în partea superioară a coapsei. Benzile coboară desfăcute în evantai.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0%.
Benzi 0–15%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Benzile nu trebuie să se suprapună.
Observați pielea.

HARTA 28

# TĂIETURĂ ÎN Y
# COAPSĂ — CVADRICEPS

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în Y.

### 02 ZONA DE APLICARE

Fața anterioară a coapsei.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Cvadricepsul.

**MUȘCHI / ȚINTĂ: CVADRICEPSUL**




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | |
|---|---|
| ANCORĂ → | 0% |
| COZI → | 25–35% |

**Poziție:** Genunchi flectat.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora sub spina iliacă; cozile coboară și înconjoară rotula.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · cozi 25–35%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu pune tensiune pe rotulă.

HARTA 29

# TĂIETURĂ ÎN I

# COAPSĂ — BANDA ILIOTIBIALĂ

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Fața laterală a coapsei.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Tractul iliotibial.

**MUȘCHI / ȚINTĂ: TRACTUL ILIOTIBIAL**




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BANDĂ | → | 15–25% |

**Poziție:** Decubit lateral, genunchi în ușoară flexie.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora sub genunchi lateral; banda urcă spre trohanter.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · bandă 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Rotunjește capetele.

HARTA 30

# TĂIETURĂ ÎN PLASĂ

## COAPSĂ — EDEM / ECHIMOZĂ

### APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: EDEM POSTTRAUMATIC**




**01 TĂIETURĂ**

Tăietură în plasă.

**02 ZONA DE APLICARE**

Peste zona tumefiată.

**03 MUȘCHI / ȚINTĂ**

Edem posttraumatic.

**04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE**

Două plase încrucișate peste zonă, ancorele spre ganglionii de drenaj.

**05 TENSIUNE**

Ancoră 0% · benzi 0–20%.

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Nu pe plăgi deschise.

**TENSIUNE ȘI POZIȚIE**

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BENZI | → | 0–20% |

**Poziție:** Mușchiul în poziție de alungire.

HARTA 31

# TĂIETURĂ ÎN I
# GAMBĂ — SOLEAR

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: SOLEARUL**




### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Gambă, partea de jos.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Solearul.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora pe calcaneu; banda urcă pe linia mediană a gambei.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% • bandă 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Rotunjește capetele.

### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | |
|---|---|
| ANCORĂ → | 0% |
| BANDĂ → | 15–25% |

**Poziție:** Genunchi flectat, gleznă în dorsiflexie.

HARTA 32

# TĂIETURĂ ÎN I

# GAMBĂ — TIBIAL ANTERIOR

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: TIBIALUL ANTERIOR**




### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Lateral de creasta tibiei.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Tibialul anterior.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora pe fața dorsală a piciorului; banda urcă lateral de tibie.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · bandă 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu pe creasta tibiei.

### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | |
|---|---|
| ANCORĂ | 0% |
| BANDĂ | 15–25% |

**Poziție:** Glezna în flexie plantară.

HARTA 33

# TĂIETURĂ ÎN Y GAMBĂ

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: GASTROCNEMIAN MEDIAL ȘI LATERAL**

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în Y cu două capete lungi.

### 02 ZONA DE APLICARE

Gambă, fața posterioară.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Gastrocnemian medial și lateral.




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BENZI | → | 15–25% |

**Poziție:** picior în dorsiflexie și genunchi întins.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancoră pe călcâi. Cozile urcă pe cele două capete ale gastrocnemianului.

### 05 TENSIUNE

Ancora 0%. Benzi 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu acoperi pliul din spatele genunchiului.

HARTA 34

# TĂIETURĂ ÎN I
# GAMBĂ — PERONIERI

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Fața laterală a gambei.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Peronierii.

**MUȘCHI / ȚINTĂ: PERONIERII**




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | |
|---|---|
| ANCORĂ | 0% |
| BANDĂ | 25–35% |

**Poziție:** Glezna în inversie.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora sub maleola laterală; banda urcă spre capul fibulei.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · bandă 25–35%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Evită maleola cu tensiune.

HARTA 35

# TĂIETURĂ ÎN PLASĂ

# GAMBĂ — CRAMPE ȘI OBOSEALĂ

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: TENSIUNE MUSCULARĂ ȘI EDEM**




### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în plasă.

### 02 ZONA DE APLICARE

Gambă posterioară.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Tensiune musculară și edem.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Plasă peste gambă, ancorele spre fosa poplitee.

### 05 TENSIUNE

Ancore 0% · benzi 0–20%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu pe varice dureroase.

### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BENZI | → | 0–20% |

**Poziție:** Gleznă în dorsiflexie.

HARTA 36

# TĂIETURĂ ÎN Y + I

# GLEZNĂ — TENDONUL LUI AHILE

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în Y + I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Posterior, de la călcâi la gambă.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Tendonul lui Ahile.

MUȘCHI / ȚINTĂ: TENDONUL LUI AHILE




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| Y | → | 15–25% |
| I | → | în centru 50% |

**Poziție:** Gleznă în dorsiflexie.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Y cu ancora sub călcâi și cozile pe gambă;
I scurt peste tendon.

### 05 TENSIUNE

Y 15–25% ·
I în centru 50%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Fără tensiune pe călcâi.

HARTA 37

# TĂIETURĂ ÎN EVANTAI

# GLEZNĂ — EDEM

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: EDEM PERIMALEOLAR**

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în evantai.

### 02 ZONA DE APLICARE

În jurul maleolelor.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Edem perimaleolar.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Două evantaie cu ancora pe gambă, benzile înguste trec peste maleole.

### 05 TENSIUNE

Ancore 0% · benzi 0–20%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu pe piele lezată.

### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | |
|---|---|
| ANCORĂ → | 0% |
| BENZI → | 0–20% |

**Poziție:** Gleznă în flexie plantară ușoară.

HARTA 38

# ETRIER ÎN U GLEZNĂ

## APLICARE VIZUALĂ

MUȘCHI / ȚINTĂ: STABILIZATORII GLEZNEI

### 01 TĂIETURĂ

Tăieturâ în l aplicată în U, pe partea joasă a calcanei.

### 02 ZONA DE APLICARE

Gleznă, față medială și laterală.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Stabilizatorii gleznei.




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| CENTRU | → | 50% |
| CAPETE | → | 0% |

**Poziție:** glezna la 90 de grade.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Centru sub osul calcanei. Puncte pe părțile laterale ale peroneului.

### 05 TENSIUNE

Centru 50%.
Capete 0%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu fixați banda prea strânsă pe piele.

HARTA 39

# TĂIETURĂ ÎN EVANTAI

# PICIOR — FASCIA PLANTARĂ

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Taietură în evantai.

### 02 ZONA DE APLICARE

Talpa piciorului.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Fascia plantară.

MUȘCHI / ȚINTĂ: FASCIA PLANTARĂ




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BENZI | → | 15–25% |

**Poziție:** Gleznă în dorsiflexie, degete în extensie.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora pe călcâi; benzile se deschid spre baza degetelor.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · benzi 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Rotunjește capetele între degete.

HARTA 40

# TĂIETURĂ ÎN I

# PICIOR — HALLUX VALGUS

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Marginea medială a piciorului.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Haluce.

**MUȘCHI / ȚINTĂ: HALUCE**




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | |
|---|---|
| ANCORĂ | 0% |
| BANDĂ | 25–50% |

**Poziție:** Halucele adus manual în poziție corectată.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora pe falanga halucelui; banda trece peste articulație spre călcâi.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · bandă 25–50% pe articulație.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Corecție de suport, nu definitivă.

HARTA 41

# TĂIETURĂ ÎN Y
# TORACIC — ROMBOIZI

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: ROMBOIZII**

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în Y.

### 02 ZONA DE APLICARE



Între coloana toracică și scapulă.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Romboizii.




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| COZI | → | 15–25% |

**Poziție:** Brațe încrucișate în față, umeri protractați.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora lângă coloană (T1–T5); cozile merg spre marginea medială a scapulei.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · cozi 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Rotunjește colțurile.

HARTA 42

# TĂIETURĂ ÎN I

# TORACIC — TRAPEZ MIJLOCIU

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: TRAPEZUL MIJLOCIU**

**01 TĂIETURĂ**

Tăietură în I.

**02 ZONA DE APLICARE**

Orizontal, de la acromion la coloană.

**03 MUȘCHI / ȚINTĂ**

Trapezul mijlociu.




**04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE**

Ancora pe acromion; banda merge orizontal spre coloana toracică.

**05 TENSIUNE**

Ancoră 0% · bandă 25–35%

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Nu trece peste coloană.

### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | |
|---|---|
| ANCORĂ → | 0% |
| BANDĂ → | 25–35% |

**Poziție:** Brațe în față, umeri protractați.

HARTA 43

# TĂIETURĂ ÎN Y
# TORACIC — DORSALUL MARE

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: DORSALUL MARE**




### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în Y.

### 02 ZONA DE APLICARE

Lateral, de la axilă la creasta iliacă.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Dorsalul mare.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora sub axilă (humerus); cozile coboară pe flanc spre creasta iliacă.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · cozi 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Evită axila.

### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| COZI | → | 15–25% |

**Poziție:** Braț ridicat deasupra capului, trunchi înclinat lateral opus.

HARTA 44

# TĂIETURĂ ÎN EVANTAI

## TORACIC — COASTE ȘI INTERCOSTALI

### APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: INTERCOSTALII ȘI COASTELE**




**01 TĂIETURĂ**

Tăietură în evantai.

**02 ZONA DE APLICARE**

Fața laterală a toracelui.

**03 MUȘCHI / ȚINTĂ**

Intercostalii și coastele.

**04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE**

Ancora pe linia axilară; benzile înguste urmează spațiile intercostale.

**05 TENSIUNE**

Ancoră 0% · benzi 10–20%.

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Nu înlocuiește evaluarea unei fracturi costale.

**TENSIUNE ȘI POZIȚIE**

| | |
|---|---|
| ANCORĂ → | 0% |
| BENZI → | 10–20% |

**Poziție:** Brațul ridicat, expirație completă la aplicare.

HARTA 45

# TĂIETURĂ ÎN X

## REGIUNEA SCAPULARĂ

### APLICARE VIZUALĂ

**01 TĂIETURĂ**

Tăietură în X, centru între cele două scapule.

**02 ZONA DE APLICARE**

Regiunea scapulară.

**03 MUȘCHI / ȚINTĂ**

Romboizi și trapez mediu.

MUȘCHI / ȚINTĂ: ROMBOIZI ȘI TRAPEZ MEDIU




**04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE**

Centrul se aplică primul. Capetele se deschid spre umeri și coloană.

**05 TENSIUNE**

Centrul 25–50%. Capete 0%.

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Puncte arondandate și fără tensiune.

**TENSIUNE ȘI POZIȚIE**

| | | |
|---|---|---|
| CENTRU | → | 25-50% |
| CAPETE | → | 0% |

**Poziție:** umerii în retracție în timpul aplicării.

HARTA 46

# TĂIETURĂ ÎN Y

# ȘOLD — FESIERUL MIJLOCIU

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: FESIERUL MIJLOCIU**

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în Y.

### 02 ZONA DE APLICARE

Lateral, deasupra trohanterului.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Fesierul mijlociu.




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| COZI | → | 15–25% |

**Poziție:** Decubit lateral, coapsa de sus în adducție.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora pe trohanterul mare; cozile urcă în eventai spre creasta iliacă.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · cozi 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Rotunjește colțurile.

HARTA 47

# TĂIETURĂ ÎN I
# ȘOLD — PIRIFORM

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: PIRIFORMUL**




### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Fesier, de la sacru la trohanter.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Piriformul.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora pe trohanterul mare; banda merge spre marginea sacrului.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · bandă 15–25%.

### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BANDĂ | → | 15–25% |

**Poziție:** Decubit lateral, șold flectat și adus.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Evită pliul interfesier.

HARTA 48

# TĂIETURĂ ÎN I
# ȘOLD — ILIOPSOAS

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Fața anterioară a șoldului.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Iliopsoasul.

**MUȘCHI / ȚINTĂ: ILIOPSOASUL**




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BANDĂ | → | 15–25% |

**Poziție:** Șold în extensie (pacientul la marginea mesei).

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora sub inghinal, pe coapsă; banda urcă spre spina iliacă anterioară.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · bandă 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu acoperi zona inghinală.

HARTA 49

# STEA DIN BENZI ÎN I

## ȘOLD — BURSITĂ TROHANTERIANĂ

### APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: BURSA TROHANTERIANĂ**




**01 TĂIETURĂ**

Stea din benzi în I.

**02 ZONA DE APLICARE**

Peste trohanterul mare.

**03 MUȘCHI / ȚINTĂ**

Bursa trohanteriană.

**04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE**

Benzi în I încrucișate în stea peste trohanter.

**05 TENSIUNE**

Centru 25–50% · capete 0%.

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Marchează punctul dureros.

**TENSIUNE ȘI POZIȚIE**

| | |
|---|---|
| CENTRU → | 25–50% |
| CAPETE → | 0% |

**Poziție:** Decubit lateral.

HARTA 50

# TĂIETURĂ ÎN Y

# ȘOLD — ADDUCTORI

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în Y

### 02 ZONA DE APLICARE

Fața medială a coapsei.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Adductorii.

**MUȘCHI / ȚINTĂ: ADDUCTORIII**




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| COZI | → | 15–25% |

**Poziție:** Șold în abducție.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora deasupra genunchiului medial; cozile urcă spre pubis.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · cozi 15–25%

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Atenție la pielea fină medială.

HARTA 51

# TĂIETURĂ ÎN Y

# ÎNCHEIETURĂ — TUNEL CARPIAN

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: FLEXORII ȘI CANALUL CARPIAN**

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în Y.

### 02 ZONA DE APLICARE

Fața palmară a încheieturii.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Flexorii și canalul carpian.




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| COZI | → | 15–25% |

**Poziție:** Încheietură în extensie.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora în palmă; cozile urcă pe antebrat de o parte și de alta.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · cozi 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu strânge circular.

HARTA 52

# TĂIETURĂ ÎN I

## ÎNCHEIETURĂ ȘI ANTEBRAȚ

### APLICARE VIZUALĂ

MUȘCHI / ȚINTĂ: EXTENSORII PUMNULUI

**01 TĂIETURĂ**

Tăietură în I, cu ancoră pe mână.

**02 ZONA DE APLICARE**

Antebraț și partea posterioară.

**03 MUȘCHI / ȚINTĂ**

Extensorii pumnului.




**04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE**

Ancoră pe dosul mâinii. Banda urcă până aproape de cot.

**05 TENSIUNE**

Ancora 0%.
Corpul benzii 15-25%.

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Nu se aplică în volta pumnului.

**TENSIUNE ȘI POZIȚIE**

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BANDĂ 1 | → | 15-25% |

Poziție: pumnul flexat în timpul aplicării.

HARTA 53

# TĂIETURĂ ÎN I

# ÎNCHEIETURĂ — STABILIZARE

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Circular, peste încheietură.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Încheietura mâinii.

**MUȘCHI / ȚINTĂ: ÎNCHEIETURA MÂINII**




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| CENTRU | → | 25–50% |
| CAPETE | → | 0% |

**Poziție:** Încheietură neutră.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Bandă scurtă în jurul încheieturii, fără să se închidă complet.

### 05 TENSIUNE

Centru 25–50% · capete 0%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Lasă un spațiu: nu închide inelul.

HARTA 54

# TĂIETURĂ ÎN I
# ÎNCHEIETURĂ — DE QUERVAIN

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în I.

### 02 ZONA DE APLICARE

Marginea radială.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Tendoanele policelui.

**MUȘCHI / ȚINTĂ: TENDOANELE POLICELUI**




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BANDĂ | → | 15–25% |

**Poziție:** Police flectat în palmă, încheietură în deviație ulnară.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora pe police; banda urcă pe marginea radială a antebrațului.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · bandă 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Fără tensiune pe police.

HARTA 55

# TĂIETURĂ ÎN PLASĂ
# MÂNA — EDEM

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: EDEMUL MÂINII**




### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în plasă.

### 02 ZONA DE APLICARE

Dosul mâinii.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Edemul mâinii.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Plasă cu ancora pe antebraț și benzi înguste spre degete.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · benzi 0–20%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu pe plăgi.

### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | |
|---|---|
| ANCORĂ → | 0% |
| BENZI → | 0–20% |

**Poziție:** Pumn închis ușor.

HARTA 56

# TĂIETURĂ ÎN Y + I

## COT — EPICONDILITĂ LATERALĂ

### APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: EXTENSORII PE EPICONDIL**

**01 TĂIETURĂ**

Tăietură în Y + I

**02 ZONA DE APLICARE**

Fața laterală a cotului.

**03 MUȘCHI / ȚINTĂ**

Extensorii pe epicondil.




**04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE**

Y de la încheietură spre epicondil;
I scurt peste zona dureroasă.

**05 TENSIUNE**

Y 15–25% ·
I în centru 50%

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Marchează punctul dureros.

**TENSIUNE ȘI POZIȚIE**

| | | |
|---|---|---|
| Y | → | 15–25% |
| I în centru | → | 50% |

**Poziție:** Cot extins, încheietură flectată.

HARTA 57

# TĂIETURĂ ÎN Y + I

# COT — EPICONDILITĂ MEDIALĂ

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: FLEXORII PE EPITROHLEE**

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în Y + I

### 02 ZONA DE APLICARE

Fața medială a cotului.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Flexorii pe epitrohlee.




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | |
|---|---|
| Y | 15–25% |
| I (ÎN CENTRU) | 50% |

**Poziție:** Cot extins, încheietură în extensie.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Y de la încheietură spre epitrohlee;
I scurt peste zona dureroasă.

### 05 TENSIUNE

Y 15–25% ·
I în centru 50%

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Evită plica cotului.

HARTA 58

# TĂIETURĂ ÎN Y

# ANTEBRAȚ — FLEXORI

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: FLEXORII ANTEBRAȚULUI**




### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în Y.

### 02 ZONA DE APLICARE



Fața palmară a antebrațului.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Flexorii antebrațului.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora în palmă; cozile urcă spre epitrohlee.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · cozi 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Rotunjește colțurile.

### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| COZI | → | 15–25% |

**Poziție:** Cot și încheietură în extensie.

HARTA 59

# TĂIETURĂ ÎN Y
# COT — TRICEPS

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în Y.

### 02 ZONA DE APLICARE

Fața posterioară a brațului.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Tricepsul.

MUȘCHI / ȚINTĂ: TRICEPSUL




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| COZI | → | 15–25% |

**Poziție:** Cot flectat, braț ridicat.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Ancora pe olecran; cozile urcă spre umăr.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · cozi 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Fără tensiune pe olecran.

HARTA 60

# TĂIETURĂ ÎN EVANTAI
# COT — EDEM
## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Tăietură în evantai.

### 02 ZONA DE APLICARE

În jurul cotului.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Edemul cotului.

MUȘCHI / ȚINTĂ: EDEMUL COTULUI




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BENZI | → | 0–20% |

**Poziție:** Cot în ușoară flexie.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Evantai cu ancora pe braț, benzile înguste peste cot spre antebraț.

### 05 TENSIUNE

Ancoră 0% · benzi 0–20%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Evită plica cotului.

HARTA 61

# DOUĂ I + X

# COMBINATĂ — LOMBAR: DOUĂ I + STEA

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: PARAVERTEBRALI + PUNCT DUREROS**




### 01 TĂIETURĂ

Două I + x.

### 02 ZONA DE APLICARE

Zona lombară.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Paravertebrali + punct dureros.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Două benzi în I paralele; peste ele, un X scurt pe punctul dureros.

### 05 TENSIUNE

I 15–25% · X centru 25–50%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Prima dată benzile în I, apoi X-ul.

### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | |
|---|---|
| I | 15–25% |
| X (centru) | 25–50% |

**Poziție:** Trunchi în flexie.

HARTA 62

# Y + I

# COMBINATĂ — UMĂR: DELTOID + SUPRASPINOS

## APLICARE VIZUALĂ

### 01 TĂIETURĂ

Y + I

### 02 ZONA DE APLICARE

Umăr.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Deltoid + supraspinos.

MUȘCHI / ȚINTĂ: DELTOID + SUPRASPINOS




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| AMBELE | → | 15–25% |
| AMBELE | → | 15–25% |

**Poziție:** Braț relaxat, apoi la spate.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Mai întâi I pe supraspinos, apoi Y pe deltoid.

### 05 TENSIUNE

Ambele 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Lasă 1 cm între capete.

HARTA 63

# Y + I

# COMBINATĂ — GENUNCHI: ROTULĂ + TENDON

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: ROTULĂ + TENDON ROTULIAN**




### 01 TĂIETURĂ

Y + I

### 02 ZONA DE APLICARE

Genunchi.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Rotulă + tendon rotulian.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Y în jurul rotulei;
I scurt orizontal peste tendonul rotulian.

### 05 TENSIUNE

Y 15–25% ·
I centru 50–75%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

I-ul nu acoperă rotula.

### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | |
|---|---|
| Y | 15–25% |
| I | centru 50–75% |

**Poziție:** Genunchi flectat.

HARTA 64

U + I

# COMBINATĂ — GLEZNĂ: ETRIER + AHILE

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: LIGAMENTE LATERALE + AHILE**

### 01 TĂIETURĂ

U + I

### 02 ZONA DE APLICARE

Gleznă.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Ligamente laterale + Ahile.




### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| U CENTRU | → | 50% |
| I | → | 15–25% |

**Poziție:** Gleznă la 90°.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Etrier în U pe gleznă; I pe tendonul lui Ahile de la călcâi la gambă.

### 05 TENSIUNE

U centru 50% · I 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Verifică circulația degetelor.

HARTA 65

Y + I

# COMBINATĂ — CERVICAL: Y + TRAPEZ

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: PARAVERTEBRALI + TRAPEZ**




### 01 TĂIETURĂ

Y + I

### 02 ZONA DE APLICARE



Ceafă și umăr.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Paravertebrali + trapez.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Y pe paravertebrali cervicali; I pe trapezul superior de partea dureroasă.

### 05 TENSIUNE

Ambele 15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu suprapune ancorele.

### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| AMBELE | → | 15–25% |
| AMBELE | → | 15–25% |

**Poziție:** Gât în flexie, apoi înclinat lateral.

HARTA 66

# Y + I

# COMBINATĂ — ÎNCHEIETURĂ: TUNEL + STABILIZARE

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: FLEXORI + ÎNCHEIETURĂ**




### 01 TĂIETURĂ

Y + I

### 02 ZONA DE APLICARE

Încheietură.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Flexori + încheietură.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Y palmar pentru tunelul carpian; I scurt circular peste încheietură.

### 05 TENSIUNE

Y 15–25% · I 25%

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Nu închide inelul.

### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| Y | → | 15–25% |
| I | → | 25% |

**Poziție:** Încheietură în extensie, apoi neutră.

HARTA 67

# Y + DOUĂ I

## COMBINATĂ — COT: EPICONDIL + EXTENSORI

### APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: EXTENSORI + EPICONDIL**

**01 TĂIETURĂ**

Y + două I

**02 ZONA DE APLICARE**

Cot lateral.

**03 MUȘCHI / ȚINTĂ**

Extensori + epicondil.




**TENSIUNE ȘI POZIȚIE**

| | | |
|---|---|---|
| Y | → | 15–25% |
| I | → | centru 50% |

**Poziție:** Cot extins, încheietură flectată.

**04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE**

Y pe extensori; două I scurte încrucișate pe epicondil.

**05 TENSIUNE**

Y 15–25% · I centru 50%.

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Marchează punctul dureros.

HARTA 68

# Y + EVANTAI

## COMBINATĂ — GAMBĂ: GASTROCNEMIAN + DRENAJ

### APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: GASTROCNEMIAN + EDEM**




**01 TĂIETURĂ**

Y + evantai

**02 ZONA DE APLICARE**

Gambă.

**03 MUȘCHI / ȚINTĂ**

Gastrocnemian + edem.

**04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE**

Y pe gastrocnemian; evantai de drenaj peste zona umflată.

**05 TENSIUNE**

Y 15–25% · evantai 0–20%.

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Drenajul se aplică ultimul.

**TENSIUNE ȘI POZIȚIE**

| | | |
|---|---|---|
| Y | → | 15–25% |
| EVANTAI | → | 0–20% |

**Poziție:** Gleznă în dorsiflexie.

HARTA 69

# Y + I

# COMBINATĂ — ȘOLD: FESIER MIJLOCIU + PIRIFORM

## APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: FESIER MIJLOCIU + PIRIFORM**




### 01 TĂIETURĂ

Y + I

### 02 ZONA DE APLICARE

Șold.

### 03 MUȘCHI / ȚINTĂ

Fesier mijlociu + piriform.

### 04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE

Y pe fesierul mijlociu;
I pe piriform de la trohanter spre sacru.

### 05 TENSIUNE

Ambele
15–25%.

### 06 ATENȚIE CLINICĂ

Evită pliul interfesier.

### TENSIUNE ȘI POZIȚIE

| | | |
|---|---|---|
| AMBELE | → | 15–25% |
| AMBELE | → | 15–25% |

**Poziție:** Decubit lateral.

HARTA 70

# Y + PLASĂ

## COMBINATĂ — COAPSĂ: ISCHIOGAMBIERI + DRENAJ

### APLICARE VIZUALĂ

**01 TĂIETURĂ**

Y + plasă.

**02 ZONA DE APLICARE**



Coapsă posterioară.

**03 MUȘCHI / ȚINTĂ**

Ischiogambieri + edem.

**MUȘCHI / ȚINTĂ: ISCHIOGAMBIERI + EDEM**




**TENSIUNE ȘI POZIȚIE**

| | | |
|---|---|---|
| Y | → | 15–25% |
| PLASĂ | → | 0–20% |

**Poziție:** Genunchi extins.

**04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE**

Y pe ischiogambieri; plasă peste zona cu echimoză.

**05 TENSIUNE**

Y 15–25% · plasă 0–20%.

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Nu pe plăgi.

HARTA 71

# DOUĂ I + Y

## COMBINATĂ – TORACIC: POSTURĂ + ROMBOIZI

### APLICARE VIZUALĂ

**01 TĂIETURĂ**

Două I + Y

**02 ZONA DE APLICARE**

Între omoplați.

**03 MUȘCHI / ȚINTĂ**

Paravertebrali + romboizi.

**MUȘCHI / ȚINTĂ: PARAVERTEBRALI + ROMBOIZI**




**TENSIUNE ȘI POZIȚIE**

| | | |
|---|---|---|
| ANCORĂ | → | 0% |
| BENZI | → | 15–25% |

**Poziție:** Brațe încrucișate în față.

**04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE**

Două I paralele pe paravertebrali; Y pe romboizi de partea dureroasă.

**05 TENSIUNE**

Toate 15–25%

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Nu suprapune capetele.

HARTA 72

# EVANTAI + I

## COMBINATĂ — PICIOR: FASCIA PLANTARĂ + AHILE

### APLICARE VIZUALĂ

**MUȘCHI / ȚINTĂ: FASCIA PLANTARĂ + AHILE**




**01 TĂIETURĂ**

Evantai + I

**02 ZONA DE APLICARE**

Talpă și călcâi.

**03 MUȘCHI / ȚINTĂ**

Fascia plantară + Ahile.

**04 ANCORARE ȘI DIRECȚIE**

Evantai pe talpă;
I continuă de pe călcâi pe tendonul lui Ahile.

**05 TENSIUNE**

Ambele 15–25%.

**06 ATENȚIE CLINICĂ**

Fără tensiune pe călcâi.

**TENSIUNE ȘI POZIȚIE**

| | | |
|---|---|---|
| AMBELE | → | 15–25% |
| AMBELE | → | 15–25% |

**Poziție:** Gleznă în dorsiflexie.