BONUS #3

# 15 Protocoale pe Obiectiv


Un protocol pe pagină · secvență • tăietură • tensiune




PROTOCOLUL 01 / 15

# Lombalgie mecanică

**Obiectiv:** Reducerea durerii lombare la încărcare




| # | Banda | Tensiune | Direcție |
|---|---|---|---|
| 1 | Două benzi în I pe paravertebrali | 15–25% | De la sacru în sus |
| 2 | Stea din benzi în I pe punctul dureros | 25–50% în centru | Centrul pe durere |

**Poziția pacientului:** Trunchiul aplecat în față


**Observații:** Pacientul să evite flexiile bruște în primele ore.


**Hărți:** 12, 11

PROTOCOLUL 02 / 15

# Durere sacroiliacă

**Obiectiv:** Suport pe articulația sacroiliacă





| # | Banda | Tensiune | Direcție |
|---|---|---|---|
| 1 | X pe articulația sacroiliacă | 25–50% în centru | Centrul pe articulație |
| 2 | I pe pătratul lombar | 15–25% | Creasta iliacă → coasta 12 |


**Poziția pacientului:** Flexie ușoară a trunchiului
**Observații:** Evită pliul interfesier.
**Hărți:** 14, 13

PROTOCOLUL 03 / 15

# Postură toracică

**Obiectiv:** Ghidarea umerilor înapoi





| # | Banda | Tensiune | Direcție |
|---|---|---|---|
| 1 | X între omoplați | 25–50% în centru | Centrul primul |
| 2 | Y pe romboizi, partea dureroasă | 15–25% | Coloană → scapulă |


**Poziția pacientului:** Umerii în retracție la X, protractați la Y
**Observații:** Reevaluează postura după 48 h.
**Hărți:** 45, 41

PROTOCOLUL 04 / 15

# Cervicalgie de birou

**Obiectiv:** Descărcarea cefei și a trapezului




| # | Banda | Tensiune | Direcție |
|---|---|---|---|
| 1 | Y inversat pe extensorii cervicali | 15–25% | De jos în sus |
| 2 | I pe trapezul superior | 15–25% | Acromion → linia părului |

**Poziția pacientului:** Gât în flexie, apoi înclinat lateral


**Observații:** Nu acoperi părul.


**Hărți:** 7, 6

PROTOCOLUL 05 / 15

# Umăr dureros la ridicarea brațului

**Obiectiv:** Suport pentru supraspinos și deltoid





| # | Banda | Tensiune | Direcție |
|---|---|---|---|
| 1 | I pe supraspinos | 15–25% | Tuberculul mare → fosa supraspinoasă |
| 2 | Y pe deltoid | 15–25% | Inserție → mușchi |


**Poziția pacientului:** Braț la spate, apoi relaxat
**Observații:** Nu înlocuiește evaluarea ortopedică.
**Hărți:** 1, 3

PROTOCOLUL 06 / 15

# Epicondilită laterală

**Obiectiv:** Descărcarea extensorilor




| # | Banda | Tensiune | Direcție |
|---|---|---|---|
| 1 | Y pe extensori | 15–25% | Încheietură → epicondil |
| 2 | I scurt pe punctul dureros | 50% în centru | Transversal |

**Poziția pacientului:** Cot extins, încheietură flectată


**Observații:** Marchează punctul dureros înainte.


**Hărți:** 56, 52

PROTOCOLUL 07 / 15

# Tunel carpian

**Obiectiv:** Descărcarea canalului carpian





| # | Banda | Tensiune | Direcție |
|---|---|---|---|
| 1 | Y palmar | 15–25% | Palmă → antebraț |
| 2 | I scurt în jurul încheieturii | 25% | Fără să închizi inelul |


**Poziția pacientului:** Încheietură în extensie
**Observații:** Verifică sensibilitatea degetelor.
**Hărți:** 51, 53

PROTOCOLUL 08 / 15

# Durere patelofemurală

**Obiectiv:** Ghidarea rotulei





| # | Banda | Tensiune | Direcție |
|---|---|---|---|
| 1 | Y în jurul rotulei | 15–25% | De pe coapsă spre tibie |
| 2 | I sub rotulă | 50% în centru | Orizontal |


**Poziția pacientului:** Genunchi flectat
**Observații:** Fără tensiune pe rotulă.
**Hărți:** 21, 23

PROTOCOLUL 09 / 15

# Tendinopatie rotuliană

**Obiectiv:** Descărcarea tendonului rotulian




| # | Banda | Tensiune | Direcție |
|---|---|---|---|
| 1 | I scurt pe tendonul rotulian | 50–75% în centru | Orizontal |
| 2 | Y pe cvadriceps | 25–35% | Șold → rotulă |

**Poziția pacientului:** Genunchi flectat


**Observații:** Reduce sărituri în primele zile.


**Hărți:** 23, 28

PROTOCOLUL 10 / 15

# Suprasolicitarea ischiogambierilor

**Obiectiv:** Relaxare și drenaj




| # | Banda | Tensiune | Direcție |
|---|---|---|---|
| 1 | Y pe ischiogambieri | 15–25% | Genunchi → ischion |
| 2 | Plasă pe zona cu echimoză | 0–20% | Spre ganglioni |

**Poziția pacientului:** Genunchi extins

**Observații:** Nu pe plăgi.


**Hărți:** 26, 30

PROTOCOLUL 11 / 15

# Entorsă de gleznă · recuperare

**Obiectiv:** Stabilizare și drenaj




| # | Banda | Tensiune | Direcție |
|---|---|---|---|
| 1 | Etrier în U | 50% în centru | Sub călcâi în sus |
| 2 | Evantai de drenaj | 0–20% | Spre gambă |

**Poziția pacientului:** Glezna la 90°


**Observații:** Verifică circulația degetelor.


**Hărți:** 38, 37

PROTOCOLUL 12 / 15

# Tendinopatia lui Ahile

**Obiectiv:** Descărcarea tendonului




| # | Banda | Tensiune | Direcție |
|---|---|---|---|
| 1 | Y + I pe Ahile | Y 15–25% · I 50% | Călcâi → gambă |
| 2 | Y pe gastrocnemian | 15–25% | Călcâi → genunchi |

**Poziția pacientului:** Gleznă în dorsiflexie

**Observații:** Fără tensiune pe călcâi.


**Hărți:** 36, 33

PROTOCOLUL 13 / 15

# Fasciită plantară

**Obiectiv:** Suport pentru fascia plantară




| # | Banda | Tensiune | Direcție |
|---|---|---|---|
| 1 | Evantai pe talpă | 15–25% | Călcâi → degete |
| 2 | I pe solear | 15–25% | Călcâi → gambă |

**Poziția pacientului:** Gleznă în dorsiflexie, degete în extensie


**Observații:** Rotunjește capetele între degete.


**Hărți:** 39, 31

PROTOCOLUL 14 / 15

# Edem posttraumatic de genunchi

**Obiectiv:** Drenaj limfatic




| # | Banda | Tensiune | Direcție |
|---|---|---|---|
| 1 | Evantai încrucișat 1 | 0–20% | Spre fosa poplitee |
| 2 | Evantai încrucișat 2 | 0–20% | Spre fosa poplitee |

**Poziția pacientului:** Genunchi flectat


**Observații:** Nu pe piele lezată.


**Hărți:** 25, 24

PROTOCOLUL 15 / 15

# Durere pe tibie la alergare

**Obiectiv:** Descărcarea tibialului anterior




| # | Banda | Tensiune | Direcție |
|---|---|---|---|
| 1 | I pe tibialul anterior | 15–25% | Dosul piciorului → genunchi |
| 2 | Y pe gastrocnemian | 15–25% | Călcâi → genunchi |

**Poziția pacientului:** Gleznă în flexie plantară

**Observații:** Reduce volumul de alergare.

**Hărți:** 32, 33