Sygnały Ostrzegawcze

Jeśli zauważysz którykolwiek z nich: nie zostawaj z tym sam/a, skieruj pacjenta dalej.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia: 112. Nie pozostawiaj pacjenta bez opieki do czasu przybycia pomocy.

Zawsze, w każdym obszarze

- Myśli, plany samobójcze lub wcześniejsze próby
- Samookaleczenia i autoagresja
- Stosowanie przemocy lub doświadczanie krzywdzenia (zwłaszcza z udziałem dzieci)
- Zaburzenia poczucia rzeczywistości (omamy, urojenia)
- Ciężkie zaburzenia snu, łaknienia lub funkcjonowania trwające od tygodni

Lęk i stres

- Objawy somatyczne niewyjaśnione dotąd medycznie (bóle w klatce piersiowej, omdlenia)
- Sięganie po substancje w celu stłumienia lęku
- Skrajne wycofanie: pacjent nie opuszcza mieszkania

Nastrój i emocje

- Utrzymujący się od tygodni spadek nastroju, anhedonia, bezradność
- Niezwykle podwyższony nastrój, brak potrzeby snu, zachowania ryzykowne
- Niepohamowane wybuchy złości niosące zagrożenie

Relacje i rodzina

- Sygnały przemocy w relacji intymnej
- Zachowania kontrolujące, groźby w otoczeniu pacjenta
- Zagrożenie dobra lub bezpieczeństwa dziecka

Trauma i bezpieczeństwo

- Ostre objawy bezpośrednio po świeżym zdarzeniu traumatycznym
- Częste stany dysocjacyjne
- Pacjent w dalszym ciągu żyje w warunkach bezpośredniego zagrożenia

Ciało i odżywianie

- Znaczny spadek masy ciała, odmawianie jedzenia, prowokowanie wymiotów
- Kompulsywny wysiłek fizyczny mimo kontuzji i wycieńczenia
- Dolegliwości somatyczne bez wcześniejszej diagnozy lekarskiej

Żałoba i strata

- Osoba w żałobie deklaruje chęć śmierci, pragnie „dołączyć" do zmarłego
- Utrzymująca się miesiącami niezdolność do podstawowego funkcjonowania
- Używanie substancji psychoaktywnych w celu uśmierzenia bólu