SIGURANȚĂ CU FIECARE CLIENT™

Semnale de Alarmă: Când să Trimiți Clientul mai Departe

Simptome la care lucrul cu hărțile nu ar trebui să fie primul pas, precum și procedura de trimitere pas cu pas.

Cuprins

1 · Regula de bază

2 · Pe domenii

3 · Pașii pentru trimitere mai departe

Următorul pas

PARTEA 1

Regula de bază

În caz de îndoială, nu lua decizii de unul singur.

De ce este important

Un bun specialist nu se bazează pe rezolvarea fiecărei probleme pe cont propriu, ci pe știința de a recunoaște când o situație necesită alt tip de sprijin. Trimiterea la locul potrivit este o dovadă de grijă, nu un eșec.

PARTEA 2

Pe domenii

Verifică la fiecare client nou.

Întotdeauna, în orice domeniu

Dacă observi acest lucru: nu rămâne singur/ă cu această situație, trimite clientul mai departe

- [ ] Gânduri, planuri de suicid sau tentative anterioare
- [ ] Autovătămare și autoagresiune
- [ ] Comiterea de violențe sau expunerea la abuz (în special implicând copii)
- [ ] Tulburări ale simțului realității (halucinații, delir)
- [ ] Tulburări severe de somn, apetit sau funcționare care persistă de săptămâni

Anxietate şi stres

Dacă observi acest lucru: nu rămâne singur/ă cu această situație, trimite clientul mai departe

- [ ] Simptome somatice neclarificate medical până în prezent (dureri în piept, leșin)
- [ ] Apelul la substanțe pentru atenuarea anxietății
- [ ] Retragere extremă: clientul nu își părăsește locuința

Dispoziţie şi emoţii

Dacă observi acest lucru: nu rămâne singur/ă cu această situaţie, trimite clientul mai departe

- [ ] Scădere persistentă a dispoziției de săptămâni întregi, anhedonie, neajutorare
- [ ] Dispoziție extrem de crescută, lipsa nevoii de somn, comportamente riscante
- [ ] Izbucniri necontrolate de furie care implică pericole

Relaţii şi familie

Dacă observi acest lucru: nu rămâne singur/ă cu această situaţie, trimite clientul mai departe

- [ ] Semne de violență în relația de cuplu
- [ ] Comportamente de control, amenințări în anturajul clientului
- [ ] Pericol pentru bunăstarea sau siguranța copilului

Traumă şi siguranţă

Dacă observi acest lucru: nu rămâne singur/ă cu această situaţie, trimite clientul mai departe

- [ ] Simptome acute imediat după un eveniment traumatic recent
- [ ] Stări disociative frecvente
- [ ] Clientul continuă să trăiască în condiții de pericol direct

Corp şi alimentaţie

Dacă observi acest lucru: nu rămâne singur/ă cu această situaţie, trimite clientul mai departe

- [ ] Scădere semnificativă în greutate, refuzul de a mânca, provocarea vărsăturilor
- [ ] Efort fizic compulsiv în ciuda accidentărilor și a epuizării
- [ ] Acuze somatice fără un diagnostic medical prealabil

Doliu şi pierdere

Dacă observi acest lucru: nu rămâne singur/ă cu această situaţie, trimite clientul mai departe

- [ ] Persoana aflată în doliu își exprimă dorința de a muri, dorește să „se alăture” persoanei decedate
- [ ] Incapacitate de funcționare de bază care persistă luni de zile
- [ ] Consum de substanțe psihoactive pentru a alina durerea

PARTEA 3

Pașii pentru trimitere mai departe

Cu calm, direct și cu participarea activă a clientului.

1. **Întreabă direct.** Întrebarea despre gândurile de suicid nu crește riscul ca acestea să fie puse în practică.
2. **Evaluează nivelul actual de risc:** există un plan, acces la mijloace, un moment stabilit, istoric de tentative anterioare?
3. **În situație de pericol iminent:** sună la 112 și nu lăsa clientul nesupravegheat.
4. **Dacă nu există pericol iminent:** stabilește cu clientul un plan de trimitere (psihiatru, medic de familie, serviciile locale de sănătate mintală).
5. **Notează și documentează** simptomele observate, desfășurarea discuției și următorii pași stabiliți.
6. **Consultă cazul în supervizare** și ai grijă de propriul spațiu emoțional.

Următorul pas

Astăzi: printează versiunea de o pagină și așaz-o la loc vizibil în cabinet sau la spațiul de lucru.