ATLAS PUNKTÓW SPUSTOWYCH

100+ kart wizualnych bólu rzutowanego



Głowa · Bark · Plecy · Miednica · Kończyna dolna

ZANIM ZACZNIESZ

JAK KORZYSTAĆ Z ATLASU

STRUKTURA

102 kart uporządkowanych według pięciu okolic ciała. Każda karta pokazuje jeden mięsień: funkcję, przyczep początkowy, przyczep końcowy, unerwienie, położenie punktu spustowego, wzorzec bólu rzutowanego, sposób palpacji i objawy towarzyszące.

SZYBKIE WYSZUKIWANIE

Skorzystaj z alfabetycznego indeksu klinicznego, zakładek PDF w panelu bocznym (każdy mięsień jest dostępny jednym kliknięciem) lub wyszukiwarki objawów: wybierz, gdzie pojawia się ból, i sprawdź, które mięśnie wchodzą w grę.

OZNACZENIA

Białe kółko z czarnym X: punkt spustowy. Intensywna czerwień: główna strefa bólu. Jasnoczerwone kropkowanie: strefa rozszerzona (spillover).

DRUK

Format A4, zoptymalizowany do 300 DPI. Przy drukowaniu wybierz ustawienie „rzeczywisty rozmiar".

WAŻNE

Atlas służy do nauki i jako materiał referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej. Przy objawach ze strony klatki piersiowej, brzucha lub objawach neurologicznych zawsze najpierw wyklucz przyczyny medyczne.

SPIS TREŚCI

WEDŁUG OKOLIC CIAŁA

GŁOWA, TWARZ I SZYJA

1. Trapezius – włókna górne · 2. Sternocleidomastoideus (SCM) · 3. Masseter (mięsień żwacz) · 4. Temporalis (mięsień skroniowy) · 5. Pterygoideus lateralis · 6. Pterygoideus medialis · 7. Splenius capitis · 8. Splenius cervicis · 9. Mięśnie podpotyliczne · 10. Semispinalis capitis · 11. Levator scapulae (dźwigacz łopatki) · 12. Mięśnie pochyłe · 13. Digastricus · 14. Occipitofrontalis (mięsień potyliczno-czołowy) · 15. Zygomaticus major · 16. Orbicularis oculi · 17. Platysma · 18. Longus colli

BARK, RAMIĘ, PRZEDRAMIĘ I DŁOŃ

19. Trapezius – włókna środkowe · 20. Trapezius – włókna dolne · 21. Supraspinatus · 22. Infraspinatus · 23. Teres minor · 24. Teres major · 25. Subscapularis · 26. Deltoideus · 27. Latissimus dorsi · 28. Mięśnie równoległoboczne · 29. Pectoralis major (mięsień piersiowy większy) · 30. Pectoralis minor (mięsień piersiowy mniejszy) · 31. Serratus anterior · 32. Subclavius · 33. Coracobrachialis · 34. Biceps brachii · 35. Brachialis · 36. Triceps brachii · 37. Anconeus · 38. Supinator · 39. Brachioradialis · 40. Extensor carpi radialis · 41. Extensor digitorum · 42. Flexor carpi radialis i ulnaris · 43. Pronator teres · 44. Palmaris longus · 45. Adductor pollicis · 46. Opponens pollicis · 47. Mięśnie międzykostne dłoni

PLECY, KRĘGOSŁUP I TUŁÓW

48. Serratus posterior superior · 49. Serratus posterior inferior · 50. Iliocostalis thoracis · 51. Iliocostalis lumborum · 52. Longissimus thoracis · 53. Multifidus · 54. Rotatores i interspinales · 55. Quadratus lumborum · 56. Rectus abdominis (mięsień prosty brzucha) · 57. Obliquus externus abdominis · 58. Mięśnie międzyżebrowe · 59. Przepona · 60. Sternalis

MIEDNICA, BIODRO I POŚLADKI

61. Gluteus maximus · 62. Gluteus medius · 63. Gluteus minimus · 64. Piriformis · 65. Głębokie rotatory (gemelli i obturator internus) · 66. Quadratus femoris · 67. Tensor fasciae latae · 68. Iliopsoas · 69. Pectineus · 70. Adductor longus i brevis · 71. Adductor magnus · 72. Gracilis · 73. Sartorius (mięsień krawiecki) · 74. Mięśnie dna miednicy

UDO, PODUDZIE I STOPA

75. Rectus femoris · 76. Vastus medialis · 77. Vastus lateralis · 78. Vastus intermedius · 79. Biceps femoris · 80. Semitendinosus i semimembranosus · 81. Popliteus · 82. Gastrocnemius (mięsień brzuchaty łydki) · 83. Soleus (mięsień płaszczkowaty) · 84. Plantaris · 85. Tibialis anterior · 86. Tibialis posterior · 87. Peroneus longus · 88. Peroneus brevis · 89. Peroneus tertius · 90. Extensor digitorum longus · 91. Extensor hallucis longus · 92. Flexor digitorum longus · 93. Flexor hallucis longus · 94. Extensor digitorum brevis · 95. Abductor hallucis · 96. Flexor digitorum brevis · 97. Quadratus plantae · 98. Abductor digiti minimi (stopa) · 99. Mięśnie międzykostne stopy · 100. Adductor hallucis · 101. Extensor hallucis brevis · 102. Flexor hallucis brevis

INDEKS ALFABETYCZNY

98	Abductor digiti minimi (stopa)	Udo
95	Abductor hallucis	Udo
100	Adductor hallucis	Udo
70	Adductor longus i brevis	Miednica
71	Adductor magnus	Miednica
45	Adductor pollicis	Bark
37	Anconeus	Bark
34	Biceps brachii	Bark
79	Biceps femoris	Udo
35	Brachialis	Bark
39	Brachioradialis	Bark
33	Coracobrachialis	Bark
26	Deltoideus	Bark
13	Digastricus	Głowa
40	Extensor carpi radialis	Bark
41	Extensor digitorum	Bark
94	Extensor digitorum brevis	Udo
90	Extensor digitorum longus	Udo
101	Extensor hallucis brevis	Udo
91	Extensor hallucis longus	Udo
42	Flexor carpi radialis i ulnaris	Bark
96	Flexor digitorum brevis	Udo
92	Flexor digitorum longus	Udo
102	Flexor hallucis brevis	Udo
93	Flexor hallucis longus	Udo
82	Gastrocnemius (mięsień brzuchaty łydki)	Udo
61	Gluteus maximus	Miednica
62	Gluteus medius	Miednica
63	Gluteus minimus	Miednica
72	Gracilis	Miednica
65	Głębokie rotatory (gemelli i obturator internus)	Miednica
51	Iliocostalis lumborum	Plecy
50	Iliocostalis thoracis	Plecy
68	Iliopsoas	Miednica
22	Infraspinatus	Bark
27	Latissimus dorsi	Bark
11	Levator scapulae (dźwigacz łopatki)	Głowa
52	Longissimus thoracis	Plecy
18	Longus colli	Głowa
3	Masseter (mięsień żwacz)	Głowa
74	Mięśnie dna miednicy	Miednica
47	Mięśnie międzykostne dłoni	Bark
99	Mięśnie międzykostne stopy	Udo
58	Mięśnie międzyżebrowe	Plecy
12	Mięśnie pochyłe	Głowa
9	Mięśnie podpotyliczne	Głowa
28	Mięśnie równoległoboczne	Bark
53	Multifidus	Plecy
57	Obliquus externus abdominis	Plecy
14	Occipitofrontalis (mięsień potyliczno-czołowy)	Głowa
46	Opponens pollicis	Bark
16	Orbicularis oculi	Głowa
44	Palmaris longus	Bark
69	Pectineus	Miednica
29	Pectoralis major (mięsień piersiowy większy)	Bark
30	Pectoralis minor (mięsień piersiowy mniejszy)	Bark

INDEKS ALFABETYCZNY (CD.)

88	Peroneus brevis	Udo
87	Peroneus longus	Udo
89	Peroneus tertius	Udo
64	Piriformis	Miednica
84	Plantaris	Udo
17	Platysma	Głowa
81	Popliteus	Udo
43	Pronator teres	Bark
59	Przepona	Plecy
5	Pterygoideus lateralis	Głowa
6	Pterygoideus medialis	Głowa
66	Quadratus femoris	Miednica
55	Quadratus lumborum	Plecy
97	Quadratus plantae	Udo
56	Rectus abdominis (mięsień prosty brzucha)	Plecy
75	Rectus femoris	Udo
54	Rotatores i interspinales	Plecy
73	Sartorius (mięsień krawiecki)	Miednica
10	Semispinalis capitis	Głowa
80	Semitendinosus i semimembranosus	Udo
31	Serratus anterior	Bark
49	Serratus posterior inferior	Plecy
48	Serratus posterior superior	Plecy
83	Soleus (mięsień płaszczkowaty)	Udo
7	Splenius capitis	Głowa
8	Splenius cervicis	Głowa
60	Sternalis	Plecy
2	Sternocleidomastoideus (SCM)	Głowa
32	Subclavius	Bark
25	Subscapularis	Bark
38	Supinator	Bark
21	Supraspinatus	Bark
4	Temporalis (mięsień skroniowy)	Głowa
67	Tensor fasciae latae	Miednica
24	Teres major	Bark
23	Teres minor	Bark
85	Tibialis anterior	Udo
86	Tibialis posterior	Udo
20	Trapezius – włókna dolne	Bark
1	Trapezius – włókna górne	Głowa
19	Trapezius – włókna środkowe	Bark
36	Triceps brachii	Bark
78	Vastus intermedius	Udo
77	Vastus lateralis	Udo
76	Vastus medialis	Udo
15	Zygomaticus major	Głowa

WYSZUKIWARKA OBJAWÓW

GDZIE BOLI?

Znajdź miejsce, w którym pojawia się ból: wymienione mięśnie są najczęstszym źródłem punktów spustowych.

Ból głowy w okolicy skroni
Trapezius – włókna górne (1), Temporalis (mięsień skroniowy) (4), Sternocleidomastoideus (SCM) (2), Mięśnie podpotyliczne (9), Semispinalis capitis (10)

Ból czoła i okolicy oczu
Sternocleidomastoideus (SCM) (2), Occipitofrontalis (mięsień potyliczno-czołowy) (14), Orbicularis oculi (16), Zygomaticus major (15), Splenius cervicis (8)

Ból szczytu głowy
Splenius capitis (7), Sternocleidomastoideus (SCM) (2)

Ból żuchwy i zębów
Masseter (mięsień żwacz) (3), Temporalis (mięsień skroniowy) (4), Pterygoideus lateralis (5), Pterygoideus medialis (6), Digastricus (13)

Sztywność szyi
Levator scapulae (dźwigacz łopatki) (11), Trapezius – włókna górne (1), Splenius capitis (7), Semispinalis capitis (10), Mięśnie pochyłe (12)

Zawroty głowy
Sternocleidomastoideus (SCM) (2), Mięśnie podpotyliczne (9)

Ból gardła i przy przełykaniu
Pterygoideus medialis (6), Digastricus (13), Longus colli (18)

Ból między łopatkami
Mięśnie równoległoboczne (28), Trapezius – włókna środkowe (19), Mięśnie pochyłe (12), Serratus posterior superior (48), Levator scapulae (dźwigacz łopatki) (11)

Ból barku z przodu
Infraspinatus (22), Biceps brachii (34), Pectoralis major (mięsień piersiowy większy) (29), Pectoralis minor (mięsień piersiowy mniejszy) (30), Deltoideus (26), Coracobrachialis (33)

Ból barku z tyłu
Teres minor (23), Teres major (24), Subscapularis (25), Triceps brachii (36), Deltoideus (26), Latissimus dorsi (27)

Ból przy unoszeniu ręki
Supraspinatus (21), Infraspinatus (22), Deltoideus (26), Subscapularis (25)

Boczny ból łokcia (łokieć tenisisty)
Supinator (38), Extensor carpi radialis (40), Brachioradialis (39), Triceps brachii (36), Anconeus (37)

Przyśrodkowy ból łokcia (łokieć golfisty)
Flexor carpi radialis i ulnaris (42), Pronator teres (43), Triceps brachii (36), Pectoralis major (mięsień piersiowy większy) (29)

Ból nadgarstka i dłoni
Extensor digitorum (41), Flexor carpi radialis i ulnaris (42), Subscapularis (25), Mięśnie pochyłe (12), Pronator teres (43)

Ból kciuka
Brachialis (35), Adductor pollicis (45), Opponens pollicis (46), Supinator (38), Mięśnie pochyłe (12)

Drętwienie dłoni
Mięśnie pochyłe (12), Pectoralis minor (mięsień piersiowy mniejszy) (30), Pronator teres (43), Subclavius (32), Coracobrachialis (33)

WYSZUKIWARKA OBJAWÓW

GDZIE BOLI? (CD.)

Znajdź miejsce, w którym pojawia się ból: wymienione mięśnie są najczęstszym źródłem punktów spustowych.

Ból w klatce piersiowej (po wykluczeniu przyczyn medycznych)
Pectoralis major (mięsień piersiowy większy) (29), Pectoralis minor (mięsień piersiowy mniejszy) (30), Sternalis (60), Mięśnie pochyłe (12), Mięśnie międzyżebrowe (58)

Ból brzucha (po wykluczeniu przyczyn medycznych)
Rectus abdominis (mięsień prosty brzucha) (56), Obliquus externus abdominis (57), Iliocostalis thoracis (50)

Ból krzyża
Quadratus lumborum (55), Iliopsoas (68), Iliocostalis lumborum (51), Longissimus thoracis (52), Multifidus (53), Gluteus medius (62)

Ból pośladka
Gluteus maximus (61), Gluteus medius (62), Piriformis (64), Quadratus lumborum (55), Longissimus thoracis (52)

Ból podobny do rwy kulszowej
Gluteus minimus (63), Piriformis (64), Głębokie rotatory (gemelli i obturator internus) (65), Semitendinosus i semimembranosus (80), Biceps femoris (79)

Ból w pachwinie
Iliopsoas (68), Pectineus (69), Adductor longus i brevis (70), Adductor magnus (71), Obliquus externus abdominis (57)

Ból po zewnętrznej stronie biodra
Gluteus medius (62), Gluteus minimus (63), Tensor fasciae latae (67), Vastus lateralis (77), Quadratus lumborum (55)

Ból kolana z przodu
Rectus femoris (75), Vastus medialis (76), Vastus lateralis (77), Vastus intermedius (78), Adductor longus i brevis (70)

Ból kolana z tyłu
Popliteus (81), Gastrocnemius (mięsień brzuchaty łydki) (82), Biceps femoris (79), Plantaris (84), Semitendinosus i semimembranosus (80)

Ból i skurcze łydki
Gastrocnemius (mięsień brzuchaty łydki) (82), Soleus (mięsień płaszczkowaty) (83), Tibialis posterior (86), Flexor digitorum longus (92)

Ból stawu skokowego
Peroneus longus (87), Peroneus brevis (88), Peroneus tertius (89), Tibialis anterior (85)

Ból pięty
Soleus (mięsień płaszczkowaty) (83), Quadratus plantae (97), Abductor hallucis (95), Tibialis posterior (86)

Ból stopy
Flexor digitorum brevis (96), Adductor hallucis (100), Tibialis posterior (86), Gastrocnemius (mięsień brzuchaty łydki) (82), Flexor digitorum longus (92)

Ból palucha
Tibialis anterior (85), Extensor hallucis longus (91), Flexor hallucis longus (93), Flexor hallucis brevis (102)

OKOLICA CIAŁA

GŁOWA, TWARZ I SZYJA

Karty 1–18 · 18 mięśni

KARTA 01 · GŁOWA, TWARZ I SZYJA

TRAPEZIUS – WŁÓKNA GÓRNE

Musculus trapezius, pars descendens

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Unoszenie i rotacja łopatki ku górze
- Zgięcie boczne głowy i szyi w tę samą stronę
- Rotacja głowy w przeciwną stronę
- Unoszenie barków (wzruszanie ramionami)

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Kresa karkowa górna, guzowatość potyliczna zewnętrzna, więzadło karkowe (C1–C6).

PRZYCZEP KOŃCOWY

Boczna jedna trzecia obojczyka (clavicula, pars acromialis).

UNERWIENIE

N. accessorius (XI nerw czaszkowy); włókna proprioceptywne C3–C4.

PUNKT SPUSTOWY

Na górnym brzegu mięśnia w kącie między szyją a barkiem, w połowie odległości między szyją a wyrostkiem barkowym; dobrze wyczuwalny chwytem szczypcowym.

BÓL RZUTOWANY

- Tylno-boczna strona szyi
- Okolica za uchem (wyrostek sutkowaty)
- Skroń (skroniowy ból głowy)
- Czasem kąt żuchwy

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- W pozycji siedzącej lub na plecach, głowa lekko pochylona w tę samą stronę
- Chwyt szczypcowy wzdłuż górnego brzegu
- Rolowanie pasma między palcami w poszukiwaniu napiętego pasma
- Nacisk odtwarza ból w kierunku skroni

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Napięciowy ból głowy
- Sztywność szyi, ograniczone zgięcie boczne
- Ból po długim siedzeniu lub rozmowach telefonicznych
- Unoszenie barków w stresie

WSKAZÓWKA KLINICZNA Sprawdź stanowisko pracy, noszenie torby i wzorzec oddechowy: górny trapezius jest przeciążony głównie przez złą ergonomię.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 02 · GŁOWA, TWARZ I SZYJA

STERNOCLEIDOMASTOIDEUS (SCM)

Musculus sternocleidomastoideus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Jednostronnie: zgięcie boczne głowy w tę samą stronę i rotacja w przeciwną stronę
- Obustronnie: zgięcie szyi
- Pomocniczy mięsień oddechowy (unosi klatkę piersiową)

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Głowa mostkowa: przednia powierzchnia rękojeści mostka. Głowa obojczykowa: przyśrodkowa jedna trzecia obojczyka.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Wyrostek sutkowaty i boczna połowa kresy karkowej górnej.

UNERWIENIE

N. accessorius (XI nerw czaszkowy); włókna czuciowe C2–C3.

PUNKT SPUSTOWY

Na całej długości głowy mostkowej i obojczykowej; badaj chwytem szczypcowym, głowa lekko obrócona w tę samą stronę.

BÓL RZUTOWANY

- Czoło i okolica oka (okolica oczodołu)
- Policzek i ucho, okolica za uchem
- Szczyt głowy i potylica
- Górna część mostka

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, głowa pochylona w tę samą stronę dla rozluźnienia
- Chwyć każdą głowę osobno chwytem szczypcowym
- Przesuwaj się od obojczyka do wyrostka sutkowatego
- Unikaj głębokiego nacisku w pobliżu tętnicy szyjnej

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Zawroty głowy, zaburzenia równowagi
- Łzawienie oka, nieostre widzenie
- Czołowy lub oczodołowy ból głowy
- Uczucie szumu w uchu po tej samej stronie

WSKAZÓWKA KLINICZNA Po urazie szyi typu whiplash SCM często jest zajęty. Badaj go razem z górnym trapezius.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 03 · GŁOWA, TWARZ I SZYJA

MASSETER (MIĘSIEŃ ŻWACZ)

Musculus masseter

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zamykanie ust (żucie, zgryz)
- Pomaga w wysuwaniu żuchwy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Łuk jarzmowy i kość jarzmowa (os zygomaticum).

PRZYCZEP KOŃCOWY

Kąt żuchwy i zewnętrzna powierzchnia gałęzi żuchwy (ramus mandibulae).

UNERWIENIE

N. massetericus (n. mandibularis, V/3).

PUNKT SPUSTOWY

W warstwie powierzchownej pod łukiem jarzmowym i nad kątem żuchwy; w warstwie głębokiej przed stawem skroniowo-żuchwowym.

BÓL RZUTOWANY

- Górne i dolne zęby trzonowe
- Żuchwa i policzek
- Nad brwią
- Głęboko w uchu (okolica stawu skroniowo-żuchwowego)

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- W pozycji siedzącej, usta lekko otwarte
- Chwyt szczypcowy: jeden palec w ustach, drugi na zewnątrz
- Poproś pacjenta o zaciśnięcie zębów: napięte pasmo się uwypukli

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ograniczone otwieranie ust
- Nadwrażliwość zębów bez widocznej przyczyny stomatologicznej
- Zgrzytanie zębami (bruksizm)

WSKAZÓWKA KLINICZNA Zmierz rozwarcie ust (norma to ok. 3 palce). Przy bruksizmie pomyśl o szynie nocnej i radzeniu sobie ze stresem.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 04 · GŁOWA, TWARZ I SZYJA

TEMPORALIS (MIĘSIEŃ SKRONIOWY)

Musculus temporalis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zamykanie ust
- Cofanie żuchwy (włókna tylne)

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Dół skroniowy (fossa temporalis) i powięź skroniowa.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Wyrostek dziobiasty żuchwy (processus coronoideus).

UNERWIENIE

Nn. temporales profundi (n. mandibularis, V/3).

PUNKT SPUSTOWY

W czterech obszarach nad łukiem jarzmowym: przednia, środkowa i dwie tylne grupy włókien; łatwo wyczuwalny podczas żucia.

BÓL RZUTOWANY

- Skroń i brew
- Bok głowy z promieniowaniem w kształcie palców
- Górne zęby
- Czasem za okiem

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- W pozycji siedzącej, zęby lekko zaciśnięte
- Palpacja płaska na skroni nad łukiem jarzmowym
- Szukaj tkliwych guzków w poprzek włókien

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból głowy w okolicy skroni
- Nadwrażliwość zębów na ciepło i zimno
- Zmęczenie żuchwy podczas żucia

WSKAZÓWKA KLINICZNA Temporalis i masseter często są zajęte razem: opracuj oba i zapytaj o nocne zgrzytanie zębami.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 05 · GŁOWA, TWARZ I SZYJA

PTERYGOIDEUS LATERALIS

Musculus pterygoideus lateralis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Otwieranie ust i wysuwanie żuchwy
- Boczny ruch mielący

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Skrzydło większe kości klinowej i blaszka boczna wyrostka skrzydłowatego.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Krążek stawowy stawu skroniowo-żuchwowego i szyjka wyrostka kłykciowego.

UNERWIENIE

N. pterygoideus lateralis (V/3).

PUNKT SPUSTOWY

Głęboko pod łukiem jarzmowym; wewnątrzustnie wyczuwalny za górnymi zębami trzonowymi, w kierunku głowy.

BÓL RZUTOWANY

- Głęboko w stawie skroniowo-żuchwowym
- Policzek nad zatoką szczękową
- Czasem przed uchem

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Palpacja wewnątrzustna w rękawiczce, za górnymi zębami trzonowymi
- Usta lekko otwarte
- Ostrożny, powolny nacisk

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Trzaski w stawie skroniowo-żuchwowym
- Zmienione odczucie zgryzu
- Ból przy żuciu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Częsta przyczyna trzasków w stawie skroniowo-żuchwowym. Głęboki mięsień opracowuj tylko delikatnie, a przy zmienionym zgryzie skonsultuj się ze stomatologiem.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 06 · GŁOWA, TWARZ I SZYJA

PTERYGOIDEUS MEDIALIS

Musculus pterygoideus medialis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zamykanie ust
- Wysuwanie i boczny ruch żuchwy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Dół skrzydłowaty (blaszka przyśrodkowa wyrostka skrzydłowatego).

PRZYCZEP KOŃCOWY

Wewnętrzna powierzchnia kąta żuchwy.

UNERWIENIE

N. pterygoideus medialis (V/3).

PUNKT SPUSTOWY

Po wewnętrznej stronie kąta żuchwy; od zewnątrz wyczuwalny przez nacisk ku górze pod kątem.

BÓL RZUTOWANY

- Gardło i nasada języka
- Pod uchem i przed nim (staw skroniowo-żuchwowy)
- Tylna ściana gardła

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Palpuj ku górze po wewnętrznej stronie kąta żuchwy
- Głowa lekko pochylona na tę samą stronę
- Przy przełykaniu ból może się nasilić

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból przy przełykaniu
- Uczucie bólu gardła bez infekcji
- Ograniczone otwieranie ust

WSKAZÓWKA KLINICZNA Jeśli przełykanie boli, a gardło nie jest zaczerwienione, pomyśl o pterygoideus medialis.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 07 · GŁOWA, TWARZ I SZYJA

SPLENIUS CAPITIS

Musculus splenius capitis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Wyprost głowy i szyi
- Rotacja i zgięcie boczne głowy w tę samą stronę

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Dolna połowa więzadła karkowego, wyrostki kolczyste C7–Th3.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Wyrostek sutkowaty i boczna jedna trzecia kresy karkowej górnej.

UNERWIENIE

Gałęzie tylne nerwów rdzeniowych szyjnych (C3–C5).

PUNKT SPUSTOWY

Między trapezius a SCM, około 2–3 cm poniżej wyrostka sutkowatego.

BÓL RZUTOWANY

- Szczyt głowy (vertex) po tej samej stronie
- Czasem potylica

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, głowa lekko obrócona
- Palpacja płaska poniżej wyrostka sutkowatego
- Rotacja głowy z oporem uwydatnia mięsień

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból szczytu głowy
- Sztywność szyi przy rotacji
- Ból po spaniu w złej pozycji

WSKAZÓWKA KLINICZNA Zapytaj o wysokość poduszki i pozycję snu: spanie na brzuchu często przeciąża mięśnie splenius.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 08 · GŁOWA, TWARZ I SZYJA

SPLENIUS CERVICIS

Musculus splenius cervicis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Wyprost szyi
- Rotacja szyi w tę samą stronę

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Wyrostki kolczyste Th3–Th6.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Guzki tylne wyrostków poprzecznych C1–C3.

UNERWIENIE

Gałęzie tylne nerwów rdzeniowych szyjnych (C4–C6).

PUNKT SPUSTOWY

W dolnej części szyi obok levator scapulae, w kącie między szyją a barkiem.

BÓL RZUTOWANY

- Głęboko za okiem
- Ból promieniujący do potylicy
- Kąt między szyją a barkiem

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu lub w pozycji siedzącej
- Głęboka palpacja bocznie na wysokości C7
- Obserwuj pasmo podczas rotacji głowy

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból za okiem
- Uczucie nieostrego widzenia
- Sztywność szyi

WSKAZÓWKA KLINICZNA Ból za okiem nie musi mieć przyczyny okulistycznej; wyklucz przyczyny medyczne, a potem zbadaj mięśnie szyi.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 09 · GŁOWA, TWARZ I SZYJA

MIĘŚNIE PODPOTYLICZNE

Mm. recti capitis posteriores et obliqui capitis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



◯ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Delikatny wyprost i rotacja głowy
- Precyzyjne ustawianie pozycji głowy (propriocepcja)

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Atlas i obrotnik (axis).

PRZYCZEP KOŃCOWY

Kość potyliczna (kresa karkowa dolna) i wyrostek poprzeczny atlasu.

UNERWIENIE

N. suboccipitalis (C1).

PUNKT SPUSTOWY

Tuż poniżej podstawy czaszki, między kością potyliczną a C2, głęboko.

BÓL RZUTOWANY

- Pasmowy ból od potylicy do skroni
- Za okiem
- Czasem aż do czoła

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, głowa w dłoniach terapeuty
- Opuszki palców wchodzą pod podstawę czaszki
- Niech nacisk tworzy ciężar głowy

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Szyjnopochodny ból głowy
- Ból głowy po pracy przy ekranie
- Ograniczone kiwanie głową

WSKAZÓWKA KLINICZNA Głównym czynnikiem przeciążającym jest wysunięta pozycja głowy: sprawdź wysokość monitora i rodzaj okularów.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 10 · GŁOWA, TWARZ I SZYJA

SEMISPINALIS CAPITIS

Musculus semispinalis capitis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Wyprost głowy
- Utrzymanie lordozy szyjnej

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Wyrostki poprzeczne C4–Th6.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Kość potyliczna między kresą karkową górną a dolną.

UNERWIENIE

Gałęzie tylne nerwów rdzeniowych szyjnych.

PUNKT SPUSTOWY

Na trzech poziomach: pod podstawą czaszki, w połowie szyi i w dolnej części szyi, obok wyrostków kolczystych.

BÓL RZUTOWANY

- Pasmo po boku głowy na wysokości skroni
- Potylica
- Tylna strona szyi

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu, czoło podparte
- Palpacja płaska 1–2 cm od linii środkowej pod potylicą
- Przesuwaj się w dół poziom po poziomie

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból głowy dookoła
- Ból szyi przy wyproście
- Drętwienie w okolicy potylicy (n. occipitalis major)

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przez mięsień przechodzi n. occipitalis major: napięty semispinalis może wywołać drętwienie i pieczenie owłosionej skóry głowy.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

LEVATOR SCAPULAE (DŹWIGACZ ŁOPATKI)

Musculus levator scapulae

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Unoszenie łopatki
- Rotacja łopatki w dół
- Zgięcie boczne i rotacja szyi w tę samą stronę

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Wyrostki poprzeczne C1–C4.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Kąt górny łopatki i górna część brzegu przyśrodkowego.

UNERWIENIE

N. dorsalis scapulae (C5) oraz C3–C4.

PUNKT SPUSTOWY

W kącie między szyją a barkiem oraz 1–2 cm nad kątem górnym łopatki.

BÓL RZUTOWANY

- Kąt między szyją a barkiem
- Wzdłuż przyśrodkowego brzegu łopatki
- Tylna strona barku

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- W pozycji siedzącej, głowa obrócona w przeciwną stronę
- Palpuj pod trapezius w kierunku kąta górnego łopatki
- Unoszenie barku uwydatnia mięsień

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- „Sztywny kark" (kręcz szyi)
- Bolesna rotacja głowy w tę samą stronę
- Ból po długim rozmawianiu przez telefon

WSKAZÓWKA KLINICZNA Klasyczna przyczyna skargi „nie mogę obrócić głowy". Odradzaj przytrzymywanie telefonu barkiem.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 12 · GŁOWA, TWARZ I SZYJA

MIĘŚNIE POCHYŁE

Mm. scaleni anterior, medius et posterior

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie boczne szyi
- Pomocnicze mięśnie oddechowe (unoszą dwa pierwsze żebra)

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Wyrostki poprzeczne C2–C7.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Pierwsze żebro (anterior, medius) i drugie żebro (posterior).

UNERWIENIE

Gałęzie przednie nerwów rdzeniowych szyjnych (C3–C8).

PUNKT SPUSTOWY

Na boku szyi nad obojczykiem, za tylnym brzegiem SCM.

BÓL RZUTOWANY

- Przednia część klatki piersiowej
- Przednia i tylna strona ramienia
- Promieniowa strona przedramienia, kciuk i palec wskazujący
- Przyśrodkowy brzeg łopatki

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, głowa lekko obrócona w przeciwną stronę
- Palpuj za SCM nad obojczykiem
- Ostrożnie: przebiega tu splot ramienny

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Drętwienie dłoni
- Ból przypominający zespół cieśni nadgarstka
- Napięcie szyi nasilające się przy oddychaniu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Mięśnie pochyłe mogą naśladować objawy „thoracic outlet". Zbadaj wzorzec oddechowy: oddychanie szczytowe je przeciąża.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 13 · GŁOWA, TWARZ I SZYJA

DIGASTRICUS

Musculus digastricus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



○ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Otwieranie ust
- Unoszenie kości gnykowej przy przełykaniu

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Brzusiec tylny: wcięcie sutkowe; brzusiec przedni: dół dwubrzuścowy żuchwy.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Ścięgno pośrednie przyczepione do kości gnykowej.

UNERWIENIE

Brzusiec tylny: n. facialis (VII); brzusiec przedni: n. mylohyoideus (V/3).

PUNKT SPUSTOWY

Na brzuścu tylnym za kątem żuchwy, na brzuścu przednim pod brodą.

BÓL RZUTOWANY

- Dolne siekacze i broda
- Górna część szyi wzdłuż przedniego brzegu SCM
- Pod uchem i za nim

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, głowa lekko odchylona
- Delikatna palpacja pod brodą i za kątem żuchwy
- Przy przełykaniu mięsień się napina

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Uczucie utrudnionego przełykania
- Nadwrażliwość dolnych zębów
- Uczucie guli w gardle

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przeciąża go wysunięta pozycja głowy i oddychanie przez usta. Sprawdź spoczynkową pozycję języka (na podniebieniu).

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 14 · GŁOWA, TWARZ I SZYJA

OCCIPITOFRONTALIS (MIĘSIEŃ POTYLICZNO-CZOŁOWY)

Musculus occipitofrontalis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Unoszenie brwi, marszczenie czoła
- Ruch owłosionej skóry głowy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Frontalis: skóra brwi; occipitalis: kresa karkowa najwyższa.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Czepiec ścięgnisty (galea aponeurotica).

UNERWIENIE

N. facialis (VII).

PUNKT SPUSTOWY

Na brzuścu czołowym nad brwią, na brzuścu potylicznym w górnej części potylicy.

BÓL RZUTOWANY

- Czoło
- Potylica
- Może promieniować też głęboko za oko

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach
- Palpacja płaska nad brwią i na potylicy
- Poproś pacjenta o uniesienie brwi

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból czoła
- Ból potylicy, przez który nie może leżeć na plecach
- Uczucie napięcia skóry głowy

WSKAZÓWKA KLINICZNA Marszczenie czoła może być oznaką stresu lub słabego wzroku: zapytaj o okulary i czas spędzany przed ekranem.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 15 · GŁOWA, TWARZ I SZYJA

ZYGOMATICUS MAJOR

Musculus zygomaticus major

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Pociąganie kącika ust ku górze i na zewnątrz (uśmiech)

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Kość jarzmowa.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Kącik ust (modiolus).

UNERWIENIE

N. facialis (VII).

PUNKT SPUSTOWY

W środkowej części mięśnia między kącikiem ust a kością jarzmową; chwytem szczypcowym od wewnątrz ust i z zewnątrz.

BÓL RZUTOWANY

- Bok nosa
- Przyśrodkowy kąt oka
- Środek czoła

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Chwyt szczypcowy: jeden palec w ustach, drugi na policzku
- Przesuwaj się od kącika ust do kości jarzmowej

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból twarzy
- Ból obok nosa
- Czasem uczucie przypominające zapalenie zatok

WSKAZÓWKA KLINICZNA Po wykluczeniu problemów z zatokami pomyśl przy bólu środkowej części twarzy także o mięśniach mimicznych.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 16 · GŁOWA, TWARZ I SZYJA

ORBICULARIS OCULI

Musculus orbicularis oculi

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zamykanie powiek
- Mrużenie oczu

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Przyśrodkowy brzeg oczodołu i więzadło powiekowe przyśrodkowe.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Skóra powiek i skóra wokół oka.

UNERWIENIE

N. facialis (VII).

PUNKT SPUSTOWY

Pod brwią, nad górną powieką; bardzo delikatnym chwytem szczypcowym.

BÓL RZUTOWANY

- Grzbiet i bok nosa
- Górna warga
- Okolica oka

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Oczy zamknięte, delikatny chwyt szczypcowy pod brwią
- Nigdy nie uciskaj gałki ocznej

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Zmęczenie oczu
- Mrużenie oczu w silnym świetle
- Napięcie wokół oczu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przeciąża go praca przy ekranie, czytanie i silne światło: zalecaj regularne przerwy i odpowiednie okulary.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

PLATYSMA

Platysma

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Pociąganie dolnej wargi i kącika ust w dół
- Napinanie skóry szyi

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Górna część klatki piersiowej (powięź piersiowa i naramienna).

PRZYCZEP KOŃCOWY

Dolny brzeg żuchwy i skóra dolnej części twarzy.

UNERWIENIE

N. facialis (VII), ramus colli.

PUNKT SPUSTOWY

Nad obojczykiem, w cienkiej warstwie nad SCM; chwytem szczypcowym razem ze skórą.

BÓL RZUTOWANY

- Kłujący ból na żuchwie
- Dolna część twarzy i broda

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Chwyt szczypcowy razem ze skórą
- Poproś pacjenta o ściągnięcie kącików ust w dół: płaski mięsień się napnie

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Kłucie w brodzie
- Napięcie przedniej strony szyi

WSKAZÓWKA KLINICZNA Często jest aktywny razem z punktami w SCM; przy cienkim mięśniu może wystarczyć rozciąganie i mobilizacja skóry.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 18 · GŁOWA, TWARZ I SZYJA

LONGUS COLLI

Musculus longus colli

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie i stabilizacja szyi
- Kontrola lordozy szyjnej

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Trzony kręgów i wyrostki poprzeczne C3–Th3.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Guzek przedni atlasu i trzony kręgów C2–C6.

UNERWIENIE

Gałęzie przednie nerwów rdzeniowych szyjnych (C2–C6).

PUNKT SPUSTOWY

Głęboko obok tchawicy, między SCM a tchawicą; tylko ostrożną głęboką palpacją.

BÓL RZUTOWANY

- Przednia część gardła
- Ból przy przełykaniu
- Przednia strona szyi

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, głowa podparta
- Odsuń SCM na bok i palpuj ostrożnie obok tchawicy
- Wyczuj tętno tętnicy szyjnej i omijaj je

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Uczucie guli w gardle
- Uczucie niestabilności szyi po urazie typu whiplash

WSKAZÓWKA KLINICZNA Po urazie typu whiplash często jest zahamowany: w aktywacji pomaga trening głębokich zginaczy szyi (kiwanie głową na leżąco).

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

OKOLICA CIAŁA

BARK, RAMIĘ, PRZEDRAMIĘ I DŁOŃ

Karty 19–47 · 29 mięśni

TRAPEZIUS – WŁÓKNA ŚRODKOWE

Musculus trapezius, pars transversa

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Przyciąganie łopatki do kręgosłupa (retrakcja)
- Stabilizacja łopatki

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Wyrostki kolczyste C7–Th3.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Wyrostek barkowy i górny brzeg grzebienia łopatki.

UNERWIENIE

N. accessorius (XI).

PUNKT SPUSTOWY

Między przyśrodkowym brzegiem łopatki a kręgosłupem, na wysokości grzebienia łopatki.

BÓL RZUTOWANY

- Między łopatką a kręgosłupem
- Pieczenie nad wyrostkiem barkowym

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu, ręce wzdłuż ciała
- Palpacja płaska w poprzek włókien

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Piekący ból między łopatkami
- Zmęczenie przy pracy siedzącej

WSKAZÓWKA KLINICZNA Często jest osłabiony i rozciągnięty (wysunięte barki): wzmacnianie jest tak samo ważne jak terapia.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 20 · BARK, RAMIĘ, PRZEDRAMIĘ I DŁOŃ

TRAPEZIUS – WŁÓKNA DOLNE

Musculus trapezius, pars ascendens

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



○ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Obniżanie łopatki (depresja)
- Rotacja łopatki ku górze

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Wyrostki kolczyste Th4–Th12.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Przyśrodkowy koniec grzebienia łopatki.

UNERWIENIE

N. accessorius (XI).

PUNKT SPUSTOWY

W dolnej przyśrodkowej części łopatki, gdzie włókna biegną do grzebienia łopatki.

BÓL RZUTOWANY

- Górna część szyi pod podstawą czaszki
- Tylna strona szyi
- Górna część łopatki

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu
- Chwyt szczypcowy obok kąta dolnego łopatki

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból szyi, którego źródło jest na plecach
- Ból wokół łopatki

WSKAZÓWKA KLINICZNA Źródło bólu szyi może być na plecach: jeśli terapia szyi nie wystarcza, zbadaj dolny trapezius.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

SUPRASPINATUS

Musculus supraspinatus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Początkowa faza odwodzenia ramienia
- Stabilizacja głowy kości ramiennej w panewce

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Dół nadgrzebieniowy (fossa supraspinata).

PRZYCZEP KOŃCOWY

Górna część guzka większego kości ramiennej.

UNERWIENIE

N. suprascapularis (C5–C6).

PUNKT SPUSTOWY

W dole nadgrzebieniowym pod trapezius; w części przyśrodkowej i bocznej.

BÓL RZUTOWANY

- Głęboko w środku barku (okolica mięśnia naramiennego)
- Zewnętrzna strona ramienia
- Boczna część łokcia

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- W pozycji siedzącej, ręka wzdłuż ciała
- Palpuj nad grzebieniem łopatki przez trapezius

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból przy unoszeniu ręki
- Nocny tępy ból barku

WSKAZÓWKA KLINICZNA Może naśladować obraz uszkodzenia stożka rotatorów. Badaj go razem z infraspinatus.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

INFRASPINATUS

Musculus infraspinatus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Rotacja zewnętrzna ramienia
- Stabilizacja głowy kości ramiennej

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Dół podgrzebieniowy (fossa infraspinata).

PRZYCZEP KOŃCOWY

Środkowa część guzka większego kości ramiennej.

UNERWIENIE

N. suprascapularis (C5–C6).

PUNKT SPUSTOWY

Pod grzebieniem łopatki, w górnej części dołu podgrzebieniowego.

BÓL RZUTOWANY

- Głęboko w przedniej części barku
- Przednia i zewnętrzna strona ramienia
- Promieniowa strona przedramienia i dłoni

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu lub w pozycji siedzącej
- Palpacja płaska na łopatce pod grzebieniem

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Nie może spać na bolesnej stronie
- Trudność z sięganiem za plecy (np. czesanie)

WSKAZÓWKA KLINICZNA Źródło „bólu barku z przodu" często leży z tyłu: infraspinatus badaj zawsze.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

TERES MINOR

Musculus teres minor

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



○ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Rotacja zewnętrzna ramienia
- Stabilizacja głowy kości ramiennej

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Górne dwie trzecie bocznego brzegu łopatki.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Dolna część guzka większego kości ramiennej.

UNERWIENIE

N. axillaris (C5–C6).

PUNKT SPUSTOWY

Na bocznym brzegu łopatki poniżej infraspinatus.

BÓL RZUTOWANY

- Głęboki, ograniczony ból w tylnej części barku

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu, ręka lekko odwiedziona
- Chwyt szczypcowy wzdłuż bocznego brzegu łopatki

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Punktowy ból barku z tyłu
- Drętwienie 4. i 5. palca (rzadko)

WSKAZÓWKA KLINICZNA Często ujawnia się dopiero po terapii infraspinatus.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

TERES MAJOR

Musculus teres major

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Rotacja wewnętrzna, przywodzenie i wyprost ramienia

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Kąt dolny łopatki.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Grzebień guzka mniejszego kości ramiennej.

UNERWIENIE

N. subscapularis inferior (C5–C7).

PUNKT SPUSTOWY

W tylnym fałdzie pachowym nad kątem dolnym łopatki.

BÓL RZUTOWANY

- Tylna część barku
- Tylna strona ramienia
- Czasem grzbietowa strona przedramienia

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, ręka uniesiona
- Chwyt szczypcowy w tylnym fałdzie pachowym

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból przy sięganiu nad głowę
- Sztywność barku

WSKAZÓWKA KLINICZNA Badaj go razem z latissimus dorsi: razem tworzą tylną ścianę dołu pachowego.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

SUBSCAPULARIS

Musculus subscapularis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Rotacja wewnętrzna ramienia
- Przednia stabilizacja głowy kości ramiennej

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Dół podłopatkowy (fossa subscapularis).

PRZYCZEP KOŃCOWY

Guzek mniejszy kości ramiennej.

UNERWIENIE

Nn. subscapulares (C5–C6).

PUNKT SPUSTOWY

W dole pachowym, na przedniej powierzchni łopatki, blisko bocznego brzegu.

BÓL RZUTOWANY

- Tylna część barku
- Łopatka
- Tylna strona ramienia
- Opaskowy ból wokół nadgarstka

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, ręka odwiedziona
- Palpuj w dół pachowy w kierunku przedniej powierzchni łopatki
- Powoli i ostrożnie

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ograniczenie ruchu typu „zamrożony bark”
- Ból nadgarstka bez widocznej przyczyny

WSKAZÓWKA KLINICZNA We wczesnej fazie zamrożonego barku (frozen shoulder) często odgrywa kluczową rolę.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

DELTOIDEUS

Musculus deltoideus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Odwodzenie ramienia (włókna środkowe)
- Zgięcie (włókna przednie)
- Wyprost (włókna tylne)

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Boczna jedna trzecia obojczyka, wyrostek barkowy, grzebień łopatki.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Guzowatość naramienna kości ramiennej.

UNERWIENIE

N. axillaris (C5–C6).

PUNKT SPUSTOWY

Na włóknach przednich, środkowych i tylnych w górnej jednej trzeciej ramienia.

BÓL RZUTOWANY

- Miejscowy ból w przedniej, bocznej lub tylnej części barku
- Górna część ramienia

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- W pozycji siedzącej
- Chwyt szczypcowy lub palpacja płaska na włóknach

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból przy unoszeniu ręki
- Uczucie osłabienia barku

WSKAZÓWKA KLINICZNA Ból mięśnia naramiennego jest miejscowy; jeśli promieniuje dalej, szukaj przyczyny w stożku rotatorów.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

LATISSIMUS DORSI

Musculus latissimus dorsi

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Rotacja wewnętrzna, przywodzenie i wyprost ramienia
- Ruchy przyciągania (podciąganie)

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Wyrostki kolczyste Th7–L5, powięź piersiowo-lędźwiowa, grzebień biodrowy, dolne żebra.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Bruzda międzyguzkowa kości ramiennej.

UNERWIENIE

N. thoracodorsalis (C6–C8).

PUNKT SPUSTOWY

W tylnym fałdzie pachowym, chwytem szczypcowym.

BÓL RZUTOWANY

- Wokół kąta dolnego łopatki
- Tylna przyśrodkowa strona ramienia
- 4. i 5. palec

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, ręka nad głową
- Chwyt szczypcowy w tylnym fałdzie pachowym

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Stały tępy ból pleców pod łopatką
- Ból przy sięganiu nad głowę

WSKAZÓWKA KLINICZNA Częsty u pływaków, wioślarzy i wspinaczy. Pomyśl o nim przy tępym bólu pleców, którego pacjent „nie potrafi dokładnie wskazać".

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 28 · BARK, RAMIĘ, PRZEDRAMIĘ I DŁOŃ

MIĘŚNIE RÓWNOLEGŁOBOCZNE

Mm. rhomboidei major et minor

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

○ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Przyciąganie łopatki do kręgosłupa i jej unoszenie

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Wyrostki kolczyste C7–Th5.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Przyśrodkowy brzeg łopatki.

UNERWIENIE

N. dorsalis scapulae (C4–C5).

PUNKT SPUSTOWY

Wzdłuż przyśrodkowego brzegu łopatki pod trapezius.

BÓL RZUTOWANY

- Wzdłuż przyśrodkowego brzegu łopatki
- Powierzchowny, „rwący" ból

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu, ręka zwisająca
- Palpuj na przyśrodkowym brzegu łopatki przez trapezius

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból między łopatkami
- Trzaski przy ruchu łopatki

WSKAZÓWKA KLINICZNA Często są rozciągane przez napięte mięśnie piersiowe: pracuj także z przodu, nie tylko z tyłu.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

PECTORALIS MAJOR (MIĘSIEŃ PIERSIOWY WIĘKSZY)

Musculus pectoralis major

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Przywodzenie i rotacja wewnętrzna ramienia
- Zgięcie (część obojczykowa)

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Przyśrodkowa połowa obojczyka, mostek, chrząstki żeber 1–6.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Grzebień guzka większego kości ramiennej.

UNERWIENIE

Nn. pectorales medialis et lateralis (C5–Th1).

PUNKT SPUSTOWY

W części obojczykowej, mostkowej i żebrowej; w przednim fałdzie pachowym chwytem szczypcowym.

BÓL RZUTOWANY

- Przednia część barku
- Przednia część klatki piersiowej
- Wewnętrzna strona ramienia, przyśrodkowa strona łokcia
- 4. i 5. palec

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, ręka lekko odwiedziona
- Chwyt szczypcowy w przednim fałdzie pachowym
- Palpacja płaska obok mostka

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból w klatce piersiowej przypominający sercowy
- Wysunięte barki
- Ból przy sięganiu do tyłu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy bólu w klatce piersiowej zawsze najpierw wyklucz przyczyny medyczne (sercowe), zanim rozważysz pochodzenie mięśniowe.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

PECTORALIS MINOR (MIĘSIEŃ PIERSIOWY MNIEJSZY)

Musculus pectoralis minor

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Pociąganie łopatki do przodu i w dół
- Pomocniczy mięsień oddechowy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Żebra 3–5.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Wyrostek kruczy (processus coracoideus).

UNERWIENIE

N. pectoralis medialis (C8–Th1).

PUNKT SPUSTOWY

Pod wyrostkiem kruczym i nad żebrami 3–5, przez pectoralis major.

BÓL RZUTOWANY

- Przednia część barku
- Klatka piersiowa
- Wewnętrzna strona ramienia i łokciowa strona dłoni

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach
- Palpuj od strony dołu pachowego pod mięsień piersiowy w kierunku wyrostka kruczego

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Wysunięty bark
- Drętwienie dłoni (ucisk nerwowo-naczyniowy)

WSKAZÓWKA KLINICZNA Napięty pectoralis minor może zawężać przebieg splotu ramiennego: zbadaj go przy objawach thoracic outlet.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 31 · BARK, RAMIĘ, PRZEDRAMIĘ I DŁOŃ

SERRATUS ANTERIOR

Musculus serratus anterior

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



◯ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Pociąganie łopatki do przodu i przytrzymywanie jej przy klatce piersiowej
- Rotacja łopatki ku górze

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Zewnętrzna powierzchnia żeber 1–9.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Przyśrodkowy brzeg łopatki (powierzchnia przednia).

UNERWIENIE

N. thoracicus longus (C5–C7).

PUNKT SPUSTOWY

W linii pachowej środkowej na wysokości żeber 5–6.

BÓL RZUTOWANY

- Bok klatki piersiowej
- Kąt dolny łopatki
- Wewnętrzna strona ramienia

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na boku, ręka wyciągnięta do przodu
- Palpuj między żebrami w linii pachowej

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- „Kolka w boku” podczas biegu
- Ból nasilający się przy głębokim wdechu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Jego osłabienie powoduje odstawanie łopatki; we wzmacnianiu pomagają warianty pompek.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

SUBCLAVIUS

Musculus subclavius

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Stabilizacja obojczyka

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Pierwsze żebro i jego chrząstka.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Dolna powierzchnia obojczyka.

UNERWIENIE

N. subclavius (C5–C6).

PUNKT SPUSTOWY

Pod obojczykiem w środkowej jednej trzeciej, przez pectoralis major.

BÓL RZUTOWANY

- Przednia strona ramienia
- Promieniowa strona przedramienia
- Kciuk i palec wskazujący

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach
- Palpuj ku górze pod obojczyk

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Drętwienie palców
- Ból barku z przodu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Pod obojczykiem przebiega żyła podobojczykowa: nie stosuj długotrwałego silnego nacisku.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 33 · BARK, RAMIĘ, PRZEDRAMIĘ I DŁOŃ

CORACOBRACHIALIS

Musculus coracobrachialis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie i przywodzenie ramienia

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Wyrostek kruczy.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Środek przyśrodkowej powierzchni kości ramiennej.

UNERWIENIE

N. musculocutaneus (C6–C7).

PUNKT SPUSTOWY

Po wewnętrznej stronie ramienia przy dole pachowym, za głową krótką bicepsa.

BÓL RZUTOWANY

- Przednia część barku
- Tylna strona ramienia i przedramienia
- Grzbiet dłoni

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, ręka odwiedziona i w rotacji zewnętrznej
- Palpuj w dole pachowym obok kości ramiennej

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból przy sięganiu ręką do tyłu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przechodzi przez niego n. musculocutaneus: jego napięcie może powodować drętwienie zewnętrznej strony przedramienia.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

BICEPS BRACHII

Musculus biceps brachii

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie łokcia
- Rotacja zewnętrzna przedramienia (supinacja)

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Głowa długa: guzek nadpanewkowy; głowa krótka: wyrostek kruczy.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Guzowatość kości promieniowej i rozcięgno mięśnia dwugłowego.

UNERWIENIE

N. musculocutaneus (C5–C6).

PUNKT SPUSTOWY

W dalszej jednej trzeciej mięśnia, na obu głowach.

BÓL RZUTOWANY

- Przednia część barku
- Przednia strona ramienia
- Dół łokciowy

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- W pozycji siedzącej, łokieć lekko zgięty
- Chwyt szczypcowy na brzuścu mięśnia

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból przy unoszeniu nad głowę
- Osłabienie przy zginaniu łokcia

WSKAZÓWKA KLINICZNA Za „bólem barku z przodu” często nie stoi ścięgno, lecz punkt spustowy w bicepsie.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

BRACHIALIS

Musculus brachialis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie łokcia (główny zginacz)

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Dalsza połowa przedniej powierzchni kości ramiennej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Guzowatość kości łokciowej i wyrostek dziobiasty.

UNERWIENIE

N. musculocutaneus (C5–C6), częściowo n. radialis.

PUNKT SPUSTOWY

Kilka centymetrów nad łokciem, bocznie pod bicepsem.

BÓL RZUTOWANY

- Nasada kciuka (strona grzbietowa)
- Dół łokciowy
- Przednia strona ramienia

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- W pozycji siedzącej, łokieć zgięty do 90°
- Odsuń biceps i palpuj głęboko obok niego

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból kciuka
- Ból przy noszeniu ciężarów

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy bólu kciuka nie szukaj tylko na dłoni: przyczyną może być także brachialis.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

TRICEPS BRACHII

Musculus triceps brachii

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Wyprost łokcia
- Wyprost ramienia (głowa długa)

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Głowa długa: guzek podpanewkowy; głowa boczna i przyśrodkowa: tylna powierzchnia kości ramiennej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Wyrostek łokciowy (olecranon).

UNERWIENIE

N. radialis (C6–C8).

PUNKT SPUSTOWY

W głowie długiej, w głowie bocznej i nad łokciem.

BÓL RZUTOWANY

- Tylna część barku
- Tylna strona ramienia
- Łokieć (nadkłykcie)
- Grzbietowa strona przedramienia

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu lub w pozycji siedzącej, ręka zwisająca
- Chwyt szczypcowy na głowie długiej

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból łokcia podobny do „łokcia tenisisty”
- Ból przy prostowaniu ręki

WSKAZÓWKA KLINICZNA Źródłem bocznego bólu łokcia nie zawsze jest przedramię: zbadaj też głowę boczną tricepsa.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

ANCONEUS

Musculus anconeus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Pomaga w wyproście łokcia
- Stabilizacja stawu łokciowego

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Nadkłykieć boczny kości ramiennej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Boczna powierzchnia wyrostka łokciowego i tylna powierzchnia kości łokciowej.

UNERWIENIE

N. radialis (C7–C8).

PUNKT SPUSTOWY

Między wyrostkiem łokciowym a nadkłykciem bocznym.

BÓL RZUTOWANY

- Wokół nadkłykcia bocznego

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- W pozycji siedzącej, łokieć zgięty
- Palpacja płaska obok wyrostka łokciowego

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Miejscowy ból łokcia

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy łokciu tenisisty dokładna lokalizacja pomaga odróżnić anconeus od prostowników.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

SUPINATOR

Musculus supinator

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Rotacja zewnętrzna przedramienia (supinacja)

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Nadkłykieć boczny kości ramiennej, więzadło poboczne promieniowe, grzebień mięśnia odwracacza kości łokciowej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Bliższa jedna trzecia kości promieniowej.

UNERWIENIE

N. radialis profundus (C6–C7).

PUNKT SPUSTOWY

Bocznie poniżej dołu łokciowego, wokół głowy kości promieniowej.

BÓL RZUTOWANY

- Nadkłykieć boczny
- Grzbiet dłoni między kciukiem a palcem wskazującym

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- W pozycji siedzącej, przedramię w supinacji
- Palpuj poniżej głowy kości promieniowej

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Łokieć tenisisty
- Ból przy wkręcaniu lub przekręcaniu klamki

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przechodzi przez niego n. radialis profundus: napięty supinator może powodować osłabienie przedramienia.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

BRACHIORADIALIS

Musculus brachioradialis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

○ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie łokcia w pozycji pośredniej przedramienia

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Boczny brzeg nadkłykciowy kości ramiennej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Wyrostek rylcowaty kości promieniowej.

UNERWIENIE

N. radialis (C5–C6).

PUNKT SPUSTOWY

1–2 cm poniżej łokcia po promieniowej stronie przedramienia.

BÓL RZUTOWANY

- Nadkłykieć boczny
- Grzbietowa strona nadgarstka
- Okolica między kciukiem a palcem wskazującym

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- W pozycji siedzącej, przedramię w pozycji pośredniej
- Chwyt szczypcowy na promieniowym brzegu przedramienia

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból łokcia przy chwytaniu
- Ból grzbietu dłoni

WSKAZÓWKA KLINICZNA Chwytem szczypcowym łatwo go oddzielić od extensor carpi radialis.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 40 · BARK, RAMIĘ, PRZEDRAMIĘ I DŁOŃ

EXTENSOR CARPI RADIALIS

Mm. extensores carpi radiales longus et brevis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Wyprost i odwodzenie promieniowe nadgarstka
- Stabilizacja chwytu

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Boczny brzeg nadkłykciowy kości ramiennej i nadkłykieć boczny.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Podstawa II i III kości śródręcza.

UNERWIENIE

N. radialis (C6–C7).

PUNKT SPUSTOWY

W górnej jednej trzeciej przedramienia, po stronie grzbietowo-promieniowej.

BÓL RZUTOWANY

- Nadkłykieć boczny
- Grzbiet dłoni i nadgarstek

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- W pozycji siedzącej, przedramię w pronacji
- Palpuj poniżej łokcia po stronie grzbietowej

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Łokieć tenisisty
- Osłabienie chwytu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Częstym obciążeniem jest praca z myszką i pisanie na klawiaturze: sprawdź ustawienie nadgarstka przy pracy.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 41 · BARK, RAMIĘ, PRZEDRAMIĘ I DŁOŃ

EXTENSOR DIGITORUM

Musculus extensor digitorum

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

◯ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Wyprost palców
- Pomaga w wyproście nadgarstka

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Nadkłykieć boczny kości ramiennej (wspólne ścięgno prostowników).

PRZYCZEP KOŃCOWY

Rozcięgno grzbietowe palców 2–5.

UNERWIENIE

N. radialis profundus (C7–C8).

PUNKT SPUSTOWY

Na grzbietowej stronie przedramienia, 3–4 cm poniżej łokcia.

BÓL RZUTOWANY

- Grzbietowa strona przedramienia
- Grzbiet dłoni
- Palec środkowy i serdeczny

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- W pozycji siedzącej, przedramię w pronacji
- Poproś pacjenta o unoszenie palców pojedynczo: pasmo jest wyczuwalne

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Sztywność palców
- Osłabienie chwytu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Częsty u muzyków i osób, które dużo piszą na klawiaturze; pomagają przerwy i rozciąganie palców.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

FLEXOR CARPI RADIALIS I ULNARIS

Mm. flexores carpi radialis et ulnaris

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



○ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie nadgarstka
- Odpowiednio odwodzenie promieniowe lub łokciowe

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej (wspólne ścięgno zginaczy).

PRZYCZEP KOŃCOWY

Radialis: podstawa II kości śródręcza; ulnaris: kość grochowata, V kość śródręcza.

UNERWIENIE

N. medianus (FCR), n. ulnaris (FCU).

PUNKT SPUSTOWY

Na dłoniowej stronie przedramienia w górnej jednej trzeciej.

BÓL RZUTOWANY

- Dłoniowa strona nadgarstka (promieniowo i łokciowo)

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- W pozycji siedzącej, przedramię w supinacji
- Poproś o zgięcie nadgarstka z oporem

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Łokieć golfisty
- Ból nadgarstka przy chwytaniu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy łokciu golfisty (zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego) badaj go razem z pronator teres.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

PRONATOR TERES

Musculus pronator teres

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Rotacja wewnętrzna przedramienia (pronacja)
- Pomaga w zgięciu łokcia

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej i wyrostek dziobiasty kości łokciowej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Środek bocznej powierzchni kości promieniowej.

UNERWIENIE

N. medianus (C6–C7).

PUNKT SPUSTOWY

Przyśrodkowo poniżej dołu łokciowego, w pobliżu nadkłykcia przyśrodkowego.

BÓL RZUTOWANY

- Dłoniowo-promieniowa strona nadgarstka i przedramienia

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- W pozycji siedzącej, przedramię w supinacji
- Palpuj skośnie poniżej dołu łokciowego

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból przy ruchach skrętnych
- Drętwienie kciuka i palca wskazującego (n. medianus)

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przechodzi przez niego n. medianus: zespół mięśnia nawrotnego obłego może naśladować zespół cieśni nadgarstka.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

PALMARIS LONGUS

Musculus palmaris longus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Napinanie rozcięgna dłoniowego
- Pomaga w zgięciu nadgarstka

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Rozcięgno dłoniowe (aponeurosis palmaris).

UNERWIENIE

N. medianus (C7–C8).

PUNKT SPUSTOWY

Na dłoniowej stronie przedramienia w górnej jednej trzeciej.

BÓL RZUTOWANY

- Kłujący, igiełkowy ból w dłoni

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- W pozycji siedzącej
- Poproś pacjenta o dotknięcie kciukiem małego palca: ścięgno się uwypukli

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból dłoni przy trzymaniu narzędzi

WSKAZÓWKA KLINICZNA U około 15% osób go brakuje; jeśli go nie ma, szukaj innego źródła bólu dłoni.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

ADDUCTOR POLLICIS

Musculus adductor pollicis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

◯ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Przywodzenie kciuka (chwyt szczypcowy)

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

III kość śródręcza i kości nadgarstka.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Paliczek bliższy kciuka (strona łokciowa).

UNERWIENIE

N. ulnaris (C8–Th1).

PUNKT SPUSTOWY

W fałdzie skórnym między kciukiem a palcem wskazującym (pierwsza przestrzeń międzypalcowa).

BÓL RZUTOWANY

- Zewnętrzna strona kciuka
- Nasada kciuka

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Chwyt szczypcowy między kciukiem a palcem wskazującym

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Niezręczność przy precyzyjnych ruchach
- Ból przy pisaniu lub chwycie szczypcowym

WSKAZÓWKA KLINICZNA Częsty po korzystaniu z telefonu, pisaniu i szyciu. Zalecaj rozciąganie palców w przerwach w pracy.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 46 · BARK, RAMIĘ, PRZEDRAMIĘ I DŁOŃ

OPPONENS POLLICIS

Musculus opponens pollicis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

◯ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Przeciwstawianie kciuka

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Kość czworoboczna większa i troczek zginaczy.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Promieniowy brzeg I kości śródręcza.

UNERWIENIE

N. medianus (C8–Th1).

PUNKT SPUSTOWY

W kłębie kciuka, po promieniowej stronie dłoni.

BÓL RZUTOWANY

- Dłoniowa strona kciuka
- Dłoniowo-promieniowa część nadgarstka

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Palpacja płaska na kłębie kciuka
- Poproś o opozycję: kciuk dotyka małego palca

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Osłabienie chwytu
- Ból przy otwieraniu słoika

WSKAZÓWKA KLINICZNA W zespole cieśni nadgarstka mięśnie kłębu kciuka mogą słabnąć: zbadaj także siłę.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 47 · BARK, RAMIĘ, PRZEDRAMIĘ I DŁOŃ

MIĘŚNIE MIĘDZYKOSTNE DŁONI

Mm. interossei dorsales et palmares manus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

○ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Odwodzenie i przywodzenie palców
- Zgięcie w stawach śródręczno-paliczkowych, wyprost w stawach międzypaliczkowych

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Zwrócone do siebie powierzchnie kości śródręcza.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Paliczki bliższe i rozcięgno grzbietowe palców.

UNERWIENIE

N. ulnaris (C8–Th1).

PUNKT SPUSTOWY

Między kośćmi śródręcza, po stronie grzbietowej i dłoniowej.

BÓL RZUTOWANY

- Boki palców aż do paliczków dalszych
- Okolica guzków Heberdena

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Chwyt szczypcowy między kośćmi śródręcza

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Sztywność palców
- Ból po bokach palców

WSKAZÓWKA KLINICZNA Ból palców często wygląda na stawowy, ale może być mięśniowy: przebadaj palpacyjnie przestrzenie między kośćmi śródręcza.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

OKOLICA CIAŁA

PLECY, KRĘGOSŁUP I TUŁÓW

Karty 48–60 · 13 mięśni

KARTA 48 · PLECY, KRĘGOSŁUP I TUŁÓW

SERRATUS POSTERIOR SUPERIOR

Musculus serratus posterior superior

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Unoszenie górnych żeber przy wdechu

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Wyrostki kolczyste C7–Th3.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Żebra 2–5.

UNERWIENIE

Nn. intercostales (Th2–Th5).

PUNKT SPUSTOWY

Pod górną częścią łopatki; dostępny tylko przy łopatce wysuniętej do przodu.

BÓL RZUTOWANY

- Głęboko pod łopatką
- Tylna strona ramienia
- Mały palec

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- W pozycji siedzącej, ręce skrzyżowane przed klatką piersiową
- Palpuj pod przyśrodkowym brzegiem łopatki

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Głęboki, stały ból pod łopatką
- Drętwienie małego palca

WSKAZÓWKA KLINICZNA Bez odciągnięcia łopatki nie jest wyczuwalny: skrzyżowanie rąk odsłania mięsień.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

SERRATUS POSTERIOR INFERIOR

Musculus serratus posterior inferior

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Pociąganie dolnych żeber w dół i do tyłu

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Wyrostki kolczyste Th11–L2.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Żebra 9–12.

UNERWIENIE

Nn. intercostales (Th9–Th12).

PUNKT SPUSTOWY

Nad dolnymi żebrami, bocznie od kręgosłupa.

BÓL RZUTOWANY

- Miejscowy, rwący ból nad dolnymi żebrami

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu
- Palpacja płaska na dolnych żebrach

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Tępy ból nad żebrami
- Ból przy rotacji

WSKAZÓWKA KLINICZNA Może boleć, nawet gdy badanie odcinka lędźwiowego jest negatywne: palpuj nad żebrami.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 50 · PLECY, KRĘGOSŁUP I TUŁÓW

ILIOCOSTALIS THORACIS

Musculus iliocostalis thoracis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Wyprost kręgosłupa
- Zgięcie boczne w tę samą stronę

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Kąty dolnych 6 żeber.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Kąty górnych 6 żeber i wyrostek poprzeczny C7.

UNERWIENIE

Gałęzie tylne nerwów rdzeniowych.

PUNKT SPUSTOWY

W środkowym i dolnym odcinku piersiowym, bocznie od kręgosłupa.

BÓL RZUTOWANY

- W kierunku łopatki
- Z przodu, na tę samą stronę brzucha

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu
- Palpacja płaska wzdłuż kątów żeber

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból w piersiowej części pleców
- Ból brzucha, który wydaje się trzewny

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy bólu brzucha z negatywnym badaniem internistycznym pomyśl także o mięśniach grzbietu.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 51 · PLECY, KRĘGOSŁUP I TUŁÓW

ILIOCOSTALIS LUMBORUM

Musculus iliocostalis lumborum

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Wyprost i zgięcie boczne odcinka lędźwiowego

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Grzebień biodrowy i kość krzyżowa.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Kąty dolnych 6 żeber.

UNERWIENIE

Gałęzie tylne nerwów rdzeniowych (lędźwiowych).

PUNKT SPUSTOWY

Na wysokości L1, bocznie od kręgosłupa.

BÓL RZUTOWANY

- W kierunku środka pośladka
- Dolna część pleców

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu, poduszka pod brzuchem
- Palpacja płaska w okolicy lędźwiowej

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból krzyża promieniujący do pośladka
- Ból przy wstawaniu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Część bólu lędźwiowego może promieniować do pośladka, choć nie jest to rwa kulszowa.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 52 · PLECY, KRĘGOSŁUP I TUŁÓW

LONGISSIMUS THORACIS

Musculus longissimus thoracis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Wyprost kręgosłupa
- Zgięcie boczne w tę samą stronę

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Kość krzyżowa, grzebień biodrowy, wyrostki kolczyste kręgów lędźwiowych.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Wyrostki poprzeczne kręgów piersiowych i żebra.

UNERWIENIE

Gałęzie tylne nerwów rdzeniowych.

PUNKT SPUSTOWY

Na wysokości Th10–L1, 2–4 cm od linii środkowej.

BÓL RZUTOWANY

- Niżej, nad mięśniem pośladkowym
- Okolica krzyżowo-biodrowa

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu
- Głęboka palpacja płaska obok linii środkowej

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból dolnej części pleców i pośladka
- Sztywność po długim staniu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Ból pojawia się kilka segmentów niżej niż punkt spustowy: szukaj wyżej.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 53 · PLECY, KRĘGOSŁUP I TUŁÓW

MULTIFIDUS

Musculus multifidus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Segmentalna stabilizacja kręgów
- Wyprost i rotacja kręgosłupa

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Kość krzyżowa, kolec biodrowy, wyrostki poprzeczne.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Wyrostki kolczyste 2–4 poziomy wyżej.

UNERWIENIE

Gałęzie tylne nerwów rdzeniowych.

PUNKT SPUSTOWY

Tuż obok wyrostków kolczystych, głęboko.

BÓL RZUTOWANY

- Miejscowy ból obok kręgosłupa
- Kość krzyżowa i kość guziczna

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu
- Głęboka palpacja tuż obok wyrostka kolczystego

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Segmentalny, punktowy ból pleców
- Ból kości ogonowej

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy przewlekłym bólu krzyża często zanika: kluczowe są ćwiczenia stabilizacyjne.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 54 · PLECY, KRĘGOSŁUP I TUŁÓW

ROTATORES I INTERSPINALES

Mm. rotatores et interspinales

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Precyzyjna rotacja i wyprost kręgów
- Propriocepcja

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Wyrostki poprzeczne (rotatores), wyrostki kolczyste (interspinales).

PRZYCZEP KOŃCOWY

Wyrostek kolczysty sąsiedniego kręgu.

UNERWIENIE

Gałęzie tylne nerwów rdzeniowych.

PUNKT SPUSTOWY

Głęboko między wyrostkami kolczystymi.

BÓL RZUTOWANY

- Linia środkowa kręgosłupa na danym poziomie

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu
- Nacisk między wyrostkami kolczystymi i obok nich

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból kręgosłupa w linii środkowej
- Kręg tkliwy na opukiwanie

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy bólu w linii środkowej tkliwym na opukiwanie zawsze wyklucz przyczynę kostną (np. złamanie).

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 55 · PLECY, KRĘGOSŁUP I TUŁÓW

QUADRATUS LUMBORUM

Musculus quadratus lumborum

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie boczne odcinka lędźwiowego w tę samą stronę
- Unoszenie miednicy
- Stabilizacja 12. żebra przy wdechu

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Grzebień biodrowy i więzadło biodrowo-lędźwiowe.

PRZYCZEP KOŃCOWY

12. żebro i wyrostki poprzeczne L1–L4.

UNERWIENIE

Gałęzie przednie Th12–L3.

PUNKT SPUSTOWY

Między 12. żebrem a grzebieniem biodrowym, bocznie od prostownika grzbietu.

BÓL RZUTOWANY

- Staw krzyżowo-biodrowy
- Dolna część pośladka
- Grzebień biodrowy
- Krętarz większy (trochanter major)

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na boku, górna ręka nad głową
- Palpuj pod bocznym brzegiem prostownika grzbietu

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Silny ból krzyża przy wstawaniu
- Ból przy kaszlu
- Nie może spać na boku

WSKAZÓWKA KLINICZNA Częsta przyczyna ostrego „postrzału". Sprawdź różnicę długości kończyn dolnych i ustawienie miednicy.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

RECTUS ABDOMINIS (MIĘSIEŃ PROSTY BRZUCHA)

Musculus rectus abdominis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie tułowia
- Tłocznia brzuszna
- Utrzymanie miednicy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Spojenie łonowe i grzebień łonowy.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Chrząstki żeber 5–7 i wyrostek mieczykowaty.

UNERWIENIE

Nn. intercostales (Th7–Th12).

PUNKT SPUSTOWY

Nad pępkiem, obok pępka i nad kością łonową.

BÓL RZUTOWANY

- Poziome pasmo na plecach
- Wokół pępka
- Podbrzusze i krzyż

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, kolana zgięte
- Chwyt szczypcowy na brzegu mięśnia brzucha
- Uniesienie głowy napina mięsień

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Uczucie wzdęcia
- Ból przypominający skurcz brzucha
- Ból krzyża ze źródłem z przodu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy bólu brzucha zawsze wyklucz przyczyny internistyczne; dopiero potem zbadaj ścianę brzucha.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 57 · PLECY, KRĘGOSŁUP I TUŁÓW

OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS

Musculus obliquus externus abdominis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Rotacja tułowia w przeciwną stronę
- Zgięcie tułowia
- Tłocznia brzuszna

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Zewnętrzna powierzchnia żeber 5–12.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Grzebień biodrowy, więzadło pachwinowe, kresa biała.

UNERWIENIE

Nn. intercostales (Th7–Th12), n. iliohypogastricus.

PUNKT SPUSTOWY

Wzdłuż dolnych żeber i w pobliżu pachwiny.

BÓL RZUTOWANY

- Nadbrzusze (przypomina zgagę)
- Pachwina i podbrzusze

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach
- Chwyt szczypcowy na bocznej ścianie brzucha

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból przypominający zgagę
- Ból w pachwinie

WSKAZÓWKA KLINICZNA Częsty u sportowców (ruchy rotacyjne). Wyklucz przyczyny internistyczne.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 58 · PLECY, KRĘGOSŁUP I TUŁÓW

MIĘŚNIE MIĘDZYŻEBROWE

Mm. intercostales externi et interni

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Unoszenie i opuszczanie żeber przy oddychaniu
- Stabilizacja ściany klatki piersiowej

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Dolny brzeg żebra powyżej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Górny brzeg żebra poniżej.

UNERWIENIE

Nn. intercostales.

PUNKT SPUSTOWY

W przestrzeniach międzyżebrowych na bolesnym poziomie.

BÓL RZUTOWANY

- Miejscowy ból wzdłuż przestrzeni międzyżebrowej

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Palpacja płaska w przestrzeni międzyżebrowej
- Głęboki wdech zwiększa tkliwość

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Kłujący ból przy wdechu
- Ból po kaszlu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy silnym i ograniczonym bólu wyklucz złamanie żebra i wczesne stadium półpaśca.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

PRZEPONA

Diaphragma

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Główny mięsień wdechowy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Wyrostek mieczykowaty, dolne 6 żeber, kręgi lędźwiowe.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Środek ścięgnisty (centrum tendineum).

UNERWIENIE

N. phrenicus (C3–C5).

PUNKT SPUSTOWY

Z przodu pod łukiem żebrowym, ostrożną palpacją na wydechu.

BÓL RZUTOWANY

- Wzdłuż łuku żebrowego
- Szczyt barku

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, kolana zgięte
- Na wydechu palpuj pod łuk żebrowy ku górze

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Kolka w boku
- Ból przy głębokim wdechu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Oddychanie szczytowe wskazuje na niewystarczającą pracę przepony: naucz pacjenta oddychania brzusznego (przeponowego).

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

STERNALIS

Musculus sternalis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Nie ma istotnej funkcji

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Przednia powierzchnia mostka i chrząstek żebrowych.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Powięź piersiowa, zmiennie.

UNERWIENIE

Nn. pectorales lub intercostales.

PUNKT SPUSTOWY

Nad mostkiem, w linii środkowej.

BÓL RZUTOWANY

- Cały mostek
- Górna część klatki piersiowej
- Wewnętrzna strona ramienia

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Palpacja płaska na mostku

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból za mostkiem
- Uczucie ściskania w klatce piersiowej

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy ściskaniu w klatce piersiowej NAJPIERW badanie lekarskie (serce). Mięsień badaj dopiero potem.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

OKOLICA CIAŁA

MIEDNICA, BIODRO I POŚLADKI

Karty 61–74 · 14 mięśni

KARTA 61 · MIEDNICA, BIODRO I POŚLADKI

GLUTEUS MAXIMUS

Musculus gluteus maximus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Wyprost biodra
- Rotacja zewnętrzna uda
- Stabilizacja miednicy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Tylna część kości biodrowej, kość krzyżowa, kość guziczna.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Guzowatość pośladkowa kości udowej i pasmo biodrowo-piszczelowe.

UNERWIENIE

N. gluteus inferior (L5–S2).

PUNKT SPUSTOWY

Obok kości krzyżowej, nad guzem kulszowym i w dolnej przyśrodkowej części.

BÓL RZUTOWANY

- Kość krzyżowa i staw krzyżowo-biodrowy
- Cały pośladek
- Kość guziczna

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na boku lub na brzuchu
- Palpacja płaska lub chwyt szczypcowy

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból przy siedzeniu
- Ból przy chodzeniu pod górę

WSKAZÓWKA KLINICZNA Częsty po długim siedzeniu; pomagają przerwy w siedzeniu i aktywacja prostowników biodra.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

GLUTEUS MEDIUS

Musculus gluteus medius

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Odwodzenie biodra
- Utrzymanie miednicy w poziomie podczas chodu

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Zewnętrzna powierzchnia kości biodrowej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Krętarz większy.

UNERWIENIE

N. gluteus superior (L4–S1).

PUNKT SPUSTOWY

Tuż pod grzebieniem biodrowym, w trzech punktach od przodu do tyłu.

BÓL RZUTOWANY

- Wzdłuż grzebienia biodrowego
- Staw krzyżowo-biodrowy
- Środek i boczna strona pośladka

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na boku
- Palpacja płaska pod grzebieniem biodrowym

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból krzyża przy chodzeniu
- Nie może leżeć na chorej stronie

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy objawie Trendelenburga (opadająca miednica) jest osłabiony: wzmacniaj go unoszeniem nogi w leżeniu bokiem.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 63 · MIEDNICA, BIODRO I POŚLADKI

GLUTEUS MINIMUS

Musculus gluteus minimus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Odwodzenie i rotacja wewnętrzna biodra

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Zewnętrzna powierzchnia kości biodrowej (część przednia).

PRZYCZEP KOŃCOWY

Przedni brzeg krętarza większego.

UNERWIENIE

N. gluteus superior (L4–S1).

PUNKT SPUSTOWY

Głęboko pod gluteus medius, w części przedniej i tylnej.

BÓL RZUTOWANY

- Zewnętrzna strona uda i podudzia aż do kostki
- Tylna strona uda i łydki

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na boku
- Głęboka palpacja pod gluteus medius

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból przypominający rwę kulszową
- Ból przy wstawaniu i utykanie

WSKAZÓWKA KLINICZNA Najczęstsza mięśniowa przyczyna „rzekomej rwy kulszowej". Przy objawach neurologicznych (drętwienie, brak odruchów) konieczne jest badanie lekarskie.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

PIRIFORMIS

Musculus piriformis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Rotacja zewnętrzna uda
- Odwodzenie przy zgiętym biodrze

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Przednia powierzchnia kości krzyżowej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Górny brzeg krętarza większego.

UNERWIENIE

N. ad m. piriformem (S1–S2).

PUNKT SPUSTOWY

W przyśrodkowej i bocznej jednej trzeciej linii między kością krzyżową a krętarzem większym.

BÓL RZUTOWANY

- Okolica stawu krzyżowo-biodrowego
- Cały pośladek
- Tylna strona uda

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na boku, górna noga zgięta
- Głęboka palpacja przez mięsień pośladkowy

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból przy siedzeniu
- Drętwienie tylnej strony nogi (zespół mięśnia gruszkowatego)

WSKAZÓWKA KLINICZNA Nerw kulszowy (n. ischiadicus) przebiega pod nim lub przez niego: przy ucisku mogą pojawić się objawy podobne do rwy kulszowej.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

GŁĘBOKIE ROTATORY (GEMELLI I OBTURATOR INTERNUS)

Mm. gemelli et obturator internus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Rotacja zewnętrzna uda
- Stabilizacja głowy kości udowej

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Kolec kulszowy, wewnętrzna powierzchnia błony zasłonowej, guz kulszowy.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Przyśrodkowa powierzchnia krętarza większego.

UNERWIENIE

N. ad m. obturatorium internum (L5–S2).

PUNKT SPUSTOWY

Pod piriformis, za krętarzem większym.

BÓL RZUTOWANY

- Głęboko w dolnej części pośladka
- Tylna część biodra

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu, kolano zgięte
- Głęboka palpacja za krętarzem

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Głęboki ból pośladka
- Dyskomfort przy siedzeniu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Często są zajęte razem z piriformis; można je opracować tym samym rozciąganiem.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 66 · MIEDNICA, BIODRO I POŚLADKI

QUADRATUS FEMORIS

Musculus quadratus femoris

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Rotacja zewnętrzna uda

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Guz kulszowy.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Grzebień międzykrętarzowy.

UNERWIENIE

N. ad m. quadratum femoris (L4–S1).

PUNKT SPUSTOWY

Między guzem kulszowym a krętarzem większym.

BÓL RZUTOWANY

- Wokół guza kulszowego
- Tylna część biodra

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu
- Głęboka palpacja bocznie od guza kulszowego

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból guza kulszowego przy siedzeniu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy bólu wokół guza kulszowego odróżnij go od problemu ze ścięgnem mięśni kulszowo-goleniowych.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 67 · MIEDNICA, BIODRO I POŚLADKI

TENSOR FASCIAE LATAE

Musculus tensor fasciae latae

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie, odwodzenie i rotacja wewnętrzna biodra
- Napinanie pasma biodrowo-piszczelowego

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Kolec biodrowy przedni górny.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Pasmo biodrowo-piszczelowe.

UNERWIENIE

N. gluteus superior (L4–S1).

PUNKT SPUSTOWY

Pod kolcem biodrowym przednim górnym i za nim.

BÓL RZUTOWANY

- Zewnętrzna strona biodra
- Zewnętrzna strona uda do kolana

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach lub na boku
- Palpacja płaska pod kolcem biodrowym przednim górnym

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból biodra
- Ból przy szybkim chodzie

WSKAZÓWKA KLINICZNA U biegaczy badaj go razem z zespołem pasma biodrowo-piszczelowego.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

ILIOPSOAS

Musculus iliopsoas

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie biodra
- Stabilizacja odcinka lędźwiowego

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Psoas: kręgi Th12–L4; iliacus: dół biodrowy.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Krętarz mniejszy.

UNERWIENIE

Splot lędźwiowy (L1–L3), n. femoralis.

PUNKT SPUSTOWY

W pachwinie pod więzadłem pachwinowym oraz przez ścianę brzucha na psoas.

BÓL RZUTOWANY

- Pionowe pasmo wzdłuż kręgosłupa
- Kość krzyżowa
- Przednia strona uda

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, kolana zgięte
- Powoli, na wydechu palpuj głęboko przez ścianę brzucha
- Omijaj aortę brzuszną (tętno)

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból krzyża w staniu, który ustępuje w leżeniu
- Trudność z wyprostowaniem się z siadu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Długie siedzenie go skraca: naucz pacjenta rozciągania zginaczy biodra w wykroku.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

PECTINEUS

Musculus pectineus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Przywodzenie i zgięcie uda

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Grzebień kości łonowej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Kresa grzebieniowa kości udowej.

UNERWIENIE

N. femoralis (L2–L3), czasem n. obturatorius.

PUNKT SPUSTOWY

Poniżej pachwiny, w górnej przyśrodkowej części uda.

BÓL RZUTOWANY

- Głęboko w pachwinie

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, noga lekko odwiedziona
- Palpuj przyśrodkowo od tętnicy udowej

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból w pachwinie
- Ból przy siedzeniu ze skrzyżowanymi nogami

WSKAZÓWKA KLINICZNA Ból w pachwinie badaj pod kątem przyczyny mięśniowej dopiero po wykluczeniu przepukliny i przyczyny w stawie biodrowym.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 70 · MIEDNICA, BIODRO I POŚLADKI

ADDUCTOR LONGUS I BREVIS

Mm. adductores longus et brevis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Przywodzenie uda
- Pomaga w zgięciu biodra

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Kość łonowa.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Kresa chropawa kości udowej.

UNERWIENIE

N. obturatorius (L2–L4).

PUNKT SPUSTOWY

W górnej jednej trzeciej wewnętrznej strony uda.

BÓL RZUTOWANY

- Pachwina
- Wewnętrzna strona uda
- Wewnętrzna strona kolana i piszczel

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, kolano zgięte i opuszczone na bok
- Chwyt szczypcowy na wewnętrznej stronie uda

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Uczucie naciągnięcia w pachwinie
- Ból przy wchodzeniu po schodach

WSKAZÓWKA KLINICZNA Częsty u piłkarzy: zapobiega się mu stopniowym obciążaniem i wzmacnianiem przywodzicieli.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

ADDUCTOR MAGNUS

Musculus adductor magnus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Przywodzenie uda
- Wyprost biodra (włókna tylne)

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Gałąź dolna kości łonowej i guz kulszowy.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Kresa chropawa i guzek przywodzicieli.

UNERWIENIE

N. obturatorius i n. ischiadicus (L2–L4).

PUNKT SPUSTOWY

Na wewnętrznej stronie uda, w środku i u góry.

BÓL RZUTOWANY

- Pachwina
- Wewnętrzna strona uda
- Głęboko w miednicy

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, noga odwiedziona
- Palpuj na przyśrodkowo-tylnej stronie uda

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból wewnętrznej strony uda
- Dyskomfort w miednicy

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy bólu wewnątrz miednicy wyklucz przyczyny ginekologiczne i urologiczne.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

GRACILIS

Musculus gracilis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Przywodzenie uda
- Zgięcie i rotacja wewnętrzna kolana

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Gałąź dolna kości łonowej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Gęsia stopka (przyśrodkowa powierzchnia piszczeli).

UNERWIENIE

N. obturatorius (L2–L3).

PUNKT SPUSTOWY

W środkowej części wewnętrznej strony uda.

BÓL RZUTOWANY

- Piekący, powierzchowny ból po wewnętrznej stronie uda

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, noga odwiedziona
- Chwyt szczypcowy

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Pieczenie po wewnętrznej stronie uda

WSKAZÓWKA KLINICZNA Odróżnij od zapalenia kaletki gęsiej stopki: ból gracilis ciągnie się wzdłuż całego uda.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 73 · MIEDNICA, BIODRO I POŚLADKI

SARTORIUS (MIĘSIEŃ KRAWIECKI)

Musculus sartorius

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie, odwodzenie i rotacja zewnętrzna biodra
- Zgięcie kolana

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Kolec biodrowy przedni górny.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Gęsia stopka.

UNERWIENIE

N. femoralis (L2–L3).

PUNKT SPUSTOWY

W kilku miejscach wzdłuż przebiegu mięśnia.

BÓL RZUTOWANY

- Kłujący, powierzchowny ból skośnie przez przednią stronę uda

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach
- Chwyt szczypcowy wzdłuż skośnego przebiegu

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Kłujący ból uda
- Drętwienie zewnętrznej strony uda (n. cutaneus femoris lat.)

WSKAZÓWKA KLINICZNA N. cutaneus femoris lateralis przebiega w pobliżu kolca biodrowego przedniego górnego: może naśladować objawy meralgia paraesthetica.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 74 · MIEDNICA, BIODRO I POŚLADKI

MIĘŚNIE DNA MIEDNICY

Mm. levator ani et coccygeus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



○ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Podtrzymywanie narządów miednicy
- Wspieranie trzymania moczu

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Kość łonowa, łuk ścięgnisty, kolec kulszowy.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Kość guziczna i więzadło odbytowo-guziczne.

UNERWIENIE

Splot krzyżowy (S3–S4).

PUNKT SPUSTOWY

Obok kości guzicznej i na wewnętrznej ścianie miednicy; palpację wewnętrzną może wykonywać tylko przeszkolony specjalista.

BÓL RZUTOWANY

- Kość guziczna
- Dolna część kości krzyżowej
- Głęboko w miednicy

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Palpacja zewnętrzna obok kości guzicznej
- Badanie wewnętrzne należy do przeszkolonego terapeuty

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból kości ogonowej przy siedzeniu
- Uczucie ucisku w miednicy

WSKAZÓWKA KLINICZNA Terapia wewnętrzna wyłącznie przez terapeutę dna miednicy z odpowiednim przygotowaniem. Zalecane jest specjalistyczne badanie lekarskie.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

OKOLICA CIAŁA

UDO, PODUDZIE I STOPA

Karty 75–102 · 28 mięśni

KARTA 75 · UDO, PODUDZIE I STOPA

RECTUS FEMORIS

Musculus rectus femoris

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Wyprost kolana
- Zgięcie biodra

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Kolec biodrowy przedni dolny.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Rzepka i guzowatość piszczeli (więzadło rzepki).

UNERWIENIE

N. femoralis (L2–L4).

PUNKT SPUSTOWY

W górnej części uda poniżej pachwiny.

BÓL RZUTOWANY

- Wokół rzepki i głęboko w kolanie

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach
- Palpacja płaska w górnej przedniej części uda

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból kolana przy schodzeniu po schodach
- Nocny ból kolana

WSKAZÓWKA KLINICZNA Źródło bólu przedniej części kolana często leży wysoko na udzie: palpuj wyżej.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 76 · UDO, PODUDZIE I STOPA

VASTUS MEDIALIS

Musculus vastus medialis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Wyprost kolana
- Przyśrodkowa stabilizacja rzepki

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Warga przyśrodkowa kresy chropawej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Przyśrodkowy brzeg rzepki i więzadło rzepki.

UNERWIENIE

N. femoralis (L2–L4).

PUNKT SPUSTOWY

Przyśrodkowo nad rzepką i w środkowej części uda.

BÓL RZUTOWANY

- Wewnętrzna strona kolana
- Wewnętrzna przednia część uda

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, kolano lekko zgięte
- Palpacja płaska przyśrodkowo nad kolanem

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- „Uciekanie" kolana (buckling)
- Ból kolana przy przysiadzie

WSKAZÓWKA KLINICZNA „Uciekanie kolana" często wynika z punktu spustowego w vastus medialis, a nie z uszkodzenia więzadła.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 77 · UDO, PODUDZIE I STOPA

VASTUS LATERALIS

Musculus vastus lateralis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Wyprost kolana

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Krętarz większy, warga boczna kresy chropawej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Boczny brzeg rzepki i więzadło rzepki.

UNERWIENIE

N. femoralis (L2–L4).

PUNKT SPUSTOWY

Na całej długości mięśnia po zewnętrznej stronie uda.

BÓL RZUTOWANY

- Zewnętrzna strona uda
- Zewnętrzna strona kolana
- Boczny brzeg rzepki

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na boku
- Palpacja płaska po zewnętrznej stronie uda

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Nie może leżeć na chorej stronie
- „Zablokowanie” rzepki

WSKAZÓWKA KLINICZNA Może powodować boczne ściąganie rzepki: opracuj go razem ze wzmacnianiem strony przyśrodkowej.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 78 · UDO, PODUDZIE I STOPA

VASTUS INTERMEDIUS

Musculus vastus intermedius

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Wyprost kolana

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Przednia i boczna powierzchnia kości udowej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Górny brzeg rzepki.

UNERWIENIE

N. femoralis (L2–L4).

PUNKT SPUSTOWY

Głęboko pod rectus femoris, w górnej części uda.

BÓL RZUTOWANY

- Przednia środkowa część uda

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach
- Odsuń rectus femoris na bok i palpuj głęboko

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Trudność z pełnym wyprostem kolana
- Ból przy wstawaniu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Z powodu głębokiego położenia często bywa pomijany w badaniu.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 79 · UDO, PODUDZIE I STOPA

BICEPS FEMORIS

Musculus biceps femoris

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie kolana
- Wyprost biodra (głowa długa)

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Głowa długa: guz kulszowy; głowa krótka: kresa chropawa.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Głowa kości strzałkowej.

UNERWIENIE

N. ischiadicus (L5–S2).

PUNKT SPUSTOWY

W dolnej połowie tylno-zewnętrznej strony uda.

BÓL RZUTOWANY

- Za kolanem
- Tylna strona uda

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu
- Chwyt szczypcowy na tylno-zewnętrznej stronie uda

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból za kolanem przy chodzeniu
- Ból po siedzeniu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy długim siedzeniu może go uciskać krawędź krzesła: sprawdź wysokość siedziska.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

SEMITENDINOSUS I SEMIMEMBRANOSUS

Mm. semitendinosus et semimembranosus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



○ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie i rotacja wewnętrzna kolana
- Wyprost biodra

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Guz kulszowy.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Przyśrodkowa powierzchnia piszczeli (gęsia stopka) i kłykieć przyśrodkowy.

UNERWIENIE

N. ischiadicus (L5–S2).

PUNKT SPUSTOWY

W dolnej połowie tylno-wewnętrznej strony uda.

BÓL RZUTOWANY

- Dolna część pośladka
- Tylna strona uda
- Wewnętrzna strona kolana i łydki

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu
- Chwyt szczypcowy na tylno-wewnętrznej stronie uda

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból przy siedzeniu
- Ból przy chodzeniu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Mięśnie kulszowo-goleniowe często są napięte; poza rozciąganiem przed urazem chroni wzmacnianie ekscentryczne.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

POPLITEUS

Musculus popliteus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- „Odblokowanie" kolana z pełnego wyprostu (rotacja wewnętrzna)
- Tylna stabilizacja kolana

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Kłykieć boczny kości udowej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Tylna powierzchnia piszczeli.

UNERWIENIE

N. tibialis (L4–S1).

PUNKT SPUSTOWY

W dolnej części dołu podkolanowego, przyśrodkowo między głowami gastrocnemius.

BÓL RZUTOWANY

- Za kolanem

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu, kolano lekko zgięte
- Głęboka palpacja w dole podkolanowym (unikaj nacisku na naczynia)

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból przy schodzeniu z góry
- Ból przy przysiadzie

WSKAZÓWKA KLINICZNA Jeśli dół podkolanowy jest obrzęknięty lub ciepły, wyklucz torbiel Bakera i zakrzepicę żył głębokich.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

GASTROCNEMIUS (MIĘSIEŃ BRZUCHATY ŁYDKI)

Musculus gastrocnemius

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie podeszwowe stopy
- Pomaga w zgięciu kolana

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Kłykieć przyśrodkowy i boczny kości udowej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Guz kości piętowej (ścięgno Achillesa).

UNERWIENIE

N. tibialis (S1–S2).

PUNKT SPUSTOWY

W obu głowach, w górnej części łydki.

BÓL RZUTOWANY

- Wewnętrzna strona sklepienia stopy
- Za kolanem
- Łydka

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu
- Chwyt szczypcowy na głowach mięśnia łydki

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Nocne skurcze łydki
- Ból przy chodzeniu pod górę

WSKAZÓWKA KLINICZNA Za nocnymi skurczami łydki często stoi punkt spustowy: zalecane jest wieczorne rozciąganie.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

SOLEUS (MIĘSIEŃ PŁASZCZKOWATY)

Musculus soleus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie podeszwowe stopy (zwłaszcza przy zgiętym kolanie)
- Pompa żylna

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Głowa kości strzałkowej i tylna powierzchnia piszczeli.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Guz kości piętowej (ścięgno Achillesa).

UNERWIENIE

N. tibialis (S1–S2).

PUNKT SPUSTOWY

W dolnej części łydki nad ścięgnem Achillesa i wyżej.

BÓL RZUTOWANY

- Pięta
- Łydka
- Rzadko staw krzyżowo-biodrowy

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu, kolano zgięte do 90°
- Chwyt szczypcowy pod gastrocnemius

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból pięty
- Ból przy wchodzeniu po schodach

WSKAZÓWKA KLINICZNA Źródłem bólu pięty nie zawsze jest stopa: zbadaj także soleus.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

PLANTARIS

Musculus plantaris

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Pomaga w zgięciu podeszwowym stopy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Kresa nadkłykciowa boczna kości udowej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Guz kości piętowej.

UNERWIENIE

N. tibialis (S1–S2).

PUNKT SPUSTOWY

Bocznie w dole podkolanowym, obok głowy bocznej gastrocnemius.

BÓL RZUTOWANY

- Za kolanem
- Górna część łydki

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu
- Palpuj w bocznej części dołu podkolanowego

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból za kolanem

WSKAZÓWKA KLINICZNA Często go brakuje; zbadaj też inne źródła bólu w dole podkolanowym.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 85 · UDO, PODUDZIE I STOPA

TIBIALIS ANTERIOR

Musculus tibialis anterior

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie grzbietowe stopy
- Inwersja stopy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Boczna powierzchnia piszczeli.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Kość klinowata przyśrodkowa i I kość śródstopia.

UNERWIENIE

N. peroneus profundus (L4–L5).

PUNKT SPUSTOWY

W górnej jednej trzeciej przedniej strony podudzia, bocznie od piszczeli.

BÓL RZUTOWANY

- Przednia strona stawu skokowego
- Paluch
- Piszczel

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach
- Palpacja płaska obok piszczeli

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Potykanie się, uczucie „opadającej stopy”
- Ból goleni po bieganiu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy „shin splints” zbadaj tibialis anterior i sprawdź też obuwie do biegania.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 86 · UDO, PODUDZIE I STOPA

TIBIALIS POSTERIOR

Musculus tibialis posterior

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Utrzymanie sklepienia stopy
- Inwersja stopy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Tylna powierzchnia piszczeli i strzałki, błona międzykostna.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Guzowatość kości łódkowatej i kości stopy.

UNERWIENIE

N. tibialis (L4–L5).

PUNKT SPUSTOWY

Głęboko pod łydką; wyczuwalny tylko pośrednio.

BÓL RZUTOWANY

- Ścięgno Achillesa
- Cała podeszwa stopy
- Łydka

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu
- Głęboka pośrednia palpacja wzdłuż tylnego brzegu piszczeli

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból stopy przy chodzeniu
- Płaskostopie

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy płaskostopiu często jest przeciążony: ważne są odpowiednie obuwie i wkładki.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 87 · UDO, PODUDZIE I STOPA

PERONEUS LONGUS

Musculus fibularis (peroneus) longus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Ewersja stopy
- Zgięcie podeszwowe stopy
- Utrzymanie sklepienia stopy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Głowa kości strzałkowej i boczna powierzchnia strzałki.

PRZYCZEP KOŃCOWY

I kość śródstopia i kość klinowata przyśrodkowa.

UNERWIENIE

N. peroneus superficialis (L5–S1).

PUNKT SPUSTOWY

2–3 cm poniżej głowy kości strzałkowej.

BÓL RZUTOWANY

- Wokół kostki bocznej i za nią
- Zewnętrzna strona stopy

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na boku
- Palpacja płaska wzdłuż strzałki

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Uczucie niestabilności stawu skokowego
- Nawracający ból po skręceniu kostki

WSKAZÓWKA KLINICZNA N. peroneus przebiega wokół głowy kości strzałkowej: nie stosuj tu silnego ani długotrwałego nacisku.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 88 · UDO, PODUDZIE I STOPA

PERONEUS BREVIS

Musculus fibularis (peroneus) brevis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY



Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Ewersja stopy
- Zgięcie podeszwowe stopy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Dolne dwie trzecie strzałki.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Guzowatość V kości śródstopia.

UNERWIENIE

N. peroneus superficialis (L5–S1).

PUNKT SPUSTOWY

W dolnej jednej trzeciej zewnętrznej strony podudzia.

BÓL RZUTOWANY

- Kostka boczna
- Zewnętrzna strona stopy

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na boku
- Palpacja płaska wzdłuż dolnej części strzałki

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Niestabilność stawu skokowego
- Ból na nierównym terenie

WSKAZÓWKA KLINICZNA Po skręceniu kostki kluczowe są wzmacnianie i trening równowagi.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 89 · UDO, PODUDZIE I STOPA

PERONEUS TERTIUS

Musculus fibularis (peroneus) tertius

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie grzbietowe stopy
- Ewersja stopy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Dolna jedna trzecia strzałki.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Podstawa V kości śródstopia (strona grzbietowa).

UNERWIENIE

N. peroneus profundus (L5–S1).

PUNKT SPUSTOWY

W dolnej jednej trzeciej przednio-zewnętrznej strony podudzia.

BÓL RZUTOWANY

- Przednia strona stawu skokowego
- Zewnętrzna strona pięty

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach
- Palpacja płaska obok extensor digitorum longus

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból stawu skokowego z przodu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Badaj go razem z extensor digitorum longus.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 90 · UDO, PODUDZIE I STOPA

EXTENSOR DIGITORUM LONGUS

Musculus extensor digitorum longus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

○ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Wyprost palców 2–5 stopy
- Zgięcie grzbietowe stopy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Kłykieć boczny piszczeli, przednia powierzchnia strzałki.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Rozcięgno grzbietowe palców 2–5 stopy.

UNERWIENIE

N. peroneus profundus (L5–S1).

PUNKT SPUSTOWY

Na przednio-zewnętrznej stronie podudzia, około 8 cm poniżej kolana.

BÓL RZUTOWANY

- Grzbiet stopy
- Środkowe palce stopy

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach
- Poproś o uniesienie palców: pasmo jest wyczuwalne

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból grzbietu stopy
- Uczucie przypominające skurcz z przodu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Może go drażnić ciasne obuwie i mocne sznurowanie: sprawdź obuwie.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 91 · UDO, PODUDZIE I STOPA

EXTENSOR HALLUCIS LONGUS

Musculus extensor hallucis longus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Wyprost palucha
- Zgięcie grzbietowe stopy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Środkowa część strzałki.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Paliczek dalszy palucha.

UNERWIENIE

N. peroneus profundus (L5–S1).

PUNKT SPUSTOWY

W środkowej i dolnej części przedniej strony podudzia.

BÓL RZUTOWANY

- Grzbiet stopy
- Paluch

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach
- Poproś o uniesienie palucha

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból palucha
- Ból po bieganiu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Wyklucz stawową przyczynę: hallux rigidus.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 92 · UDO, PODUDZIE I STOPA

FLEXOR DIGITORUM LONGUS

Musculus flexor digitorum longus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

○ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie palców 2–5 stopy
- Zgięcie podeszwowe stopy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Tylna powierzchnia piszczeli.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Paliczki dalsze palców 2–5 stopy.

UNERWIENIE

N. tibialis (L5–S2).

PUNKT SPUSTOWY

Głęboko po wewnętrznej stronie łydki, za piszczelą.

BÓL RZUTOWANY

- Środkowa część podeszwy
- Mniejsze palce stopy

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu
- Palpuj za przyśrodkowym brzegiem piszczeli

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból stopy przy chodzeniu
- Skurcz palców stopy

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy płaskostopiu często jest przeciążony.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 93 · UDO, PODUDZIE I STOPA

FLEXOR HALLUCIS LONGUS

Musculus flexor hallucis longus

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

○ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie palucha
- Utrzymanie sklepienia stopy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Tylna powierzchnia strzałki.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Paliczek dalszy palucha.

UNERWIENIE

N. tibialis (L5–S2).

PUNKT SPUSTOWY

Głęboko w dolnej części łydki, bocznie.

BÓL RZUTOWANY

- Podeszwowa strona palucha
- Nasada palucha

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu
- Głęboka palpacja w dolnej części łydki

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból palucha od strony podeszwy
- Ból przy staniu na palcach

WSKAZÓWKA KLINICZNA U tancerzy i biegaczy często jest przeciążony.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 94 · UDO, PODUDZIE I STOPA

EXTENSOR DIGITORUM BREVIS

Musculus extensor digitorum brevis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Pomaga w wyproście palców 2–4 stopy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Grzbietowa powierzchnia kości piętowej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Ścięgna prostowników palców 2–4 stopy.

UNERWIENIE

N. peroneus profundus (L5–S1).

PUNKT SPUSTOWY

Na grzbiecie stopy, przed kostką boczną.

BÓL RZUTOWANY

- Miejscowy ból na grzbiecie stopy

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach
- Palpacja płaska przed kostką boczną

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból grzbietu stopy w bucie

WSKAZÓWKA KLINICZNA Może go uciskać ciasny język buta: pomoże luźniejsze sznurowanie.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 95 · UDO, PODUDZIE I STOPA

ABDUCTOR HALLUCIS

Musculus abductor hallucis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

◯ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Odwodzenie palucha
- Utrzymanie sklepienia przyśrodkowego

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Guz kości piętowej (wyrostek przyśrodkowy).

PRZYCZEP KOŃCOWY

Paliczek bliższy palucha (przyśrodkowo).

UNERWIENIE

N. plantaris medialis (S1–S2).

PUNKT SPUSTOWY

Na wewnętrznym brzegu stopy, przed piętą.

BÓL RZUTOWANY

- Wewnętrzna strona pięty
- Sklepienie przyśrodkowe

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach, stopa skręcona na zewnątrz
- Palpacja płaska na wewnętrznym brzegu stopy

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból po wewnętrznej stronie stopy przy chodzeniu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przebiega w pobliżu kanału stępu: przy drętwieniu zbadaj także n. tibialis.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 96 · UDO, PODUDZIE I STOPA

FLEXOR DIGITORUM BREVIS

Musculus flexor digitorum brevis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie palców 2–5 stopy
- Utrzymanie sklepienia stopy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Guz kości piętowej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Paliczki środkowe palców 2–5 stopy.

UNERWIENIE

N. plantaris medialis (S1–S2).

PUNKT SPUSTOWY

Na środku podeszwy pod rozcięgnem podeszwowym.

BÓL RZUTOWANY

- Głowy kości śródstopia (przodostopie)

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu
- Głęboka palpacja na środku podeszwy

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból przodostopia
- Ból po długim staniu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Odróżnij od zapalenia rozcięgna podeszwowego.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 97 · UDO, PODUDZIE I STOPA

QUADRATUS PLANTAE

Musculus quadratus plantae

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Koryguje kierunek pociągania flexor digitorum longus

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Podeszwowa powierzchnia kości piętowej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Ścięgno flexor digitorum longus.

UNERWIENIE

N. plantaris lateralis (S1–S2).

PUNKT SPUSTOWY

Głęboko przed piętą, na środku podeszwy.

BÓL RZUTOWANY

- Podeszwowa strona pięty

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu
- Głęboka palpacja przed piętą

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Poranny ból pięty

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy bólu pięty (ostroga piętowa) do objawów może przyczyniać się także quadratus plantae.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 98 · UDO, PODUDZIE I STOPA

ABDUCTOR DIGITI MINIMI (STOPA)

Musculus abductor digiti minimi pedis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

◯ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Odwodzenie i zgięcie małego palca stopy

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Guz kości piętowej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Paliczek bliższy małego palca stopy.

UNERWIENIE

N. plantaris lateralis (S1–S2).

PUNKT SPUSTOWY

Na zewnętrznym brzegu stopy.

BÓL RZUTOWANY

- Zewnętrzny brzeg stopy
- Głowa V kości śródstopia

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na boku
- Chwyt szczypcowy na zewnętrznym brzegu stopy

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból po zewnętrznej stronie stopy

WSKAZÓWKA KLINICZNA Ciasne obuwie może uciskać zewnętrzny brzeg stopy.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 99 · UDO, PODUDZIE I STOPA

MIĘŚNIE MIĘDZYKOSTNE STOPY

Mm. interossei pedis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

○ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Odwodzenie i przywodzenie palców stopy
- Stabilizacja stawów śródstopno-paliczkowych

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Boczne powierzchnie kości śródstopia.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Paliczki bliższe palców stopy.

UNERWIENIE

N. plantaris lateralis (S1–S2).

PUNKT SPUSTOWY

Między kośćmi śródstopia, po stronie grzbietowej i podeszwowej.

BÓL RZUTOWANY

- Boki palców stopy
- Okolica kości śródstopia

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Palpuj między kośćmi śródstopia

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból palców stopy
- Drętwienie między palcami

WSKAZÓWKA KLINICZNA Odróżnij od nerwiaka Mortona (drętwienie między palcami).

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 100 · UDO, PODUDZIE I STOPA

ADDUCTOR HALLUCIS

Musculus adductor hallucis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

Punkt spustowy (X) · Główna strefa bólu · Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Przywodzenie palucha
- Utrzymanie sklepienia poprzecznego

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Podstawy kości śródstopia 2–4 i torebki stawowe palców.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Paliczek bliższy palucha (bocznie).

UNERWIENIE

N. plantaris lateralis (S1–S2).

PUNKT SPUSTOWY

Głęboko pod przodostopiem.

BÓL RZUTOWANY

- Przodostopie pod głowami kości śródstopia

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu
- Głęboka palpacja na przodostopiu

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból przodostopia
- Ból w butach na wysokim obcasie

WSKAZÓWKA KLINICZNA Przy obniżeniu sklepienia poprzecznego często jest przeciążony; pomagają ćwiczenia palców (zwijanie ręcznika).

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 101 · UDO, PODUDZIE I STOPA

EXTENSOR HALLUCIS BREVIS

Musculus extensor hallucis brevis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

◯ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Wyprost stawu śródstopno-paliczkowego palucha

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Grzbietowa powierzchnia kości piętowej.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Paliczek bliższy palucha.

UNERWIENIE

N. peroneus profundus (L5–S1).

PUNKT SPUSTOWY

Na grzbiecie stopy, przyśrodkowo obok extensor digitorum brevis.

BÓL RZUTOWANY

- Grzbiet stopy nad nasadą palucha

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na plecach
- Palpacja płaska na grzbiecie stopy

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból grzbietu stopy nad paluchem

WSKAZÓWKA KLINICZNA Często jest zajęty razem z extensor digitorum brevis.

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.

KARTA 102 · UDO, PODUDZIE I STOPA

FLEXOR HALLUCIS BREVIS

Musculus flexor hallucis brevis

BÓL RZUTOWANY I PUNKT SPUSTOWY

◯ Punkt spustowy (X) ● Główna strefa bólu ● Strefa rozszerzona

FUNKCJA

- Zgięcie stawu śródstopno-paliczkowego palucha
- Utrzymanie sklepienia przyśrodkowego

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

Kość prostopadłościenna i kość klinowata boczna.

PRZYCZEP KOŃCOWY

Paliczek bliższy palucha (przez trzeszczki).

UNERWIENIE

N. plantaris medialis (S1–S2).

PUNKT SPUSTOWY

Po wewnętrznej stronie podeszwy pod I kością śródstopia.

BÓL RZUTOWANY

- Głowa I kości śródstopia
- Paluch

PALPACJA PUNKTU SPUSTOWEGO

- Na brzuchu
- Palpuj pod I kością śródstopia

OBJAWY TOWARZYSZĄCE

- Ból przy odbiciu

WSKAZÓWKA KLINICZNA Odróżnij od zapalenia trzeszczek (sesamoiditis).

Materiał edukacyjny i referencyjny. Nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani osobistego badania przez wykwalifikowanego terapeutę.