MAGABIZTOS MINDEN PÁCIENSNÉL™

# 30 klinikai eset lépésről lépésre

Panasz → lelet → gondolatmenet → kezelés. Kitalált, de tipikus esetek, hogy egy nehéz páciensnél is legyen egy kész gondolkodási út.

Triggerpont Atlasz · Oktatási anyag egészségügyi szakembereknek és hallgatóknak. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist.

# Tartalom

1 · Hogyan használd

2 · A 30 eset

Következő lépés

1. RÉSZ

# Hogyan használd

Olvasd úgy, mint egy esetmegbeszélést.

**Fontos**

Az esetek oktatási célú, kitalált példák, nem valódi betegek. Az izmok sorszáma a „60 kezelési protokoll” sorszámát jelöli, ha az is megvan. Minden esetnél először a „Előbb zárd ki” sort nézd meg.

1. Olvasd el a panaszt, és mielőtt továbbmész, tippeld meg, mely izmok jönnek szóba.
2. Hasonlítsd össze a gondolatmenettel.
3. Nézd meg a kizárandó állapotokat.
4. Keresd meg az izmokat az atlaszban.

2. RÉSZ

# A 30 eset

Fejtől a lábfejig.

## 1. Fejfájás a képernyő előtt

Nő, 34 éves, irodai munka · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | Délutánra erősödő halántéki és tarkótáji fejfájás, hetente 3–4×. |
| **LELET** | Fej előretolt tartás; feszes kötegek a trapezius felső rostjaiban és a suboccipitalis területen; a nyomás reprodukálja a halántéki fájdalmat. |
| **GONDOLATMENET** | A fájdalom helye (halánték, tarkó) és a testtartás a trapezius felső rostjaira és a suboccipitalis izmokra utal. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Trapezius – felső rostok (protokoll 1.); Suboccipitalis izmok (protokoll 9.); Temporalis (halántékizom) (protokoll 4.) |
| **OTTHONRA** | Állbehúzás óránként, monitor szemmagasságban, oldalra döntéses nyújtás. |

**Előbb zárd ki:** Hirtelen kezdetű, életében legerősebb fejfájás, látászavar, láz: nem ez az eset.

## 2. Merev nyak reggel

Férfi, 41 éves, tehergépkocsi-vezető · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | Ébredéskor nem tudja a fejét balra fordítani; a nyak és a lapocka belső széle fáj. |
| **LELET** | Rotáció balra korlátozott; érzékeny pont a jobb lapocka felső szöglete felett. |
| **GONDOLATMENET** | A fordítási korlátozás és a lapockaszöglet feletti fájdalom a levator scapulae klasszikus képe. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Levator scapulae (lapockaemelő) (protokoll 11.); Trapezius – felső rostok (protokoll 1.); Splenius cervicis (protokoll 8.) |
| **OTTHONRA** | Levator-nyújtás naponta kétszer; alacsonyabb párna. |

**Előbb zárd ki:** Sérülés, karba sugárzó zsibbadás, láz nincs.

## 3. Fogfájás, de a fogorvos nem talált semmit

Nő, 29 éves, egyetemista vizsgaidőszakban · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | Felső őrlőfogak fájnak, reggel feszes állkapocs. |
| **LELET** | Szájnyitás 2 ujjnyi; érzékeny pontok a masseterben; a nyomás reprodukálja a fogfájást. |
| **GONDOLATMENET** | Fogászati ok kizárva, a mintázat a masseterre jellemző; a stressz és a fogösszeszorítás fenntartja. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Masseter (rágóizom) (protokoll 3.); Temporalis (halántékizom) (protokoll 4.); Pterygoideus medialis (protokoll 6.) |
| **OTTHONRA** | Önmasszázs, a nyelv a szájpadláson, fogösszeszorítás figyelése. |

**Előbb zárd ki:** Fogászati vizsgálat megtörtént.

## 4. Szédülés és fejfájás nyakmozgáskor

Nő, 52 éves · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | A homlok és a szem körül fáj, néha enyhe egyensúlyzavar. |
| **LELET** | Az SCM sternalis része érzékeny; csipeszfogás reprodukálja a homlokfájdalmat. |
| **GONDOLATMENET** | Az SCM okozhat homlok- és szem körüli fájdalmat, valamint egyensúlyérzet-zavart. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Sternocleidomastoideus (SCM) (protokoll 2.); Trapezius – felső rostok (protokoll 1.) |
| **OTTHONRA** | Lassú fejmozgások, fekve tévézés kerülése. |

**Előbb zárd ki:** Valódi forgó szédülés, hallásvesztés, látászavar, beszédzavar: előbb orvos. Itt a háziorvos már kizárta.

## 5. Kézbe sugárzó fájdalom

Férfi, 38 éves, edző · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | Fájdalom a mellkas elején, a lapocka belső szélén és a hüvelykujj felé. |
| **LELET** | A scalenus területen finom nyomás reprodukálja; nincs erőcsökkenés. |
| **GONDOLATMENET** | A scalenusok a mellkas, a lapocka és a kéz felé sugároznak; a felső mellkasi légzés fenntartja. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Scalenus izmok (protokoll 12.); Pectoralis minor (protokoll 19.); Levator scapulae (lapockaemelő) (protokoll 11.) |
| **OTTHONRA** | Hasi légzés napi 5 percben, nehéz táska kerülése. |

**Előbb zárd ki:** Erőcsökkenés, reflexeltérés, tartós zsibbadás: ideggyöki eredet kizárására orvos.

## 6. Fájó váll alvás közben

Nő, 47 éves · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | A jobb váll elején mélyen fáj, nem tud a jobb oldalán aludni. |
| **LELET** | Érzékeny pontok az infraspinatusban; a nyomás a váll elejére sugároz. |
| **GONDOLATMENET** | Az infraspinatus a váll elejébe sugároz, miközben hátul van: gyakori félreértés. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Infraspinatus (protokoll 13.); Teres minor (protokoll 15.); Deltoideus (protokoll 17.) |
| **OTTHONRA** | Oldalt fekve párna a kar alá; keresztben húzó nyújtás. |

**Előbb zárd ki:** Erőtlen karemelés sérülés után, éjszakai fájdalom, amely semmire nem enyhül: orvos.

## 7. Fájdalmas karemelés

Férfi, 55 éves, festő · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | A váll oldalán fáj, ha a karját fej fölé emeli. |
| **LELET** | Érzékeny pont a lapockatövis felett; a nyomás a váll oldalára és a könyök külső oldalára sugároz. |
| **GONDOLATMENET** | A supraspinatus mintázata. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Supraspinatus (protokoll 14.); Infraspinatus (protokoll 13.); Deltoideus (protokoll 17.) |
| **OTTHONRA** | Ingamozgás naponta kétszer, munka közben szünetek. |

**Előbb zárd ki:** Sérülés, gyors erővesztés, éjszakai fájdalom: rotátorköpeny-szakadás kizárására orvos.

## 8. Befagyott váll-szerű korlátozás

Nő, 58 éves · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | Nem tudja a karját kifelé forgatni, a váll hátulja és a csukló fáj. |
| **LELET** | Kifelé forgatás erősen korlátozott; a hónaljból elért subscapularis érzékeny. |
| **GONDOLATMENET** | A subscapularis a váll hátuljába és a csuklóba sugároz, és korlátozza a kifelé forgatást. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Subscapularis (protokoll 16.); Pectoralis major (protokoll 18.); Teres minor (protokoll 15.) |
| **OTTHONRA** | Ajtókeret-nyújtás kifelé forgatással. |

**Előbb zárd ki:** Ha minden irányban korlátozott és éjszaka erősen fáj (adhaesiv capsulitis), orvosi vizsgálat és közös terv.

## 9. Mellkasi fájdalom edzés után

Férfi, 30 éves · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | A mellkas bal elején fáj fekvenyomás után. |
| **LELET** | A pectoralis major külső szélén feszes köteg; a nyomás reprodukálja. |
| **GONDOLATMENET** | Mechanikus, mozgásra és nyomásra változó fájdalom, edzés utáni túlterhelés. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Pectoralis major (protokoll 18.); Pectoralis minor (protokoll 19.); Serratus anterior (protokoll 21.) |
| **OTTHONRA** | Ajtófélfa-nyújtás, fokozatos visszatérés. |

**Előbb zárd ki:** Terheléskor jelentkező mellkasi fájdalom, légszomj, verejtékezés: AZONNAL orvos. Itt nem ez a helyzet.

## 10. Teniszkönyök

Férfi, 44 éves, villanyszerelő · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | A könyök külső oldala fáj csavarozáskor és fogáskor. |
| **LELET** | Érzékeny pontok az alkari feszítőkben a könyök alatt; a fogás fáj. |
| **GONDOLATMENET** | Az alkari feszítők a könyök külső oldalára sugároznak. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Alkari feszítők (ECRL, ECRB, extensor digitorum) (protokoll 25.); Triceps brachii (protokoll 24.); Supraspinatus (protokoll 14.) |
| **OTTHONRA** | Alkarnyújtás, szerszám markolatának megvastagítása. |

**Előbb zárd ki:** Duzzanat, melegség, éjszakai zsibbadás: orvos.

## 11. Zsibbadó, fájó tenyér

Nő, 39 éves, fodrász · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | A tenyér és az ujjak tenyéri oldala fáj, főleg munka után. |
| **LELET** | Az alkari hajlítók feszesek; éjszaka nincs zsibbadás. |
| **GONDOLATMENET** | Túlterhelt alkari hajlítók. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Alkari hajlítók (protokoll 26.); Pectoralis minor (protokoll 19.); Scalenus izmok (protokoll 12.) |
| **OTTHONRA** | Alkarnyújtás munka közben óránként. |

**Előbb zárd ki:** Éjszakai zsibbadás, ujjak ügyetlensége (kéztőalagút-szindróma): orvos.

## 12. Fájdalom a lapockák között

Nő, 33 éves, könyvelő · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | Égő fájdalom a lapockák között, estére rosszabb. |
| **LELET** | Görnyedt tartás; érzékeny pontok a rhomboideusban és a trapezius középső rostjaiban. |
| **GONDOLATMENET** | A gyakran túlnyújtott, gyenge hátizmok és a rövid mellizom kombinációja. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Rhomboideus (protokoll 20.); Trapezius – középső rostok (protokoll 27.); Pectoralis minor (protokoll 19.) |
| **OTTHONRA** | Mellizom-nyújtás, lapockahúzás 10× óránként. |

**Előbb zárd ki:** Mellkasi fájdalom terheléskor, légszomj: orvos.

## 13. Szúró fájdalom a mellkas oldalán

Férfi, 27 éves, futó · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | A bordák oldalán szúr futás közben. |
| **LELET** | A serratus anterior érzékeny az 5–6. bordánál. |
| **GONDOLATMENET** | Intenzív légzés és futás túlterheli a serratus anteriort. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Serratus anterior (protokoll 21.); Obliquus externus abdominis (protokoll 36.) |
| **OTTHONRA** | Mély légzés karemeléssel, fokozatos tempó. |

**Előbb zárd ki:** Láz, köhögés, légzéssel összefüggő éles fájdalom: orvos.

## 14. Derékfájás hajlás után

Férfi, 46 éves, raktáros · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | Hirtelen derékfájás egy doboz felemelése után; oldalra hajlás fáj. |
| **LELET** | A quadratus lumborum érzékeny; a lábba nem sugároz, nincs zsibbadás. |
| **GONDOLATMENET** | Oldalra hajlásra és a csípőcsont tarajára sugárzó fájdalom: quadratus lumborum. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Quadratus lumborum (protokoll 34.); Iliocostalis lumborum (protokoll 31.); Gluteus medius (protokoll 38.) |
| **OTTHONRA** | Oldalra döntéses nyújtás, emelés térdből. |

**Előbb zárd ki:** Lábba sugárzó zsibbadás, gyengeség, vizelet- vagy székletürítési zavar: azonnal orvos.

## 15. Derékfájás hosszú ülés után

Nő, 36 éves, programozó · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | Felálláskor nem tud kiegyenesedni, az ágyék fáj. |
| **LELET** | Az iliopsoas feszes; kitöréses helyzetben húzás az ágyékban. |
| **GONDOLATMENET** | A tartósan hajlított csípő megrövidíti az iliopsoast, ami az ágyékba sugároz. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Iliopsoas (protokoll 41.); Rectus femoris (protokoll 47.); Multifidus (protokoll 33.) |
| **OTTHONRA** | Kitöréses nyújtás óránként, álló munkaszakaszok. |

**Előbb zárd ki:** Hasi panasz, láz: orvos.

## 16. Fájdalom a has alján és a hátban

Nő, 31 éves, intenzív hasizomedzés után · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | Vízszintes sávban fáj a hát közepe. |
| **LELET** | A rectus abdominis érzékeny a köldök mellett. |
| **GONDOLATMENET** | A rectus abdominis a hátba sugározhat vízszintes sávban. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Rectus abdominis (protokoll 35.); Obliquus externus abdominis (protokoll 36.); Iliocostalis thoracis (protokoll 30.) |
| **OTTHONRA** | Hason könyöktámasz, kevesebb hasprés. |

**Előbb zárd ki:** Hasi fájdalom lázzal, hányással, menstruációtól független alhasi fájdalom: orvos.

## 17. Fenékfájdalom ülés közben

Férfi, 50 éves, taxis · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | A fenék közepe fáj, a comb hátsó részére húzódik. |
| **LELET** | A piriformis érzékeny; a 4-es nyújtás reprodukálja. |
| **GONDOLATMENET** | Ülő munka és pénztárca a hátsó zsebben fenntartja. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Piriformis (protokoll 40.); Gluteus minimus (protokoll 39.); Gluteus maximus (protokoll 37.) |
| **OTTHONRA** | 4-es nyújtás, pénztárca a hátsó zsebből ki. |

**Előbb zárd ki:** Zsibbadás, gyengeség, reflexeltérés: ideggyöki eredet kizárása.

## 18. Isiász-szerű fájdalom

Nő, 45 éves · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | A comb külső oldalán és a lábszár külső oldalán húzódó fájdalom. |
| **LELET** | A gluteus minimus érzékeny a nagy tompor felett; nincs zsibbadás, erő és reflexek rendben. |
| **GONDOLATMENET** | A gluteus minimus az isiászhoz hasonló mintázatot ad. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Gluteus minimus (protokoll 39.); Piriformis (protokoll 40.); Quadratus lumborum (protokoll 34.) |
| **OTTHONRA** | Csípőnyújtás, hosszú autózás megszakítása. |

**Előbb zárd ki:** Ha zsibbadás, gyengeség vagy reflexeltérés lenne: orvos.

## 19. Csípőfájdalom oldalt fekve

Nő, 60 éves · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | A csípő oldala fáj, nem tud azon az oldalon aludni. |
| **LELET** | A gluteus medius és a TFL érzékeny. |
| **GONDOLATMENET** | A gluteus medius és a TFL a csípő oldalára és a comb külső oldalára sugároz. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Gluteus medius (protokoll 38.); Tensor fasciae latae (TFL) (protokoll 42.); Gluteus minimus (protokoll 39.) |
| **OTTHONRA** | Párna a térdek közé alváskor, csípőtávolító erősítés. |

**Előbb zárd ki:** Csípőízületi kopás gyanúja (lágyékfájdalom, beszűkült forgatás): orvos.

## 20. Lágyékfájdalom focistánál

Férfi, 22 éves · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | A lágyék és a comb belső oldala fáj oldalra lépéskor. |
| **LELET** | Az adductor longus érzékeny a felső harmadban. |
| **GONDOLATMENET** | Hirtelen oldalirányú mozgások terhelik az adductorokat. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Adductor longus (protokoll 43.); Pectineus (protokoll 45.); Adductor magnus (protokoll 44.) |
| **OTTHONRA** | Pillangó-nyújtás, fokozatos visszatérés. |

**Előbb zárd ki:** Sérv gyanúja (köhögéskor duzzanat a lágyékban): orvos.

## 21. Térdfájdalom lépcsőn

Nő, 42 éves · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | A térd eleje fáj lépcsőn lefelé. |
| **LELET** | A rectus femoris és a vastus medialis érzékeny; a térd nem duzzadt. |
| **GONDOLATMENET** | A combfeszítők a térd elejére sugároznak. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Rectus femoris (protokoll 47.); Vastus medialis (protokoll 48.); Vastus lateralis (protokoll 49.) |
| **OTTHONRA** | Combnyújtás, ülve térdnyújtás erősítésnek. |

**Előbb zárd ki:** Duzzanat, beakadás, kifordulás, sérülés: orvos.

## 22. A térd külső oldala fáj futóknál

Férfi, 35 éves, futó · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | Hosszú futás után a térd külső oldala fáj. |
| **LELET** | A vastus lateralis és a TFL érzékeny. |
| **GONDOLATMENET** | A vastus lateralis és a TFL a térd külső oldalára sugároz. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Vastus lateralis (protokoll 49.); Tensor fasciae latae (TFL) (protokoll 42.); Gluteus medius (protokoll 38.) |
| **OTTHONRA** | Combnyújtás, futótáv fokozatos növelése. |

**Előbb zárd ki:** Duzzanat, sérülés: orvos.

## 23. Fájó térdhajlat

Nő, 26 éves, táncos · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | A térdhajlat fáj nyújtott lábbal. |
| **LELET** | A biceps femoris és a gastrocnemius felső része érzékeny. |
| **GONDOLATMENET** | A combhajlítók és a vádli felső része a térdhajlatba sugároz. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Biceps femoris (protokoll 50.); Semitendinosus / semimembranosus (protokoll 51.); Gastrocnemius (protokoll 52.) |
| **OTTHONRA** | Combhajlító-nyújtás törölközővel. |

**Előbb zárd ki:** Térdhajlati duzzanat, vádliduzzanat (Baker-ciszta, trombózis): orvos.

## 24. Éjszakai vádligörcs

Nő, 65 éves · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | Éjszaka görcsöl a vádli, nappal húzódik. |
| **LELET** | A gastrocnemius érzékeny mindkét fejben; nincs duzzanat. |
| **GONDOLATMENET** | A rövidült, túlterhelt vádliizom görcsre hajlamos. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Gastrocnemius (protokoll 52.); Soleus (protokoll 53.) |
| **OTTHONRA** | Esti vádlinyújtás, folyadékbevitel. |

**Előbb zárd ki:** Egyoldali duzzanat, melegség, pirosság: trombózis gyanúja, azonnal orvos.

## 25. Sarokfájdalom

Férfi, 48 éves, túrázó · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | A sarok fáj járáskor, főleg a nap végén. |
| **LELET** | A soleus és a quadratus plantae érzékeny. |
| **GONDOLATMENET** | A soleus a sarokba sugároz; a talp mély izmai is. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Soleus (protokoll 53.); Quadratus plantae (protokoll 60.); Flexor digitorum brevis (protokoll 58.) |
| **OTTHONRA** | Vádlinyújtás hajlított térddel, talpmasszázs labdával. |

**Előbb zárd ki:** Reggeli első lépéskor éles fájdalom (talpi bőnye), duzzanat, zsibbadás: szakember.

## 26. Sípcsontfájdalom kezdő futónál

Nő, 24 éves · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | A lábszár eleje fáj futás után. |
| **LELET** | A tibialis anterior érzékeny; a csont nyomásra nem fáj. |
| **GONDOLATMENET** | Túl gyors terhelésnövelés. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Tibialis anterior (protokoll 54.); Extensor digitorum longus (protokoll 57.) |
| **OTTHONRA** | Lábfejnyújtás, futótáv csökkentése. |

**Előbb zárd ki:** Ha a csont egy ponton fáj, és terhelésre fokozódik (fáradásos törés): orvos.

## 27. Bokafájdalom kifordulás után (6 hét)

Férfi, 29 éves · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | A külboka körül tartós fájdalom, instabilitás-érzés. |
| **LELET** | A peroneus longus érzékeny, a boka stabil vizsgálatkor. |
| **GONDOLATMENET** | A peroneusok a külbokára sugároznak, és a sérülés után túlterheltek. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Peroneus (fibularis) longus (protokoll 55.); Tibialis anterior (protokoll 54.) |
| **OTTHONRA** | Egylábas állás, bokastabilizálás. |

**Előbb zárd ki:** Friss sérülés, nem terhelhető láb, nagy duzzanat: röntgen, orvos.

## 28. Talpfájdalom egész nap állásban

Nő, 51 éves, eladó · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | A talp közepe és a lábujjtövek fájnak. |
| **LELET** | A flexor digitorum brevis és az abductor hallucis érzékeny. |
| **GONDOLATMENET** | Tartós állás és nem megfelelő cipő. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Flexor digitorum brevis (protokoll 58.); Abductor hallucis (protokoll 59.); Tibialis posterior (protokoll 56.) |
| **OTTHONRA** | Talpmasszázs labdával, kényelmes cipő. |

**Előbb zárd ki:** Zsibbadás, égő érzés (idegi ok), duzzanat: orvos.

## 29. Halántéki fejfájás és fogcsikorgatás

Férfi, 37 éves · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | Reggel halántéki fejfájás, a párja hallja éjszaka a fogcsikorgatást. |
| **LELET** | A temporalis és a masseter érzékeny. |
| **GONDOLATMENET** | Éjszakai bruxizmus terheli a rágóizmokat. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Temporalis (halántékizom) (protokoll 4.); Masseter (rágóizom) (protokoll 3.); Pterygoideus lateralis (protokoll 5.) |
| **OTTHONRA** | Esti önmasszázs, fogorvos a harapásemelőért. |

**Előbb zárd ki:** Fogászati vizsgálat (harapásemelő).

## 30. Fejtetőn érzett fájdalom

Nő, 44 éves, varrónő · oktatási esetpélda

| | |
|---|---|
| **PANASZ** | A fejtető fáj, ha sokáig lefelé néz. |
| **LELET** | A splenius capitis érzékeny. |
| **GONDOLATMENET** | A splenius capitis a fejtetőre sugároz. |
| **KEZELENDŐ IZMOK** | Splenius capitis (protokoll 7.); Semispinalis capitis (protokoll 10.); Suboccipitalis izmok (protokoll 9.) |
| **OTTHONRA** | Munka közben a munkadarab feljebb, óránként állbehúzás. |

**Előbb zárd ki:** Hirtelen, szokatlan fejfájás, neurológiai tünet: orvos.

# Következő lépés

**Ezen a héten:** olvass el napi 3 esetet, és a következő hasonló páciensnél kövesd a gondolatmenetet.