MAGABIZTOS MINDEN PÁCIENSNÉL™

Mit mondj a páciensnek

Mondatok, amelyekkel érthetően elmagyarázod a kisugárzó fájdalmat, és a páciens bízik benned.

Tartalom

1 · Mondatok helyzetekre

2 · Amit kerülj

Következő lépés

1. RÉSZ

Mondatok helyzetekre

Mondd a saját szavaiddal.

1.

Ha nem érti, miért a vállát kezeled, amikor a karja fáj

„A fájdalom nem mindig ott keletkezik, ahol érzed. Ez az izom a vállad mögött van, de a karodba küldi a fájdalmat. Nézd, itt a kártyán."

2.

Ha megijed a kisugárzó fájdalomtól

„Ez jó jel: megtaláltuk azt a pontot, ami a panaszt okozza. Szólj, ha túl erős, és azonnal engedek."

3.

Nyomás közben

„Egytől tízig mennyire kellemetlen? Az ötös-hetes a jó, efölött szólj."

4.

Ha azt kérdezi, mikor lesz jobb

„Sokaknál már néhány kezelés után érezhető változás van, de ez függ attól is, mennyit dolgozunk együtt otthon. Ezért kapsz egy lapot."

5.

Ha nem csinálja az otthoni gyakorlatot

„Nem kell sok idő: napi két perc. Melyik napszak lenne neked a legkönnyebb?"

6.

Ha orvoshoz kell küldened

„Van néhány jel, amit szeretném, ha egy orvos is megnézne, mielőtt folytatjuk. Ez nem azt jelenti, hogy baj van, csak így biztonságos."

7.

A kezelés után

„Holnap kicsit izomlázszerű érzésed lehet, ez normális. Igyál elég vizet, és csináld meg a nyújtást este.”

8.

Ha visszaesés van

„Ez gyakran előfordul, főleg stresszes héten. Nézzük meg együtt, mi változott a munkádban vagy az alvásodban.”

2. RÉSZ

Amit kerülj

Ezek a mondatok ijesztenek vagy túlígérnek.

Ne mondd

- [ ] „Ez biztosan elmúlik.” (Nem ígérhetsz eredményt.)
- [ ] „Ez semmiség.” (Bagatellizál.)
- [ ] „Teljesen be van csípődve.” (Ijesztő, pontatlan.)
- [ ] „Majd én meggyógyítalak.” (Túlígérés.)

Következő lépés

Holnap: használd az első mondatot, amikor a következő páciensnek megmutatod a kisugárzást az atlasz kártyáján.