MAGABIZTOS MINDEN PÁCIENSNÉL™

Vizsgafelkészítő: 150 kérdés és válasz

Gyakorlati vizsgákra, szigorlatra és klinikai gyakorlatra. Takard le a választ, és kérdezd ki magad.

Triggerpont Atlasz · Oktatási anyag egészségügyi szakembereknek és hallgatóknak. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist.

Tartalom

1 · Alapfogalmak és biztonság

2 · Fej, arc és nyak

3 · Váll, kar és kéz

4 · Hát és törzs

5 · Medence és csípő

6 · Comb, lábszár és lábfej

Következő lépés

1. RÉSZ

Alapfogalmak és biztonság

30 általános kérdés.

1. Mi a triggerpont?

Érzékeny, tapintható pont egy feszes izomkötegen belül, amely nyomásra helyi és kisugárzó fájdalmat okozhat.

2. Mi a különbség aktív és látens triggerpont között?

Az aktív spontán is fájdalmat okoz, a látens csak nyomásra érzékeny.

3. Mi a kisugárzó (referált) fájdalom?

Fájdalom, amelyet a páciens a triggerponttól távolabbi területen érez.

4. Mi az ischaemiás kompresszió?

Tartós, fokozatos nyomás a triggerpontra, amíg a feszülés enged.

5. Mekkora legyen a nyomás erőssége?

Általában 10-es skálán kb. 5–7-es kellemetlenség, a páciens jelzése szerint.

6. Mennyi ideig tartsd a kompressziót?

Általában 30–90 másodpercig, 3–5 ismétléssel.

7. Miért nyújtunk a kompresszió után?

Hogy a feszes köteg hosszát helyreállítsuk és a hatást megtartsuk.

8. Mi a feszes köteg?

Az izmon belül tapintható, kötélszerű, keményebb rostcsoport.

9. Mi a helyi rángási válasz?

A feszes köteg rövid összehúzódása, amikor a triggerpontot harántul pattintjuk.

10. Mit jelent a VAS?

Vizuális analóg skála, a fájdalom erősségének 0–10-es értékelésére.

11. Mely tényezők tartják fenn a triggerpontokat?

Rossz testtartás, ismétlődő terhelés, stressz, alváshiány, rövidült izmok, inaktivitás.

12. Mikor ne kezeld a pácienst?

Láz, friss sérülés, trombózis gyanúja, ismeretlen eredetű éjszakai fájdalom, neurológiai tünetek esetén.

13. Mit tegyél, ha kezelés közben szédülés jelentkezik?

Azonnal hagyd abba, és ha nem múlik, küldd orvoshoz.

14. Miért fontos az otthoni program?

Mert a fenntartó tényezők otthon és munkában hatnak; nélküle a panasz visszatér.

15. Mi a csipeszfogás, és mikor használod?

Az izomhas két ujj közé fogása; felületes, megfogható izmoknál (pl. trapezius, SCM).

16. Mire figyelj véralvadásgátlót szedő páciensnél?

Csak enyhe nyomást használj, figyelj a bevérzésre.

17. Mi a különbség a triggerpont és a tender point között?

A triggerpont kisugárzó fájdalmat okozhat feszes kötegben, a tender point helyi érzékenység.

18. Hogyan dokumentálsz egy kezelést?

Panasz, VAS, kezelt izmok, technika, reakció, otthoni teendő, következő lépés.

19. Miért vizsgáld a fájdalom helyétől távoli izmokat is?

Mert a kisugárzás miatt a forrás gyakran máshol van, mint ahol fáj.

20. Mi a teendő, ha a nyomás a karba zsibbadást okoz?

Csökkentsd a nyomást vagy hagyd abba; tartós zsibbadásnál orvos.

21. Melyik izom okozhat 'fogfájást' fogászati ok nélkül?

Leggyakrabban a masseter és a temporalis.

22. Melyik izom okozhat homlok- és szem körüli fájdalmat?

Az SCM és a suboccipitalis izmok.

23. Melyik izom fáj elöl, miközben hátul van?

Az infraspinatus: a lapockán van, és a váll elejébe sugároz.

24. Melyik izom utánozhatja az isiászt?

A gluteus minimus és a piriformis.

25. Melyik izom okozhat sarokfájdalmat?

A soleus és a quadratus plantae.

26. Mire figyelj az SCM kezelésénél?

Csak csipeszfogás, soha ne nyomj hátra a nyak elülső részén (arteria carotis).

27. Mire figyelj a vádli kezelésénél?

Egyoldali duzzanat, melegség, pirosság esetén ne masszírozz (trombózis gyanúja).

28. Mire figyelj az iliopsoas kezelésénél?

Az ütőér közelében soha ne nyomj; hasi panasznál és terhességnél ne kezeld a hasi részt.

29. Mi a jó testhelyzet a quadratus lumborum kezeléséhez?

Oldalt fekve, a felső láb hátrafelé leengedve, hogy a csípő-borda távolság nőjön.

30. Miért hasznos a hasi légzés a scalenus-panaszoknál?

Mert csökkenti a scalenusok túlterhelését a felső mellkasi légzés helyett.

2. RÉSZ

Fej, arc és nyak

24 kérdés.

31. Hol keresed a Trapezius – felső rostok triggerpontját?

A vállöv tetején, a nyak és az akromion között félúton, a felső szabad szélen.

32. Hová sugározhat a Trapezius – felső rostok fájdalma?

Halánték, a fej oldala, a nyak oldala, a fül mögött, állkapocsszöglet.

33. Hol keresed a Sternocleidomastoideus (SCM) triggerpontját?

Az izomhas mentén, a sternalis és a clavicularis részen külön, a középső harmadban a legérzékenyebb.

34. Hová sugározhat a Sternocleidomastoideus (SCM) fájdalma?

Homlok, a szem körül, arc, a fül mélyén, fejtető, nyakszirt.

35. Hol keresed a Masseter (rágóizom) triggerpontját?

A felületes rétegben a járomív alatt és az állkapocsszöglet felett; a mély rétegben az állkapocsízület előtt.

36. Hová sugározhat a Masseter (rágóizom) fájdalma?

Felső és alsó őrlőfogak, állkapocs, szemöldök, a fül mélyén.

37. Hol keresed a Temporalis (halántékizom) triggerpontját?

Négy területen a járomív felett, elölről hátrafelé; rágás közben jól tapintható.

38. Hová sugározhat a Temporalis (halántékizom) fájdalma?

Halánték, szemöldök, a szem mögött, felső fogak, a fej oldala.

39. Hol keresed a Pterygoideus lateralis triggerpontját?

Mélyen a járomív alatt; szájon belül a felső őrlőfogak mögött, felfelé és hátrafelé.

40. Hová sugározhat a Pterygoideus lateralis fájdalma?

Állkapocsízület, arc (arcüreg felett).

41. Hol keresed a Pterygoideus medialis triggerpontját?

Az állkapocsszöglet belső oldalán, alulról tapintva; szájon belül az utolsó őrlőfog mögött.

42. Hová sugározhat a Pterygoideus medialis fájdalma?

A nyelv töve, torok, a fül alatt, állkapocsízület.

43. Hol keresed a Splenius capitis triggerpontját?

A nyak hátsó-oldalsó részén, a SCM és a trapezius között, a nyakszirt alatt kb. 2–3 ujjnyival.

44. Hová sugározhat a Splenius capitis fájdalma?

Fejtető.

45. Hol keresed a Splenius cervicis triggerpontját?

A nyak alsó részén, a lapocka felső szöglete felett, a levator scapulae mellett.

46. Hová sugározhat a Splenius cervicis fájdalma?

A szem mögött, nyakszirt, a nyak és a váll találkozása.

47. Hol keresed a Suboccipitalis izmok triggerpontját?

Közvetlenül a nyakszirtcsont alatt, a középvonal két oldalán, mélyen.

48. Hová sugározhat a Suboccipitalis izmok fájdalma?

A fej oldala, a szem mögött, homlok, nyakszirt.

49. Hol keresed a Semispinalis capitis triggerpontját?

A tarkón, a középvonal mellett 2–3 cm-re, a nyakszirt alatt és a nyak közepén.

50. Hová sugározhat a Semispinalis capitis fájdalma?

A fej oldala, halánték, homlok, nyakszirt.

51. Hol keresed a Levator scapulae (lapockaemelő) triggerpontját?

A lapocka felső szöglete fölött kissé medialisan, és a nyak oldalán a trapezius felső szélének mélyén.

52. Hová sugározhat a Levator scapulae (lapockaemelő) fájdalma?

A nyak és a váll találkozása, a lapocka belső széle, a váll hátsó része.

53. Hol keresed a Scalenus izmok triggerpontját?

A nyak oldalán, a SCM mögött és alatt, a kulcscsont felett.

54. Hová sugározhat a Scalenus izmok fájdalma?

Mellkas eleje, felkar, a lapocka belső széle, a kéz (hüvelyk- és mutatóujj).

3. RÉSZ

Váll, kar és kéz

28 kérdés.

55. Hol keresed az Infraspinatus triggerpontját?

A lapocka hátsó felszínén, a lapockatövis alatt, a fossa infraspinata középső és felső részén.

56. Hová sugározhat az Infraspinatus fájdalma?

A váll eleje (mélyen), felkar elülső-oldalsó része, alkar, a kéz hüvelykujj felőli oldala.

57. Hol keresed a Supraspinatus triggerpontját?

A lapockatövis felett, a fossa supraspinata medialis részén és laterálisan a vállcsúcs alatt.

58. Hová sugározhat a Supraspinatus fájdalma?

A váll oldala (deltoid terület), a felkar külső oldala, a könyök külső oldala.

59. Hol keresed a Teres minor triggerpontját?

A lapocka külső szélén, az infraspinatus alatt, a hónalj hátsó redője felett.

60. Hová sugározhat a Teres minor fájdalma?

A váll hátsó része (pontszerűen), a felkar hátsó része.

61. Hol keresed a Subscapularis triggerpontját?

A lapocka elülső felszínén, a hónaljból elérve, a lapocka külső széle mentén.

62. Hová sugározhat a Subscapularis fájdalma?

A váll hátsó része, a lapocka, a felkar hátsó része, a csukló.

63. Hol keresed a Deltoideus triggerpontját?

Az elülső, középső és hátsó rostokban, a vállcsúcs alatt 2–5 cm-re.

64. Hová sugározhat a Deltoideus fájdalma?

A váll (a pont körül), a felkar.

65. Hol keresed a Pectoralis major triggerpontját?

A mellizom külső szélén (hónalj elülső redője), a kulcscsont alatt és a szegycsont mellett.

66. Hová sugározhat a Pectoralis major fájdalma?

A mellkas eleje, a váll eleje, a kar belső oldala, a mell.

67. Hol keresed a Pectoralis minor triggerpontját?

A processus coracoideus alatt, a 3–5. borda felett, a pectoralis major alatt mélyen.

68. Hová sugározhat a Pectoralis minor fájdalma?

A váll eleje, a mellkas, a kar belső oldala, a kisujj felőli kéz.

69. Hol keresed a Rhomboideus triggerpontját?

A lapocka belső széle és a gerinc között, a trapezius alatt.

70. Hová sugározhat a Rhomboideus fájdalma?

A lapocka belső széle, a lapockák között.

71. Hol keresed a Serratus anterior triggerpontját?

A mellkas oldalán, a hónalj alatt az 5–6. borda magasságában.

72. Hová sugározhat a Serratus anterior fájdalma?

A mellkas oldala, a lapocka alsó csúcsa, a kar belső oldala.

73. Hol keresed a Latissimus dorsi triggerpontját?

A hónalj hátsó redőjében, a lapocka alsó csúcsa magasságában.

74. Hová sugározhat a Latissimus dorsi fájdalma?

A lapocka alsó csúcsa, a kar hátsó-belső oldala, a gyűrűs- és kisujj.

75. Hol keresed a Biceps brachii triggerpontját?

A felkar elülső részének középső harmadában, mindkét fejben.

76. Hová sugározhat a Biceps brachii fájdalma?

A váll eleje, a könyökhajlat.

77. Hol keresed a Triceps brachii triggerpontját?

A felkar hátsó részén, a hosszú fejben a hónalj alatt, és a könyök felett 4–6 cm-rel.

78. Hová sugározhat a Triceps brachii fájdalma?

A váll hátsó része, a könyök külső oldala, az alkar hátsó oldala.

79. Hol keresed az Alkari feszítők (ECRL, ECRB, extensor digitorum) triggerpontját?

Az alkar hátsó-külső oldalán, a könyök alatt 3–6 cm-re.

80. Hová sugározhat az Alkari feszítők (ECRL, ECRB, extensor digitorum) fájdalma?

A könyök külső oldala, az alkar hátsó oldala, a kézhát, az ujjak.

81. Hol keresed az Alkari hajlítók triggerpontját?

Az alkar belső-elülső oldalán, a könyök alatt 3–6 cm-re.

82. Hová sugározhat az Alkari hajlítók fájdalma?

A csukló tenyéri oldala, a tenyér, az ujjak tenyéri oldala.

4. RÉSZ

Hát és törzs

20 kérdés.

83. Hol keresed a Trapezius – középső rostok triggerpontját?

A lapocka belső széle és a gerinc között, a lapockatövis magasságában, felületesen.

84. Hová sugározhat a Trapezius – középső rostok fájdalma?

A lapockák között, a gerinc mellett égő érzés.

85. Hol keresed a Trapezius – alsó rostok triggerpontját?

A lapocka alsó csúcsa és a gerinc között, a középső hátban.

86. Hová sugározhat a Trapezius – alsó rostok fájdalma?

A nyak hátsó része, a vállcsúcs, a lapockák között.

87. Hol keresed a Serratus posterior superior triggerpontját?

A lapocka felső része alatt, a gerinc mellett; a lapockát oldalra húzva érhető el.

88. Hová sugározhat a Serratus posterior superior fájdalma?

A lapocka alatt mélyen, a váll hátsó része, a kar hátsó oldala, a kisujj.

89. Hol keresed az Iliocostalis thoracis triggerpontját?

A gerinc mellett kb. 5–8 cm-re, a középső és alsó háti szakaszon.

90. Hová sugározhat az Iliocostalis thoracis fájdalma?

A hát közepe, a has (néha), a lapocka alatt.

91. Hol keresed az Iliocostalis lumborum triggerpontját?

Az ágyéki szakaszon a gerinc mellett kb. 5–7 cm-re, az alsó bordák alatt.

92. Hová sugározhat az Iliocostalis lumborum fájdalma?

Az ágyék, a fenék, a has alsó része.

93. Hol keresed a Longissimus thoracis triggerpontját?

A gerinc mellett 2–4 cm-re, az alsó háti és felső ágyéki szakaszon.

94. Hová sugározhat a Longissimus thoracis fájdalma?

A fenék, az ágyék, a csípőcsont taraja.

95. Hol keresed a Multifidus triggerpontját?

Közvetlenül a tövisnyúlványok mellett, mélyen, bármely gerincszakaszon (leggyakrabban ágyéki).

96. Hová sugározhat a Multifidus fájdalma?

A gerinc mellett pontszerűen, a keresztcsont, a has (ritkán).

97. Hol keresed a Quadratus lumborum triggerpontját?

Az utolsó borda és a csípőcsont taraja között, a gerincmerevítő külső szélén, mélyen.

98. Hová sugározhat a Quadratus lumborum fájdalma?

A csípőcsont taraja, a fenék, a csípő oldala, az ágyék.

99. Hol keresed a Rectus abdominis triggerpontját?

A köldök felett és alatt, a középvonal mellett 2–4 cm-re.

100. Hová sugározhat a Rectus abdominis fájdalma?

A hát közepe vízszintes sávban, a has, az ágyék.

101. Hol keresed az Obliquus externus abdominis triggerpontját?

A has oldalán, a bordaív alatt és a csípőcsont taraja felett.

102. Hová sugározhat az Obliquus externus abdominis fájdalma?

A has oldala, az ágyék, a mellkas alja.

5. RÉSZ

Medence és csípő

20 kérdés.

103. Hol keresed a Gluteus maximus triggerpontját?

A fenék alsó-belső részén, a keresztcsont mellett és az ülőgumó felett.

104. Hová sugározhat a Gluteus maximus fájdalma?

A fenék, a keresztcsont, a farokcsont környéke.

105. Hol keresed a Gluteus medius triggerpontját?

A csípőcsont taraja alatt 2–5 cm-re, a fenék felső-külső részén.

106. Hová sugározhat a Gluteus medius fájdalma?

Az ágyék alja, a keresztcsont, a csípő oldala, a fenék.

107. Hol keresed a Gluteus minimus triggerpontját?

Mélyen a gluteus medius alatt, a csípőcsont taraja és a combcsont nagy tompora között.

108. Hová sugározhat a Gluteus minimus fájdalma?

A comb külső oldala, a lábszár külső oldala, a comb hátsó része, a boka.

109. Hol keresed a Piriformis triggerpontját?

A keresztcsont külső széle és a nagy tompor csúcsa közötti vonal középső és külső harmadában.

110. Hová sugározhat a Piriformis fájdalma?

A fenék, a keresztcsont, a comb hátsó része, a csípőízület hátsó része.

111. Hol keresed az Iliopsoas triggerpontját?

A comb elején a lágyékszalag alatt (a. femoralistól oldalra), és a hasban a csípőlapát belső oldalán.

112. Hová sugározhat az Iliopsoas fájdalma?

Az ágyék a gerinc mellett, a keresztcsont, a comb eleje.

113. Hol keresed a Tensor fasciae latae (TFL) triggerpontját?

A csípő elülső-külső részén, a spina iliaca anterior superior alatt.

114. Hová sugározhat a Tensor fasciae latae (TFL) fájdalma?

A comb külső oldala, a térd külső oldala.

115. Hol keresed az Adductor longus triggerpontját?

A comb belső oldalán, a felső harmadban.

116. Hová sugározhat az Adductor longus fájdalma?

A lágyék, a comb belső oldala, a térd belső oldala.

117. Hol keresed az Adductor magnus triggerpontját?

A comb belső-hátsó oldalán, a középső harmadban, és az ülőgumó közelében.

118. Hová sugározhat az Adductor magnus fájdalma?

A lágyék, a comb belső oldala, a medence mélye.

119. Hol keresed a Pectineus triggerpontját?

A comb belső-elülső részén, a lágyékhajlat alatt, az a. femoralistól befelé.

120. Hová sugározhat a Pectineus fájdalma?

A lágyék mélyen, a comb belső-elülső része.

121. Hol keresed a Sartorius triggerpontját?

A comb elején ferdén, a csípőcsont elülső csúcsától a térd belső oldaláig, felületesen.

122. Hová sugározhat a Sartorius fájdalma?

A comb eleje (égő, szúró érzés), a térd belső oldala.

6. RÉSZ

Comb, lábszár és lábfej

28 kérdés.

123. Hol keresed a Rectus femoris triggerpontját?

A comb elején, közvetlenül a csípő alatt, a spina iliaca anterior inferior közelében.

124. Hová sugározhat a Rectus femoris fájdalma?

A térd eleje, a térdkalács körül.

125. Hol keresed a Vastus medialis triggerpontját?

A comb belső-elülső oldalán, a térd felett 5–10 cm-re.

126. Hová sugározhat a Vastus medialis fájdalma?

A térd belső oldala, a térd eleje.

127. Hol keresed a Vastus lateralis triggerpontját?

A comb külső oldalán, több ponton a csípő és a térd között.

128. Hová sugározhat a Vastus lateralis fájdalma?

A comb külső oldala, a térd külső oldala, a térdkalács mögött.

129. Hol keresed a Biceps femoris triggerpontját?

A comb hátsó-külső részén, a középső és alsó harmadban.

130. Hová sugározhat a Biceps femoris fájdalma?

A térdhajlat, a comb hátsó része.

131. Hol keresed a Semitendinosus / semimembranosus triggerpontját?

A comb hátsó-belső részén, a középső és alsó harmadban.

132. Hová sugározhat a Semitendinosus / semimembranosus fájdalma?

A fenék alsó része, a comb hátsó része, a térdhajlat belső oldala.

133. Hol keresed a Gastrocnemius triggerpontját?

A vádli felső részén, a belső és külső fejben, a térdhajlat alatt.

134. Hová sugározhat a Gastrocnemius fájdalma?

A lábboltozat, a vádli, a térdhajlat.

135. Hol keresed a Soleus triggerpontját?

A vádli alsó részén, mélyen, a gastrocnemius alatt, az Achilles-ín felett.

136. Hová sugározhat a Soleus fájdalma?

A sarok, a vádli, a keresztcsont (ritkán).

137. Hol keresed a Tibialis anterior triggerpontját?
A sípcsont mellett kívül, a lábszár felső harmadában.

138. Hová sugározhat a Tibialis anterior fájdalma?
A boka eleje, a nagylábujj.

139. Hol keresed a Peroneus (fibularis) longus triggerpontját?
A lábszár külső oldalán, a felső harmadban, a fibulafej alatt 2–4 cm-re.

140. Hová sugározhat a Peroneus (fibularis) longus fájdalma?
A külboka, a lábfej külső oldala.

141. Hol keresed a Tibialis posterior triggerpontját?
Mélyen a vádli alatt, a sípcsont belső-hátsó széle mögött.

142. Hová sugározhat a Tibialis posterior fájdalma?
Az achilles-ín, a sarok, a talp.

143. Hol keresed az Extensor digitorum longus triggerpontját?
A lábszár elülső-külső részén, a tibialis anterior mellett kívül, a felső harmadban.

144. Hová sugározhat az Extensor digitorum longus fájdalma?
A lábfej háta, a középső lábujjak.

145. Hol keresed a Flexor digitorum brevis triggerpontját?
A talp közepén, a sarok előtt.

146. Hová sugározhat a Flexor digitorum brevis fájdalma?
A talp közepe, a lábujjtövek.

147. Hol keresed az Abductor hallucis triggerpontját?
A talp belső szélén, a sarok és a nagylábujj töve között.

148. Hová sugározhat az Abductor hallucis fájdalma?
A sarok belső oldala, a lábboltozat belső széle.

149. Hol keresed a Quadratus plantae triggerpontját?
A talp hátsó részén, mélyen, közvetlenül a sarokcsont előtt.

150. Hová sugározhat a Quadratus plantae fájdalma?
A sarok talpi felszíne.

Következő lépés

Ma: válaszolj az első 30 kérdésre válaszok nélkül, és jelöld meg, amelyiket nem tudtad.