MEGTALÁLOD, ÉS TUDOD, MIT TEGYÉL™

A 10 leggyakoribb panasz protokollja

A panaszok, amelyekkel a legtöbb páciens érkezik, és az izmok sorrendje, amelyekkel érdemes kezdeni. A részletes technika a 60 protokollban.

Triggerpont Atlasz · Oktatási anyag egészségügyi szakembereknek és hallgatóknak. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist.

Tartalom

1 · Hogyan használd

2 · A 10 panasz

Következő lépés

1. RÉSZ

Hogyan használd

Panasz → izmok sorrendben → protokoll.

1. Kérdezd meg és rajzoltasd le, hol fáj (használd az izomfelmérő lapot).
2. Zárd ki a „Előbb zárd ki” pontban leírtakat.
3. Vizsgáld meg az izmokat a megadott sorrendben, és kezeld, amelyik reprodukálja a panaszt.
4. Adj otthoni nyújtást, és a következő alkalommal ellenőrizd a változást.

2. RÉSZ

A 10 panasz

Mindegyiknél: izmok sorrendben, és amit előbb ki kell zárni.

1. Tenziós fejfájás

SORREND	IZOM	HOL KERESD
1	Trapezius – felső rostok	A vállöv tetején, a nyak és az akromion között félúton, a felső szabad szélen.
2	Suboccipitalis izmok	Közvetlenül a nyakszirtcsont alatt, a középvonal két oldalán, mélyen.
3	Sternocleidomastoideus (SCM)	Az izomhas mentén, a sternalis és a clavicularis részen külön, a középső harmadban a legérzékenyebb.
4	Temporalis (halántékizom)	Négy területen a járomív felett, elölről hátrafelé; rágás közben jól tapintható.
5	Semispinalis capitis	A tarkón, a középvonal mellett 2–3 cm-re, a nyakszirt alatt és a nyak közepén.

Előbb zárd ki

Hirtelen, életében legerősebb fejfájás, láz és tarkómerevség, látászavar, beszédzavar, gyengeség: azonnal orvos.

2. Nyakfájás és merev nyak

SORREND	IZOM	HOL KERESD
1	Levator scapulae (lapockaemelő)	A lapocka felső szöglete fölött kissé medialisan, és a nyak oldalán a trapezius felső szélének mélyén.
2	Trapezius – felső rostok	A vállöv tetején, a nyak és az akromion között félúton, a felső szabad szélen.
3	Splenius cervicis	A nyak alsó részén, a lapocka felső szöglete felett, a levator scapulae mellett.
4	Scalenus izmok	A nyak oldalán, a SCM mögött és alatt, a kulcscsont felett.

SORREND	IZOM	HOL KERESD
5	Semispinalis capitis	A tarkón, a középvonal mellett 2–3 cm-re, a nyakszirt alatt és a nyak közepén.

> **Előbb zárd ki**
>
> Sérülés utáni nyakfájás, karba sugárzó zsibbadás vagy gyengeség: orvosi vizsgálat.

3. Állkapocs- és arcfájdalom

SORREND	IZOM	HOL KERESD
1	Masseter (rágóizom)	A felületes rétegben a járomív alatt és az állkapocsszöglet felett; a mély rétegben az állkapocsízület előtt.
2	Temporalis (halántékizom)	Négy területen a járomív felett, elölről hátrafelé; rágás közben jól tapintható.
3	Pterygoideus lateralis	Mélyen a járomív alatt; szájon belül a felső őrlőfogak mögött, felfelé és hátrafelé.
4	Pterygoideus medialis	Az állkapocsszöglet belső oldalán, alulról tapintva; szájon belül az utolsó őrlőfog mögött.
5	Sternocleidomastoideus (SCM)	Az izomhas mentén, a sternalis és a clavicularis részen külön, a középső harmadban a legérzékenyebb.

> **Előbb zárd ki**
>
> Fogászati ok, gyulladás, beakadó állkapocs: fogorvos vagy szájsebész.

4. Vállfájdalom karemeléskor

SORREND	IZOM	HOL KERESD
1	Infraspinatus	A lapocka hátsó felszínén, a lapockatövis alatt, a fossa infraspinata középső és felső részén.
2	Supraspinatus	A lapockatövis felett, a fossa supraspinata medialis részén és laterálisan a vállcsúcs alatt.
3	Subscapularis	A lapocka elülső felszínén, a hónaljból elérve, a lapocka külső széle mentén.

SORREND	IZOM	HOL KERESD
4	Deltoideus	Az elülső, középső és hátsó rostokban, a vállcsúcs alatt 2–5 cm-re.
5	Pectoralis minor	A processus coracoideus alatt, a 3–5. borda felett, a pectoralis major alatt mélyen.

> **Előbb zárd ki**
>
> Sérülés után erőtlen kar, éjszakai fájdalom, amely nem enged: orvosi vizsgálat (rotátorköpeny).

5. Teniszkönyök-szerű panasz

SORREND	IZOM	HOL KERESD
1	Alkari feszítők (ECRL, ECRB, extensor digitorum)	Az alkar hátsó-külső oldalán, a könyök alatt 3–6 cm-re.
2	Triceps brachii	A felkar hátsó részén, a hosszú fejben a hónalj alatt, és a könyök felett 4–6 cm-rel.
3	Supraspinatus	A lapockatövis felett, a fossa supraspinata medialis részén és laterálisan a vállcsúcs alatt.
4	Scalenus izmok	A nyak oldalán, a SCM mögött és alatt, a kulcscsont felett.

> **Előbb zárd ki**
>
> Duzzanat, melegség, éjszakai zsibbadás az ujjakban: orvosi vizsgálat.

6. Lapockák közötti fájdalom

SORREND	IZOM	HOL KERESD
1	Rhomboideus	A lapocka belső széle és a gerinc között, a trapezius alatt.
2	Trapezius – középső rostok	A lapocka belső széle és a gerinc között, a lapockatövis magasságában, felületesen.
3	Serratus posterior superior	A lapocka felső része alatt, a gerinc mellett; a lapockát oldalra húzva érhető el.
4	Scalenus izmok	A nyak oldalán, a SCM mögött és alatt, a kulcscsont felett.

SORREND	IZOM	HOL KERESD
5	Levator scapulae (lapockaemelő)	A lapocka felső szöglete fölött kissé medialisan, és a nyak oldalán a trapezius felső szélének mélyén.

> **Előbb zárd ki**
>
> Mellkasi fájdalom terheléskor, légszomj, verejtékezés: azonnal orvos (szív).

7. Derékfájás

SORREND	IZOM	HOL KERESD
1	Quadratus lumborum	Az utolsó borda és a csípőcsont taraja között, a gerincmerevítő külső szélén, mélyen.
2	Iliocostalis lumborum	Az ágyéki szakaszon a gerinc mellett kb. 5–7 cm-re, az alsó bordák alatt.
3	Multifidus	Közvetlenül a tövisnyúlványok mellett, mélyen, bármely gerincszakaszon (leggyakrabban ágyéki).
4	Iliopsoas	A comb elején a lágyékszalag alatt (a. femoralistól oldalra), és a hasban a csípőlapát belső oldalán.
5	Gluteus medius	A csípőcsont taraja alatt 2–5 cm-re, a fenék felső-külső részén.

> **Előbb zárd ki**
>
> Lábba sugárzó zsibbadás vagy gyengeség, vizelet- vagy székletürítési zavar, láz, fogyás: azonnal orvos.

8. Fenékből a combba sugárzó fájdalom

SORREND	IZOM	HOL KERESD
1	Gluteus minimus	Mélyen a gluteus medius alatt, a csípőcsont taraja és a combcsont nagy tompora között.
2	Piriformis	A keresztcsont külső széle és a nagy tompor csúcsa közötti vonal középső és külső harmadában.
3	Gluteus medius	A csípőcsont taraja alatt 2–5 cm-re, a fenék felső-külső részén.

SORREND	IZOM	HOL KERESD
4	Quadratus lumborum	Az utolsó borda és a csípőcsont taraja között, a gerincmerevítő külső szélén, mélyen.

> **Előbb zárd ki**
>
> Zsibbadás, gyengeség, reflexeltérés (ideggyöki eredet): orvosi vizsgálat.

9. Térdfájdalom

SORREND	IZOM	HOL KERESD
1	Rectus femoris	A comb elején, közvetlenül a csípő alatt, a spina iliaca anterior inferior közelében.
2	Vastus medialis	A comb belső-elülső oldalán, a térd felett 5–10 cm-re.
3	Vastus lateralis	A comb külső oldalán, több ponton a csípő és a térd között.
4	Biceps femoris	A comb hátsó-külső részén, a középső és alsó harmadban.
5	Adductor longus	A comb belső oldalán, a felső harmadban.

> **Előbb zárd ki**
>
> Duzzanat, melegség, beakadás, kifordulás, sérülés: orvosi vizsgálat.

10. Sarok- és talpfájdalom

SORREND	IZOM	HOL KERESD
1	Soleus	A vádli alsó részén, mélyen, a gastrocnemius alatt, az Achilles-ín felett.
2	Gastrocnemius	A vádli felső részén, a belső és külső fejben, a térdhajlat alatt.
3	Quadratus plantae	A talp hátsó részén, mélyen, közvetlenül a sarokcsont előtt.
4	Flexor digitorum brevis	A talp közepén, a sarok előtt.
5	Abductor hallucis	A talp belső szélén, a sarok és a nagylábujj töve között.

SORREND	IZOM	HOL KERESD
6	Tibialis posterior	Mélyen a vádli alatt, a sípcsont belső-hátsó széle mögött.

Előbb zárd ki

Egyoldali vádliduzzanat (trombózis), éjszakai fájdalom, zsibbadás: orvosi vizsgálat.

Következő lépés

Ezen a héten: a következő három páciensnél nézd meg, melyik panaszhoz tartozik, és kövesd a sorrendet.