Kezelési sorrend–ellenőrzőlista

Egy kezelés 12 lépésben. Tedd ki a kezelőágy mellé.

- [ ] **Kérdezd ki:** hol fáj, mióta, mitől rosszabb és jobb, mit csinál munkában.
- [ ] **Szűrj:** láz, fogyás, éjszakai fájdalom, zsibbadás, gyengeség, sérülés? Ha igen: orvos.
- [ ] **Rajzoltasd le** a fájdalmat a testtérképen, és kérj VAS-értéket (0–10).
- [ ] **Nézd meg az atlaszt:** mely izmok sugároznak erre a területre?
- [ ] **Vizsgáld:** mozgástartomány, majd tapintás; keresd a feszes köteget és az ismerős fájdalmat.
- [ ] **Kezeld:** ischaemiás kompresszió 30–90 mp, 3–5 ismétlés, a páciens jelzése szerint.
- [ ] **Nyújts:** 3 × 20–30 mp, kilégzésre.
- [ ] **Aktív mozgás:** a páciens végigviszi a teljes mozgástartományt.
- [ ] **Ellenőrizd újra:** VAS és mozgástartomány a kezelés végén.
- [ ] **Adj otthoni lapot:** egy nyújtás, egy teendő.
- [ ] **Dokumentálj:** izmok, technika, reakció, következő lépés.
- [ ] **Beszéld meg** a következő időpontot és az elvárható változást.

Triggerpont Atlasz · Oktatási anyag egészségügyi szakembereknek és hallgatóknak. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist.