MEGTALÁLOD, ÉS TUDOD, MIT TEGYÉL™

Nyújtási útmutató testtájanként

Mind a 60 izom nyújtása egy helyen, testtájak szerint, ugyanabban a sorrendben, mint az atlasz és a protokollok.

Tartalom

1 · Hogyan nyújts

2 · Fej, arc és nyak

3 · Váll, kar és kéz

4 · Hát és törzs

5 · Medence és csípő

6 · Comb, lábszár és lábfej

Következő lépés

1. RÉSZ

Hogyan nyújts

Három szabály minden nyújtásnál.

Szabályok

- [ ] Lassan, kilégzésre menj bele, rugózás nélkül.
- [ ] Enyhe húzás legyen, soha ne fájdalom: ha fáj, engedj vissza.
- [ ] Tartsd 20–30 másodpercig, 3 ismétlés; a kezelés után mindig nyújts.

2. RÉSZ

Fej, arc és nyak

Terapeutának és páciensnek is.

Trapezius – felső rostok

Fej az ellenkező oldalra döntve, enyhe előrehajlítással; ülve a páciens ugyanazon oldali kezével fogja a szék alját.

3 × 20–30 mp

Sternocleidomastoideus (SCM)

Fej az ellenkező oldalra döntve, majd az álla lassan a kezelt oldal felé fordul; enyhe hátrahajlítás csak akkor, ha nem okoz szédülést.

3 × 20–30 mp

Masseter (rágóizom)

Lassú szájnyitás a nyelv hegyével a szájpadláson; a terapeuta két ujja finoman segíti lefelé az állkapcsot.

3 × 20–30 mp

Temporalis (halántékizom)

Lassú szájnyitás, miközben a terapeuta ujjai felfelé simítanak a halántékon.

3 × 20–30 mp

Pterygoideus lateralis

Az állkapocs lassú hátrahúzása (a páciens kissé hátrahúzza az állát), majd lassú szájzárás.

3 × 20–30 mp

Pterygoideus medialis

Lassú szájnyitás, az állkapocs kissé az ellenkező oldalra tolva.

3 × 20–30 mp

Splenius capitis

Fej előrehajlítva és az ellenkező oldalra fordítva.

3 × 20–30 mp

Splenius cervicis

Fej előrehajlítva és az ellenkező oldalra döntve-fordítva.

3 × 20–30 mp

Suboccipitalis izmok

Állbehúzás (a fej egyenesen hátracsúszik), majd enyhe biccentés előre.

3 × 20–30 mp

Semispinalis capitis

Fej előrehajlítva, enyhe oldalra fordítással.

3 × 20–30 mp

Levator scapulae (lapockaemelő)

Fej előre- és az ellenkező oldalra fordítva (orral a hónalj felé), a kezelt oldali kéz a tarkó mögött.

3 × 20–30 mp

Scalenus izmok

Fej az ellenkező oldalra döntve, enyhe hátrahajlítással; a kezelt oldali kulcscsontot a terapeuta lefelé rögzíti.

3 × 20–30 mp

3. RÉSZ

Váll, kar és kéz

Terapeutának és páciensnek is.

Infraspinatus

A kezelt oldali kar a test előtt keresztben, a könyök a másik kézzel a mellkas felé húzva; vagy a kéz a hát mögött.

3 × 20–30 mp

Supraspinatus

A kezelt oldali kéz a hát mögött, a másik kéz finoman húzza a csuklót az ellenkező oldal felé.

3 × 20–30 mp

Teres minor

A kar a test előtt keresztben, a könyök a mellkas felé húzva.

3 × 20–30 mp

Subscapularis

Kar kifelé forgatva, könyök 90°-ban, a kezet finoman hátra engedve (ajtófélfánál).

3 × 20–30 mp

Deltoideus

Elülső rostok: kar hátra; hátsó rostok: kar a test előtt keresztben.

3 × 20–30 mp

Pectoralis major

Ajtófélfa-nyújtás: alkar a kereten, könyök vállmagasságban, a test lassan előre lép.

3 × 20–30 mp

Pectoralis minor

Vállak hátra és le; ajtófélfánál a könyök a vállmagasság fölött.

3 × 20–30 mp

Rhomboideus

Karok előre keresztben (önmagunk átölelése), a hát enyhén kerekítve.

3 × 20–30 mp

Serratus anterior

Kar hátra és a lapocka a gerinc felé húzva; mély belégzés közben.

3 × 20–30 mp

Latissimus dorsi

Kar a fej fölött, a törzs az ellenkező oldalra döntve.

3 × 20–30 mp

Biceps brachii

Könyök nyújtva, alkar befelé forgatva, a kar hátra.

3 × 20–30 mp

Triceps brachii

Kar a fej fölött, a könyök teljesen hajlítva, a másik kéz finoman hátrafelé nyomja.

3 × 20–30 mp

Alkari feszítők (ECRL, ECRB, extensor digitorum)

Könyök nyújtva, csukló és ujjak hajlítva, a másik kéz finoman húzza lefelé.

3 × 20–30 mp

Alkari hajlítók

Könyök nyújtva, tenyér felfelé, az ujjak hátrafelé húzva.

3 × 20–30 mp

4. RÉSZ

Hát és törzs

Terapeutának és páciensnek is.

Trapezius – középső rostok

Karok előre keresztben, a hát kerekítve.

3 × 20–30 mp

Trapezius – alsó rostok

Karok előre és fel, a hát kerekítve.

3 × 20–30 mp

Serratus posterior superior

Kar előre keresztben, a hát kerekítve.

3 × 20–30 mp

Iliocostalis thoracis

Ülve előrehajlás, a törzs enyhén az ellenkező oldalra fordítva.

3 × 20–30 mp

Iliocostalis lumborum

Háton fekve térdek a mellkashoz húzva.

3 × 20–30 mp

Longissimus thoracis

Ülve előrehajlás, vagy háton térdek a mellkashoz.

3 × 20–30 mp

Multifidus

Háton fekve térdek a mellkashoz, enyhe oldalra fordítással.

3 × 20–30 mp

Quadratus lumborum

Állva vagy oldalt fekve oldalra döntés, a felső kar a fej fölött.

3 × 20–30 mp

Rectus abdominis

Háton fekve, egy párna a derék alatt, karok a fej fölött.

3 × 20–30 mp

Obliquus externus abdominis

Háton fekve, a térdek az ellenkező oldalra döntve, a vállak a földön.

3 × 20–30 mp

5. RÉSZ

Medence és csípő

Terapeutának és páciensnek is.

Gluteus maximus

Háton fekve, a térd az ellenkező váll felé húzva.

3 × 20–30 mp

Gluteus medius

Oldalt fekve a felső láb a test mögött lelóg az ágy szélén; vagy állva keresztezett lábbal oldalra dőlés.

3 × 20–30 mp

Gluteus minimus

Háton fekve a láb az ellenkező oldalra keresztezve.

3 × 20–30 mp

Piriformis

Háton fekve, a kezelt láb bokája a másik térdre téve, a másik comb a mellkas felé húzva (4-es nyújtás).

3 × 20–30 mp

Iliopsoas

Kitörés-pozíció: a hátsó térd a földön, a csípő előre tolva.

3 × 20–30 mp

Tensor fasciae latae (TFL)

Oldalt fekve a felső láb nyújtva, hátra és lefelé engedve.

3 × 20–30 mp

Adductor longus

Ülve talpak összeérintve (pillangó), a térdek lefelé engedve.

3 × 20–30 mp

Adductor magnus

Ülve terpeszben előrehajlás.

3 × 20–30 mp

Pectineus

Láb távolítva és nyújtva, enyhén hátra.

3 × 20–30 mp

Sartorius

Csípő nyújtva, enyhén befelé forgatva (kitörés-pozíció).

3 × 20–30 mp

6. RÉSZ

Comb, lábszár és lábfej

Terapeutának és páciensnek is.

Rectus femoris

Hason fekve vagy állva a sarok a fenék felé húzva, a csípő nyújtva.

3 × 20–30 mp

Vastus medialis

Térd teljesen hajlítva (sarok a fenékhez).

3 × 20–30 mp

Vastus lateralis

Térd teljesen hajlítva, a láb enyhén befelé forgatva.

3 × 20–30 mp

Biceps femoris

Háton fekve egyenes láb emelése, a boka felhúzva.

3 × 20–30 mp

Semitendinosus / semimembranosus

Háton fekve egyenes láb emelése, enyhén kifelé.

3 × 20–30 mp

Gastrocnemius

Állva a falnál, a hátsó láb nyújtva, a sarok a földön.

3 × 20–30 mp

Soleus

Állva a falnál, a hátsó térd enyhén hajlítva, a sarok a földön.

3 × 20–30 mp

Tibialis anterior

Boka és lábujjak lefelé feszítve (ülve a lábfej talppal felfelé maga alá hajtva).

3 × 20–30 mp

Peroneus (fibularis) longus

Lábfej befelé fordítva és lefelé feszítve.

3 × 20–30 mp

Tibialis posterior

Lábfej kifelé fordítva és felhúzva.

3 × 20–30 mp

Extensor digitorum longus

Lábujjak és boka lefelé feszítve.

3 × 20–30 mp

Flexor digitorum brevis

Lábujjak felfelé húzva, a boka felhúzva.

3 × 20–30 mp

Abductor hallucis

Nagylábujj befelé (a többi felé) húzva, a boka felhúzva.

3 × 20–30 mp

Quadratus plantae

Lábujjak és boka felhúzva.

3 × 20–30 mp

Következő lépés

Ma: próbáld ki magadon a nyakad és a vállad nyújtásait, hogy a páciensnek is pontosan el tudd magyarázni.