MEGTALÁLOD, ÉS TUDOD, MIT TEGYÉL™

Önkezelési technikák a terapeutának

A kezed a munkaeszközöd. Így vigyázz rá, hogy évek múlva is fájdalom nélkül dolgozhass.

Triggerpont Atlasz · Oktatási anyag egészségügyi szakembereknek és hallgatóknak. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist.

Tartalom

1 · Miért fáj a terapeuta keze

2 · Napi 5 perces rutin

3 · Eszközök

Következő lépés

1. RÉSZ

Miért fáj a terapeuta keze

A leggyakoribb túlterhelések.

TERÜLET	MI TERHELI	MIT TEGYÉL
Hüvelykujj	Tartós, egyenes hüvelykujjas nyomás	Váltogasd: ujjbegyek, ököl, könyök, alkar; a hüvelykujjat soha ne túlnyújtva használd.
Csukló	Hajlított csuklóval adott nyomás	A nyomás a testsúlyból jöjjön, egyenes csuklóval.
Alkar	Folyamatos szorítás	Kezelések között 30 mp alkarnyújtás.
Derék és váll	Túl alacsony vagy magas kezelőágy	Az ágy legyen csípőmagasságban; lépj közelebb, ne hajolj.

2. RÉSZ

Napi 5 perces rutin

Munka előtt és után.

1. Ujjak és csukló átmozgatása: 10 ökölbe szorítás és nyitás.
2. Alkarfeszítők és -hajlítók nyújtása: 2 × 30 mp mindkét irányba.
3. Önmasszázs a tenyéren és az alkaron a másik kézzel vagy labdával: 1 perc.
4. Vállkörzés és lapockahúzás: 10 ismétlés.
5. Mellizom-nyújtás ajtófélfánál: 30 mp.

3. RÉSZ

Eszközök

Hogy ne a hüvelykujjad dolgozzon.

Amit érdemes használni

- [ ] Teniszlabda vagy masszázslabda a saját önmasszázsodhoz.
- [ ] Ökölnyomás vagy könyök a nagy izmokon (farizom, comb).
- [ ] Alkar a hát hosszanti simításához.
- [ ] Rövidebb kezelési blokkok, közte 2–3 perc szünet.

Figyelj a jelekre

Ha a hüvelykujjad töve, a csuklód vagy az ujjaid zsibbadnak vagy éjszaka fájnak, csökkentsd a terhelést, és kérj vizsgálatot. Neked is jár kezelés.

Következő lépés

Holnaptól: minden kezelés előtt 1 perc csukló- és alkarnyújtás, és nagy izmokon könyök vagy ököl a hüvelykujj helyett.