01 · FEJ, ARC ÉS NYAK

Trapezius – felső rostok

Hol: A vállöv tetején, a nyak és az akromion között félúton, a felső szabad szélen.

Sugárzás: halánték, a fej oldala, a nyak oldala, a fül mögött, állkapocsszöglet

Nyújtás: Fej az ellenkező oldalra döntve, enyhe előrehajlítással; ülve a páciens ugyanazon oldali kezével fogja a szék alját.

02 · FEJ, ARC ÉS NYAK

Levator scapulae (lapockaemelő)

Hol: A lapocka felső szöglete fölött kissé medialisan, és a nyak oldalán a trapezius felső szélének mélyén.

Sugárzás: a nyak és a váll találkozása, a lapocka belső széle, a váll hátsó része

Nyújtás: Fej előre- és az ellenkező oldalra fordítva (orral a hónalj felé), a kezelt oldali kéz a tarkó mögött.

03 · FEJ, ARC ÉS NYAK

Sternocleidomastoideus (SCM)

Hol: Az izomhas mentén, a sternalis és a clavicularis részen külön, a középső harmadban a legérzékenyebb.

Sugárzás: homlok, a szem körül, arc, a fül mélyén, fejtető, nyakszirt

Nyújtás: Fej az ellenkező oldalra döntve, majd az álla lassan a kezelt oldal felé fordul; enyhe hátrahajlítás csak akkor, ha nem okoz szédülést.

04 · FEJ, ARC ÉS NYAK

Suboccipitalis izmok

Hol: Közvetlenül a nyakszirtcsont alatt, a középvonal két oldalán, mélyen.

Sugárzás: a fej oldala, a szem mögött, homlok, nyakszirt

Nyújtás: Állbehúzás (a fej egyenesen hátracsúszik), majd enyhe biccentés előre.

05 · FEJ, ARC ÉS NYAK

Masseter (rágóizom)

Hol: A felületes rétegben a járomív alatt és az állkapocsszöglet felett; a mély rétegben az állkapocsízület előtt.

Sugárzás: felső és alsó őrlőfogak, állkapocs, szemöldök, a fül mélyén

Nyújtás: Lassú szájnyitás a nyelv hegyével a szájpadláson; a terapeuta két ujja finoman segíti lefelé az állkapcsot.

06 · FEJ, ARC ÉS NYAK

Temporalis (halántékizom)

Hol: Négy területen a járomív felett, elölről hátrafelé; rágás közben jól tapintható.

Sugárzás: halánték, szemöldök, a szem mögött, felső fogak, a fej oldala

Nyújtás: Lassú szájnyitás, miközben a terapeuta ujjai felfelé simítanak a halántékon.

07 · FEJ, ARC ÉS NYAK

Scalenus izmok

Hol: A nyak oldalán, a SCM mögött és alatt, a kulcscsont felett.

Sugárzás: mellkas eleje, felkar, a lapocka belső széle, a kéz (hüvelyk- és mutatóujj)

Nyújtás: Fej az ellenkező oldalra döntve, enyhe hátrahajlítással; a kezelt oldali kulcscsontot a terapeuta lefelé rögzíti.

08 · VÁLL, KAR ÉS KÉZ

Infraspinatus

Hol: A lapocka hátsó felszínén, a lapockatövis alatt, a fossa infraspinata középső és felső részén.

Sugárzás: a váll eleje (mélyen), felkar elülső-oldalsó része, alkar, a kéz hüvelykujj felőli oldala

Nyújtás: A kezelt oldali kar a test előtt keresztben, a könyök a másik kézzel a mellkas felé húzva; vagy a kéz a hát mögött.

09 · VÁLL, KAR ÉS KÉZ

Supraspinatus

Hol: A lapockatövis felett, a fossa supraspinata medialis részén és laterálisan a vállcsúcs alatt.

Sugárzás: a váll oldala (deltoid terület), a felkar külső oldala, a könyök külső oldala

Nyújtás: A kezelt oldali kéz a hát mögött, a másik kéz finoman húzza a csuklót az ellenkező oldal felé.

10 · VÁLL, KAR ÉS KÉZ

Pectoralis minor

Hol: A processus coracoideus alatt, a 3–5. borda felett, a pectoralis major alatt mélyen.

Sugárzás: a váll eleje, a mellkas, a kar belső oldala, a kisujj felőli kéz

Nyújtás: Vállak hátra és le; ajtófélfánál a könyök a vállmagasság fölött.

11 · VÁLL, KAR ÉS KÉZ

Rhomboideus

Hol: A lapocka belső széle és a gerinc között, a trapezius alatt.

Sugárzás: a lapocka belső széle, a lapockák között

Nyújtás: Karok előre keresztben (önmagunk átölelése), a hát enyhén kerekítve.

12 · VÁLL, KAR ÉS KÉZ

Alkari feszítők (ECRL, ECRB, extensor digitorum)

Hol: Az alkar hátsó-külső oldalán, a könyök alatt 3–6 cm-re.

Sugárzás: a könyök külső oldala, az alkar hátsó oldala, a kézhát, az ujjak

Nyújtás: Könyök nyújtva, csukló és ujjak hajlítva, a másik kéz finoman húzza lefelé.

13 · HÁT ÉS TÖRZS

Quadratus lumborum

Hol: Az utolsó borda és a csípőcsont taraja között, a gerincmerevítő külső szélén, mélyen.

Sugárzás: a csípőcsont taraja, a fenék, a csípő oldala, az ágyék

Nyújtás: Állva vagy oldalt fekve oldalra döntés, a felső kar a fej fölött.

14 · MEDENCE ÉS CSÍPŐ

Iliopsoas

Hol: A comb elején a lágyékszalag alatt (a. femoralistól oldalra), és a hasban a csípőlapát belső oldalán.

Sugárzás: az ágyék a gerinc mellett, a keresztcsont, a comb eleje

Nyújtás: Kitörés-pozíció: a hátsó térd a földön, a csípő előre tolva.

15 · MEDENCE ÉS CSÍPŐ

Gluteus medius

Hol: A csípőcsont taraja alatt 2–5 cm-re, a fenék felső-külső részén.

Sugárzás: az ágyék alja, a keresztcsont, a csípő oldala, a fenék

Nyújtás: Oldalt fekve a felső láb a test mögött lelóg az ágy szélén; vagy állva keresztezett lábbal oldalra dőlés.

16 · MEDENCE ÉS CSÍPŐ

Gluteus minimus

Hol: Mélyen a gluteus medius alatt, a csípőcsont taraja és a combcsont nagy tompora között.

Sugárzás: a comb külső oldala, a lábszár külső oldala, a comb hátsó része, a boka

Nyújtás: Háton fekve a láb az ellenkező oldalra keresztezve.

17 · MEDENCE ÉS CSÍPŐ

Piriformis

Hol: A keresztcsont külső széle és a nagy tompor csúcsa közötti vonal középső és külső harmadában.

Sugárzás: a fenék, a keresztcsont, a comb hátsó része, a csípőízület hátsó része

Nyújtás: Háton fekve, a kezelt láb bokája a másik térdre téve, a másik comb a mellkas felé húzva (4-es nyújtás).

18 · COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ

Vastus lateralis

Hol: A comb külső oldalán, több ponton a csípő és a térd között.

Sugárzás: a comb külső oldala, a térd külső oldala, a térdkalács mögött

Nyújtás: Térd teljesen hajlítva, a láb enyhén befelé forgatva.

19 · COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ

Gastrocnemius

Hol: A vádli felső részén, a belső és külső fejben, a térdhajlat alatt.

Sugárzás: a lábboltozat, a vádli, a térdhajlat

Nyújtás: Állva a falnál, a hátsó láb nyújtva, a sarok a földön.

20 · COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ

Soleus

Hol: A vádli alsó részén, mélyen, a gastrocnemius alatt, az Achilles-ín felett.

Sugárzás: a sarok, a vádli, a keresztcsont (ritkán)

Nyújtás: Állva a falnál, a hátsó térd enyhén hajlítva, a sarok a földön.