KISUGÁRZÓ FÁJDALOM · TARKÓ ÉS NYAK

Fáj a tarkód vagy a nyakad?

> *A fájdalom forrása gyakran nem ott van, ahol érzed. Ezek az izmok küldhetnek ide fájdalmat:*

Trapezius – felső rostok

Ott van: A vállöv tetején, a nyak és az akromion között félúton, a felső szabad szélen.

Sternocleidomastoideus (SCM)

Ott van: Az izomhas mentén, a sternalis és a clavicularis részen külön, a középső harmadban a legérzékenyebb.

Splenius cervicis

Ott van: A nyak alsó részén, a lapocka felső szöglete felett, a levator scapulae mellett.

Suboccipitalis izmok

Ott van: Közvetlenül a nyakszirtcsont alatt, a középvonal két oldalán, mélyen.

Semispinalis capitis

Ott van: A tarkón, a középvonal mellett 2–3 cm-re, a nyakszirt alatt és a nyak közepén.

Kérdezd meg a terapeutádat, melyik izom okozza a te panaszodat. Triggerpont Atlasz · oktatási célú ábra, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM · FEJ: HOMLOK, HALÁNTÉK, FEJTETŐ

Fáj a fejed?

> *A fájdalom forrása gyakran nem ott van, ahol érzed. Ezek az izmok küldhetnek ide fájdalmat:*

Trapezius – felső rostok

Ott van: A vállöv tetején, a nyak és az akromion között félúton, a felső szabad szélen.

Sternocleidomastoideus (SCM)

Ott van: Az izomhas mentén, a sternalis és a clavicularis részen külön, a középső harmadban a legérzékenyebb.

Masseter (rágóizom)

Ott van: A felületes rétegben a járomív alatt és az állkapocsszöglet felett; a mély rétegben az állkapocsízület előtt.

Temporalis (halántékizom)

Ott van: Négy területen a járomív felett, elölről hátrafelé; rágás közben jól tapintható.

Splenius capitis

Ott van: A nyak hátsó-oldalsó részén, a SCM és a trapezius között, a nyakszirt alatt kb. 2–3 ujjnyival.

Kérdezd meg a terapeutádat, melyik izom okozza a te panaszodat. Triggerpont Atlasz · oktatási célú ábra, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM · ARC, FOGAK ÉS ÁLLKAPOCS

Fáj a fogad vagy az állkapcsod?

> *A fájdalom forrása gyakran nem ott van, ahol érzed. Ezek az izmok küldhetnek ide fájdalmat:*

Trapezius – felső rostok

Ott van: A vállöv tetején, a nyak és az akromion között félúton, a felső szabad szélen.

Sternocleidomastoideus (SCM)

Ott van: Az izomhas mentén, a sternalis és a clavicularis részen külön, a középső harmadban a legérzékenyebb.

Masseter (rágóizom)

Ott van: A felületes rétegben a járomív alatt és az állkapocsszöglet felett; a mély rétegben az állkapocsízület előtt.

Temporalis (halántékizom)

Ott van: Négy területen a járomív felett, elölről hátrafelé; rágás közben jól tapintható.

Pterygoideus lateralis

Ott van: Mélyen a járomív alatt; szájon belül a felső őrlőfogak mögött, felfelé és hátrafelé.

Kérdezd meg a terapeutádat, melyik izom okozza a te panaszodat. Triggerpont Atlasz · oktatási célú ábra, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM · VÁLL ELEJE ÉS MELLKAS

Fáj a vállad eleje?

> *A fájdalom forrása gyakran nem ott van, ahol érzed. Ezek az izmok küldhetnek ide fájdalmat:*

Scalenus izmok

Ott van: A nyak oldalán, a SCM mögött és alatt, a kulcscsont felett.

Infraspinatus

Ott van: A lapocka hátsó felszínén, a lapockatövis alatt, a fossa infraspinata középső és felső részén.

Pectoralis major

Ott van: A mellizom külső szélén (hónalj elülső redője), a kulcscsont alatt és a szegycsont mellett.

Pectoralis minor

Ott van: A processus coracoideus alatt, a 3–5. borda felett, a pectoralis major alatt mélyen.

Biceps brachii

Ott van: A felkar elülső részének középső harmadában, mindkét fejben.

Kérdezd meg a terapeutádat, melyik izom okozza a te panaszodat. Triggerpont Atlasz · oktatási célú ábra, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM · VÁLL HÁTULJA ÉS LAPOCKA

Fáj a lapockád vagy a vállad hátulja?

> *A fájdalom forrása gyakran nem ott van, ahol érzed. Ezek az izmok küldhetnek ide fájdalmat:*

Levator scapulae (lapockaemelő)

Ott van: A lapocka felső szöglete fölött kissé medialisan, és a nyak oldalán a trapezius felső szélének mélyén.

Scalenus izmok

Ott van: A nyak oldalán, a SCM mögött és alatt, a kulcscsont felett.

Supraspinatus

Ott van: A lapockatövis felett, a fossa supraspinata medialis részén és laterálisan a vállcsúcs alatt.

Teres minor

Ott van: A lapocka külső szélén, az infraspinatus alatt, a hónalj hátsó redője felett.

Subscapularis

Ott van: A lapocka elülső felszínén, a hónaljból elérve, a lapocka külső széle mentén.

Kérdezd meg a terapeutádat, melyik izom okozza a te panaszodat. Triggerpont Atlasz · oktatási célú ábra, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM · FELKAR ÉS KÖNYÖK

Fáj a könyököd vagy a karod?

> *A fájdalom forrása gyakran nem ott van, ahol érzed. Ezek az izmok küldhetnek ide fájdalmat:*

Scalenus izmok

Ott van: A nyak oldalán, a SCM mögött és alatt, a kulcscsont felett.

Infraspinatus

Ott van: A lapocka hátsó felszínén, a lapockatövis alatt, a fossa infraspinata középső és felső részén.

Supraspinatus

Ott van: A lapockatövis felett, a fossa supraspinata medialis részén és laterálisan a vállcsúcs alatt.

Teres minor

Ott van: A lapocka külső szélén, az infraspinatus alatt, a hónalj hátsó redője felett.

Subscapularis

Ott van: A lapocka elülső felszínén, a hónaljból elérve, a lapocka külső széle mentén.

Kérdezd meg a terapeutádat, melyik izom okozza a te panaszodat. Triggerpont Atlasz · oktatási célú ábra, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM · ALKAR, CSUKLÓ ÉS KÉZ

Fáj a csuklód vagy a kezed?

> *A fájdalom forrása gyakran nem ott van, ahol érzed. Ezek az izmok küldhetnek ide fájdalmat:*

Scalenus izmok

Ott van: A nyak oldalán, a SCM mögött és alatt, a kulcscsont felett.

Infraspinatus

Ott van: A lapocka hátsó felszínén, a lapockatövis alatt, a fossa infraspinata középső és felső részén.

Subscapularis

Ott van: A lapocka elülső felszínén, a hónaljból elérve, a lapocka külső széle mentén.

Pectoralis minor

Ott van: A processus coracoideus alatt, a 3–5. borda felett, a pectoralis major alatt mélyen.

Latissimus dorsi

Ott van: A hónalj hátsó redőjében, a lapocka alsó csúcsa magasságában.

Kérdezd meg a terapeutádat, melyik izom okozza a te panaszodat. Triggerpont Atlasz · oktatási célú ábra, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM · HÁT KÖZEPE ÉS HAS

Fáj a hátad közepe?

> *A fájdalom forrása gyakran nem ott van, ahol érzed. Ezek az izmok küldhetnek ide fájdalmat:*

Serratus anterior

Ott van: A mellkas oldalán, a hónalj alatt az 5–6. borda magasságában.

Trapezius – középső rostok

Ott van: A lapocka belső széle és a gerinc között, a lapockatövis magasságában, felületesen.

Iliocostalis thoracis

Ott van: A gerinc mellett kb. 5–8 cm-re, a középső és alsó háti szakaszon.

Iliocostalis lumborum

Ott van: Az ágyéki szakaszon a gerinc mellett kb. 5–7 cm-re, az alsó bordák alatt.

Multifidus

Ott van: Közvetlenül a tövisnyúlványok mellett, mélyen, bármely gerincszakaszon (leggyakrabban ágyéki).

Kérdezd meg a terapeutádat, melyik izom okozza a te panaszodat. Triggerpont Atlasz · oktatási célú ábra, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM · FENÉK, CSÍPŐ ÉS LÁGYÉK

Fáj a feneked vagy a csípőd?

> *A fájdalom forrása gyakran nem ott van, ahol érzed. Ezek az izmok küldhetnek ide fájdalmat:*

Iliocostalis lumborum

Ott van: Az ágyéki szakaszon a gerinc mellett kb. 5–7 cm-re, az alsó bordák alatt.

Longissimus thoracis

Ott van: A gerinc mellett 2–4 cm-re, az alsó háti és felső ágyéki szakaszon.

Quadratus lumborum

Ott van: Az utolsó borda és a csípőcsont taraja között, a gerincmerevítő külső szélén, mélyen.

Gluteus maximus

Ott van: A fenék alsó-belső részén, a keresztcsont mellett és az ülőgumó felett.

Gluteus medius

Ott van: A csípőcsont taraja alatt 2–5 cm-re, a fenék felső-külső részén.

Kérdezd meg a terapeutádat, melyik izom okozza a te panaszodat. Triggerpont Atlasz · oktatási célú ábra, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM · ÁGYÉK ÉS KERESZTCSONT

Fáj a derekad?

> *A fájdalom forrása gyakran nem ott van, ahol érzed. Ezek az izmok küldhetnek ide fájdalmat:*

Iliocostalis lumborum

Ott van: Az ágyéki szakaszon a gerinc mellett kb. 5–7 cm-re, az alsó bordák alatt.

Longissimus thoracis

Ott van: A gerinc mellett 2–4 cm-re, az alsó háti és felső ágyéki szakaszon.

Multifidus

Ott van: Közvetlenül a tövisnyúlványok mellett, mélyen, bármely gerincszakaszon (leggyakrabban ágyéki).

Quadratus lumborum

Ott van: Az utolsó borda és a csípőcsont taraja között, a gerincmerevítő külső szélén, mélyen.

Rectus abdominis

Ott van: A köldök felett és alatt, a középvonal mellett 2–4 cm-re.

Kérdezd meg a terapeutádat, melyik izom okozza a te panaszodat. Triggerpont Atlasz · oktatási célú ábra, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM · COMB ÉS TÉRD

Fáj a térded vagy a combod?

> *A fájdalom forrása gyakran nem ott van, ahol érzed. Ezek az izmok küldhetnek ide fájdalmat:*

Gluteus minimus

Ott van: Mélyen a gluteus medius alatt, a csípőcsont taraja és a combcsont nagy tompora között.

Piriformis

Ott van: A keresztcsont külső széle és a nagy tompor csúcsa közötti vonal középső és külső harmadában.

Iliopsoas

Ott van: A comb elején a lágyékszalag alatt (a. femoralistól oldalra), és a hasban a csípőlapát belső oldalán.

Tensor fasciae latae (TFL)

Ott van: A csípő elülső-külső részén, a spina iliaca anterior superior alatt.

Adductor longus

Ott van: A comb belső oldalán, a felső harmadban.

Kérdezd meg a terapeutádat, melyik izom okozza a te panaszodat. Triggerpont Atlasz · oktatási célú ábra, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot.

KISUGÁRZÓ FÁJDALOM · LÁBSZÁR, BOKA ÉS LÁBFEJ

Fáj a sarkad vagy a talpad?

> *A fájdalom forrása gyakran nem ott van, ahol érzed. Ezek az izmok küldhetnek ide fájdalmat:*

Gluteus minimus

Ott van: Mélyen a gluteus medius alatt, a csípőcsont taraja és a combcsont nagy tompora között.

Gastrocnemius

Ott van: A vádli felső részén, a belső és külső fejben, a térdhajlat alatt.

Soleus

Ott van: A vádli alsó részén, mélyen, a gastrocnemius alatt, az Achilles-ín felett.

Tibialis anterior

Ott van: A sípcsont mellett kívül, a lábszár felső harmadában.

Peroneus (fibularis) longus

Ott van: A lábszár külső oldalán, a felső harmadban, a fibulafej alatt 2–4 cm-re.

Kérdezd meg a terapeutádat, melyik izom okozza a te panaszodat. Triggerpont Atlasz · oktatási célú ábra, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot.