A PÁCIENS OTTHON IS FOLYTATJA™

4 hetes öngondoskodási tervek panaszonként

10 gyakori panaszra egy-egy négyhetes otthoni terv, amit a kezelés végén a páciens kezébe adhatsz.

Triggerpont Atlasz · Oktatási anyag egészségügyi szakembereknek és hallgatóknak. Nem helyettesíti az orvosi diagnózist.

Tartalom

1 · A páciensnek

2 · A 10 terv

Következő lépés

1. RÉSZ

A páciensnek

Így használd a tervet.

Fontos

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

2. RÉSZ

A 10 terv

Három gyakorlat, négy hét, egy mindennapi tanács.

Tenziós fejfájás

1. **Trapezius – felső rostok:** Ülj egyenesen, fogd meg a széked alját a fájós oldalon, és döntsd a fejed lassan a másik oldalra, amíg a nyakad oldalán enyhe húzást érzel. Tartsd 30 másodpercig, 3-szor, naponta kétszer.

2. **Suboccipitalis izmok:** Feküdj hanyatt, tegyél a tarkód alá két teniszlabdát egy zokniban, és pihenj rajta 2 percig. Utána húzd be lassan az álladat 10-szer.

3. **Temporalis (halántékizom):** Ha érzed, hogy kezdődik a fejfájás, masszírozd körkörösen a halántékodat mindkét oldalon 1 percig, lassan, közben lélegezz mélyeket.

HÉT	TEENDŐ
1. hét · Ismerkedés	Naponta 1× az első gyakorlat. Figyeld, mikor erősödik a fájdalom.
2. hét · Rendszeresség	Naponta 2× az első két gyakorlat, és a mindennapi tanács bevezetése.
3. hét · Teljes program	Naponta 2× mind a három gyakorlat.
4. hét · Megtartás	Naponta 1× mind a három gyakorlat, és jegyezd fel, mi segített a legtöbbet.

Mindennap

Képernyő szemmagasságban, óránként 1 perc szünet, esti lazítás.

Nyakfájás és merev nyak

1. **Levator scapulae (lapockaemelő):** Fordítsd a fejed a másik oldalra, és nézz le a hónaljad felé. A fájós oldali kezed tedd a tarkódra. Tartsd 30 másodpercig, 3-szor, naponta kétszer.

2. **Trapezius – felső rostok:** Ülj egyenesen, fogd meg a széked alját a fájós oldalon, és döntsd a fejed lassan a másik oldalra, amíg a nyakad oldalán enyhe húzást érzel. Tartsd 30 másodpercig, 3-szor, naponta kétszer.

3. **Splenius cervicis:** Óránként egyszer húzd hátra egyenesen az álladat (mintha dupla tokát csinálnál), és tartsd 5 másodpercig. 5-ször.

HÉT	TEENDŐ
1. hét · Ismerkedés	Naponta 1× az első gyakorlat. Figyeld, mikor erősödik a fájdalom.
2. hét · Rendszeresség	Naponta 2× az első két gyakorlat, és a mindennapi tanács bevezetése.
3. hét · Teljes program	Naponta 2× mind a három gyakorlat.
4. hét · Megtartás	Naponta 1× mind a három gyakorlat, és jegyezd fel, mi segített a legtöbbet.

> **Mindennap**
>
> Alacsonyabb párna, a telefon ne a váll és a fül között.

Állkapocs- és arcfájdalom

1. **Masseter (rágóizom):** Az ujjbegyeiddel masszírozd körkörösen az arcodat a fülcimpád előtt és alatt 1 percig. Napközben figyeld: ha összeszorítod a fogaidat, engedd el, a nyelved pihenjen a szájpadláson.

2. **Temporalis (halántékizom):** Ha érzed, hogy kezdődik a fejfájás, masszírozd körkörösen a halántékodat mindkét oldalon 1 percig, lassan, közben lélegezz mélyeket.

3. **Pterygoideus medialis:** Napközben többször ellenőrizd: a fogaid ne érjenek össze, az ajkad legyen zárva, az állkapcsod laza.

HÉT	TEENDŐ
1. hét · Ismerkedés	Naponta 1× az első gyakorlat. Figyeld, mikor erősödik a fájdalom.
2. hét · Rendszeresség	Naponta 2× az első két gyakorlat, és a mindennapi tanács bevezetése.
3. hét · Teljes program	Naponta 2× mind a három gyakorlat.
4. hét · Megtartás	Naponta 1× mind a három gyakorlat, és jegyezd fel, mi segített a legtöbbet.

> **Mindennap**
>
> Fogösszeszorítás figyelése, rágógumi kerülése.

Vállfájdalom

1. **Infraspinatus:** Húzd át a fájós karodat a mellkasod előtt a másik vállad felé, a másik kezeddel fogd meg a könyöködet, és húzd finoman. 30 másodperc, 3-szor.
2. **Supraspinatus:** Engedd lógni a karodat, és körözz vele kicsiket előre-hátra, mint egy inga, 1 percig. Naponta kétszer.
3. **Pectoralis minor:** Ülve húzd hátra és le a lapockáidat, mintha a hátsó zsebedbe akarnád tenni őket. Tartsd 5 másodpercig, 10-szer.

HÉT	TEENDŐ
1. hét · Ismerkedés	Naponta 1× az első gyakorlat. Figyeld, mikor erősödik a fájdalom.
2. hét · Rendszeresség	Naponta 2× az első két gyakorlat, és a mindennapi tanács bevezetése.
3. hét · Teljes program	Naponta 2× mind a három gyakorlat.
4. hét · Megtartás	Naponta 1× mind a három gyakorlat, és jegyezd fel, mi segített a legtöbbet.

> **Mindennap**
> Ne aludj a fájós oldalon, a kar alatt párna.

Könyök- és alkarfájdalom

1. **Alkari feszítők (ECRL, ECRB, extensor digitorum):** Nyújtsd ki a karod magad előtt tenyérrel lefelé, és a másik kezeddel hajlítsd lefelé a csuklódat és az ujjaidat. 30 másodperc, 3-szor.
2. **Alkari hajlítók:** Nyújtsd ki a karod tenyérrel felfelé, és a másik kezeddel húzd az ujjaidat lefelé-hátrafelé. 30 másodperc, 3-szor.
3. **Triceps brachii:** Emeld a karod a fejed fölé, hajlítsd be a könyököd, és a másik kezeddel finoman nyomd hátra. 30 másodperc, 3-szor.

HÉT	TEENDŐ
1. hét · Ismerkedés	Naponta 1× az első gyakorlat. Figyeld, mikor erősödik a fájdalom.
2. hét · Rendszeresség	Naponta 2× az első két gyakorlat, és a mindennapi tanács bevezetése.
3. hét · Teljes program	Naponta 2× mind a három gyakorlat.
4. hét · Megtartás	Naponta 1× mind a három gyakorlat, és jegyezd fel, mi segített a legtöbbet.

> **Mindennap**
>
> Munka közben óránként alkarnyújtás, lazább fogás.

Lapockák közötti fájdalom

1. **Rhomboideus:** Öleld át magad, mintha fáznál, és kerekítsd ki a hátad, amíg a lapockáid között húzást érzel. 30 másodperc, 3-szor.
2. **Trapezius – középső rostok:** Öleld át magad, és kerekítsd ki a hátad. 30 másodperc, 3-szor. Utána húzd hátra a lapockáidat 10-szer.
3. **Pectoralis major:** Állj egy ajtókeretbe, tedd az alkarodat a keretre vállmagasságban, és lépj lassan előre, amíg a mellkasodon húzást érzel. 30 másodperc, 3-szor.

HÉT	TEENDŐ
1. hét · Ismerkedés	Naponta 1× az első gyakorlat. Figyeld, mikor erősödik a fájdalom.
2. hét · Rendszeresség	Naponta 2× az első két gyakorlat, és a mindennapi tanács bevezetése.
3. hét · Teljes program	Naponta 2× mind a három gyakorlat.
4. hét · Megtartás	Naponta 1× mind a három gyakorlat, és jegyezd fel, mi segített a legtöbbet.

> **Mindennap**
>
> Egyenes ülés, lapockahúzás óránként.

Derékfájás

1. **Quadratus lumborum:** Állva emeld a karodat a fejed fölé, és dőlj lassan a másik oldalra, a csípőd maradjon a helyén. 30 másodperc, 3-szor.
2. **Iliopsoas:** Térdelj le az egyik térdedre, a másik lábad előtted. Told lassan előre a csípődet, amíg a hátsó combod elején húzást érzel. 30 másodperc, 3-szor.
3. **Multifidus:** Négykézláb nyújtsd ki az egyik karodat előre és a másik lábadat hátra, tartsd 5 másodpercig. 10-szer oldalanként.

HÉT	TEENDŐ
1. hét · Ismerkedés	Naponta 1× az első gyakorlat. Figyeld, mikor erősödik a fájdalom.

HÉT	TEENDŐ
2. hét · Rendszeresség	Naponta 2× az első két gyakorlat, és a mindennapi tanács bevezetése.
3. hét · Teljes program	Naponta 2× mind a három gyakorlat.
4. hét · Megtartás	Naponta 1× mind a három gyakorlat, és jegyezd fel, mi segített a legtöbbet.

> **Mindennap**
> Óránként állj fel, emelj térdből.

Fenékből a combba sugárzó fájdalom

1. **Piriformis:** Feküdj hanyatt, tedd a fájós lábad bokáját a másik térdedre, és húzd a másik combodat a mellkasod felé. 30 másodperc, 3-szor.
2. **Gluteus minimus:** Feküdj hanyatt, tedd a fájós lábad bokáját a másik térdedre, és húzd a másik combodat a mellkasod felé. 30 másodperc, 3-szor.
3. **Gluteus medius:** Állva tedd a fájós lábadat a másik mögé keresztben, és told ki a csípődet oldalra, amíg húzást érzel. 30 másodperc, 3-szor.

HÉT	TEENDŐ
1. hét · Ismerkedés	Naponta 1× az első gyakorlat. Figyeld, mikor erősödik a fájdalom.
2. hét · Rendszeresség	Naponta 2× az első két gyakorlat, és a mindennapi tanács bevezetése.
3. hét · Teljes program	Naponta 2× mind a három gyakorlat.
4. hét · Megtartás	Naponta 1× mind a három gyakorlat, és jegyezd fel, mi segített a legtöbbet.

> **Mindennap**
> Pénztárca ne a hátsó zsebben, ne keresztezd a lábad.

Térdfájdalom

1. **Rectus femoris:** Állva kapaszkodj meg, fogd meg a bokádat, és húzd a sarkadat a feneked felé, a térdeid egymás mellett. 30 másodperc, 3-szor.
2. **Vastus medialis:** Ülj egy székre, nyújtsd ki lassan a térdedet, tartsd 5 másodpercig, majd engedd le. 10-szer lábanként.

3. **Vastus lateralis:** Állva fogd meg a bokádat, és húzd a sarkadat a feneked felé. 30 másodperc, 3-szor.

HÉT	TEENDŐ
1. hét · Ismerkedés	Naponta 1× az első gyakorlat. Figyeld, mikor erősödik a fájdalom.
2. hét · Rendszeresség	Naponta 2× az első két gyakorlat, és a mindennapi tanács bevezetése.
3. hét · Teljes program	Naponta 2× mind a három gyakorlat.
4. hét · Megtartás	Naponta 1× mind a három gyakorlat, és jegyezd fel, mi segített a legtöbbet.

> **Mindennap**
> Lépcsőn lassan, fokozatos terhelés.

Sarok- és talpfájdalom

1. **Soleus:** Állj a fal elé, a fájós lábad hátul, hajlítsd be kicsit a térdedet, a sarkad maradjon a földön. 30 másodperc, 3-szor.
2. **Gastrocnemius:** Állj a fal elé, tedd a fájós lábadat hátra nyújtott térddel, a sarkad a földön, és dőlj a falnak. 30 másodperc, 3-szor.
3. **Flexor digitorum brevis:** Ülve gurítsd a talpad alatt egy teniszlabdát lassan előre-hátra 2 percig. Naponta egyszer.

HÉT	TEENDŐ
1. hét · Ismerkedés	Naponta 1× az első gyakorlat. Figyeld, mikor erősödik a fájdalom.
2. hét · Rendszeresség	Naponta 2× az első két gyakorlat, és a mindennapi tanács bevezetése.
3. hét · Teljes program	Naponta 2× mind a három gyakorlat.
4. hét · Megtartás	Naponta 1× mind a három gyakorlat, és jegyezd fel, mi segített a legtöbbet.

> **Mindennap**
> Kényelmes cipő, esti talpmasszázs labdával.

Következő lépés

Terapeutának: a következő páciensnél nyomtasd ki a panaszához illő tervet, és a 4. hét végére tűzz ki egy kontrollt.