Otthoni gyakorlat

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Trapezius – felső rostok**. Ez az izom gyakran ide sugároz: halánték, a fej oldala, a nyak oldala, a fül mögött, állkapocsszöglet.

A gyakorlat

Ülj egyenesen, fogd meg a széked alját a fájós oldalon, és döntsd a fejed lassan a másik oldalra, amíg a nyakad oldalán enyhe húzást érzel. Tartsd 30 másodpercig, 3-szor, naponta kétszer.

A mindennapokban

Oldalra döntéses nyújtás naponta kétszer; a monitor szemmagasságban; a telefont ne tartsa a fül és a váll között.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Sternocleidomastoideus (SCM)**. Ez az izom gyakran ide sugároz: homlok, a szem körül, arc, a fül mélyén, fejtető, nyakszirt.

A gyakorlat

Ülve lazítsd el a vállad, és lassan fordítsd a fejed jobbra, majd balra, ahogy kényelmes. 10-szer mindkét irányba, naponta kétszer. Ha szédülsz, hagyd abba.

A mindennapokban

Lassú fejbiccentés és -fordítás; fekve tévézés és felpolcolt fejjel olvasás kerülése.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

FEJ, ARC ÉS NYAK · MASSETER (RÁGÓIZOM)

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Masseter (rágóizom)**. Ez az izom gyakran ide sugároz: felső és alsó őrlőfogak, állkapocs, szemöldök, a fül mélyén.

A gyakorlat

Az ujjbegyeiddel masszírozd körkörösen az arcodat a fülcimpád előtt és alatt 1 percig. Napközben figyeld: ha összeszorítod a fogaidat, engedd el, a nyelved pihenjen a szájpadláson.

A mindennapokban

Napi önmasszázs körkörösen; rágógumi kerülése; figyelni a nappali fogösszeszorításra.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

FEJ, ARC ÉS NYAK · TEMPORALIS (HALÁNTÉKIZOM)

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Temporalis (halántékizom)**. Ez az izom gyakran ide sugároz: halánték, szemöldök, a szem mögött, felső fogak, a fej oldala.

A gyakorlat

Ha érzed, hogy kezdődik a fejfájás, masszírozd körkörösen a halántékodat mindkét oldalon 1 percig, lassan, közben lélegezz mélyeket.

A mindennapokban

Halántéktáji önmasszázs fejfájás kezdetén; az éjszakai fogcsikorgatás figyelése.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Pterygoideus lateralis**. Ez az izom gyakran ide sugároz: állkapocsízület, arc (arcüreg felett).

A gyakorlat

Tükör előtt nyisd ki lassan a szádat egyenes vonalban, az állad ne térjen ki oldalra. 10-szer, naponta kétszer.

A mindennapokban

Kemény, nagy falatok kerülése; tudatos lassú szájnyitás egyenes vonalban.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Pterygoideus medialis**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a nyelv töve, torok, a fül alatt, állkapocsízület.

A gyakorlat

Napközben többször ellenőrizd: a fogaid ne érjenek össze, az ajkad legyen zárva, az állkapcsod laza.

A mindennapokban

Fogösszeszorítás tudatos elengedése; puha étrend fájdalmas napokon.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

FEJ, ARC ÉS NYAK · SPLENIUS CAPITIS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Splenius capitis**. Ez az izom gyakran ide sugároz: fejtető.

A gyakorlat

Ülve hajtsd le az álladat a mellkasod felé, és fordítsd kicsit a másik oldalra, amíg a tarkódon enyhe húzást érzel. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Hosszan felfelé nézés (festés, polcpakolás) kerülése; jó párnamagasság.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

FEJ, ARC ÉS NYAK · SPLENIUS CERVICIS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Splenius cervicis**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a szem mögött, nyakszirt, a nyak és a váll találkozása.

A gyakorlat

Óránként egyszer húzd hátra egyenesen az álladat (mintha dupla tokát csinálnál), és tartsd 5 másodpercig. 5-ször.

A mindennapokban

Fej előretolt tartásának javítása; óránkénti mozgásszünet.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

FEJ, ARC ÉS NYAK · SUBOCCIPITALIS IZMOK

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Suboccipitalis izmok**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a fej oldala, a szem mögött, homlok, nyakszirt.

A gyakorlat

Feküdj hanyatt, tegyél a tarkód alá két teniszlabdát egy zokniban, és pihenj rajta 2 percig. Utána húzd be lassan az álladat 10-szer.

A mindennapokban

Állbehúzás naponta 10×; a képernyő szemmagasságban; óránként rövid szünet.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

FEJ, ARC ÉS NYAK · SEMISPINALIS CAPITIS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Semispinalis capitis**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a fej oldala, halánték, homlok, nyakszirt.

A gyakorlat

Ülve tedd a kezeidet a tarkódra, és engedd, hogy a karjaid súlya lassan előrehajtsa a fejed. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Fej előretolt tartás kerülése; olvasáskor a könyv szemmagasságban.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

FEJ, ARC ÉS NYAK · LEVATOR SCAPULAE (LAPOCKAEMELŐ)

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Levator scapulae (lapockaemelő)**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a nyak és a váll találkozása, a lapocka belső széle, a váll hátsó része.

A gyakorlat

Fordítsd a fejed a másik oldalra, és nézz le a hónaljad felé. A fájós oldali kezed tedd a tarkódra. Tartsd 30 másodpercig, 3-szor, naponta kétszer.

A mindennapokban

Ugyanez a nyújtás naponta kétszer; magas párna és a fej oldalra fordítása munka közben kerülendő.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Scalenus izmok**. Ez az izom gyakran ide sugároz: mellkas eleje, felkar, a lapocka belső széle, a kéz (hüvelyk- és mutatóujj).

A gyakorlat

Feküdj hanyatt, tedd a kezed a hasadra, és lélegezz úgy, hogy belégzéskor a hasad emelkedjen, ne a vállad. 5 perc naponta.

A mindennapokban

Hasi (rekeszizom-) légzés gyakorlása; nehéz táska vállon hordásának kerülése.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

VÁLL, KAR ÉS KÉZ · INFRASPINATUS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Infraspinatus**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a váll eleje (mélyen), felkar elülső-oldalsó része, alkar, a kéz hüvelykujj felőli oldala.

A gyakorlat

Húzd át a fájós karodat a mellkasod előtt a másik vállad felé, a másik kezeddel fogd meg a könyöködet, és húzd finoman. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Alvás a fájós oldalon kerülendő; a karra párna alátámasztás oldalt fekve.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Supraspinatus**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a váll oldala (deltoid terület), a felkar külső oldala, a könyök külső oldala.

A gyakorlat

Engedd lógni a karodat, és körözz vele kicsiket előre-hátra, mint egy inga, 1 percig. Naponta kétszer.

A mindennapokban

Nehéz tárgyak fej fölé emelésének kerülése; vállkörzés naponta.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Teres minor**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a váll hátsó része (pontszerűen), a felkar hátsó része.

A gyakorlat

Húzd át a fájós karodat a mellkasod előtt, a másik kezeddel finoman a könyöködnél. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Ugyanaz, mint az infraspinatusnál; a kar ne aludjon a fej fölött.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

VÁLL, KAR ÉS KÉZ · SUBSCAPULARIS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Subscapularis**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a váll hátsó része, a lapocka, a felkar hátsó része, a csukló.

A gyakorlat

Állj egy ajtókeretbe, könyököd behajlítva, tenyered a kereten. Fordulj lassan el a karodtól, amíg a váll elején enyhe húzást érzel. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Kifelé forgatás gyakorlása; a kar ne maradjon sokáig a test mellé szorítva.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

VÁLL, KAR ÉS KÉZ · DELTOIDEUS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Deltoideus**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a váll (a pont körül), a felkar.

A gyakorlat

Masszírozd a vállad külső részét az ujjaiddal körkörösen 1 percig, majd húzd át a karod a mellkasod előtt 30 másodpercre.

A mindennapokban

Ismétlődő emelés közben szünetek.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

VÁLL, KAR ÉS KÉZ · PECTORALIS MAJOR

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Pectoralis major**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a mellkas eleje, a váll eleje, a kar belső oldala, a mell.

A gyakorlat

Állj egy ajtókeretbe, tedd az alkarodat a keretre vállmagasságban, és lépj lassan előre, amíg a mellkasodon húzást érzel. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Görnyedt tartás javítása; vállak hátra-le.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

VÁLL, KAR ÉS KÉZ · PECTORALIS MINOR

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Pectoralis minor**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a váll eleje, a mellkas, a kar belső oldala, a kisujj felőli kéz.

A gyakorlat

Ülve húzd hátra és le a lapockáidat, mintha a hátsó zsebedbe akarnád tenni őket. Tartsd 5 másodpercig, 10-szer.

A mindennapokban

Előreesett váll javítása; a hátizmok erősítése.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

VÁLL, KAR ÉS KÉZ · RHOMBOIDEUS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Rhomboideus**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a lapocka belső széle, a lapockák között.

A gyakorlat

Öleld át magad, mintha fáznál, és kerekítsd ki a hátad, amíg a lapockáid között húzást érzel. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

A mellizom nyújtása (a rhomboideus gyakran túlnyújtott, gyenge).

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

VÁLL, KAR ÉS KÉZ · SERRATUS ANTERIOR

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Serratus anterior**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a mellkas oldala, a lapocka alsó csúcsa, a kar belső oldala.

A gyakorlat

Feküdj a hátadra, emeld a karodat a fejed fölé, és vegyél 5 lassú, mély lélegzetet a bordáid közé.

A mindennapokban

Köhögés, intenzív futás után gyakori: fokozatos terhelés.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

VÁLL, KAR ÉS KÉZ · LATISSIMUS DORSI

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Latissimus dorsi**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a lapocka alsó csúcsa, a kar hátsó-belső oldala, a gyűrűs- és kisujj.

A gyakorlat

Állva emeld a karodat a fejed fölé, és dőlj lassan a másik oldalra, amíg az oldaladon húzást érzel. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Felhúzódzkodás és húzó mozgások után nyújtás.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

VÁLL, KAR ÉS KÉZ · BICEPS BRACHII

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Biceps brachii**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a váll eleje, a könyökhajlat.

A gyakorlat

Tedd a tenyered hátra egy asztal szélére, nyújtott könyökkel, és fordulj el lassan, amíg a felkarod elején húzást érzel. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Nehéz tárgyak hajlított könyökkel való cipelésének kerülése.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

VÁLL, KAR ÉS KÉZ · TRICEPS BRACHII

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Triceps brachii**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a váll hátsó része, a könyök külső oldala, az alkar hátsó oldala.

A gyakorlat

Emeld a karod a fejed fölé, hajlítsd be a könyököd, és a másik kezeddel finoman nyomd hátra. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Mankóhasználatnál, fekvőtámasznál szünetek.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

VÁLL, KAR ÉS KÉZ · ALKARI FESZÍTŐK (ECRL, ECRB, EXTENSOR DIGITORUM)

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Alkari feszítők (ECRL, ECRB, extensor digitorum)**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a könyök külső oldala, az alkar hátsó oldala, a kézhát, az ujjak.

A gyakorlat

Nyújtsd ki a karod magad előtt tenyérrel lefelé, és a másik kezeddel hajlítsd lefelé a csuklódat és az ujjaidat. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Egérhasználat, csavarozás közben szünetek; szorítás csökkentése.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Alkari hajlítók**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a csukló tenyéri oldala, a tenyér, az ujjak tenyéri oldala.

A gyakorlat

Nyújtsd ki a karod tenyérrel felfelé, és a másik kezeddel húzd az ujjaidat lefelé-hátrafelé. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Kézi munkánál (kertészkedés, szerelés) szünetek; markolás lazítása.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Trapezius – középső rostok**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a lapockák között, a gerinc mellett égő érzés.

A gyakorlat

Öleld át magad, és kerekítsd ki a hátad. 30 másodperc, 3-szor. Utána húzd hátra a lapockáidat 10-szer.

A mindennapokban

Görnyedt ülés javítása; a mellizom nyújtása.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Trapezius – alsó rostok**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a nyak hátsó része, a vállcsúcs, a lapockák között.

A gyakorlat

Feküdj hasra, homlokod egy törölközőn. Emeld fel lassan a karjaidat Y alakban, tartsd 3 másodpercig. 10-szer.

A mindennapokban

Erősítés: hason fekve karemelés Y alakban.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

HÁT ÉS TÖRZS · SERRATUS POSTERIOR SUPERIOR

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Serratus posterior superior**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a lapocka alatt mélyen, a váll hátsó része, a kar hátsó oldala, a kisujj.

A gyakorlat

Ülve tedd a kezed a hasadra, és lélegezz lassan úgy, hogy a hasad emelkedjen. 5 perc naponta.

A mindennapokban

Felső mellkasi (kapkodó) légzés helyett hasi légzés.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

HÁT ÉS TÖRZS · ILIOCOSTALIS THORACIS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Iliocostalis thoracis**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a hát közepe, a has (néha), a lapocka alatt.

A gyakorlat

Ülj egy szék szélére, hajolj lassan előre, a karjaid lógjanak a lábad között. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Hosszú ülés közben mozgásszünet.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

HÁT ÉS TÖRZS · ILIOCOSTALIS LUMBORUM

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Iliocostalis lumborum**. Ez az izom gyakran ide sugároz: az ágyék, a fenék, a has alsó része.

A gyakorlat

Feküdj hanyatt, húzd mindkét térdedet a mellkasodhoz, és öleld át. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Emelés térdből, egyenes háttal; hosszú ülés megszakítása.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

HÁT ÉS TÖRZS · LONGISSIMUS THORACIS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Longissimus thoracis**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a fenék, az ágyék, a csípőcsont taraja.

A gyakorlat

Négykézláb domborítsd fel a hátad (macska), majd engedd le lassan (tehén). 10-szer.

A mindennapokban

Ülő munka megszakítása óránként.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

HÁT ÉS TÖRZS · MULTIFIDUS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Multifidus**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a gerinc mellett pontszerűen, a keresztcsont, a has (ritkán).

A gyakorlat

Négykézláb nyújtsd ki az egyik karodat előre és a másik lábadat hátra, tartsd 5 másodpercig. 10-szer oldalanként.

A mindennapokban

Mélyizom-aktiválás (hasprés nélküli has behúzás).

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

HÁT ÉS TÖRZS · QUADRATUS LUMBORUM

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Quadratus lumborum**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a csípőcsont taraja, a fenék, a csípő oldala, az ágyék.

A gyakorlat

Állva emeld a karodat a fejed fölé, és dőlj lassan a másik oldalra, a csípőd maradjon a helyén. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Egy lábon állás, egyoldali táskahordás kerülése.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

HÁT ÉS TÖRZS · RECTUS ABDOMINIS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Rectus abdominis**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a hát közepe vízszintes sávban, a has, az ágyék.

A gyakorlat

Feküdj hasra, támaszkodj a könyökeidre, és engedd, hogy a hasad lazán nyúljon. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Túlzott hasizomgyakorlás után nyújtás.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

HÁT ÉS TÖRZS · OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Obliquus externus abdominis**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a has oldala, az ágyék, a mellkas alja.

A gyakorlat

Feküdj hanyatt, hajlítsd be a térdedet, és döntsd lassan mindkét térdedet az egyik oldalra, a vállad maradjon lent. 30 másodperc oldalanként.

A mindennapokban

Csavaró mozgások fokozatos terhelése.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

MEDENCE ÉS CSÍPŐ · GLUTEUS MAXIMUS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Gluteus maximus**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a fenék, a keresztcsont, a farokcsont környéke.

A gyakorlat

Feküdj hanyatt, húzd az egyik térdedet a másik vállad felé, két kézzel. 30 másodperc oldalanként, 3-szor.

A mindennapokban

Hosszú ülés megszakítása; kemény széken párna.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

MEDENCE ÉS CSÍPŐ · GLUTEUS MEDIUS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Gluteus medius**. Ez az izom gyakran ide sugároz: az ágyék alja, a keresztcsont, a csípő oldala, a fenék.

A gyakorlat

Állva tedd a fájós lábadat a másik mögé keresztben, és told ki a csípődet oldalra, amíg húzást érzel. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Egy lábon állás, lábkeresztezés kerülése; csípőtávolító erősítés.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

MEDENCE ÉS CSÍPŐ · GLUTEUS MINIMUS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Gluteus minimus**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a comb külső oldala, a lábszár külső oldala, a comb hátsó része, a boka.

A gyakorlat

Feküdj hanyatt, tedd a fájós lábad bokáját a másik térdedre, és húzd a másik combodat a mellkasod felé. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Hosszú autózás, ülés megszakítása.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

MEDENCE ÉS CSÍPŐ · PIRIFORMIS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Piriformis**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a fenék, a keresztcsont, a comb hátsó része, a csípőízület hátsó része.

A gyakorlat

Feküdj hanyatt, tedd a fájós lábad bokáját a másik térdedre, és húzd a másik combodat a mellkasod felé. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Ülés pénztárcán kerülése; lábkeresztezés kerülése.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

MEDENCE ÉS CSÍPŐ · ILIOPSOAS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Iliopsoas**. Ez az izom gyakran ide sugároz: az ágyék a gerinc mellett, a keresztcsont, a comb eleje.

A gyakorlat

Térdelj le az egyik térdedre, a másik lábad előtted. Told lassan előre a csípődet, amíg a hátsó combod elején húzást érzel. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Hosszú ülés után kitöréses nyújtás.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

MEDENCE ÉS CSÍPŐ · TENSOR FASCIAE LATAE (TFL)

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Tensor fasciae latae (TFL)**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a comb külső oldala, a térd külső oldala.

A gyakorlat

Állva tedd a fájós lábadat a másik mögé keresztben, és dőlj a másik oldalra. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Ülés közben a combok ne legyenek erősen hajlítva.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

MEDENCE ÉS CSÍPŐ · ADDUCTOR LONGUS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Adductor longus**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a lágyék, a comb belső oldala, a térd belső oldala.

A gyakorlat

Ülj le, érintsd össze a talpadat, és engedd lassan lefelé a térdeidet. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Hirtelen oldalirányú mozgások előtt bemelegítés.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

MEDENCE ÉS CSÍPŐ · ADDUCTOR MAGNUS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Adductor magnus**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a lágyék, a comb belső oldala, a medence mélye.

A gyakorlat

Ülj le terpeszben, és hajolj lassan előre egyenes háttal. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Fokozatos terhelés, bemelegítés.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

MEDENCE ÉS CSÍPŐ · PECTINEUS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Pectineus**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a lágyék mélyen, a comb belső-elülső része.

A gyakorlat

Ülj le, érintsd össze a talpadat, és engedd lassan a térdeidet lefelé. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Ülés közben a combok ne legyenek összeszorítva.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

MEDENCE ÉS CSÍPŐ · SARTORIUS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Sartorius**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a comb eleje (égő, szúró érzés), a térd belső oldala.

A gyakorlat

Térdelj le az egyik térdedre, és told lassan előre a csípődet. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Törökülés tartós kerülése.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ · RECTUS FEMORIS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Rectus femoris**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a térd eleje, a térdkalács körül.

A gyakorlat

Állva kapaszkodj meg, fogd meg a bokádat, és húzd a sarkadat a feneked felé, a térdeid egymás mellett. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Lépcsőzés, guggolás fokozatos terhelése.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ · VASTUS MEDIALIS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Vastus medialis**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a térd belső oldala, a térd eleje.

A gyakorlat

Ülj egy székre, nyújtsd ki lassan a térdedet, tartsd 5 másodpercig, majd engedd le. 10-szer lábanként.

A mindennapokban

Erősítés: ülve térdnyújtás tartással.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ · VASTUS LATERALIS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Vastus lateralis**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a comb külső oldala, a térd külső oldala, a térdkalács mögött.

A gyakorlat

Állva fogd meg a bokádat, és húzd a sarkadat a feneked felé. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Oldalt fekvés a fájós oldalon kerülendő.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ · BICEPS FEMORIS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Biceps femoris**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a térdhajlat, a comb hátsó része.

A gyakorlat

Ülj egy szék szélére, nyújtsd ki az egyik lábadat, a sarkad a földön, és hajolj előre egyenes háttal. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Hosszú ülés közben a szék éle ne nyomja a combot.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ · SEMITENDINOSUS / SEMIMEMBRANOSUS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Semitendinosus / semimembranosus**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a fenék alsó része, a comb hátsó része, a térdhajlat belső oldala.

A gyakorlat

Feküdj hanyatt, tegyél egy törölközőt a talpadra, és húzd fel lassan a nyújtott lábadat, amíg a combod hátulján húzást érzel. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Bemelegítés futás előtt.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ · GASTROCNEMIUS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Gastrocnemius**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a lábboltozat, a vádli, a térdhajlat.

A gyakorlat

Állj a fal elé, tedd a fájós lábadat hátra nyújtott térddel, a sarkad a földön, és dőlj a falnak. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Éjszakai görcsnél esti nyújtás; elegendő folyadék.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ · SOLEUS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Soleus**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a sarok, a vádli, a keresztcsont (ritkán).

A gyakorlat

Állj a fal elé, a fájós lábad hátul, hajlítsd be kicsit a térdedet, a sarkad maradjon a földön. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Magas sarkú cipő kerülése.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ · TIBIALIS ANTERIOR

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Tibialis anterior**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a boka eleje, a nagylábujj.

A gyakorlat

Ülve tedd a lábfejedet a feneked alá úgy, hogy a lábfejed teteje a földön legyen. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Fokozatos futásterhelés; kemény talajon kevesebb futás.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ · PERONEUS (FIBULARIS) LONGUS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Peroneus (fibularis) longus**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a külboka, a lábfej külső oldala.

A gyakorlat

Állj egy lábon 30 másodpercig, kapaszkodj, ha kell. Naponta 3-szor lábanként.

A mindennapokban

Bokastabilizáló gyakorlatok egy lábon állva.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ · TIBIALIS POSTERIOR

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Tibialis posterior**. Ez az izom gyakran ide sugároz: az Achilles-ín, a sarok, a talp.

A gyakorlat

Ülve tegyél egy törölközőt a talpad alá, és a lábujjaiddal húzd magad felé apránként. 1 perc.

A mindennapokban

Megfelelő boltozattámasz; lúdtalp esetén szakember.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ · EXTENSOR DIGITORUM LONGUS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Extensor digitorum longus**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a lábfej háta, a középső lábujjak.

A gyakorlat

Ülve hajlítsd lefelé a lábujjaidat és a lábfejedet, amíg a lábfejed tetején húzást érzel. 30 másodperc, 3-szor.

A mindennapokban

Szűk cipő kerülése.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ · FLEXOR DIGITORUM BREVIS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Flexor digitorum brevis**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a talp közepe, a lábujjtövek.

A gyakorlat

Ülve gurítsd a talpad alatt egy teniszlabdát lassan előre-hátra 2 percig. Naponta egyszer.

A mindennapokban

Megfelelő cipő; talpmasszázs labdával.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ · ABDUCTOR HALLUCIS

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Abductor hallucis**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a sarok belső oldala, a lábboltozat belső széle.

A gyakorlat

Ülve próbáld a nagylábujjadat a többitől eltávolítani, tartsd 5 másodpercig. 10-szer.

A mindennapokban

Széles orrú cipő; nagylábujj-erősítés.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

Otthoni gyakorlat

COMB, LÁBSZÁR ÉS LÁBFEJ · QUADRATUS PLANTAE

Miért kaptad ezt a lapot?

A fájdalmad egy része ebből az izomból indulhat: **Quadratus plantae**. Ez az izom gyakran ide sugároz: a sarok talpi felszíne.

A gyakorlat

Ülve gurítsd a talpad alatt egy fagyasztott vizes palackot 2 percig, főleg a sarok előtt.

A mindennapokban

Talpmasszázs labdával, kényelmes cipő.

Pipáld ki, ha megcsináltad

	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. hét	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A terapeutád megjegyzése

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.