A PÁCIENS OTTHON IS FOLYTATJA™

# Ergonómiai tanácsok: iroda, telefon, alvás

A páciensnek: apró változtatások, amelyek csökkentik az izmok terhelését a mindennapokban.

# Tartalom

1 · Az íróasztalnál

2 · Telefon és tablet

3 · Alvás

4 · Emelés és cipelés

Következő lépés

1. RÉSZ

# Az íróasztalnál

Ha sok órát ülsz.

## Állítsd be

- [ ] A monitor felső széle szemmagasságban, karnyújtásnyira.
- [ ] A könyök kb. 90°-ban, a váll laza.
- [ ] A talpad teljesen a földön, a combod vízszintes.
- [ ] Óránként állj fel 1–2 percre.
- [ ] A billentyűzet és az egér közel, hogy ne nyújtózkodj.

2. RÉSZ

# Telefon és tablet

A fej előretolt tartása a nyakat terheli.

## Figyelj

- [ ] Emeld a telefont szemmagasságba, ne a fejed hajtsd le.
- [ ] Hívásnál használj fülhallgatót, ne szorítsd a telefont a váll és a fül közé.
- [ ] Óránként húzd hátra egyenesen az álladat 5-ször.

3. RÉSZ

# Alvás

Az éjszakai testhelyzet is számít.

## Próbáld ki

- [ ] Párna, amely a nyakat egyenesben tartja (nem túl magas).
- [ ] Oldalt fekve párna a térdek közé.
- [ ] Ne aludj hason elfordított fejjel.
- [ ] Ha a vállad fáj, ne aludj azon az oldalon; a kar alá tegyél párnát.

4. RÉSZ

# Emelés és cipelés

A derék és a váll védelmében.

## Szabályok

- [ ] Emelj térdből, a teher közel a testedhez.
- [ ] Ne fordulj el teherrel a kezedben.
- [ ] Váltogasd a táskát a két váll között, vagy használj hátizsákot.

**Fontos**

Ezt a lapot a terapeutád adta. Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Ha a fájdalom erősödik, zsibbadás vagy gyengeség jelentkezik, hagyd abba, és szólj a terapeutádnak vagy az orvosodnak.

# Következő lépés

**Ma:** állítsd be a monitorodat szemmagasságba, és tegyél egy emlékeztetőt a telefonodba óránkénti felállásra.