TETİK NOKTA ATLASI

100+ yansıyan ağrı görsel kartı



Baş • Omuz • Sırt • Pelvis • Alt ekstremite

BAŞLAMADAN ÖNCE

ATLAS NASIL KULLANILIR

YAPI

Beş vücut bölgesine göre düzenlenmiş 102 kart. Her kart tek bir kası gösterir: fonksiyon, orijin, insersiyo, innervasyon, tetik noktanın yeri, yansıyan ağrı paterni, palpasyon yöntemi ve eşlik eden belirtiler.

HIZLI ARAMA

Alfabetik klinik dizini, yan paneldeki PDF yer imlerini (her kasa tek tıkla ulaşılır) veya belirti aramasını kullanın: ağrının nerede ortaya çıktığını seçin ve hangi kasların söz konusu olduğunu görün.

İŞARETLER

Siyah X'li beyaz daire: tetik nokta. Yoğun kırmızı: ana ağrı bölgesi. Açık kırmızı noktalama: yayılım bölgesi (spillover).

BASKI

A4 format, 300 DPI için optimize edilmiştir. Yazdırırken «gerçek boyut» ayarını seçin.

ÖNEMLİ

Atlas öğrenme ve başvuru amacıyla hazırlanmıştır. Tıbbi tanının yerini tutmaz. Göğüs, karın veya nörolojik belirtilerde her zaman önce tıbbi nedenleri dışlayın.

İÇİNDEKİLER

VÜCUT BÖLGELERİNE GÖRE

BAŞ, YÜZ VE BOYUN

1. Trapezius – üst lifler · 2. Sternocleidomastoideus (SCM) · 3. Masseter (çiğneme kası) · 4. Temporalis (şakak kası) · 5. Pterygoideus lateralis · 6. Pterygoideus medialis · 7. Splenius capitis · 8. Splenius cervicis · 9. Suboksipital kaslar · 10. Semispinalis capitis · 11. Levator scapulae (kürek kemiği kaldırıcı kas) · 12. Skalen kaslar · 13. Digastricus · 14. Occipitofrontalis (oksipitofrontal kas) · 15. Zygomaticus major · 16. Orbicularis oculi · 17. Platysma · 18. Longus colli

OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

19. Trapezius – orta lifler · 20. Trapezius – alt lifler · 21. Supraspinatus · 22. Infraspinatus · 23. Teres minor · 24. Teres major · 25. Subscapularis · 26. Deltoideus · 27. Latissimus dorsi · 28. Rhomboid kaslar · 29. Pectoralis major (büyük göğüs kası) · 30. Pectoralis minor (küçük göğüs kası) · 31. Serratus anterior · 32. Subclavius · 33. Coracobrachialis · 34. Biceps brachii · 35. Brachialis · 36. Triceps brachii · 37. Anconeus · 38. Supinator · 39. Brachioradialis · 40. Extensor carpi radialis · 41. Extensor digitorum · 42. Flexor carpi radialis ve ulnaris · 43. Pronator teres · 44. Palmaris longus · 45. Adductor pollicis · 46. Opponens pollicis · 47. Elin interosseöz kasları

SIRT, OMURGA VE GÖVDE

48. Serratus posterior superior · 49. Serratus posterior inferior · 50. Iliocostalis thoracis · 51. Iliocostalis lumborum · 52. Longissimus thoracis · 53. Multifidus · 54. Rotatores ve interspinales · 55. Quadratus lumborum · 56. Rectus abdominis (düz karın kası) · 57. Obliquus externus abdominis · 58. İnterkostal kaslar · 59. Diyafram · 60. Sternalis

PELVİS, KALÇA VE GLUTEAL BÖLGE

61. Gluteus maximus · 62. Gluteus medius · 63. Gluteus minimus · 64. Piriformis · 65. Derin rotatorlar (gemelli ve obturator internus) · 66. Quadratus femoris · 67. Tensor fasciae latae · 68. Iliopsoas · 69. Pectineus · 70. Adductor longus ve brevis · 71. Adductor magnus · 72. Gracilis · 73. Sartorius (terzi kası) · 74. Pelvik taban kasları

UYLUK, BACAK VE AYAK

75. Rectus femoris · 76. Vastus medialis · 77. Vastus lateralis · 78. Vastus intermedius · 79. Biceps femoris · 80. Semitendinosus ve semimembranosus · 81. Popliteus · 82. Gastrocnemius (baldır kası) · 83. Soleus · 84. Plantaris · 85. Tibialis anterior · 86. Tibialis posterior · 87. Peroneus longus · 88. Peroneus brevis · 89. Peroneus tertius · 90. Extensor digitorum longus · 91. Extensor hallucis longus · 92. Flexor digitorum longus · 93. Flexor hallucis longus · 94. Extensor digitorum brevis · 95. Abductor hallucis · 96. Flexor digitorum brevis · 97. Quadratus plantae · 98. Abductor digiti minimi (ayak) · 99. Ayağın interosseöz kasları · 100. Adductor hallucis · 101. Extensor hallucis brevis · 102. Flexor hallucis brevis

ALFABETİK DİZİN

98	Abductor digiti minimi (ayak)	Uyluk
95	Abductor hallucis	Uyluk
100	Adductor hallucis	Uyluk
70	Adductor longus ve brevis	Pelvis
71	Adductor magnus	Pelvis
45	Adductor pollicis	Omuz
37	Anconeus	Omuz
99	Ayağın interosseöz kasları	Uyluk
34	Biceps brachii	Omuz
79	Biceps femoris	Uyluk
35	Brachialis	Omuz
39	Brachioradialis	Omuz
33	Coracobrachialis	Omuz
26	Deltoideus	Omuz
65	Derin rotatorlar (gemelli ve obturator internus)	Pelvis
13	Digastricus	Baş
59	Diyafram	Sırt
47	Elin interosseöz kasları	Omuz
40	Extensor carpi radialis	Omuz
41	Extensor digitorum	Omuz
94	Extensor digitorum brevis	Uyluk
90	Extensor digitorum longus	Uyluk
101	Extensor hallucis brevis	Uyluk
91	Extensor hallucis longus	Uyluk
42	Flexor carpi radialis ve ulnaris	Omuz
96	Flexor digitorum brevis	Uyluk
92	Flexor digitorum longus	Uyluk
102	Flexor hallucis brevis	Uyluk
93	Flexor hallucis longus	Uyluk
82	Gastrocnemius (baldır kası)	Uyluk
61	Gluteus maximus	Pelvis
62	Gluteus medius	Pelvis
63	Gluteus minimus	Pelvis
72	Gracilis	Pelvis
51	Iliocostalis lumborum	Sırt
50	Iliocostalis thoracis	Sırt
68	Iliopsoas	Pelvis
22	Infraspinatus	Omuz
58	İnterkostal kaslar	Sırt
27	Latissimus dorsi	Omuz
11	Levator scapulae (kürek kemiği kaldırıcı kas)	Baş
52	Longissimus thoracis	Sırt
18	Longus colli	Baş
3	Masseter (çiğneme kası)	Baş
53	Multifidus	Sırt
57	Obliquus externus abdominis	Sırt
14	Occipitofrontalis (oksipitofrontal kas)	Baş
46	Opponens pollicis	Omuz
16	Orbicularis oculi	Baş
44	Palmaris longus	Omuz
69	Pectineus	Pelvis
29	Pectoralis major (büyük göğüs kası)	Omuz
30	Pectoralis minor (küçük göğüs kası)	Omuz
74	Pelvik taban kasları	Pelvis
88	Peroneus brevis	Uyluk
87	Peroneus longus	Uyluk

ALFABETİK DİZİN (DEVAM)

89	Peroneus tertius	Uyluk
64	Piriformis	Pelvis
84	Plantaris	Uyluk
17	Platysma	Baş
81	Popliteus	Uyluk
43	Pronator teres	Omuz
5	Pterygoideus lateralis	Baş
6	Pterygoideus medialis	Baş
66	Quadratus femoris	Pelvis
55	Quadratus lumborum	Sırt
97	Quadratus plantae	Uyluk
56	Rectus abdominis (düz karın kası)	Sırt
75	Rectus femoris	Uyluk
28	Rhomboid kaslar	Omuz
54	Rotatores ve interspinales	Sırt
73	Sartorius (terzi kası)	Pelvis
10	Semispinalis capitis	Baş
80	Semitendinosus ve semimembranosus	Uyluk
31	Serratus anterior	Omuz
49	Serratus posterior inferior	Sırt
48	Serratus posterior superior	Sırt
12	Skalen kaslar	Baş
83	Soleus	Uyluk
7	Splenius capitis	Baş
8	Splenius cervicis	Baş
60	Sternalis	Sırt
2	Sternocleidomastoideus (SCM)	Baş
32	Subclavius	Omuz
9	Suboksipital kaslar	Baş
25	Subscapularis	Omuz
38	Supinator	Omuz
21	Supraspinatus	Omuz
4	Temporalis (şakak kası)	Baş
67	Tensor fasciae latae	Pelvis
24	Teres major	Omuz
23	Teres minor	Omuz
85	Tibialis anterior	Uyluk
86	Tibialis posterior	Uyluk
20	Trapezius – alt lifler	Omuz
19	Trapezius – orta lifler	Omuz
1	Trapezius – üst lifler	Baş
36	Triceps brachii	Omuz
78	Vastus intermedius	Uyluk
77	Vastus lateralis	Uyluk
76	Vastus medialis	Uyluk
15	Zygomaticus major	Baş

BELİRTİ ARAMASI

NERENİZ AĞRIYOR?

Ağrının ortaya çıktığı yeri bulun: listelenen kaslar tetik noktaların en sık kaynağıdır.

Şakaklarda baş ağrısı
Trapezius – üst lifler (1), Temporalis (şakak kası) (4), Sternocleidomastoideus (SCM) (2), Suboksipital kaslar (9), Semispinalis capitis (10)

Alın ve göz çevresinde ağrı
Sternocleidomastoideus (SCM) (2), Occipitofrontalis (oksipitofrontal kas) (14), Orbicularis oculi (16), Zygomaticus major (15), Splenius cervicis (8)

Başın tepesinde ağrı
Splenius capitis (7), Sternocleidomastoideus (SCM) (2)

Çene ve diş ağrısı
Masseter (çiğneme kası) (3), Temporalis (şakak kası) (4), Pterygoideus lateralis (5), Pterygoideus medialis (6), Digastricus (13)

Boyun sertliği
Levator scapulae (kürek kemiği kaldırıcı kas) (11), Trapezius – üst lifler (1), Splenius capitis (7), Semispinalis capitis (10), Skalen kaslar (12)

Baş dönmesi
Sternocleidomastoideus (SCM) (2), Suboksipital kaslar (9)

Boğaz ağrısı ve yutkunurken ağrı
Pterygoideus medialis (6), Digastricus (13), Longus colli (18)

Kürek kemikleri arasında ağrı
Rhomboid kaslar (28), Trapezius – orta lifler (19), Skalen kaslar (12), Serratus posterior superior (48), Levator scapulae (kürek kemiği kaldırıcı kas) (11)

Omzun önünde ağrı
Infraspinatus (22), Biceps brachii (34), Pectoralis major (büyük göğüs kası) (29), Pectoralis minor (küçük göğüs kası) (30), Deltoideus (26), Coracobrachialis (33)

Omzun arkasında ağrı
Teres minor (23), Teres major (24), Subscapularis (25), Triceps brachii (36), Deltoideus (26), Latissimus dorsi (27)

Kolu kaldırırken ağrı
Supraspinatus (21), Infraspinatus (22), Deltoideus (26), Subscapularis (25)

Dirseğin dış yanında ağrı (tenisçi dirseği)
Supinator (38), Extensor carpi radialis (40), Brachioradialis (39), Triceps brachii (36), Anconeus (37)

Dirseğin iç yanında ağrı (golfçü dirseği)
Flexor carpi radialis ve ulnaris (42), Pronator teres (43), Triceps brachii (36), Pectoralis major (büyük göğüs kası) (29)

El bileği ve el ağrısı
Extensor digitorum (41), Flexor carpi radialis ve ulnaris (42), Subscapularis (25), Skalen kaslar (12), Pronator teres (43)

Başparmak ağrısı
Brachialis (35), Adductor pollicis (45), Opponens pollicis (46), Supinator (38), Skalen kaslar (12)

Elde uyuşma
Skalen kaslar (12), Pectoralis minor (küçük göğüs kası) (30), Pronator teres (43), Subclavius (32), Coracobrachialis (33)

BELİRTİ ARAMASI

NERENİZ AĞRIYOR? (DEVAM)

Ağrının ortaya çıktığı yeri bulun: listelenen kaslar tetik noktaların en sık kaynağıdır.

Göğüs ağrısı (tıbbi nedenler dışlandıktan sonra)
Pectoralis major (büyük göğüs kası) (29), Pectoralis minor (küçük göğüs kası) (30), Sternalis (60), Skalen kaslar (12), İnterkostal kaslar (58)

Karın ağrısı (tıbbi nedenler dışlandıktan sonra)
Rectus abdominis (düz karın kası) (56), Obliquus externus abdominis (57), Iliocostalis thoracis (50)

Bel ağrısı
Quadratus lumborum (55), Iliopsoas (68), Iliocostalis lumborum (51), Longissimus thoracis (52), Multifidus (53), Gluteus medius (62)

Kalça (gluteal) ağrısı
Gluteus maximus (61), Gluteus medius (62), Piriformis (64), Quadratus lumborum (55), Longissimus thoracis (52)

Siyatik benzeri ağrı
Gluteus minimus (63), Piriformis (64), Derin rotatorlar (gemelli ve obturator internus) (65), Semitendinosus ve semimembranosus (80), Biceps femoris (79)

Kasık ağrısı
Iliopsoas (68), Pectineus (69), Adductor longus ve brevis (70), Adductor magnus (71), Obliquus externus abdominis (57)

Kalçanın dış yanında ağrı
Gluteus medius (62), Gluteus minimus (63), Tensor fasciae latae (67), Vastus lateralis (77), Quadratus lumborum (55)

Dizin önünde ağrı
Rectus femoris (75), Vastus medialis (76), Vastus lateralis (77), Vastus intermedius (78), Adductor longus ve brevis (70)

Dizin arkasında ağrı
Popliteus (81), Gastrocnemius (baldır kası) (82), Biceps femoris (79), Plantaris (84), Semitendinosus ve semimembranosus (80)

Baldır ağrısı ve krampları
Gastrocnemius (baldır kası) (82), Soleus (83), Tibialis posterior (86), Flexor digitorum longus (92)

Ayak bileği ağrısı
Peroneus longus (87), Peroneus brevis (88), Peroneus tertius (89), Tibialis anterior (85)

Topuk ağrısı
Soleus (83), Quadratus plantae (97), Abductor hallucis (95), Tibialis posterior (86)

Ayak ağrısı
Flexor digitorum brevis (96), Adductor hallucis (100), Tibialis posterior (86), Gastrocnemius (baldır kası) (82), Flexor digitorum longus (92)

Ayak başparmağı ağrısı
Tibialis anterior (85), Extensor hallucis longus (91), Flexor hallucis longus (93), Flexor hallucis brevis (102)

VÜCUT BÖLGESİ

BAŞ, YÜZ VE BOYUN

Kartlar 1–18 · 18 kas

KART 01 · BAŞ, YÜZ VE BOYUN

TRAPEZIUS – ÜST LİFLER

Musculus trapezius, pars descendens

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Skapulanın elevasyonu ve yukarı rotasyonu
- Baş ve boynun aynı tarafa lateral fleksiyonu
- Başın karşı tarafa rotasyonu
- Omuzların kaldırılması (omuz silkme)

ORİJİN

Linea nuchae superior, protuberantia occipitalis externa, ligamentum nuchae (C1–C6).

İNSERSİYO

Klavikulanın lateral üçte biri (clavicula, pars acromialis).

İNNERVASYON

N. accessorius (XI. kranial sinir); C3–C4 proprioseptif lifleri.

TETİK NOKTA

Kasın üst kenarında, boyun ile omuz arasındaki açıda, boyun ile akromiyon arasındaki mesafenin ortasında; pens tutuşla kolayca palpe edilir.

YANSIYAN AĞRI

- Boynun arka-yan tarafı
- Kulak arkası (mastoid çıkıntı)
- Şakak (temporal baş ağrısı)
- Bazen mandibula açısı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Oturur veya sırtüstü pozisyonda, baş hafifçe aynı tarafa eğik
- Üst kenar boyunca pens tutuş
- Gergin bandı bulmak için dokuyu parmaklar arasında yuvarlayın
- Baskı ağrıyı şakağa doğru yeniden oluşturur

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Gerilim tipi baş ağrısı
- Boyun sertliği, kısıtlı lateral fleksiyon
- Uzun süre oturma veya telefon konuşmalarından sonra ağrı
- Stres altında omuzların kalkması

KLİNİK İPUCU Çalışma ortamını, çanta taşıma alışkanlığını ve solunum paternini kontrol edin: üst trapezius çoğunlukla kötü ergonomi nedeniyle aşırı yüklenir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 02 · BAŞ, YÜZ VE BOYUN

STERNOCLEIDOMASTOIDEUS (SCM)

Musculus sternocleidomastoideus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Tek taraflı: başın aynı tarafa lateral fleksiyonu ve karşı tarafa rotasyonu
- Çift taraflı: boyun fleksiyonu
- Yardımcı solunum kası (göğüs kafesini kaldırır)

ORİJİN

Sternal baş: manubrium sterninin ön yüzü. Klaviküler baş: klavikulanın medial üçte biri.

İNSERSİYO

Processus mastoideus ve linea nuchae superiorun lateral yarısı.

İNNERVASYON

N. accessorius (XI. kranial sinir); C2–C3 duyusal lifleri.

TETİK NOKTA

Sternal ve klaviküler başın tüm uzunluğu boyunca; baş hafifçe aynı tarafa dönükken pens tutuşla muayene edin.

YANSIYAN AĞRI

- Alın ve göz çevresi (orbital bölge)
- Yanak ve kulak, kulak arkası
- Başın tepesi ve oksiput
- Sternumun üst kısmı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, gevşeme için baş aynı tarafa eğik
- Her başı ayrı ayrı pens tutuşla kavrayın
- Klavikuladan mastoide doğru ilerleyin
- Karotis arteri yakınında derin baskıdan kaçının

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Baş dönmesi, denge bozukluğu
- Gözde sulanma, bulanık görme
- Frontal veya orbital baş ağrısı
- Aynı tarafta kulakta uğultu hissi

KLİNİK İPUCU Whiplash tipi boyun travmasından sonra SCM sıklıkla etkilenir. Üst trapezius ile birlikte muayene edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 03 · BAŞ, YÜZ VE BOYUN

MASSETER (ÇİĞNEME KASI)

Musculus masseter

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



◯ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ağzın kapanması (çiğneme, ısırma)
- Mandibulanın öne itilmesine yardım eder

ORİJİN

Arcus zygomaticus ve elmacık kemiği (os zygomaticum).

İNSERSİYO

Mandibula açısı ve ramus mandibulaenin dış yüzü.

İNNERVASYON

N. massetericus (n. mandibularis, V/3).

TETİK NOKTA

Yüzeyel tabakada arcus zygomaticusun altında ve mandibula açısının üstünde; derin tabakada temporomandibular eklemin önünde.

YANSIYAN AĞRI

- Üst ve alt azı dişleri
- Mandibula ve yanak
- Kaşın üstü
- Kulağın derininde (temporomandibular eklem bölgesi)

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Oturur pozisyonda, ağız hafif açık
- Pens tutuş: bir parmak ağız içinde, diğeri dışarıda
- Hastadan dişlerini sıkmasını isteyin: gergin bant belirginleşir

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Ağız açıklığında kısıtlılık
- Görünür dişsel neden olmadan diş hassasiyeti
- Diş gıcırdatma (bruksizm)

KLİNİK İPUCU Ağız açıklığını ölçün (normali yaklaşık 3 parmaktır). Bruksizmde gece plağını ve stres yönetimini düşünün.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

TEMPORALIS (ŞAKAK KASI)

Musculus temporalis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ağzın kapanması
- Mandibulanın geriye çekilmesi (arka lifler)

ORİJİN

Fossa temporalis ve fascia temporalis.

İNSERSİYO

Mandibulanın processus coronoideusu.

İNNERVASYON

Nn. temporales profundi (n. mandibularis, V/3).

TETİK NOKTA

Arcus zygomaticusun üstünde dört bölgede: ön, orta ve iki arka lif grubu; çiğneme sırasında kolayca palpe edilir.

YANSIYAN AĞRI

- Şakak ve kaş
- Başın yanında parmak şeklinde yayılım
- Üst dişler
- Bazen göz arkası

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Oturur pozisyonda, dişler hafifçe sıkılı
- Arcus zygomaticusun üstünde şakakta düz palpasyon
- Liflere dik yönde hassas nodüller arayın

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Şakak bölgesinde baş ağrısı
- Sıcak ve soğuğa karşı diş hassasiyeti
- Çiğnerken çenede yorgunluk

KLİNİK İPUCU Temporalis ve masseter çoğu zaman birlikte etkilenir: ikisini de tedavi edin ve gece diş gıcırdatmayı sorun.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 05 · BAŞ, YÜZ VE BOYUN

PTERYGOIDEUS LATERALIS

Musculus pterygoideus lateralis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ağzın açılması ve mandibulanın öne itilmesi
- Yana öğütme hareketi

ORİJİN

Sfenoid kemiğin büyük kanadı ve processus pterygoideusun lateral laminası.

İNSERSİYO

Temporomandibular eklem diski ve processus condylarisin boynu.

İNNERVASYON

N. pterygoideus lateralis (V/3).

TETİK NOKTA

Arcus zygomaticusun altında derinde; ağız içinden üst azı dişlerinin arkasında, kafaya doğru palpe edilir.

YANSIYAN AĞRI

- Temporomandibular eklemin derininde
- Maksiller sinüs üzerinde yanak
- Bazen kulağın önü

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Eldivenle ağız içi palpasyon, üst azı dişlerinin arkasında
- Ağız hafif açık
- Dikkatli, yavaş baskı

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Temporomandibular eklemde klik sesi
- Isırma hissinde değişiklik
- Çiğnerken ağrı

KLİNİK İPUCU Temporomandibular eklemdeki klik seslerinin sık bir nedenidir. Derin kası yalnızca nazikçe tedavi edin; ısırma değiştiyse bir diş hekimine danışın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 06 · BAŞ, YÜZ VE BOYUN

PTERYGOIDEUS MEDIALIS

Musculus pterygoideus medialis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ağzın kapanması
- Mandibulanın öne itilmesi ve yana hareketi

ORİJİN

Fossa pterygoidea (processus pterygoideusun medial laminası).

İNSERSİYO

Mandibula açısının iç yüzü.

İNNERVASYON

N. pterygoideus medialis (V/3).

TETİK NOKTA

Mandibula açısının iç tarafında; dışarıdan açının altından yukarı doğru baskıyla palpe edilir.

YANSIYAN AĞRI

- Boğaz ve dil kökü
- Kulağın altı ve önü (temporomandibular eklem)
- Farenksin arka duvarı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Mandibula açısının iç tarafında yukarı doğru palpe edin
- Baş hafifçe aynı tarafa eğik
- Yutkunurken ağrı artabilir

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Yutkunurken ağrı
- Enfeksiyon olmadan boğaz ağrısı hissi
- Ağız açıklığında kısıtlılık

KLİNİK İPUCU Yutkunmak acıtıyor ama boğaz kızarık değilse pterygoideus medialisi düşünün.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 07 · BAŞ, YÜZ VE BOYUN

SPLENIUS CAPITIS

Musculus splenius capitis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Baş ve boynun ekstansiyonu
- Başın aynı tarafa rotasyonu ve lateral fleksiyonu

ORİJİN

Ligamentum nuchaenin alt yarısı, C7–T3 processus spinosusları.

İNSERSİYO

Processus mastoideus ve linea nuchae superiorun lateral üçte biri.

İNNERVASYON

Servikal spinal sinirlerin arka dalları (C3–C5).

TETİK NOKTA

Trapezius ile SCM arasında, processus mastoideusun yaklaşık 2–3 cm altında.

YANSIYAN AĞRI

- Aynı taraftaki başın tepesi (verteks)
- Bazen oksiput

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, baş hafifçe dönük
- Mastoid çıkıntının altında düz palpasyon
- Dirence karşı baş rotasyonu kası belirginleştirir

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Başın tepesinde ağrı
- Rotasyonda boyun sertliği
- Kötü pozisyonda uyuduktan sonra ağrı

KLİNİK İPUCU Yastık yüksekliğini ve uyku pozisyonunu sorun: yüzüstü uyumak splenius kaslarını sıklıkla aşırı yükler.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 08 · BAŞ, YÜZ VE BOYUN

SPLENIUS CERVICIS

Musculus splenius cervicis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Boyun ekstansiyonu
- Boynun aynı tarafa rotasyonu

ORİJİN

T3–T6 processus spinosusları.

İNSERSİYO

C1–C3 processus transversuslarının arka tüberkülleri.

İNNERVASYON

Servikal spinal sinirlerin arka dalları (C4–C6).

TETİK NOKTA

Boynun alt kısmında levator scapulae yanında, boyun ile omuz arasındaki açıda.

YANSIYAN AĞRI

- Gözün derininde arkada
- Oksiputa yayılan ağrı
- Boyun ile omuz arasındaki açı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü veya oturur pozisyonda
- C7 hizasında lateralde derin palpasyon
- Baş rotasyonu sırasında bandı gözlemleyin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Göz arkasında ağrı
- Bulanık görme hissi
- Boyun sertliği

KLİNİK İPUCU Göz arkasındaki ağrının oftalmolojik bir nedeni olmayabilir; tıbbi nedenleri dışlayın, ardından boyun kaslarını muayene edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 09 · BAŞ, YÜZ VE BOYUN

SUBOKSİPİTAL KASLAR

Mm. recti capitis posteriores et obliqui capitis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Başın hafif ekstansiyonu ve rotasyonu
- Baş pozisyonunun hassas ayarı (propriosepsiyon)

ORİJİN

Atlas ve axis.

İNSERSİYO

Oksipital kemik (linea nuchae inferior) ve atlasın processus transversusu.

İNNERVASYON

N. suboccipitalis (C1).

TETİK NOKTA

Kafatası tabanının hemen altında, oksipital kemik ile C2 arasında, derinde.

YANSIYAN AĞRI

- Oksiputtan şakağa uzanan bant şeklinde ağrı
- Göz arkası
- Bazen alına kadar

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, baş terapistin ellerinde
- Parmak uçları kafatası tabanının altına girer
- Baskıyı başın ağırlığı oluştursun

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Servikojenik baş ağrısı
- Ekran başında çalıştıktan sonra baş ağrısı
- Baş sallamada kısıtlılık

KLİNİK İPUCU Ana aşırı yükleyici etken öne kaymış baş postürüdür: monitör yüksekliğini ve gözlük tipini kontrol edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 10 · BAŞ, YÜZ VE BOYUN

SEMISPINALIS CAPITIS

Musculus semispinalis capitis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Baş ekstansiyonu
- Servikal lordozun korunması

ORİJİN

C4–T6 processus transversusları.

İNSERSİYO

Linea nuchae superior ile inferior arasındaki oksipital kemik.

İNNERVASYON

Servikal spinal sinirlerin arka dalları.

TETİK NOKTA

Üç seviyede: kafatası tabanının altında, boynun ortasında ve boynun alt kısmında, processus spinosusların yanında.

YANSIYAN AĞRI

- Şakak hizasında başın yanında bant
- Oksiput
- Boynun arka tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü, alın desteklenmiş
- Oksiputun altında orta hattan 1–2 cm uzakta düz palpasyon
- Seviye seviye aşağı doğru ilerleyin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Başın çevresinde ağrı
- Ekstansiyonda boyun ağrısı
- Oksiput bölgesinde uyuşma (n. occipitalis major)

KLİNİK İPUCU N. occipitalis major kasın içinden geçer: gergin bir semispinalis saçlı deride uyuşma ve yanmaya neden olabilir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 11 · BAŞ, YÜZ VE BOYUN

LEVATOR SCAPULAE (KÜREK KEMİĞİ KALDIRICI KAS)

Musculus levator scapulae

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Skapulanın elevasyonu
- Skapulanın aşağı rotasyonu
- Boynun aynı tarafa lateral fleksiyonu ve rotasyonu

ORİJİN

C1–C4 processus transversusları.

İNSERSİYO

Skapulanın üst açısı ve medial kenarın üst kısmı.

İNNERVASYON

N. dorsalis scapulae (C5) ve C3–C4.

TETİK NOKTA

Boyun ile omuz arasındaki açıda ve skapulanın üst açısının 1–2 cm üstünde.

YANSIYAN AĞRI

- Boyun ile omuz arasındaki açı
- Skapulanın medial kenarı boyunca
- Omzun arka tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Oturur pozisyonda, baş karşı tarafa dönük
- Trapeziusun altından skapulanın üst açısına doğru palpe edin
- Omuz elevasyonu kası belirginleştirir

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- «Tutulmuş boyun» (tortikolis)
- Başın aynı tarafa ağrılı rotasyonu
- Uzun telefon konuşmalarından sonra ağrı

KLİNİK İPUCU «Başımı çeviremiyorum» şikâyetinin klasik nedenidir. Telefonu omuzla tutmamasını önerin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 12 · BAŞ, YÜZ VE BOYUN

SKALEN KASLAR

Mm. scaleni anterior, medius et posterior

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Boynun lateral fleksiyonu
- Yardımcı solunum kasları (ilk iki kaburgayı kaldırır)

ORİJİN

C2–C7 processus transversusları.

İNSERSİYO

Birinci kaburga (anterior, medius) ve ikinci kaburga (posterior).

İNNERVASYON

Servikal spinal sinirlerin ön dalları (C3–C8).

TETİK NOKTA

Boynun yanında klavikulanın üstünde, SCM'nin arka kenarının arkasında.

YANSIYAN AĞRI

- Göğsün ön kısmı
- Kolun ön ve arka tarafı
- Ön kolun radial tarafı, başparmak ve işaret parmağı
- Skapulanın medial kenarı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, baş hafifçe karşı tarafa dönük
- SCM'nin arkasında klavikulanın üstünde palpe edin
- Dikkat: burada brakiyal pleksus geçer

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Elde uyuşma
- Karpal tünel sendromuna benzeyen ağrı
- Nefes alırken artan boyun gerginliği

KLİNİK İPUCU Skalenler «thoracic outlet» belirtilerini taklit edebilir. Solunum paternini değerlendirin: üst göğüs solunumu onları aşırı yükler.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 13 · BAŞ, YÜZ VE BOYUN

DIGASTRICUS

Musculus digastricus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ağzın açılması
- Yutkunurken hyoid kemiğin kaldırılması

ORİJİN

Arka karın: incisura mastoidea; ön karın: mandibulanın fossa digastricası.

İNSERSİYO

Hyoid kemiğe tutunan ara tendon.

İNNERVASYON

Arka karın: n. facialis (VII); ön karın: n. mylohyoideus (V/3).

TETİK NOKTA

Arka karında mandibula açısının arkasında, ön karında çenenin altında.

YANSIYAN AĞRI

- Alt kesici dişler ve çene
- SCM'nin ön kenarı boyunca boynun üst kısmı
- Kulağın altı ve arkası

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, baş hafifçe geride
- Çenenin altında ve mandibula açısının arkasında nazik palpasyon
- Yutkunurken kas gerilir

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Yutkunmada zorlanma hissi
- Alt dişlerde hassasiyet
- Boğazda yumru hissi

KLİNİK İPUCU Öne kaymış baş postürü ve ağızdan solunum onu aşırı yükler. Dilin istirahat pozisyonunu (damakta) kontrol edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

OCCIPITOFRONTALIS (OKSİPİTOFRONTAL KAS)

Musculus occipitofrontalis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Kaşların kaldırılması, alnın kırıştırılması
- Saçlı derinin hareketi

ORİJİN

Frontalis: kaş derisi; occipitalis: linea nuchae suprema.

İNSERSİYO

Galea aponeurotica.

İNNERVASYON

N. facialis (VII).

TETİK NOKTA

Frontal karında kaşın üstünde, oksipital karında oksiputun üst kısmında.

YANSIYAN AĞRI

- Alın
- Oksiput
- Gözün derinine de yayılabilir

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü
- Kaşın üstünde ve oksiputta düz palpasyon
- Hastadan kaşlarını kaldırmasını isteyin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Alın ağrısı
- Sırtüstü yatmayı engelleyen oksiput ağrısı
- Saçlı deride gerginlik hissi

KLİNİK İPUCU Alın kırıştırma stres veya zayıf görmenin işareti olabilir: gözlükleri ve ekran süresini sorun.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 15 · BAŞ, YÜZ VE BOYUN

ZYGOMATICUS MAJOR

Musculus zygomaticus major

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ağız köşesinin yukarı ve dışa çekilmesi (gülümseme)

ORİJİN

Elmacık kemiği.

İNSERSİYO

Ağız köşesi (modiolus).

İNNERVASYON

N. facialis (VII).

TETİK NOKTA

Ağız köşesi ile elmacık kemiği arasında kasın orta kısmında; ağız içinden ve dışarıdan pens tutuşla.

YANSIYAN AĞRI

- Burnun yanı
- Gözün medial köşesi
- Alnın ortası

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Pens tutuş: bir parmak ağız içinde, diğeri yanakta
- Ağız köşesinden elmacık kemiğine doğru ilerleyin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Yüz ağrısı
- Burun yanında ağrı
- Bazen sinüzite benzeyen his

KLİNİK İPUCU Sinüs sorunları dışlandıktan sonra yüzün orta kısmındaki ağrıda mimik kaslarını da düşünün.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 16 · BAŞ, YÜZ VE BOYUN

ORBICULARIS OCULI

Musculus orbicularis oculi

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Göz kapaklarının kapanması
- Gözlerin kısılması

ORİJİN

Orbitanın medial kenarı ve ligamentum palpebrale mediale.

İNSERSİYO

Göz kapağı derisi ve göz çevresindeki deri.

İNNERVASYON

N. facialis (VII).

TETİK NOKTA

Kaşın altında, üst göz kapağının üstünde; çok nazik pens tutuşla.

YANSIYAN AĞRI

- Burun sırtı ve yanı
- Üst dudak
- Göz çevresi

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Gözler kapalı, kaşın altında nazik pens tutuş
- Göz küresine asla bastırmayın

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Göz yorgunluğu
- Güçlü ışıkta gözleri kısma
- Göz çevresinde gerginlik

KLİNİK İPUCU Ekran başında çalışma, okuma ve güçlü ışık onu aşırı yükler: düzenli molalar ve uygun gözlük önerin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 17 · BAŞ, YÜZ VE BOYUN

PLATYSMA

Platysma

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

Tetik nokta (X) Ana ağrı bölgesi Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Alt dudak ve ağız köşesinin aşağı çekilmesi
- Boyun derisinin gerilmesi

ORİJİN

Göğsün üst kısmı (pektoral ve deltoid fasya).

İNSERSİYO

Mandibulanın alt kenarı ve yüzün alt kısmının derisi.

İNNERVASYON

N. facialis (VII), ramus colli.

TETİK NOKTA

Klavikulanın üstünde, SCM'nin üzerinde ince bir tabaka halinde; deriyle birlikte pens tutuşla.

YANSIYAN AĞRI

- Mandibulada batıcı ağrı
- Yüzün alt kısmı ve çene

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Deriyle birlikte pens tutuş
- Hastadan ağız köşelerini aşağı çekmesini isteyin: yassı kas gerilir

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Çenede batma
- Boynun ön tarafında gerginlik

KLİNİK İPUCU Sıklıkla SCM'deki noktalarla birlikte aktiftir; ince kasta germe ve deri mobilizasyonu yeterli olabilir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 18 · BAŞ, YÜZ VE BOYUN

LONGUS COLLI

Musculus longus colli

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Boyun fleksiyonu ve stabilizasyonu
- Servikal lordozun kontrolü

ORİJİN

C3–T3 omur gövdeleri ve processus transversusları.

İNSERSİYO

Atlasın ön tüberkülü ve C2–C6 omur gövdeleri.

İNNERVASYON

Servikal spinal sinirlerin ön dalları (C2–C6).

TETİK NOKTA

Trakeanın yanında derinde, SCM ile trakea arasında; yalnızca dikkatli derin palpasyonla.

YANSIYAN AĞRI

- Boğazın ön kısmı
- Yutkunurken ağrı
- Boynun ön tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, baş desteklenmiş
- SCM'yi yana itin ve trakeanın yanında dikkatle palpe edin
- Karotis nabzını hissedin ve ondan uzak durun

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Boğazda yumru hissi
- Whiplash tipi travmadan sonra boyunda instabilite hissi

KLİNİK İPUCU Whiplash tipi travmadan sonra çoğu zaman inhibe olur: aktivasyonda derin boyun fleksörü eğitimi (sırtüstü baş sallama) yardımcı olur.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

VÜCUT BÖLGESİ

OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

Kartlar 19–47 · 29 kas

KART 19 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

TRAPEZIUS – ORTA LİFLER

Musculus trapezius, pars transversa

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Skapulanın omurgaya doğru çekilmesi (retraksiyon)
- Skapulanın stabilizasyonu

ORİJİN

C7–T3 processus spinosusları.

İNSERSİYO

Akromiyon ve spina scapulaenin üst kenarı.

İNNERVASYON

N. accessorius (XI).

TETİK NOKTA

Skapulanın medial kenarı ile omurga arasında, spina scapulae hizasında.

YANSIYAN AĞRI

- Skapula ile omurga arası
- Akromiyon üzerinde yanma

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü, kollar vücudun yanında
- Liflere dik yönde düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Kürek kemikleri arasında yanıcı ağrı
- Oturarak çalışırken yorgunluk

KLİNİK İPUCU Çoğu zaman zayıflamış ve gerilmiştir (öne kaymış omuzlar): güçlendirme tedavi kadar önemlidir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 20 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

TRAPEZIUS – ALT LİFLER

Musculus trapezius, pars ascendens

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Skapulanın aşağı çekilmesi (depresyon)
- Skapulanın yukarı rotasyonu

ORİJİN

T4–T12 processus spinosusları.

İNSERSİYO

Spina scapulaenin medial ucu.

İNNERVASYON

N. accessorius (XI).

TETİK NOKTA

Skapulanın alt medial kısmında, liflerin spina scapulaeye uzandığı yerde.

YANSIYAN AĞRI

- Kafatası tabanının altında boynun üst kısmı
- Boynun arka tarafı
- Skapulanın üst kısmı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü
- Skapulanın alt açısının yanında pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Kaynağı sırtta olan boyun ağrısı
- Skapula çevresinde ağrı

KLİNİK İPUCU Boyun ağrısının kaynağı sırtta olabilir: boyun tedavisi yetmiyorsa alt trapeziusu muayene edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 21 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

SUPRASPINATUS

Musculus supraspinatus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Kol abdüksiyonunun başlangıç fazı
- Humerus başının glenoid içinde stabilizasyonu

ORİJİN

Fossa supraspinata.

İNSERSİYO

Tuberculum majusun üst kısmı.

İNNERVASYON

N. suprascapularis (C5–C6).

TETİK NOKTA

Fossa supraspinatada trapeziusun altında; medial ve lateral kısımda.

YANSIYAN AĞRI

- Omzun ortasında derinde (deltoid bölgesi)
- Kolun dış tarafı
- Dirseğin lateral kısmı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Oturur pozisyonda, kol vücudun yanında
- Trapeziusun içinden spina scapulaenin üstünde palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Kolu kaldırırken ağrı
- Gece omuzda künt ağrı

KLİNİK İPUCU Rotator manşet yırtığı tablosunu taklit edebilir. Infraspinatus ile birlikte muayene edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 22 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

INFRASPINATUS

Musculus infraspinatus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Kolun dış rotasyonu
- Humerus başının stabilizasyonu

ORİJİN

Fossa infraspinata.

İNSERSİYO

Tuberculum majusun orta kısmı.

İNNERVASYON

N. suprascapularis (C5–C6).

TETİK NOKTA

Spina scapulaenin altında, fossa infraspinatanın üst kısmında.

YANSIYAN AĞRI

- Omzun ön kısmında derinde
- Kolun ön ve dış tarafı
- Ön kolun ve elin radial tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü veya oturur pozisyonda
- Spina scapulaenin altında skapula üzerinde düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Ağrılı tarafa yatarak uyuyamama
- Arkaya uzanmada zorluk (ör. saç tarama)

KLİNİK İPUCU «Omzun önündeki ağrının» kaynağı çoğu zaman arkadadır: infraspinatusu her zaman muayene edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

TERES MINOR

Musculus teres minor

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



◯ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Kolun dış rotasyonu
- Humerus başının stabilizasyonu

ORİJİN

Skapulanın lateral kenarının üst üçte ikisi.

İNSERSİYO

Tuberculum majusun alt kısmı.

İNNERVASYON

N. axillaris (C5–C6).

TETİK NOKTA

Skapulanın lateral kenarında infraspinatusun altında.

YANSIYAN AĞRI

- Omzun arka kısmında derin, sınırlı ağrı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü, kol hafif abdüksiyonda
- Skapulanın lateral kenarı boyunca pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Omzun arkasında noktasal ağrı
- 4. ve 5. parmakta uyuşma (nadiren)

KLİNİK İPUCU Çoğu zaman ancak infraspinatus tedavisinden sonra ortaya çıkar.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 24 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

TERES MAJOR

Musculus teres major

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Kolun iç rotasyonu, addüksiyonu ve ekstansiyonu

ORİJİN

Skapulanın alt açısı.

İNSERSİYO

Crista tuberculi minoris humeri.

İNNERVASYON

N. subscapularis inferior (C5–C7).

TETİK NOKTA

Arka aksiller katlantıda, skapulanın alt açısının üstünde.

YANSIYAN AĞRI

- Omzun arka kısmı
- Kolun arka tarafı
- Bazen ön kolun dorsal tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, kol yukarıda
- Arka aksiller katlantıda pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Baş üstüne uzanırken ağrı
- Omuz sertliği

KLİNİK İPUCU Latissimus dorsi ile birlikte muayene edin: ikisi birlikte koltuk altının arka duvarını oluşturur.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 25 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

SUBSCAPULARIS

Musculus subscapularis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



◯ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Kolun iç rotasyonu
- Humerus başının ön stabilizasyonu

ORİJİN

Fossa subscapularis.

İNSERSİYO

Tuberculum minus humeri.

İNNERVASYON

Nn. subscapulares (C5–C6).

TETİK NOKTA

Koltuk altında, skapulanın ön yüzünde, lateral kenara yakın.

YANSIYAN AĞRI

- Omzun arka kısmı
- Skapula
- Kolun arka tarafı
- El bileği çevresinde bant şeklinde ağrı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, kol abdüksiyonda
- Koltuk altından skapulanın ön yüzüne doğru palpe edin
- Yavaş ve dikkatli

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- «Donuk omuz» tipi hareket kısıtlılığı
- Görünür nedeni olmayan el bileği ağrısı

KLİNİK İPUCU Donuk omzun (frozen shoulder) erken evresinde çoğu zaman kilit rol oynar.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 26 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

DELTOIDEUS

Musculus deltoideus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Kol abdüksiyonu (orta lifler)
- Fleksiyon (ön lifler)
- Ekstansiyon (arka lifler)

ORİJİN

Klavikulanın lateral üçte biri, akromiyon, spina scapulae.

İNSERSİYO

Tuberositas deltoidea humeri.

İNNERVASYON

N. axillaris (C5–C6).

TETİK NOKTA

Kolun üst üçte birinde ön, orta ve arka liflerde.

YANSIYAN AĞRI

- Omzun ön, yan veya arka kısmında lokal ağrı
- Kolun üst kısmı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Oturur pozisyonda
- Lifler üzerinde pens tutuş veya düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Kolu kaldırırken ağrı
- Omuzda güçsüzlük hissi

KLİNİK İPUCU Deltoid ağrısı lokaldir; daha uzağa yayılıyorsa nedeni rotator manşette arayın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 27 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

LATISSIMUS DORSI

Musculus latissimus dorsi

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Kolun iç rotasyonu, addüksiyonu ve ekstansiyonu
- Çekme hareketleri (barfiks)

ORİJİN

T7–L5 processus spinosusları, torakolomber fasya, crista iliaca, alt kaburgalar.

İNSERSİYO

Sulcus intertubercularis humeri.

İNNERVASYON

N. thoracodorsalis (C6–C8).

TETİK NOKTA

Arka aksiller katlantıda, pens tutuşla.

YANSIYAN AĞRI

- Skapulanın alt açısı çevresi
- Kolun arka-medial tarafı
- 4. ve 5. parmak

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, kol başın üstünde
- Arka aksiller katlantıda pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Skapulanın altında sürekli künt sırt ağrısı
- Baş üstüne uzanırken ağrı

KLİNİK İPUCU Yüzücülerde, kürekçilerde ve tırmanıcılarda sıktır. Hastanın «tam yerini gösteremediği» künt sırt ağrısında onu düşünün.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

RHOMBOID KASLAR

Mm. rhomboidei major et minor

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Skapulanın omurgaya doğru çekilmesi ve elevasyonu

ORİJİN

C7–T5 processus spinosusları.

İNSERSİYO

Skapulanın medial kenarı.

İNNERVASYON

N. dorsalis scapulae (C4–C5).

TETİK NOKTA

Trapeziusun altında skapulanın medial kenarı boyunca.

YANSIYAN AĞRI

- Skapulanın medial kenarı boyunca
- Yüzeyel, «sızlayan» ağrı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü, kol sarkık
- Trapeziusun içinden skapulanın medial kenarında palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Kürek kemikleri arasında ağrı
- Skapula hareketinde çıtırtı

KLİNİK İPUCU Çoğu zaman gergin göğüs kasları tarafından gerilirler: yalnızca arkada değil önde de çalışın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

PECTORALIS MAJOR (BÜYÜK GÖĞÜS KASI)

Musculus pectoralis major

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Kolun addüksiyonu ve iç rotasyonu
- Fleksiyon (klaviküler kısım)

ORİJİN

Klavikulanın medial yarısı, sternum, 1–6. kaburga kıkırdakları.

İNSERSİYO

Crista tuberculi majoris humeri.

İNNERVASYON

Nn. pectorales medialis et lateralis (C5–T1).

TETİK NOKTA

Klaviküler, sternal ve kostal kısımda; ön aksiller katlantıda pens tutuşla.

YANSIYAN AĞRI

- Omzun ön kısmı
- Göğsün ön kısmı
- Kolun iç tarafı, dirseğin medial tarafı
- 4. ve 5. parmak

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, kol hafif abdüksiyonda
- Ön aksiller katlantıda pens tutuş
- Sternumun yanında düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Kalp ağrısına benzeyen göğüs ağrısı
- Öne kaymış omuzlar
- Arkaya uzanırken ağrı

KLİNİK İPUCU Göğüs ağrısında kas kaynaklı olduğunu düşünmeden önce her zaman tıbbi (kardiyak) nedenleri dışlayın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 30 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

PECTORALIS MINOR (KÜÇÜK GÖĞÜS KASI)

Musculus pectoralis minor

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Skapulanın öne ve aşağı çekilmesi
- Yardımcı solunum kası

ORİJİN

3–5. kaburgalar.

İNSERSİYO

Processus coracoideus.

İNNERVASYON

N. pectoralis medialis (C8–T1).

TETİK NOKTA

Processus coracoideusun altında ve 3–5. kaburgaların üstünde, pectoralis majorun içinden.

YANSIYAN AĞRI

- Omzun ön kısmı
- Göğüs
- Kolun iç tarafı ve elin ulnar tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü
- Koltuk altı tarafından göğüs kasının altına, processus coracoideusa doğru palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Öne kaymış omuz
- Elde uyuşma (nörovasküler sıkışma)

KLİNİK İPUCU Gergin bir pectoralis minor brakiyal pleksusun geçişini daraltabilir: thoracic outlet belirtilerinde onu muayene edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 31 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

SERRATUS ANTERIOR

Musculus serratus anterior

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Skapulanın öne çekilmesi ve göğüs kafesine sabitlenmesi
- Skapulanın yukarı rotasyonu

ORİJİN

1–9. kaburgaların dış yüzü.

İNSERSİYO

Skapulanın medial kenarı (ön yüz).

İNNERVASYON

N. thoracicus longus (C5–C7).

TETİK NOKTA

Orta aksiller hatta 5–6. kaburga hizasında.

YANSIYAN AĞRI

- Göğüs kafesinin yanı
- Skapulanın alt açısı
- Kolun iç tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yan yatar pozisyonda, kol öne uzatılmış
- Aksiller hatta kaburgalar arasında palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Koşarken «yan ağrısı»
- Derin nefeste artan ağrı

KLİNİK İPUCU Zayıflığı kanatlaşan skapulaya neden olur; güçlendirmede şınav varyasyonları yardımcıdır.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 32 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

SUBCLAVIUS

Musculus subclavius

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Klavikulanın stabilizasyonu

ORİJİN

Birinci kaburga ve kıkırdağı.

İNSERSİYO

Klavikulanın alt yüzü.

İNNERVASYON

N. subclavius (C5–C6).

TETİK NOKTA

Klavikulanın altında orta üçte birde, pectoralis majorun içinden.

YANSIYAN AĞRI

- Kolun ön tarafı
- Ön kolun radial tarafı
- Başparmak ve işaret parmağı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü
- Klavikulanın altına yukarı doğru palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Parmaklarda uyuşma
- Omzun önünde ağrı

KLİNİK İPUCU Klavikulanın altından subklavyen ven geçer: uzun süreli güçlü baskı uygulamayın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 33 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

CORACOBRACHIALIS

Musculus coracobrachialis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Kolun fleksiyonu ve addüksiyonu

ORİJİN

Processus coracoideus.

İNSERSİYO

Humerusun medial yüzünün ortası.

İNNERVASYON

N. musculocutaneus (C6–C7).

TETİK NOKTA

Kolun iç tarafında koltuk altına yakın, bicepsin kısa başının arkasında.

YANSIYAN AĞRI

- Omzun ön kısmı
- Kol ve ön kolun arka tarafı
- El sırtı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, kol abdüksiyonda ve dış rotasyonda
- Koltuk altında humerusun yanında palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Kolu arkaya uzatırken ağrı

KLİNİK İPUCU İçinden n. musculocutaneus geçer: gerginliği ön kolun dış tarafında uyuşmaya neden olabilir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 34 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

BICEPS BRACHII

Musculus biceps brachii

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Dirsek fleksiyonu
- Ön kolun dış rotasyonu (supinasyon)

ORİJİN

Uzun baş: tuberculum supraglenoidale; kısa baş: processus coracoideus.

İNSERSİYO

Tuberositas radii ve aponeurosis bicipitalis.

İNNERVASYON

N. musculocutaneus (C5–C6).

TETİK NOKTA

Kasın distal üçte birinde, iki başta da.

YANSIYAN AĞRI

- Omzun ön kısmı
- Kolun ön tarafı
- Dirsek çukuru

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Oturur pozisyonda, dirsek hafif fleksiyonda
- Kas karnında pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Baş üstüne kaldırırken ağrı
- Dirsek fleksiyonunda güçsüzlük

KLİNİK İPUCU «Omzun önündeki ağrının» arkasında çoğu zaman tendon değil, bicepsteki bir tetik nokta vardır.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 35 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

BRACHIALIS

Musculus brachialis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Dirsek fleksiyonu (ana fleksör)

ORİJİN

Humerusun ön yüzünün distal yarısı.

İNSERSİYO

Tuberositas ulnae ve processus coronoideus.

İNNERVASYON

N. musculocutaneus (C5–C6), kısmen n. radialis.

TETİK NOKTA

Dirseğin birkaç santimetre üstünde, bicepsin altında lateralde.

YANSIYAN AĞRI

- Başparmak tabanı (dorsal taraf)
- Dirsek çukuru
- Kolun ön tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Oturur pozisyonda, dirsek 90° fleksiyonda
- Bicepsi yana itin ve yanında derin palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Başparmak ağrısı
- Ağırlık taşırken ağrı

KLİNİK İPUCU Başparmak ağrısında yalnızca elde aramayın: neden brachialis de olabilir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 36 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

TRICEPS BRACHII

Musculus triceps brachii

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Dirsek ekstansiyonu
- Kol ekstansiyonu (uzun baş)

ORİJİN

Uzun baş: tuberculum infraglenoidale; lateral ve medial baş: humerusun arka yüzü.

İNSERSİYO

Olekranon.

İNNERVASYON

N. radialis (C6–C8).

TETİK NOKTA

Uzun başta, lateral başta ve dirseğin üstünde.

YANSIYAN AĞRI

- Omzun arka kısmı
- Kolun arka tarafı
- Dirsek (epikondiller)
- Ön kolun dorsal tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü veya oturur pozisyonda, kol sarkık
- Uzun başta pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- «Tenisçi dirseğine» benzeyen dirsek ağrısı
- Kolu düzeltirken ağrı

KLİNİK İPUCU Lateral dirsek ağrısının kaynağı her zaman ön kol değildir: tricepsin lateral başını da muayene edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

ANCONEUS

Musculus anconeus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Dirsek ekstansiyonuna yardım eder
- Dirsek ekleminin stabilizasyonu

ORİJİN

Humerusun lateral epikondili.

İNSERSİYO

Olekranonun lateral yüzü ve ulnanın arka yüzü.

İNNERVASYON

N. radialis (C7–C8).

TETİK NOKTA

Olekranon ile lateral epikondil arasında.

YANSIYAN AĞRI

- Lateral epikondil çevresi

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Oturur pozisyonda, dirsek fleksiyonda
- Olekranonun yanında düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Lokal dirsek ağrısı

KLİNİK İPUCU Tenisçi dirseğinde kesin lokalizasyon anconeusu ekstansörlerden ayırmaya yardımcı olur.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

SUPINATOR

Musculus supinator

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ön kolun dış rotasyonu (supinasyon)

ORİJİN

Humerusun lateral epikondili, radial kollateral bağ, ulnanın crista musculi supinatorisi.

İNSERSİYO

Radiusun proksimal üçte biri.

İNNERVASYON

N. radialis profundus (C6–C7).

TETİK NOKTA

Dirsek çukurunun altında lateralde, radius başının çevresinde.

YANSIYAN AĞRI

- Lateral epikondil
- Başparmak ile işaret parmağı arasında el sırtı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Oturur pozisyonda, ön kol supinasyonda
- Radius başının altında palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Tenisçi dirseği
- Vida sıkarken veya kapı kolu çevirirken ağrı

KLİNİK İPUCU İçinden n. radialis profundus geçer: gergin bir supinator ön kolda güçsüzlüğe neden olabilir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 39 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

BRACHIORADIALIS

Musculus brachioradialis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ön kol nötr pozisyondayken dirsek fleksiyonu

ORİJİN

Humerusun lateral suprakondiler kenarı.

İNSERSİYO

Radiusun processus styloideusu.

İNNERVASYON

N. radialis (C5–C6).

TETİK NOKTA

Ön kolun radial tarafında dirseğin 1–2 cm altında.

YANSIYAN AĞRI

- Lateral epikondil
- El bileğinin dorsal tarafı
- Başparmak ile işaret parmağı arası

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Oturur pozisyonda, ön kol nötr pozisyonda
- Ön kolun radial kenarında pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Kavrarken dirsek ağrısı
- El sırtında ağrı

KLİNİK İPUCU Pens tutuşla extensor carpi radialisten kolayca ayrılır.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

EXTENSOR CARPI RADIALIS

Mm. extensores carpi radiales longus et brevis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- El bileği ekstansiyonu ve radial deviasyonu
- Kavramanın stabilizasyonu

ORİJİN

Humerusun lateral suprakondiler kenarı ve lateral epikondil.

İNSERSİYO

II. ve III. metakarp tabanı.

İNNERVASYON

N. radialis (C6–C7).

TETİK NOKTA

Ön kolun üst üçte birinde, dorsoradial tarafta.

YANSIYAN AĞRI

- Lateral epikondil
- El sırtı ve el bileği

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Oturur pozisyonda, ön kol pronasyonda
- Dirseğin altında dorsal tarafta palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Tenisçi dirseği
- Kavrama gücünde azalma

KLİNİK İPUCU Fare kullanımı ve klavyede yazma sık bir yüktür: çalışırken el bileğinin pozisyonunu kontrol edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 41 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

EXTENSOR DIGITORUM

Musculus extensor digitorum

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Parmak ekstansiyonu
- El bileği ekstansiyonuna yardım eder

ORİJİN

Humerusun lateral epikondili (ortak ekstansör tendonu).

İNSERSİYO

2–5. parmakların dorsal aponevrozu.

İNNERVASYON

N. radialis profundus (C7–C8).

TETİK NOKTA

Ön kolun dorsal tarafında, dirseğin 3–4 cm altında.

YANSIYAN AĞRI

- Ön kolun dorsal tarafı
- El sırtı
- Orta parmak ve yüzük parmağı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Oturur pozisyonda, ön kol pronasyonda
- Hastadan parmaklarını tek tek kaldırmasını isteyin: bant hissedilir

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Parmaklarda sertlik
- Kavrama gücünde azalma

KLİNİK İPUCU Müzisyenlerde ve çok klavye kullananlarda sıktır; molalar ve parmak germe yardımcı olur.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

FLEXOR CARPI RADIALIS VE ULNARIS

Mm. flexores carpi radialis et ulnaris

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- El bileği fleksiyonu
- Sırasıyla radial veya ulnar deviasyon

ORİJİN

Humerusun medial epikondili (ortak fleksör tendonu).

İNSERSİYO

Radialis: II. metakarp tabanı; ulnaris: os pisiforme, V. metakarp.

İNNERVASYON

N. medianus (FCR), n. ulnaris (FCU).

TETİK NOKTA

Ön kolun palmar tarafında üst üçte birde.

YANSIYAN AĞRI

- El bileğinin palmar tarafı (radial ve ulnar)

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Oturur pozisyonda, ön kol supinasyonda
- Dirence karşı el bileği fleksiyonu isteyin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Golfçü dirseği
- Kavrarken el bileği ağrısı

KLİNİK İPUCU Golfçü dirseğinde (medial epikondilit) pronator teres ile birlikte muayene edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

PRONATOR TERES

Musculus pronator teres

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ön kolun iç rotasyonu (pronasyon)
- Dirsek fleksiyonuna yardım eder

ORİJİN

Humerusun medial epikondili ve ulnanın processus coronoideusu.

İNSERSİYO

Radiusun lateral yüzünün ortası.

İNNERVASYON

N. medianus (C6-C7).

TETİK NOKTA

Dirsek çukurunun altında medialde, medial epikondile yakın.

YANSIYAN AĞRI

- El bileği ve ön kolun palmar-radial tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Oturur pozisyonda, ön kol supinasyonda
- Dirsek çukurunun altında çapraz palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Çevirme hareketlerinde ağrı
- Başparmak ve işaret parmağında uyuşma (n. medianus)

KLİNİK İPUCU İçinden n. medianus geçer: pronator teres sendromu karpal tünel sendromunu taklit edebilir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 44 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

PALMARIS LONGUS

Musculus palmaris longus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Palmar aponevrozun gerilmesi
- El bileği fleksiyonuna yardım eder

ORİJİN

Humerusun medial epikondili.

İNSERSİYO

Aponeurosis palmaris.

İNNERVASYON

N. medianus (C7–C8).

TETİK NOKTA

Ön kolun palmar tarafında üst üçte birde.

YANSIYAN AĞRI

- Avuç içinde batıcı, iğne gibi ağrı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Oturur pozisyonda
- Hastadan başparmağıyla serçe parmağına dokunmasını isteyin: tendon belirginleşir

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Alet tutarken avuç içi ağrısı

KLİNİK İPUCU İnsanların yaklaşık %15'inde bulunmaz; yoksa avuç içi ağrısının başka bir kaynağını arayın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 45 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

ADDUCTOR POLLICIS

Musculus adductor pollicis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Başparmak addüksiyonu (pens tutuş)

ORİJİN

III. metakarp ve karpal kemikler.

İNSERSİYO

Başparmağın proksimal falanksı (ulnar taraf).

İNNERVASYON

N. ulnaris (C8–T1).

TETİK NOKTA

Başparmak ile işaret parmağı arasındaki deri katlantısında (birinci web aralığı).

YANSIYAN AĞRI

- Başparmağın dış tarafı
- Başparmak tabanı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Başparmak ile işaret parmağı arasında pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- İnce hareketlerde beceriksizlik
- Yazarken veya pens tutuşta ağrı

KLİNİK İPUCU Telefon kullanımı, yazma ve dikişten sonra sıktır. İş molalarında parmak germe önerin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 46 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

OPPONENS POLLICIS

Musculus opponens pollicis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Başparmak opozisyonu

ORİJİN

Os trapezium ve retinaculum flexorum.

İNSERSİYO

I. metakarpın radial kenarı.

İNNERVASYON

N. medianus (C8–T1).

TETİK NOKTA

Tenar kabartıda, elin radial tarafında.

YANSIYAN AĞRI

- Başparmağın palmar tarafı
- El bileğinin palmar-radial kısmı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Tenar kabartıda düz palpasyon
- Opozisyon isteyin: başparmak serçe parmağa dokunur

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Kavrama gücünde azalma
- Kavanoz açarken ağrı

KLİNİK İPUCU Karpal tünel sendromunda tenar kaslar zayıflayabilir: kuvveti de değerlendirin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 47 · OMUZ, KOL, ÖN KOL VE EL

ELİN İNTEROSSEÖZ KASLARI

Mm. interossei dorsales et palmares manus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Parmakların abdüksiyonu ve addüksiyonu
- MKF eklemlerde fleksiyon, İF eklemlerde ekstansiyon

ORİJİN

Metakarpların birbirine bakan yüzleri.

İNSERSİYO

Proksimal falanksl ar ve parmakların dorsal aponevrozu.

İNNERVASYON

N. ulnaris (C8–T1).

TETİK NOKTA

Metakarplar arasında, dorsal ve palmar tarafta.

YANSIYAN AĞRI

- Parmakların yanları distal falanksl ara kadar
- Heberden nodülleri bölgesi

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Metakarplar arasında pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Parmaklarda sertlik
- Parmakların yanlarında ağrı

KLİNİK İPUCU Parmak ağrısı çoğu zaman eklem kaynaklı görünür ama kas kaynaklı olabilir: metakarplar arasındaki aralıkları palpasyonla tarayın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

VÜCUT BÖLGESİ

SIRT, OMURGA VE GÖVDE

Kartlar 48–60 · 13 kas

KART 48 · SIRT, OMURGA VE GÖVDE

SERRATUS POSTERIOR SUPERIOR

Musculus serratus posterior superior

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- İnspirasyonda üst kaburgaların kaldırılması

ORİJİN

C7–T3 processus spinosusları.

İNSERSİYO

2–5. kaburgalar.

İNNERVASYON

Nn. intercostales (T2–T5).

TETİK NOKTA

Skapulanın üst kısmının altında; yalnızca skapula öne çekildiğinde ulaşılabilir.

YANSIYAN AĞRI

- Skapulanın altında derinde
- Kolun arka tarafı
- Serçe parmak

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Oturur pozisyonda, kollar göğsün önünde çapraz
- Skapulanın medial kenarının altında palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Skapulanın altında derin, sürekli ağrı
- Serçe parmakta uyuşma

KLİNİK İPUCU Skapula uzaklaştırılmadan palpe edilemez: kolları çaprazlamak kası açığa çıkarır.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 49 · SIRT, OMURGA VE GÖVDE

SERRATUS POSTERIOR INFERIOR

Musculus serratus posterior inferior

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Alt kaburgaların aşağı ve geriye çekilmesi

ORİJİN

T11–L2 processus spinosusları.

İNSERSİYO

9–12. kaburgalar.

İNNERVASYON

Nn. intercostales (T9–T12).

TETİK NOKTA

Alt kaburgaların üstünde, omurganın lateralinde.

YANSIYAN AĞRI

- Alt kaburgalar üzerinde lokal, sızlayan ağrı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü
- Alt kaburgalar üzerinde düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Kaburgalar üzerinde künt ağrı
- Rotasyonda ağrı

KLİNİK İPUCU Lomber muayene negatif olsa bile ağrıyabilir: kaburgaların üzerinde palpe edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 50 · SIRT, OMURGA VE GÖVDE

ILIOCOSTALIS THORACIS

Musculus iliocostalis thoracis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Omurga ekstansiyonu
- Aynı tarafa lateral fleksiyon

ORİJİN

Alt 6 kaburganın açıları.

İNSERSİYO

Üst 6 kaburganın açıları ve C7 processus transversusu.

İNNERVASYON

Spinal sinirlerin arka dalları.

TETİK NOKTA

Orta ve alt torakal bölgede, omurganın lateralinde.

YANSIYAN AĞRI

- Skapulaya doğru
- Önde, karnın aynı tarafına

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü
- Kaburga açıları boyunca düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Sırtın torakal kısmında ağrı
- İç organ kaynaklı gibi görünen karın ağrısı

KLİNİK İPUCU Dahiliye muayenesi negatif olan karın ağrısında sırt kaslarını da düşünün.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 51 · SIRT, OMURGA VE GÖVDE

ILIOCOSTALIS LUMBORUM

Musculus iliocostalis lumborum

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Lomber bölgenin ekstansiyonu ve lateral fleksiyonu

ORİJİN

Crista iliaca ve sakrum.

İNSERSİYO

Alt 6 kaburganın açıları.

İNNERVASYON

Spinal sinirlerin arka dalları (lomber).

TETİK NOKTA

L1 hizasında, omurganın lateralinde.

YANSIYAN AĞRI

- Kalçanın (gluteal bölgenin) ortasına doğru
- Belin alt kısmı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü, karın altında yastık
- Lomber bölgede düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Kalçaya yayılan bel ağrısı
- Ayağa kalkarken ağrı

KLİNİK İPUCU Lomber ağrının bir kısmı siyatik olmadığı halde kalçaya yayılabilir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 52 · SIRT, OMURGA VE GÖVDE

LONGISSIMUS THORACIS

Musculus longissimus thoracis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Omurga ekstansiyonu
- Aynı tarafa lateral fleksiyon

ORİJİN

Sakrum, crista iliaca, lomber omurların processus spinosusları.

İNSERSİYO

Torakal omurların processus transversusları ve kaburgalar.

İNNERVASYON

Spinal sinirlerin arka dalları.

TETİK NOKTA

T10–L1 hizasında, orta hattan 2–4 cm uzakta.

YANSIYAN AĞRI

- Daha aşağıda, gluteal kasın üstünde
- Sakroiliak bölge

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü
- Orta hattın yanında derin düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Belin alt kısmında ve kalçada ağrı
- Uzun süre ayakta kaldıktan sonra sertlik

KLİNİK İPUCU Ağrı tetik noktadan birkaç segment aşağıda ortaya çıkar: daha yukarıda arayın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 53 · SIRT, OMURGA VE GÖVDE

MULTIFIDUS

Musculus multifidus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Omurların segmental stabilizasyonu
- Omurga ekstansiyonu ve rotasyonu

ORİJİN

Sakrum, spina iliaca, processus transversuslar.

İNSERSİYO

2–4 seviye yukarıdaki processus spinosuslar.

İNNERVASYON

Spinal sinirlerin arka dalları.

TETİK NOKTA

Processus spinosusların hemen yanında, derinde.

YANSIYAN AĞRI

- Omurganın yanında lokal ağrı
- Sakrum ve koksiks

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü
- Processus spinosusun hemen yanında derin palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Segmental, noktasal sırt ağrısı
- Kuyruk sokumu ağrısı

KLİNİK İPUCU Kronik bel ağrısında çoğu zaman atrofiye uğrar: stabilizasyon egzersizleri kilit önemdedir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

ROTATORES VE INTERSPINALES

Mm. rotatores et interspinales

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Omurların hassas rotasyonu ve ekstansiyonu
- Propriosepsiyon

ORİJİN

Processus transversuslar (rotatores), processus spinosuslar (interspinales).

İNSERSİYO

Komşu omurun processus spinosusu.

İNNERVASYON

Spinal sinirlerin arka dalları.

TETİK NOKTA

Processus spinosuslar arasında derinde.

YANSIYAN AĞRI

- İlgili seviyede omurganın orta hattı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü
- Processus spinosuslar arasında ve yanında baskı

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Orta hatta omurga ağrısı
- Perküsyonda hassas omur

KLİNİK İPUCU Perküsyonla hassas orta hat ağrısında her zaman kemik kaynaklı bir nedeni (ör. kırık) dışlayın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 55 · SIRT, OMURGA VE GÖVDE

QUADRATUS LUMBORUM

Musculus quadratus lumborum

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Lomber bölgenin aynı tarafa lateral fleksiyonu
- Pelvisin kaldırılması
- İnspirasyonda 12. kaburganın stabilizasyonu

ORİJİN

Crista iliaca ve ligamentum iliolumbale.

İNSERSİYO

12. kaburga ve L1–L4 processus transversusları.

İNNERVASYON

T12–L3 ön dalları.

TETİK NOKTA

12. kaburga ile crista iliaca arasında, erector spinaenin lateralinde.

YANSIYAN AĞRI

- Sakroiliak eklem
- Kalçanın alt kısmı
- Crista iliaca
- Trokanter major

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yan yatar pozisyonda, üstteki kol başın üstünde
- Erector spinaenin lateral kenarının altında palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Ayağa kalkarken şiddetli bel ağrısı
- Öksürürken ağrı
- Yan yatarak uyuyamama

KLİNİK İPUCU Akut «bel tutulmasının» sık bir nedenidir. Bacak uzunluk farkını ve pelvis pozisyonunu kontrol edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 56 · SIRT, OMURGA VE GÖVDE

RECTUS ABDOMINIS (DÜZ KARIN KASI)

Musculus rectus abdominis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Gövde fleksiyonu
- Karın içi basıncın artırılması
- Pelvisin kontrolü

ORİJİN

Symphysis pubica ve crista pubica.

İNSERSİYO

5–7. kaburga kıkırdakları ve processus xiphoideus.

İNNERVASYON

Nn. intercostales (T7–T12).

TETİK NOKTA

Göbeğin üstünde, göbeğin yanında ve pubik kemiğin üstünde.

YANSIYAN AĞRI

- Sırtta yatay bant
- Göbek çevresi
- Alt karın ve bel

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, dizler bükülü
- Karın kasının kenarında pens tutuş
- Başın kaldırılması kası gerer

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Şişkinlik hissi
- Karın krampına benzeyen ağrı
- Kaynağı önde olan bel ağrısı

KLİNİK İPUCU Karın ağrısında her zaman dahili nedenleri dışlayın; ancak ondan sonra karın duvarını muayene edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 57 · SIRT, OMURGA VE GÖVDE

OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS

Musculus obliquus externus abdominis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Gövdenin karşı tarafa rotasyonu
- Gövde fleksiyonu
- Karın içi basıncın artırılması

ORİJİN

5–12. kaburgaların dış yüzü.

İNSERSİYO

Crista iliaca, ligamentum inguinale, linea alba.

İNNERVASYON

Nn. intercostales (T7–T12), n. iliohypogastricus.

TETİK NOKTA

Alt kaburgalar boyunca ve kasığa yakın.

YANSIYAN AĞRI

- Epigastrium (mide ekşimesine benzer)
- Kasık ve alt karın

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü
- Karnın yan duvarında pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Mide ekşimesine benzeyen ağrı
- Kasık ağrısı

KLİNİK İPUCU Sporcularda sıktır (rotasyon hareketleri). Dahili nedenleri dışlayın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 58 · SIRT, OMURGA VE GÖVDE

İNTERKOSTAL KASLAR

Mm. intercostales externi et interni

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Solunumda kaburgaların kaldırılması ve indirilmesi
- Göğüs duvarının stabilizasyonu

ORİJİN

Üstteki kaburganın alt kenarı.

İNSERSİYO

Alttaki kaburganın üst kenarı.

İNNERVASYON

Nn. intercostales.

TETİK NOKTA

Ağrılı seviyedeki interkostal aralıklarda.

YANSIYAN AĞRI

- İnterkostal aralık boyunca lokal ağrı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- İnterkostal aralıkta düz palpasyon
- Derin nefes hassasiyeti artırır

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Nefes alırken batıcı ağrı
- Öksürükten sonra ağrı

KLİNİK İPUCU Şiddetli ve sınırlı ağrıda kaburga kırığını ve zonanın erken evresini dışlayın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

DIYAFRAM

Diaphragma

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



◯ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ana inspirasyon kası

ORİJİN

Processus xiphoideus, alt 6 kaburga, lomber omurlar.

İNSERSİYO

Centrum tendineum.

İNNERVASYON

N. phrenicus (C3–C5).

TETİK NOKTA

Önde kaburga yayının altında, ekspirasyonda dikkatli palpasyonla.

YANSIYAN AĞRI

- Kaburga yayı boyunca
- Omuz tepesi

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, dizler bükülü
- Ekspirasyonda kaburga yayının altından yukarı doğru palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Yan ağrısı
- Derin nefeste ağrı

KLİNİK İPUCU Üst göğüs solunumu diyaframın yetersiz çalıştığını gösterir: hastaya karın (diyafram) solunumunu öğretin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 60 · SIRT, OMURGA VE GÖVDE

STERNALIS

Musculus sternalis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Önemli bir fonksiyonu yoktur

ORİJİN

Sternum ve kaburga kıkırdaklarının ön yüzü.

İNSERSİYO

Pektoral fasya, değişken.

İNNERVASYON

Nn. pectorales veya intercostales.

TETİK NOKTA

Sternumun üstünde, orta hatta.

YANSIYAN AĞRI

- Tüm sternum
- Göğsün üst kısmı
- Kolun iç tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sternum üzerinde düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Sternum arkasında ağrı
- Göğüste sıkışma hissi

KLİNİK İPUCU Göğüste sıkışmada ÖNCE tıbbi muayene (kalp). Kası ancak ondan sonra muayene edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

VÜCUT BÖLGESİ

PELVİS, KALÇA VE GLUTEAL BÖLGE

Kartlar 61–74 · 14 kas

KART 61 · PELVİS, KALÇA VE GLUTEAL BÖLGE

GLUTEUS MAXIMUS

Musculus gluteus maximus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Kalça ekstansiyonu
- Uyluğun dış rotasyonu
- Pelvisin stabilizasyonu

ORİJİN

İliumun arka kısmı, sakrum, koksiks.

İNSERSİYO

Femurun tuberositas glutea'sı ve iliotibial bant.

İNNERVASYON

N. gluteus inferior (L5–S2).

TETİK NOKTA

Sakrumun yanında, tuber ischiadicumun üstünde ve alt medial kısımda.

YANSIYAN AĞRI

- Sakrum ve sakroiliak eklem
- Tüm gluteal bölge
- Koksiks

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yan yatar veya yüzüstü pozisyonda
- Düz palpasyon veya pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Otururken ağrı
- Yokuş yukarı yürürken ağrı

KLİNİK İPUCU Uzun süre oturduktan sonra sıktır; oturmaya ara vermek ve kalça ekstansörlerini aktive etmek yardımcı olur.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

GLUTEUS MEDIUS

Musculus gluteus medius

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Kalça abdüksiyonu
- Yürürken pelvisin yatay tutulması

ORİJİN

İliumun dış yüzü.

İNSERSİYO

Trokanter major.

İNNERVASYON

N. gluteus superior (L4–S1).

TETİK NOKTA

Crista iliacanın hemen altında, önden arkaya üç noktada.

YANSIYAN AĞRI

- Crista iliaca boyunca
- Sakroiliak eklem
- Gluteal bölgenin ortası ve yanı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yan yatar pozisyonda
- Crista iliacanın altında düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Yürürken bel ağrısı
- Ağrılı tarafa yatamama

KLİNİK İPUCU Trendelenburg belirtisinde (düşen pelvis) zayıftır: yan yatarak bacak kaldırma ile güçlendirin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 63 · PELVİS, KALÇA VE GLUTEAL BÖLGE

GLUTEUS MINIMUS

Musculus gluteus minimus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Kalçanın abdüksiyonu ve iç rotasyonu

ORİJİN

İliumun dış yüzü (ön kısım).

İNSERSİYO

Trokanter majorun ön kenarı.

İNNERVASYON

N. gluteus superior (L4–S1).

TETİK NOKTA

Gluteus mediusun altında derinde, ön ve arka kısımda.

YANSIYAN AĞRI

- Uyluk ve bacağın dış tarafı ayak bileğine kadar
- Uyluk ve baldırın arka tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yan yatar pozisyonda
- Gluteus mediusun altında derin palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Siyatiğe benzeyen ağrı
- Ayağa kalkarken ağrı ve topallama

KLİNİK İPUCU «Yalancı siyatiğin» en sık kas kaynaklı nedenidir. Nörolojik belirtilerde (uyuşma, refleks kaybı) tıbbi muayene gereklidir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

PIRIFORMIS

Musculus piriformis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Uyluğun dış rotasyonu
- Kalça fleksiyondayken abdüksiyon

ORİJİN

Sakrumun ön yüzü.

İNSERSİYO

Trokanter majorun üst kenarı.

İNNERVASYON

N. ad m. piriformem (S1–S2).

TETİK NOKTA

Sakrum ile trokanter major arasındaki çizginin medial ve lateral üçte birinde.

YANSIYAN AĞRI

- Sakroiliak eklem bölgesi
- Tüm gluteal bölge
- Uyluğun arka tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yan yatar pozisyonda, üstteki bacak bükülü
- Gluteal kasın içinden derin palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Otururken ağrı
- Bacağın arka tarafında uyuşma (piriformis sendromu)

KLİNİK İPUCU Siyatik sinir (n. ischiadicus) altından veya içinden geçer: sıkışmada siyatiğe benzer belirtiler ortaya çıkabilir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 65 · PELVİS, KALÇA VE GLUTEAL BÖLGE

DERİN ROTATORLAR (GEMELLI VE OBTURATOR INTERNUS)

Mm. gemelli et obturator internus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Uyluğun dış rotasyonu
- Femur başının stabilizasyonu

ORİJİN

Spina ischiadica, membrana obturatorianın iç yüzü, tuber ischiadicum.

İNSERSİYO

Trokanter majorun medial yüzü.

İNNERVASYON

N. ad m. obturatorium internum (L5–S2).

TETİK NOKTA

Piriformisin altında, trokanter majorun arkasında.

YANSIYAN AĞRI

- Gluteal bölgenin alt kısmında derinde
- Kalçanın arka kısmı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü, diz bükülü
- Trokanterin arkasında derin palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Derin gluteal ağrı
- Otururken rahatsızlık

KLİNİK İPUCU Çoğu zaman piriformis ile birlikte etkilenirler; aynı germe ile tedavi edilebilirler.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

QUADRATUS FEMORIS

Musculus quadratus femoris

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Uyluğun dış rotasyonu

ORİJİN

Tuber ischiadicum.

İNSERSİYO

Crista intertrochanterica.

İNNERVASYON

N. ad m. quadratum femoris (L4–S1).

TETİK NOKTA

Tuber ischiadicum ile trokanter major arasında.

YANSIYAN AĞRI

- Tuber ischiadicum çevresi
- Kalçanın arka kısmı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü
- Tuber ischiadicumun lateralinde derin palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Otururken oturma kemiğinde ağrı

KLİNİK İPUCU Tuber ischiadicum çevresindeki ağrıda onu hamstring tendonu sorunundan ayırın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 67 · PELVİS, KALÇA VE GLUTEAL BÖLGE

TENSOR FASCIAE LATAE

Musculus tensor fasciae latae

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Kalçanın fleksiyonu, abdüksiyonu ve iç rotasyonu
- İliotibial bandın gerilmesi

ORİJİN

Spina iliaca anterior superior.

İNSERSİYO

İliotibial bant.

İNNERVASYON

N. gluteus superior (L4–S1).

TETİK NOKTA

Spina iliaca anterior superiorun altında ve arkasında.

YANSIYAN AĞRI

- Kalçanın dış tarafı
- Uyluğun dış tarafı dize kadar

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü veya yan yatar pozisyonda
- Spina iliaca anterior superiorun altında düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Kalça ağrısı
- Hızlı yürürken ağrı

KLİNİK İPUCU Koşucularda iliotibial bant sendromu ile birlikte muayene edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

ILIOPSOAS

Musculus iliopsoas

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Kalça fleksiyonu
- Lomber bölgenin stabilizasyonu

ORİJİN

Psoas: T12–L4 omurlar; iliacus: fossa iliaca.

İNSERSİYO

Trokanter minor.

İNNERVASYON

Lomber pleksus (L1–L3), n. femoralis.

TETİK NOKTA

Kasıkta ligamentum inguinalenin altında ve karın duvarının içinden psoas üzerinde.

YANSIYAN AĞRI

- Omurga boyunca dikey bant
- Sakrum
- Uyluğun ön tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, dizler bükülü
- Yavaşça, ekspirasyonda karın duvarının içinden derin palpe edin
- Abdominal aortadan (nabız) uzak durun

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Ayaktayken artan, yatınca geçen bel ağrısı
- Oturduğu yerden doğrulmada zorluk

KLİNİK İPUCU Uzun süre oturmak onu kısaltır: hastaya lunge pozisyonunda kalça fleksörü germeyi öğretin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

PECTINEUS

Musculus pectineus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Uyluğun addüksiyonu ve fleksiyonu

ORİJİN

Pecten ossis pubis.

İNSERSİYO

Linea pectinea femoris.

İNNERVASYON

N. femoralis (L2–L3), bazen n. obturatorius.

TETİK NOKTA

Kasığın altında, uyluğun üst medial kısmında.

YANSIYAN AĞRI

- Kasığın derininde

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, bacak hafif abdüksiyonda
- Femoral arterin medialinde palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Kasık ağrısı
- Bacak bacak üstüne oturunca ağrı

KLİNİK İPUCU Kasık ağrısında kas kaynağını ancak fıtık ve kalça eklemi kaynaklı nedenler dışlandıktan sonra araştırın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

ADDUCTOR LONGUS VE BREVIS

Mm. adductores longus et brevis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Uyluğun addüksiyonu
- Kalça fleksiyonuna yardım eder

ORİJİN

Pubik kemik.

İNSERSİYO

Linea aspera femoris.

İNNERVASYON

N. obturatorius (L2–L4).

TETİK NOKTA

Uyluğun iç tarafının üst üçte birinde.

YANSIYAN AĞRI

- Kasık
- Uyluğun iç tarafı
- Dizin iç tarafı ve tibia

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, diz bükülü ve yana düşmüş
- Uyluğun iç tarafında pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Kasıkta çekilme hissi
- Merdiven çıkarken ağrı

KLİNİK İPUCU Futbolcularda sıktır: kademeli yükleme ve addüktör güçlendirme ile önlenir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 71 · PELVİS, KALÇA VE GLUTEAL BÖLGE

ADDUCTOR MAGNUS

Musculus adductor magnus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Uyluğun addüksiyonu
- Kalça ekstansiyonu (arka lifler)

ORİJİN

Ramus inferior ossis pubis ve tuber ischiadicum.

İNSERSİYO

Linea aspera ve tuberculum adductorium.

İNNERVASYON

N. obturatorius ve n. ischiadicus (L2–L4).

TETİK NOKTA

Uyluğun iç tarafında, ortada ve yukarıda.

YANSIYAN AĞRI

- Kasık
- Uyluğun iç tarafı
- Pelvisin derininde

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, bacak abdüksiyonda
- Uyluğun medial-arka tarafında palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Uyluğun iç tarafında ağrı
- Pelviste rahatsızlık

KLİNİK İPUCU Pelvis içi ağrıda jinekolojik ve ürolojik nedenleri dışlayın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

GRACILIS

Musculus gracilis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Uyluğun addüksiyonu
- Dizin fleksiyonu ve iç rotasyonu

ORİJİN

Ramus inferior ossis pubis.

İNSERSİYO

Pes anserinus (tibianın medial yüzü).

İNNERVASYON

N. obturatorius (L2–L3).

TETİK NOKTA

Uyluğun iç tarafının orta kısmında.

YANSIYAN AĞRI

- Uyluğun iç tarafında yanıcı, yüzeyel ağrı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, bacak abdüksiyonda
- Pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Uyluğun iç tarafında yanma

KLİNİK İPUCU Pes anserinus bursitinden ayırın: gracilis ağrısı tüm uyluk boyunca uzanır.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 73 · PELVİS, KALÇA VE GLUTEAL BÖLGE

SARTORIUS (TERZI KASI)

Musculus sartorius

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Kalçanın fleksiyonu, abdüksiyonu ve dış rotasyonu
- Diz fleksiyonu

ORİJİN

Spina iliaca anterior superior.

İNSERSİYO

Pes anserinus.

İNNERVASYON

N. femoralis (L2–L3).

TETİK NOKTA

Kasın seyri boyunca birkaç noktada.

YANSIYAN AĞRI

- Uyluğun ön tarafında çapraz uzanan batıcı, yüzeyel ağrı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü
- Çapraz seyri boyunca pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Uylukta batıcı ağrı
- Uyluğun dış tarafında uyuşma (n. cutaneus femoris lat.)

KLİNİK İPUCU N. cutaneus femoris lateralis spina iliaca anterior superiorun yakınından geçer: meralgia paresthetica belirtilerini taklit edebilir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 74 · PELVİS, KALÇA VE GLUTEAL BÖLGE

PELVİK TABAN KASLARI

Mm. levator ani et coccygeus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Pelvik organların desteklenmesi
- İdrar tutmanın desteklenmesi

ORİJİN

Pubik kemik, arcus tendineus, spina ischiadica.

İNSERSİYO

Koksiks ve ligamentum anococcygeum.

İNNERVASYON

Sakral pleksus (S3–S4).

TETİK NOKTA

Koksiksin yanında ve pelvisin iç duvarında; iç palpasyonu yalnızca eğitimli bir uzman yapabilir.

YANSIYAN AĞRI

- Koksiks
- Sakrumun alt kısmı
- Pelvisin derininde

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Koksiksin yanında dış palpasyon
- İç muayene eğitimli bir terapistin işidir

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Otururken kuyruk sokumu ağrısı
- Pelviste baskı hissi

KLİNİK İPUCU İç tedavi yalnızca uygun eğitimi almış bir pelvik taban terapisti tarafından yapılmalıdır. Uzman hekim muayenesi önerilir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

VÜCUT BÖLGESİ

UYLUK, BACAK VE AYAK

Kartlar 75–102 · 28 kas

KART 75 · UYLUK, BACAK VE AYAK

RECTUS FEMORIS

Musculus rectus femoris

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Diz ekstansiyonu
- Kalça fleksiyonu

ORİJİN

Spina iliaca anterior inferior.

İNSERSİYO

Patella ve tuberositas tibiae (ligamentum patellae).

İNNERVASYON

N. femoralis (L2–L4).

TETİK NOKTA

Uyluğun üst kısmında kasığın altında.

YANSIYAN AĞRI

- Patella çevresi ve dizin derininde

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü
- Uyluğun üst ön kısmında düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Merdiven inerken diz ağrısı
- Gece diz ağrısı

KLİNİK İPUCU Dizin ön kısmındaki ağrının kaynağı çoğu zaman uyluğun yukarısındadır: daha yukarıda palpe edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 76 · UYLUK, BACAK VE AYAK

VASTUS MEDIALIS

Musculus vastus medialis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Diz ekstansiyonu
- Patellanın medial stabilizasyonu

ORİJİN

Linea asperanın medial dudağı.

İNSERSİYO

Patellanın medial kenarı ve ligamentum patellae.

İNNERVASYON

N. femoralis (L2–L4).

TETİK NOKTA

Patellanın üstünde medialde ve uyluğun orta kısmında.

YANSIYAN AĞRI

- Dizin iç tarafı
- Uyluğun iç ön kısmı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, diz hafif bükülü
- Dizin üstünde medialde düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Dizin «boşalması» (buckling)
- Çömelirken diz ağrısı

KLİNİK İPUCU «Dizin boşalması» çoğu zaman bağ yaralanmasından değil, vastus medialisteki bir tetik noktadan kaynaklanır.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 77 · UYLUK, BACAK VE AYAK

VASTUS LATERALIS

Musculus vastus lateralis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Diz ekstansiyonu

ORİJİN

Trokanter major, linea asperanın lateral dudağı.

İNSERSİYO

Patellanın lateral kenarı ve ligamentum patellae.

İNNERVASYON

N. femoralis (L2–L4).

TETİK NOKTA

Uyluğun dış tarafında kasın tüm uzunluğu boyunca.

YANSIYAN AĞRI

- Uyluğun dış tarafı
- Dizin dış tarafı
- Patellanın lateral kenarı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yan yatar pozisyonda
- Uyluğun dış tarafında düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Ağrılı tarafa yatamama
- Patellanın «kilitlenmesi»

KLİNİK İPUCU Patellayı laterale çekebilir: medial tarafı güçlendirmeyle birlikte tedavi edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 78 · UYLUK, BACAK VE AYAK

VASTUS INTERMEDIUS

Musculus vastus intermedius

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Diz ekstansiyonu

ORİJİN

Femurun ön ve lateral yüzü.

İNSERSİYO

Patellanın üst kenarı.

İNNERVASYON

N. femoralis (L2–L4).

TETİK NOKTA

Rectus femorisin altında derinde, uyluğun üst kısmında.

YANSIYAN AĞRI

- Uyluğun ön orta kısmı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü
- Rectus femorisi yana itin ve derin palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Dizi tam düzeltmede zorluk
- Ayağa kalkarken ağrı

KLİNİK İPUCU Derin yerleşimi nedeniyle muayenede çoğu zaman atlanır.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 79 · UYLUK, BACAK VE AYAK

BICEPS FEMORIS

Musculus biceps femoris

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Diz fleksiyonu
- Kalça ekstansiyonu (uzun baş)

ORİJİN

Uzun baş: tuber ischiadicum; kısa baş: linea aspera.

İNSERSİYO

Fibula başı.

İNNERVASYON

N. ischiadicus (L5–S2).

TETİK NOKTA

Uyluğun arka-dış tarafının alt yarısında.

YANSIYAN AĞRI

- Diz arkası
- Uyluğun arka tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü
- Uyluğun arka-dış tarafında pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Yürürken diz arkasında ağrı
- Oturduktan sonra ağrı

KLİNİK İPUCU Uzun süre otururken sandalye kenarı ona baskı yapabilir: oturma yüksekliğini kontrol edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 80 · UYLUK, BACAK VE AYAK

SEMITENDINOSUS VE SEMIMEMBRANOSUS

Mm. semitendinosus et semimembranosus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Dizin fleksiyonu ve iç rotasyonu
- Kalça ekstansiyonu

ORİJİN

Tuber ischiadicum.

İNSERSİYO

Tibianın medial yüzü (pes anserinus) ve medial kondil.

İNNERVASYON

N. ischiadicus (L5–S2).

TETİK NOKTA

Uyluğun arka-iç tarafının alt yarısında.

YANSIYAN AĞRI

- Gluteal bölgenin alt kısmı
- Uyluğun arka tarafı
- Diz ve baldırın iç tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü
- Uyluğun arka-iç tarafında pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Otururken ağrı
- Yürürken ağrı

KLİNİK İPUCU Hamstringler çoğu zaman gergindir; germenin yanında eksantrik güçlendirme yaralanmaya karşı korur.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

POPLITEUS

Musculus popliteus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Dizin tam ekstansiyondan «kilidinin açılması» (iç rotasyon)
- Dizin arka stabilizasyonu

ORİJİN

Femurun lateral kondili.

İNSERSİYO

Tibianın arka yüzü.

İNNERVASYON

N. tibialis (L4–S1).

TETİK NOKTA

Diz çukurunun alt kısmında, gastrocnemius başları arasında medialde.

YANSIYAN AĞRI

- Diz arkası

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü, diz hafif bükülü
- Diz çukurunda derin palpasyon (damarlara baskıdan kaçının)

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Yokuş aşağı inerken ağrı
- Çömelirken ağrı

KLİNİK İPUCU Diz çukuru şişmiş veya sıcaksa Baker kistini ve derin ven trombozunu dışlayın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 82 · UYLUK, BACAK VE AYAK

GASTROCNEMIUS (BALDIR KASI)

Musculus gastrocnemius

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayağın plantar fleksiyonu
- Diz fleksiyonuna yardım eder

ORİJİN

Femurun medial ve lateral kondili.

İNSERSİYO

Kalkaneus tüberi (Aşil tendonu).

İNNERVASYON

N. tibialis (S1–S2).

TETİK NOKTA

İki başta, baldırın üst kısmında.

YANSIYAN AĞRI

- Ayak kemerinin iç tarafı
- Diz arkası
- Baldır

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü
- Baldır kasının başlarında pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Gece baldır krampları
- Yokuş yukarı yürürken ağrı

KLİNİK İPUCU Gece baldır kramplarının arkasında çoğu zaman bir tetik nokta vardır: akşam germe önerilir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

SOLEUS

Musculus soleus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayağın plantar fleksiyonu (özellikle diz bükülüyken)
- Venöz pompa

ORİJİN

Fibula başı ve tibianın arka yüzü.

İNSERSİYO

Kalkaneus tüberi (Aşil tendonu).

İNNERVASYON

N. tibialis (S1–S2).

TETİK NOKTA

Baldırın alt kısmında Aşil tendonunun üstünde ve daha yukarıda.

YANSIYAN AĞRI

- Topuk
- Baldır
- Nadiren sakroiliak eklem

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü, diz 90° bükülü
- Gastrocnemiusun altında pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Topuk ağrısı
- Merdiven çıkarken ağrı

KLİNİK İPUCU Topuk ağrısının kaynağı her zaman ayak değildir: soleusu da muayene edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 84 · UYLUK, BACAK VE AYAK

PLANTARIS

Musculus plantaris

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayağın plantar fleksiyonuna yardım eder

ORİJİN

Femurun lateral suprakondiler çizgisi.

İNSERSİYO

Kalkaneus tüberi.

İNNERVASYON

N. tibialis (S1–S2).

TETİK NOKTA

Diz çukurunda lateralde, gastrocnemiusun lateral başının yanında.

YANSIYAN AĞRI

- Diz arkası
- Baldırın üst kısmı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü
- Diz çukurunun lateral kısmında palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Diz arkasında ağrı

KLİNİK İPUCU Çoğu zaman bulunmaz; diz çukurundaki diğer ağrı kaynaklarını da muayene edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 85 · UYLUK, BACAK VE AYAK

TIBIALIS ANTERIOR

Musculus tibialis anterior

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

Tetik nokta (X) · Ana ağrı bölgesi · Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayağın dorsifleksiyonu
- Ayağın inversiyonu

ORİJİN

Tibianın lateral yüzü.

İNSERSİYO

Medial kuneiform kemik ve I. metatars.

İNNERVASYON

N. peroneus profundus (L4–L5).

TETİK NOKTA

Bacağın ön tarafının üst üçte birinde, tibianın lateralinde.

YANSIYAN AĞRI

- Ayak bileğinin ön tarafı
- Ayak başparmağı
- Kaval kemiği

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü
- Tibianın yanında düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Tökezleme, «düşük ayak» hissi
- Koştuktan sonra kaval kemiği ağrısı

KLİNİK İPUCU «Shin splints» durumunda tibialis anterioru muayene edin ve koşu ayakkabısını da kontrol edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 86 · UYLUK, BACAK VE AYAK

TIBIALIS POSTERIOR

Musculus tibialis posterior

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayak kemerinin korunması
- Ayağın inversiyonu

ORİJİN

Tibia ve fibulanın arka yüzü, membrana interossea.

İNSERSİYO

Os naviculare tüberozitesi ve ayak kemikleri.

İNNERVASYON

N. tibialis (L4–L5).

TETİK NOKTA

Baldırın altında derinde; yalnızca dolaylı olarak palpe edilir.

YANSIYAN AĞRI

- Aşil tendonu
- Tüm ayak tabanı
- Baldır

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü
- Tibianın arka kenarı boyunca derin dolaylı palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Yürürken ayak ağrısı
- Düztabanlık

KLİNİK İPUCU Düztabanlıkta çoğu zaman aşırı yüklenir: uygun ayakkabı ve tabanlık önemlidir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 87 · UYLUK, BACAK VE AYAK

PERONEUS LONGUS

Musculus fibularis (peroneus) longus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayağın eversiyonu
- Ayağın plantar fleksiyonu
- Ayak kemerinin korunması

ORİJİN

Fibula başı ve fibulanın lateral yüzü.

İNSERSİYO

I. metatars ve medial kuneiform kemik.

İNNERVASYON

N. peroneus superficialis (L5–S1).

TETİK NOKTA

Fibula başının 2–3 cm altında.

YANSIYAN AĞRI

- Lateral malleol çevresi ve arkası
- Ayağın dış tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yan yatar pozisyonda
- Fibula boyunca düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Ayak bileğinde instabilite hissi
- Ayak bileği burkulmasından sonra tekrarlayan ağrı

KLİNİK İPUCU N. peroneus fibula başının etrafından geçer: burada güçlü veya uzun süreli baskı uygulamayın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 88 · UYLUK, BACAK VE AYAK

PERONEUS BREVIS

Musculus fibularis (peroneus) brevis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA



○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayağın eversiyonu
- Ayağın plantar fleksiyonu

ORİJİN

Fibulanın alt üçte ikisi.

İNSERSİYO

V. metatars tüberozitesi.

İNNERVASYON

N. peroneus superficialis (L5–S1).

TETİK NOKTA

Bacağın dış tarafının alt üçte birinde.

YANSIYAN AĞRI

- Lateral malleol
- Ayağın dış tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yan yatar pozisyonda
- Fibulanın alt kısmı boyunca düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Ayak bileği instabilitesi
- Engebeli zeminde ağrı

KLİNİK İPUCU Ayak bileği burkulmasından sonra güçlendirme ve denge eğitimi kilit önemdedir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 89 · UYLUK, BACAK VE AYAK

PERONEUS TERTIUS

Musculus fibularis (peroneus) tertius

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayağın dorsifleksiyonu
- Ayağın eversiyonu

ORİJİN

Fibulanın alt üçte biri.

İNSERSİYO

V. metatars tabanı (dorsal taraf).

İNNERVASYON

N. peroneus profundus (L5–S1).

TETİK NOKTA

Bacağın ön-dış tarafının alt üçte birinde.

YANSIYAN AĞRI

- Ayak bileğinin ön tarafı
- Topuğun dış tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü
- Extensor digitorum longusun yanında düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Ayak bileğinin önünde ağrı

KLİNİK İPUCU Extensor digitorum longus ile birlikte muayene edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 90 · UYLUK, BACAK VE AYAK

EXTENSOR DIGITORUM LONGUS

Musculus extensor digitorum longus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayağın 2–5. parmaklarının ekstansiyonu
- Ayağın dorsifleksiyonu

ORİJİN

Tibianın lateral kondili, fibulanın ön yüzü.

İNSERSİYO

Ayağın 2–5. parmaklarının dorsal aponevrozu.

İNNERVASYON

N. peroneus profundus (L5–S1).

TETİK NOKTA

Bacağın ön-dış tarafında, dizin yaklaşık 8 cm altında.

YANSIYAN AĞRI

- Ayak sırtı
- Ayağın orta parmakları

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü
- Parmakları kaldırmasını isteyin: bant hissedilir

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Ayak sırtında ağrı
- Önde krampa benzeyen his

KLİNİK İPUCU Dar ayakkabı ve sıkı bağcık onu tahriş edebilir: ayakkabıyı kontrol edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

EXTENSOR HALLUCIS LONGUS

Musculus extensor hallucis longus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayak başparmağının ekstansiyonu
- Ayağın dorsifleksiyonu

ORİJİN

Fibulanın orta kısmı.

İNSERSİYO

Ayak başparmağının distal falanksı.

İNNERVASYON

N. peroneus profundus (L5–S1).

TETİK NOKTA

Bacağın ön tarafının orta ve alt kısmında.

YANSIYAN AĞRI

- Ayak sırtı
- Ayak başparmağı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü
- Ayak başparmağını kaldırmasını isteyin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Ayak başparmağı ağrısı
- Koştuktan sonra ağrı

KLİNİK İPUCU Eklem kaynaklı bir nedeni dışlayın: hallux rigidus.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 92 · UYLUK, BACAK VE AYAK

FLEXOR DIGITORUM LONGUS

Musculus flexor digitorum longus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayağın 2–5. parmaklarının fleksiyonu
- Ayağın plantar fleksiyonu

ORİJİN

Tibianın arka yüzü.

İNSERSİYO

Ayağın 2–5. parmaklarının distal falanksları.

İNNERVASYON

N. tibialis (L5–S2).

TETİK NOKTA

Baldırın iç tarafında derinde, tibianın arkasında.

YANSIYAN AĞRI

- Ayak tabanının orta kısmı
- Ayağın küçük parmakları

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü
- Tibianın medial kenarının arkasında palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Yürürken ayak ağrısı
- Ayak parmaklarında kramp

KLİNİK İPUCU Düztabanlıkta çoğu zaman aşırı yüklenir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 93 · UYLUK, BACAK VE AYAK

FLEXOR HALLUCIS LONGUS

Musculus flexor hallucis longus

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayak başparmağının fleksiyonu
- Ayak kemerinin korunması

ORİJİN

Fibulanın arka yüzü.

İNSERSİYO

Ayak başparmağının distal falanksı.

İNNERVASYON

N. tibialis (L5–S2).

TETİK NOKTA

Baldırın alt kısmında derinde, lateralde.

YANSIYAN AĞRI

- Ayak başparmağının plantar tarafı
- Ayak başparmağı tabanı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü
- Baldırın alt kısmında derin palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Tabandan ayak başparmağı ağrısı
- Parmak ucunda dururken ağrı

KLİNİK İPUCU Dansçılarda ve koşucularda çoğu zaman aşırı yüklenir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 94 · UYLUK, BACAK VE AYAK

EXTENSOR DIGITORUM BREVIS

Musculus extensor digitorum brevis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayağın 2–4. parmaklarının ekstansiyonuna yardım eder

ORİJİN

Kalkaneusun dorsal yüzü.

İNSERSİYO

Ayağın 2–4. parmaklarının ekstansör tendonları.

İNNERVASYON

N. peroneus profundus (L5–S1).

TETİK NOKTA

Ayak sırtında, lateral malleolün önünde.

YANSIYAN AĞRI

- Ayak sırtında lokal ağrı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü
- Lateral malleolün önünde düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Ayakkabı içinde ayak sırtında ağrı

KLİNİK İPUCU Ayakkabının dar dili ona baskı yapabilir: bağcıkları gevşetmek yardımcı olur.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 95 · UYLUK, BACAK VE AYAK

ABDUCTOR HALLUCIS

Musculus abductor hallucis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayak başparmağının abdüksiyonu
- Medial kemerin korunması

ORİJİN

Kalkaneus tüberi (medial çıkıntı).

İNSERSİYO

Ayak başparmağının proksimal falanksı (medial).

İNNERVASYON

N. plantaris medialis (S1–S2).

TETİK NOKTA

Ayağın iç kenarında, topuğun önünde.

YANSIYAN AĞRI

- Topuğun iç tarafı
- Medial kemer

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü, ayak dışa dönük
- Ayağın iç kenarında düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Yürürken ayağın iç tarafında ağrı

KLİNİK İPUCU Tarsal tünele yakın seyreder: uyuşmada n. tibialisi de muayene edin.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 96 · UYLUK, BACAK VE AYAK

FLEXOR DIGITORUM BREVIS

Musculus flexor digitorum brevis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayağın 2–5. parmaklarının fleksiyonu
- Ayak kemerinin korunması

ORİJİN

Kalkaneus tüberi.

İNSERSİYO

Ayağın 2–5. parmaklarının orta falanksları.

İNNERVASYON

N. plantaris medialis (S1–S2).

TETİK NOKTA

Ayak tabanının ortasında plantar fasyanın altında.

YANSIYAN AĞRI

- Metatars başları (ön ayak)

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü
- Ayak tabanının ortasında derin palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Ön ayak ağrısı
- Uzun süre ayakta kaldıktan sonra ağrı

KLİNİK İPUCU Plantar fasiitten ayırın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 97 · UYLUK, BACAK VE AYAK

QUADRATUS PLANTAE

Musculus quadratus plantae

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Flexor digitorum longusun çekme yönünü düzeltir

ORİJİN

Kalkaneusun plantar yüzü.

İNSERSİYO

Flexor digitorum longus tendonu.

İNNERVASYON

N. plantaris lateralis (S1–S2).

TETİK NOKTA

Topuğun önünde derinde, ayak tabanının ortasında.

YANSIYAN AĞRI

- Topuğun plantar tarafı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü
- Topuğun önünde derin palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Sabah topuk ağrısı

KLİNİK İPUCU Topuk ağrısında (topuk dikeni) quadratus plantae de belirtilere katkıda bulunabilir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

ABDUCTOR DIGITI MINIMI (AYAK)

Musculus abductor digiti minimi pedis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayak serçe parmağının abdüksiyonu ve fleksiyonu

ORİJİN

Kalkaneus tüberi.

İNSERSİYO

Ayak serçe parmağının proksimal falanksı.

İNNERVASYON

N. plantaris lateralis (S1–S2).

TETİK NOKTA

Ayağın dış kenarında.

YANSIYAN AĞRI

- Ayağın dış kenarı
- V. metatars başı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yan yatar pozisyonda
- Ayağın dış kenarında pens tutuş

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Ayağın dış tarafında ağrı

KLİNİK İPUCU Dar ayakkabı ayağın dış kenarına baskı yapabilir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 99 · UYLUK, BACAK VE AYAK

AYAĞIN İNTEROSSEÖZ KASLARI

Mm. interossei pedis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayak parmaklarının abdüksiyonu ve addüksiyonu
- Metatarsofalangeal eklemlerin stabilizasyonu

ORİJİN

Metatarsların yan yüzleri.

İNSERSİYO

Ayak parmaklarının proksimal falanksları.

İNNERVASYON

N. plantaris lateralis (S1–S2).

TETİK NOKTA

Metatarslar arasında, dorsal ve plantar tarafta.

YANSIYAN AĞRI

- Ayak parmaklarının yanları
- Metatars bölgesi

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Metatarslar arasında palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Ayak parmağı ağrısı
- Parmaklar arasında uyuşma

KLİNİK İPUCU Morton nöromundan (parmaklar arasında uyuşma) ayırın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 100 · UYLUK, BACAK VE AYAK

ADDUCTOR HALLUCIS

Musculus adductor hallucis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayak başparmağının addüksiyonu
- Transvers kemerin korunması

ORİJİN

2–4. metatars tabanları ve parmakların eklem kapsülleri.

İNSERSİYO

Ayak başparmağının proksimal falanksı (lateral).

İNNERVASYON

N. plantaris lateralis (S1–S2).

TETİK NOKTA

Ön ayağın altında derinde.

YANSIYAN AĞRI

- Metatars başlarının altında ön ayak

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü
- Ön ayakta derin palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Ön ayak ağrısı
- Yüksek topuklu ayakkabıda ağrı

KLİNİK İPUCU Transvers kemer düştüğünde çoğu zaman aşırı yüklenir; parmak egzersizleri (havlu toplama) yardımcı olur.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

KART 101 · UYLUK, BACAK VE AYAK

EXTENSOR HALLUCIS BREVIS

Musculus extensor hallucis brevis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayak başparmağının metatarsofalangeal ekleminin ekstansiyonu

ORİJİN

Kalkaneusun dorsal yüzü.

İNSERSİYO

Ayak başparmağının proksimal falanksı.

İNNERVASYON

N. peroneus profundus (L5–S1).

TETİK NOKTA

Ayak sırtında, extensor digitorum brevisin medialinde.

YANSIYAN AĞRI

- Ayak başparmağı tabanının üstünde ayak sırtı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Sırtüstü
- Ayak sırtında düz palpasyon

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- Ayak başparmağı üzerinde ayak sırtı ağrısı

KLİNİK İPUCU Çoğu zaman extensor digitorum brevis ile birlikte etkilenir.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.

FLEXOR HALLUCIS BREVIS

Musculus flexor hallucis brevis

YANSIYAN AĞRI VE TETİK NOKTA

○ Tetik nokta (X) ● Ana ağrı bölgesi ● Yayılım bölgesi

FONKSİYON

- Ayak başparmağının metatarsofalangeal ekleminin fleksiyonu
- Medial kemerin korunması

ORİJİN

Os cuboideum ve lateral kuneiform kemik.

İNSERSİYO

Ayak başparmağının proksimal falanksı (sesamoidler aracılığıyla).

İNNERVASYON

N. plantaris medialis (S1–S2).

TETİK NOKTA

Ayak tabanının iç tarafında I. metatarsın altında.

YANSIYAN AĞRI

- I. metatars başı
- Ayak başparmağı

TETİK NOKTA PALPASYONU

- Yüzüstü
- I. metatarsın altında palpe edin

EŞLİK EDEN BELİRTİLER

- İtme fazında ağrı

KLİNİK İPUCU Sesamoiditten ayırın.

Eğitim ve başvuru materyalidir. Tıbbi tanının veya yetkin bir terapistin yüz yüze muayenesinin yerini tutmaz.