TRYGG MED VARJE KLIENT™

Varningstecken: när du bör remittera klienten vidare

Symtom där kartorna inte bör vara första steget, och rutin för remittering steg för steg.

Innehåll

1 · Grundregel

2 · Efter område

3 · Steg för remittering

Nästa steg

DEL 1

Grundregel

Fatta inte beslut ensam om du tvekar.

Varför detta är viktigt

En skicklig yrkesperson löser inte alla problem på egen hand, utan vet när situationen kräver annan hjälp. Att remittera till rätt instans är ett uttryck för omsorg, inte ett misslyckande.

DEL 2

Efter område

Stäm av vid varje ny klient.

Alltid, oavsett område

Om du upptäcker detta: stå inte ensam med det, remittera klienten vidare

- [ ] Självmordstankar, självmordsplaner eller tidigare försök
- [ ] Självskada och autoaggression
- [ ] Utövande av våld eller att utsättas för övergrepp (särskilt med barn inblandade)
- [ ] Realitetsbrist (hallucinationer, vanföreställningar)
- [ ] Allvarliga sömn-, ät- eller funktionsstörningar som pågått i veckor

Ångest och stress

Om du upptäcker detta: stå inte ensam med det, remittera klienten vidare

- [ ] Somatiska symtom utan medicinsk förklaring (bröstsmärtor, svimning)
- [ ] Bruk av alkohol eller lugnande medel för att dämpa ångest
- [ ] Extrem tillbakadragenhet: klienten lämnar inte hemmet

Stämningsläge och känslor

Om du upptäcker detta: stå inte ensam med det, remittera klienten vidare

- [ ] Ihållande sänkt stämningsläge under flera veckor, anhedoni, hjälplöshet
- [ ] Ovanlig upprymdhet, minskat sömnbehov, riskfyllt beteende
- [ ] Okontrollerade ilskeutbrott som utgör en fara

Relationer och familj

Om du upptäcker detta: stå inte ensam med det, remittera klienten vidare

- [ ] Tecken på våld i nära relationer
- [ ] Kontrollerande beteende eller hot i klientens miljö
- [ ] Fara för barns omsorgssituation eller trygghet

Trauma och trygghet

Om du upptäcker detta: stå inte ensam med det, remittera klienten vidare

- [ ] Akuta symtom strax efter en nyligen inträffad traumatisk händelse
- [ ] Täta dissociativa tillstånd
- [ ] Klienten lever fortfarande under omedelbar fara

Kropp och ätbeteende

Om du upptäcker detta: stå inte ensam med det, remittera klienten vidare

- [ ] Betydande viktnedgång, matvägran, framkallade kräkningar
- [ ] Kompulsiv träning trots skador och utmattning
- [ ] Somatiska besvär utan föregående medicinsk utredning

Sorg och förlust

Om du upptäcker detta: stå inte ensam med det, remittera klienten vidare

- [ ] Den sörjande uttrycker en önskan om att dö, vill »följa efter« den avlidne
- [ ] Ihållande bristande vardagsfunktion under flera månader
- [ ] Bruk av alkohol eller droger för att döva smärtan

DEL 3

Steg för remittering

Lugnt, direkt och i aktivt samarbete med klienten.

1. **Fråga rakt ut.** Att fråga om självmordstankar ökar inte risken för att de genomförs.
2. **Bedöm den aktuella risknivån:** finns det en plan, tillgång till medel, en tidsram eller tidigare försök?
3. **Vid omedelbar fara:** ring 112 och lämna inte klienten utan tillsyn.
4. **Om det inte är omedelbar fara:** gör en plan för remiss tillsammans med klienten (vårdcentralen, psykiatrisk akutmottagning, lokala psykiatriska mottagningar).
5. **Anteckna och dokumentera** observerade symtom, samtalets förlopp och överenskomna åtgärder.
6. **Ta upp ärendet i handledning** och ta hand om ditt eget känslomässiga utrymme.

Nästa steg

I dag: skriv ut ensidesversionen och sätt upp den på en synlig plats på mottagningen eller arbetsplatsen.