Varningstecken

Om du upptäcker något av dessa: stå inte ensam med det, remittera klienten vidare.

Vid akut fara: ring 112. Lämna inte klienten utan tillsyn innan hjälpen har anlänt.

Alltid, oavsett område

- Självmordstankar, självmordsplaner eller tidigare försök
- Självskada och autoaggression
- Utövande av våld eller att utsättas för övergrepp (särskilt med barn inblandade)
- Realitetsbrist (hallucinationer, vanföreställningar)
- Allvarliga sömn-, ät- eller funktionsstörningar som pågått i veckor

Ångest och stress

- Somatiska symtom utan medicinsk förklaring (bröstsmärtor, svimning)
- Bruk av alkohol eller lugnande medel för att dämpa ångest
- Extrem tillbakadragenhet: klienten lämnar inte hemmet

Stämningsläge och känslor

- Ihållande sänkt stämningsläge under flera veckor, anhedoni, hjälplöshet
- Ovanlig upprymdhet, minskat sömnbehov, riskfyllt beteende
- Okontrollerade ilskeutbrott som utgör en fara

Relationer och familj

- Tecken på våld i nära relationer
- Kontrollerande beteende eller hot i klientens miljö
- Fara för barns omsorgssituation eller trygghet

Trauma och trygghet

- Akuta symtom strax efter en nyligen inträffad traumatisk händelse
- Täta dissociativa tillstånd
- Klienten lever fortfarande under omedelbar fara

Kropp och ätbeteende

- Betydande viktnedgång, matvägran, framkallade kräkningar
- Kompulsiv träning trots skador och utmattning
- Somatiska besvär utan föregående medicinsk utredning

Sorg och förlust

- Den sörjande uttrycker en önskan om att dö, vill »följa efter« den avlidne
- Ihållande bristande vardagsfunktion under flera månader
- Bruk av alkohol eller droger för att döva smärtan