



Models with NF : RealNVP

Real-valued Non-Volume Preserving; [Din](#)

- 1. 역변환이 쉬워야 한다.



(a) Forward propagation



(b) Inverse propagation

$$\begin{cases} \mathbf{y}_{1:d} &= \mathbf{x}_{1:d} \\ \mathbf{y}_{d+1:D} &= \mathbf{x}_{d+1:D} \odot \exp(s(\mathbf{x}_{1:d})) + t(\mathbf{x}_{1:d}) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mathbf{x}_{1:d} &= \mathbf{y}_{1:d} \\ \mathbf{x}_{d+1:D} &= (\mathbf{y}_{d+1:D} - t(\mathbf{y}_{1:d})) \odot \exp(-s(\mathbf{y}_{1:d})) \end{cases}$$

$$\mathbf{y}_{1:d} = \mathbf{x}_{1:d}$$

$$\mathbf{y}_{d+1:D} = \mathbf{x}_{d+1:D} \odot \exp(s(\mathbf{x}_{1:d})) + t(\mathbf{x}_{1:d})$$

Models with NF : RealNVP

Real-valued Non-Volume Preserving; [Dinh et al., 2017](#)

- 2. 자코비안 행렬식이 계산하기 쉬워야 한다.

원래 자코비안 행렬식은 계산하기 어렵지만, lower triangular matrix로 주어진다면
=> product of diagonal elements => 계산이 쉬워진다.

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbb{I}_d & \mathbf{0}_{d \times (D-d)} \\ \frac{\partial \mathbf{y}_{d+1:D}}{\partial \mathbf{x}_{1:d}} & \text{diag}(\exp(s(\mathbf{x}_{1:d}))) \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{J}) = \prod_{j=1}^{D-d} \exp(s(\mathbf{x}_{1:d}))_j = \exp\left(\sum_{j=1}^{D-d} s(\mathbf{x}_{1:d})_j\right)$$