

Jacobian matrix

$$\begin{aligned} p_i(\mathbf{z}_i) &= p_{i-1}(f_i^{-1}(\mathbf{z}_i)) \left| \det \frac{df_i^{-1}}{d\mathbf{z}_i} \right| \\ &= p_{i-1}(\mathbf{z}_{i-1}) \left| \det \left(\frac{df_i}{d\mathbf{z}_{i-1}} \right)^{-1} \right| \\ &= p_{i-1}(\mathbf{z}_{i-1}) \left| \det \frac{df_i}{d\mathbf{z}_{i-1}} \right|^{-1} \end{aligned}$$

$$\log p_i(\mathbf{z}_i) = \log p_{i-1}(\mathbf{z}_{i-1}) - \log \left| \det \frac{df_i}{d\mathbf{z}_{i-1}} \right|$$

결론

- $f(x)$ 를 잘 만들면 $p(z)$ 를 만들 수 있다.

조건 1. f 는 가역적이어야 한다.

조건 2. 자코비안 행렬식이 쉬운 계산.
triangular matrix

\Rightarrow det계산이 diagonal elements의 곱으로
타난다.

이러한 행렬이 coupling layers로 불림.

$$p(\mathbf{X}) = \pi(f^{-1}(\mathbf{X})) \left| \det \frac{df^{-1}}{d\mathbf{X}} \right|$$

$$\begin{aligned} p_i(\mathbf{z}_i) &= p_{i-1}(f_i^{-1}(\mathbf{z}_i)) \left| \det \frac{df_i^{-1}}{d\mathbf{z}_i} \right| \\ &= p_{i-1}(\mathbf{z}_{i-1}) \left| \det \left(\frac{df_i}{d\mathbf{z}_{i-1}} \right)^{-1} \right| \\ &= p_{i-1}(\mathbf{z}_{i-1}) \left| \det \frac{df_i}{d\mathbf{z}_{i-1}} \right|^{-1} \\ &= \log p_{i-1}(\mathbf{z}_{i-1}) - \log \left| \det \frac{df_i}{d\mathbf{z}_{i-1}} \right| \end{aligned}$$