

Cálculo diferencial de funções de várias variáveis
Instituto de Matemática e Estatística
Universidade Federal Fluminense

Begoña Alarcón Rioco Kamei

February 4, 2022



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License](#)

Índice

Introdução	5
Capítulo 1: Funções vetoriais de uma variável	6
Capítulo 2: Funções escalares de várias variáveis	7
Domínio, imagem e gráfico	8
Exemplos	10
Exercícios	11
Curvas de nível	15
Exemplos	16
Exercícios	23
Superfícies de nível	26
Exemplos	27
Exercícios	28
Topologia em \mathbb{R}^n	30
Exemplos	33
Exercícios	38
Conceito e propriedades de limites	41
Exemplos	43
Exercícios	44
Cálculo de limites. Continuidade	46
Exemplos	47
Exercícios	50
Derivadas Parciais	52
Exemplos	55
Exercícios	60
Diferenciabilidade. Plano tangente	63
Exemplos	66
Exercícios	71
Aproximação linear de funções	72
Exemplos	75
Exercícios	78
Derivadas Parciais de Ordem Superior	
Aproximação não linear	81
Exemplos	83
Exercícios	87
Regra da Cadeia e Derivação Implícita	89
Exemplos	94
Exercícios	100

Lista de Figuras

1	Domínio e imagem de uma função real de uma variável real	8
2	Gráfico de uma função real de uma variável real	9
3	Domínio e imagem de uma função real de duas variáveis reais	9
4	Gráfico de uma função real de duas variáveis reais	9
5	Superfície em \mathbb{R}^3 que não é gráfico de uma função	10
6	Domínio e imagem de uma função real de três variáveis reais	10
7	Gráfico da função constante	11
8	Gráfico da função $f(x, y) = x^2 + y^2$	11
9	Domínio da função $f(x, y) = \sqrt{y - x} + \sqrt{1 - y}$	12
10	Relação da curva de nível com o domínio e a imagem da função	15
11	Relação da curva de nível com o gráfico da função	15
12	Gráfico da função $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$	16
13	Curvas de nível da função $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$	17
14	Gráfico da função $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$	17
15	Curvas de nível da função $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$	18
16	Gráfico da função $f(x, y) = 1 - x^2$	19
17	Curvas de nível da função $f(x, y) = 1 - x^2$	19
18	Cilindros parabólicos	19
19	Gráfico da função $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$	20
20	Cones circulares	20
21	Gráfico da função $f(x, y) = y^2 - x^2$	21
22	Curvas de nível da função $f(x, y) = y^2 - x^2$	22
23	Curvas de nível da função $f(x, y) = -\sqrt{4 - x^2 - y^2}$ que passa pelo ponto $(0, \sqrt{3})$ (em roxo)	23
24	Relação da superfície de nível com o domínio e a imagem da função	26
25	Superfície de nível $k = 1$ da função $f(x, y, z) = x^2 + y^2$	27
26	Superfície de nível $k < 0$ (azul), $k = 0$ (amarelo) e $k > 0$ (vermelho) da função $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$	28
27	Gráfico 3D com as superfícies de nível da função $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$	28
28	Bola de centro P e raio $r > 0$ em \mathbb{R}	30
29	Bola de centro P e raio $r > 0$ em \mathbb{R}^2	30
30	Bola de centro P e raio $r > 0$ em \mathbb{R}^3	31
31	Conjuntos abertos em \mathbb{R}^2	31
32	Bola fechada em \mathbb{R}	31
33	Bola fechada em \mathbb{R}^2	32
34	Interior (esquerda) e exterior (direita) de uma elipse	33
35	Interior (esquerda) e exterior (direita) de um polígono	33
36	Conjunto dado por $x^2 - y^2 > 0$ (esquerda) e $x^2 - y^2 < 0$ (direita)	33
37	Bola furada em \mathbb{R}^2	34
38	Elipse	34
39	Polígono	34
40	Conjuntos dados por $x^2 - y^2 = 0$, $x^2 - y^2 \leq 0$, $x^2 - y^2 \geq 0$, $4 \leq x^2 + y^2 \leq 9$ (respectivamente de esquerda a direita)	35

41	Conjuntos dados por $4 < x^2 + y^2 \leq 9$	35
42	intervalos limitados com mesma fronteira	35
43	Fronteira de bola aberta e de bola fechada em \mathbb{R}^2	36
44	Fronteira de bola aberta e de bola fechada em \mathbb{R}^3	36
45	Pontos de acumulação no interior e nos extremos do intervalo	36
46	Pontos de acumulação em intervalos furados	36
47	Ponto de acumulação da bola fechada furada em \mathbb{R}^2	37
48	Pontos de acumulação em conjuntos fechados de \mathbb{R}^2	37
49	Pontos de acumulação em conjuntos abertos de \mathbb{R}^2	38
50	Limite de uma função definida em \mathbb{R}^2	41
51	Continuidade da função composta	47
52	Domínio função $f(x, y) = \ln \frac{x-y}{x^2+y^2}$	49
53	Continuidade da função composta	49
54	Segmento interseção $C_1 : y = b, x \in I$	52
55	Segmento interseção $C_2 : x = a, y \in J$ e $C_1 : y = b, x \in I$	53
56	Interpretação geométrica das derivadas parciais	54
57	Tabela lei dos gases ideais	55
58	Plano tangente a G_f em $(a, b, f(a, b))$	65
59	O plano tangente contém as duas retas tangentes.	66
60	Diferencial de uma função de uma variável	74
61	Diferencial de uma função de duas variáveis	75
62	Vetor gradiente	89
63	Composição de funções	90
64	Vetor gradiente de $f(x, y) = 2 \arctan \frac{x}{y}$ no ponto $(1, 1)$	94

Introdução

Apostila da disciplina Cálculo 2B (GMA) e Cálculo 2B Especial (GAN).

Foram digitalizadas e aprimoradas as antigas notas manuscritas de Rioco Kamei (professora aposentada da UFF) tornado o conteúdo mais moderno, flexível e fácil de adaptar a qualquer modalidade de ensino: a distância, presencial ou híbrido.

Foram incorporados conteúdos mais aplicados às ciências e engenharias, por exemplo, uma visão das derivadas parciais como taxas de variação ou dar uma estimativa (linear ou quadrática) de uma lei a partir de dados experimentais, entre outros.

Foram incorporadas interpretações geométricas de alguns elementos como a diferencial de uma função de uma e de duas variáveis.

Esse texto faz parte dos recursos educacionais digitais que estão sendo elaborados e coletados na plataforma

<https://redmatuff.github.io/calculovariavariaveis/>

Agradecemos imensamente a forte colaboração da monitora Maria Américo na digitalização de textos e criação das figuras. Sem o trabalho dela não teria sido possível escrever esta apostila.

Também agradecemos a Rioco Kamei pela gentileza de emprestar para nós suas notas de aula.

Se você é aluno e tem sugestões para aprimorar o texto: apresentação do conteúdo, figuras, mais exemplos, etc não duvide em entrar em contato comigo!! Pensem que este texto é para vocês, alunos. Façam dele um lugar aconchegante para vocês!

Email de contato: balarcon@id.uff.br

Dedicado a todos os alunos que me inspiraram e a todos os alunos que encontrarem neste texto um canal de aprendizagem de cálculo de funções de várias variáveis.



Capítulo 1: Funções vetoriais de uma variável

Em andamento....

Capítulo 2: Funções escalares de várias variáveis



Domínio, imagem e gráfico

Objetivos:

- Compreender a noção de função escalar de várias variáveis, domínio, imagem e gráfico;
- Calcular e esboçar os conjuntos domínio, imagem e gráfico;

Uma função real de n variáveis é uma função do tipo $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, que associa a cada n -upla $(x_1, \dots, x_n) \in D$ um único número $w = f(x_1, \dots, x_n)$. O conjunto D é o domínio da função; a imagem da função é dada pelo conjunto

$$Im(f) = \{w = f(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}; (x_1, \dots, x_n) \in D\} = f(D) \subset \mathbb{R}$$

e o conjunto

$$G_f = \{(x_1, \dots, x_n, w) \in \mathbb{R}^{n+1}; w = f(x_1, \dots, x_n), (x_1, \dots, x_n) \in D\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$$

é o gráfico da função.

Observações:

- (I) Se $n = 1 \implies f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função real de uma variável.




Figure 1: Domínio e imagem de uma função real de uma variável real

Temos:

- (i) D é o domínio da função
- (ii) $Imf = \{y = f(x) \in \mathbb{R}; x \in D\} \subset \mathbb{R}$
- (iii) $G_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y = f(x), x \in D\} \subset \mathbb{R}^2$




Figure 2: Gráfico de uma função real de uma variável real




Figure 3: Domínio e imagem de uma função real de duas variáveis reais

(II) Se $n = 2 \Rightarrow f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \in D \mapsto z = f(x, y) \in \mathbb{R}$, é uma função real de duas variáveis.

Temos que:

- (i) $D = \text{domínio da função}$
- (ii) $\text{Im } f = f(D) = \{z = f(x, y) \in \mathbb{R}; (x, y) \in D\} \subset \mathbb{R}$
- (iii) $G_f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = f(x, y), (x, y) \in D\} \subset \mathbb{R}^3$




Figure 4: Gráfico de uma função real de duas variáveis reais

Atenção: Nem toda superfície do \mathbb{R}^3 é gráfico de alguma função $f(x, y)$. Com efeito, seja $S : x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{2}$ (esfera de raio 1 e centro $(0, 0, 1)$).

Dado (x, y) no interior do disco $D : x^2 + y^2 \leq 1$, temos que a reta paralela ao eixo z , passando por (x, y) , intercepta S em dois pontos distintos. Logo, S não pode ser gráfico de uma função de x e y .




Figure 5: Superfície em \mathbb{R}^3 que não é gráfico de uma função

- (III) Se $n = 3 \Rightarrow f : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z) \in D \mapsto w = f(x, y, z) \in \mathbb{R}$ é uma função real de três variáveis.




Figure 6: Domínio e imagem de uma função real de três variáveis reais

Temos que:

- (i) $D = \text{domínio da função}$
- (ii) $Im f = f(D) = \{w = f(x, y, z) \in \mathbb{R}; (x, y, z) \in D\} \subset \mathbb{R}^4$
- (iii) $G_f = (x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4; w = f(x, y, z), (x, y, z) \in D\} \subset \mathbb{R}^4$

Atenção: Como $G_f \subset \mathbb{R}^4$, é impossível desenhá-lo.

Exemplos

- Função Constante: Seja $f(x, y) = c$, $c \in \mathbb{R}$.


Temos $D_f = \mathbb{R}^2$, $Im f = \{c\}$, $G_f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = c, (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$

- Função polinomial: Seja $f(x, y) = x^2 + y^2$. Calcule,

- (a) $f(-1, 2)$ (b) $f(a, +b, a - b)$ (c) D_f (d) $Im f$ (e) G_f

Solução

(a) $f(-1, 2) = (-1)^2 + 2^2 = 1 + 4 = 5$

**Figure 7: Gráfico da função constante**

(b) $f(a+b, a-b) = (a+b)^2 + (a-b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 + a^2 - 2ab + b^2 = 2a^2 + 2b^2$


(c) $D_f = \mathbb{R}^2$

(d) $Im_f = [0, +\infty[$

(e) $G_f : z = f(x, y) \implies G_f : z = x^2 + y^2$ (paraboloide circular)

Impondo $x = 0$, obtemos $z = x^2$, de forma que no plano yz a interseção do G_f é uma parábola. Se tomarmos $z = k$ ($k > 0$) obteremos $x^2 + y^2 = k$. Isto significa que os traços ou cortes horizontais são circunferências.

Assim, o esboço do G_f é:

**Figure 8: Gráfico da função $f(x, y) = x^2 + y^2$**

3. Seja $f(x, y) = \sqrt{y-x} + \sqrt{1-y}$. Esboce o domínio da função.

Solução

A função f está bem definida se os radicandos $y-x$ e $1-y$ não forem negativos, isto é: $y-x \geq 0$ e $1-y \geq 0 \iff y \geq x$ e $y \leq 1$. Portanto, o domínio de f é dado por onde: $D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y \geq x\}$ e $D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y \leq 1\}$.

Exercícios

1. Seja $f(x, y) = \ln(x+y-1)$. Determine:
 - $f(1, 1)$
 - $f(e, 1)$
 - o domínio de f
 - a imagem de f
2. Seja $f(x, y) = \sqrt{36 - 9x^2 - 4y^2}$. Determine:
 - o domínio de f




Figure 9: Domínio da função $f(x, y) = \sqrt{y - x} + \sqrt{1 - y}$

- (b) a imagem de f
 (c) o gráfico de f .

3. Seja $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2-1}}$. Determine:
 (a) $f(1, 3, -4)$
 (b) o domínio de f
 (c) a imagem de f .


4. Determine e faça o esboço do domínio das funções
 (a) $f(x, y) = \frac{5 \ln(x+y)}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$
 (b) $f(x, y, z) = \ln(16 - 4x^2 - 4y^2 - z^2)$

5. Esboce o gráfico da função
 (a) $f(x, y) = 2$
 (b) $f(x, y) = 1 - x - y$
 (c) $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$
 (d) $f(x, y) = 1 - x^2$
 (e) $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - 16y^2}$
 (f) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$
 (g) $f(x, y) = y^2 - x^2$
 (h) $f(x, y) = \frac{1}{x^2+y^2}$

Respostas


1. (a) 0 (b) 1

- $$(c) \quad \{(x, y); x + y > 1\}$$




(d) \mathbb{R}

2. (a) $\left\{(x, y); \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1\right\}$

(b) $[0, 6]$

(c) $G_f : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{36} = 1, z \geq 0$



3. (a) $\frac{1}{5}$


(b) $\{(x, y, z); x^2 + y^2 + z^2 > 1\}$

(c) $[0, +\infty[$


4. (a) $(x, y); x^2 + y^2 < 4ey > -x$

(b) $(x, y, z); \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{16} < 1$


5. (a) $G_f : z = 2$ (plano horizontal)




(b) $x + y + z = 1$ (plano)




(c) $z = 4 - x^2 - y^2$ (paraboloide)




(d) $G_f : z = 1 - x^2$ (cilindro parabólico)





(e) $G_f : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{36} = 1, z \geq 0$



(f) $G_f : z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (parte superior do cone)



(g) $G_f : z = y^2 - x^2$ (paraboloide hiperbólico) (h) $G_f : z = \frac{1}{x^2+y^2}$





Curvas de nível

Objetivos:

- Compreender a noção de curvas de nível e sua relação com o domínio, imagem e gráfico da função;
- Calcular e identificar a curva de nível que passa por um dado ponto.
- Esboçar curvas de nível; Mapa de contorno.

Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \in D \mapsto z = f(x, y) \in \mathbb{R}$

Seja $k \in \text{Im } f$, o conjunto $C_k = \{(x, y) \in D; f(x, y) = k\} \subset D \subset \mathbb{R}^2$ é dito curva de nível de f no nível k .




Figure 10: Relação da curva de nível com o domínio e a imagem da função

Observe que a curva $f(C_k)$ (imagem da curva de nível C_k pela função $f(x, y)$) é a curva interseção do gráfico da função f com o plano $z = k$.




Figure 11: Relação da curva de nível com o gráfico da função

Observações:

- (I) $C_k \subset D \subset \mathbb{R}^2$, $f(C_k) \subset G_f \subset \mathbb{R}^3$
- (II) Se $f(x, y)$ é a temperatura no ponto (x, y) , então C_k é uma isoterna (pontos de mesma temperatura)
- (III) Se f é energia potencial, então C_k é uma curva equipotencial.

Exemplos

1. Seja $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$. Determine:

- (a) D_f
- (b) Imf
- (c) G_f
- (d) curvas de nível C_k .

Solução

- (a) $D_f = \mathbb{R}^2$
- (b) $Imf =]-\infty, 1]$
- (c) $G_f : z = 1 - x^2 - y^2$. Vamos utilizar traços para esboçar G_f . Impondo $x = 0$, obtemos $z = 1 - y^2$, de modo que a interseção do G_f com plano yz ($x = 0$) é uma parábola. Impondo $z = 0$, obtemos o traço $x^2 + y^2 = 1$, que corresponde a uma circunferência no plano xy . Assim, temos a forma da superfície que é chamada de paraboloide.




Figure 12: Gráfico da função $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$

- (d) Seja $k \in Imf =]-\infty, 1]$. Então, a curva de nível C_k é dada por

$$C_k : 1 - x^2 - y^2 = k \implies C_k : x^2 + y^2 = 1 - k$$

Para $k = 1$, temos $C_1 : x^2 + y^2 = 0 \implies x = 0, y = 0$. Logo, $C_1 = \{(0, 0)\}$.

Para $k < 1$, donde $1 - k > 0$, temos $C_k : x^2 + y^2 = (\sqrt{1 - k})^2$. Assim, as curvas de nível ($k < 1$) são circunferências concêntricas de centro na origem e raio $\sqrt{1 - k}$.




Figure 13: Curvas de nível da função $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$

2. Seja $z = f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$. Determine:

- (a) D_f
- (b) Imf
- (c) G_f
- (d) curvas de nível C_k .

Solução

- (a) $D_f : 1 - x^2 - y^2 \geq 0 \Rightarrow D_f : x^2 + y^2 \leq 1$ (disco de centro em $(0, 0)$ e raio 1)
- (b) $Imf = [0, 1]$
- (c) $G_f : z = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \Rightarrow G_f : z^2 = 1 - x^2 - y^2, z \geq 0 \Rightarrow G_f : x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ (hemisfério superior de centro em $(0, 0, 0)$ e raio 1)




Figure 14: Gráfico da função $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$

- (d) Seja $k \in Imf = [0, 1]$. A curva de nível correspondente a $z = k$ é

$$C_k : f(x, y) = k \quad \text{ou} \quad \sqrt{1 - x^2 - y^2} = k \quad \text{ou} \quad x^2 + y^2 = 1 - k^2$$

Para $k = 0$, temos $C_0 : x^2 + y^2 = 1$.

Para $k = 1$, temos $C_1 : x^2 + y^2 = 0$, então $C_1 = \{(0, 0)\}$.

Para k , tal que $0 < k < 1$, temos circunferências concêntricas de centro na origem e raio $\sqrt{1 - k^2}$.




Figure 15: Curvas de nível da função $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$

Observação: $f(x, y) = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \Rightarrow G_f : z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$. Portanto, $G_f : x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \leq 0$ (hemisfério inferior de centro na origem e raio 1).

3. Seja $z = f(x, y) = 1 - x^2$. Determine:

- (a) D_f
- (b) Imf
- (c) G_f
- (d) curvas de nível C_k .

Solução

- (a) $D_f = \mathbb{R}^2$
- (b) $Imf =] -\infty, 1]$
- (c) $G_f : z = 1 - x^2$. Observe que a equação do gráfico, $z = 1 - x^2$, não envolve a variável y . Portanto, qualquer plano vertical $y = k$ (paralelo ao plano xz) intercepta o G_f segundo uma parábola de equação $z = 1 - x^2$. Assim, G_f é obtido tomando a parábola $z = 1 - x^2$ no plano xz e movendo-a na direção do eixo y . A superfície é dita cilindro parabólico.




Figure 16: Gráfico da função $f(x, y) = 1 - x^2$

(d) Seja $k \in Imf =]-\infty, 1]$. A curva de nível correspondente é

$$C_k : 1 - x^2 = k \implies C_k : x^2 = 1 - k > 0 \implies C_k : x = \pm\sqrt{1 - k}$$

Se $k = 1$, temos $C_1 : x = 0$ (eixo y);

Se $k < 1$, temos $C_k = \text{reta } x = \sqrt{1 - k} \quad \text{ou reta } x = -\sqrt{1 - k}$




Figure 17: Curvas de nível da função $f(x, y) = 1 - x^2$

Observação: $f(x, y) = x^2, g(x, y) = a^2 - y^2 \implies G_f \text{ e } G_g \text{ são cilindros parabólicos.}$




Figure 18: Cilindros parabólicos

4. Seja $z = f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Determine:

- (a) D_f
- (b) Imf
- (c) G_f
- (d) curvas de nível C_k .

Solução

- (a) $D_f = \mathbb{R}^2$
- (b) $Imf = [0, +\infty[$
- (c) $G_f : z = \sqrt{x^2 + y^2}$. Fazendo $x = 0$, temos $z = |y|$, que é a curva interseção do G_f com plano yz . Fazendo $z = c$, $c > 0$, temos $x^2 + y^2 = c^2$, de modo que a interseção do G_f com o plano horizontal $z = c$ é uma circunferência. Assim, temos que G_f é a parte superior do cone.




Figure 19: Gráfico da função $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

- (d) Seja $k \in Imf = [0, +\infty[$. Então, a curva de nível correspondente é dada por $C_k : \sqrt{x^2 + y^2} = k$ ou $x^2 + y^2 = k^2$.
Se $k = 0$, temos $C_0 = \{(0, 0)\}$.
Se $k > 0$ temos circunferências concêntricas na origem e raio k .

Observações:

- (i) Os gráficos de $f(x, y) = -\sqrt{x^2 + y^2}$, $f(x, y) = a - \sqrt{x^2 + y^2}$, $f(x, y) = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$, $f(x, y) = \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{3}}$ são partes de cones circulares.




Figure 20: Cones circulares

- (ii) O gráfico de $f(x, y) = \sqrt{ax^2 + by^2}$, $a > 0, b > 0, a \neq b \Rightarrow G_f$ é a parte superior do cone elíptico.

5. Seja, $z = f(x, y) = y^2 - x^2$. Determine:

- (a) D_f
- (b) Imf
- (c) G_f
- (d) curvas de nível C_k .

Solução

- (a) $D_f = \mathbb{R}^2$
- (b) $Imf = \mathbb{R}$
- (c) $G_f : z = y^2 - x^2$. Fazendo $x = 0$, o traço no plano yz é a parábola $z = y^2$ com concavidade para cima. Os traços verticais $y = k$ são parábolas $z = k^2 - x^2$ com concavidade para baixo. Os traços horizontais $z = k$, $k > 0$, são hipérboles $y^2 - x^2 = k$ e os traços horizontais $z = -k$, $k > 0$, são hipérboles $y^2 - x^2 = -k$. Assim, temos o esboço do G_f , dito paraboloide hiperbólico (que tem a forma de uma sela).




Figure 21: Gráfico da função $f(x, y) = y^2 - x^2$

- (d) Seja $k \in Imf = \mathbb{R}$. A curva de nível correspondente é dada por

$$C_k : y^2 - x^2 = k$$

Se $k > 0$, temos hipérboles com vértices $(0, \pm\sqrt{k})$.

Se $k = 0$, temos duas retas pela origem, $y = x$ e $y = -x$.

Se $k < 0$, temos hipérboles com vértices $(\pm\sqrt{-k}, 0)$.




Figure 22: Curvas de nível da função $f(x, y) = y^2 - x^2$

6. Seja, $z = f(x, y) = -\sqrt{4 - x^2 - y^2}$. Determine:

- A curva de nível que passa pelo ponto $(0, \sqrt{3})$.
- A reta tangente à curva de nível do item (a) no ponto $(1, \sqrt{2})$. Identifique o vetor velocidade.
- Esboce em um único gráfico a curva, a reta tangente e a direção do vetor velocidade.

Solução

- Como $f(0, \sqrt{3}) = -1$, então a curva de nível é $-\sqrt{4 - x^2 - y^2} = -1$, isto é, $C_{-1} : x^2 + y^2 = 3$.
- Observe que $f(1, \sqrt{2}) = -1$. portanto $(1, \sqrt{2}) \in C_{-1}$ e faz sentido calcular a reta tangente a C_{-1} nesse ponto. Caso contrário não existiria.

Uma parametrização de C_{-1} é $\gamma : \begin{cases} x(t) = \sqrt{3} \cos t \\ y(t) = \sqrt{3} \sin t \end{cases}, \forall t \in [0, 2\pi]$.

Portanto, a equação paramétrica da reta seria $\gamma(s_0) + \gamma'(s_0)t, \forall t \in \mathbb{R}$, onde s_0 é tal que $\gamma(s_0) = (1, \sqrt{2})$.

Calculando s_0 $\begin{cases} \sqrt{3} \cos s_0 = 1 \\ \sqrt{3} \sin s_0 = \sqrt{2} \end{cases}$ e substituindo na derivada da parametrização, $\gamma' : \begin{cases} x'(t) = -\sqrt{3} \sin t \\ y'(t) = \sqrt{3} \cos t \end{cases}$, temos que $\gamma'(s_0) = (-\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \sqrt{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}})$.

Daí, a equação paramétrica da reta tangente é: $(1, \sqrt{2}) + (-\sqrt{2}, 1)t, \forall t \in \mathbb{R}$.

O vetor velocidade é $\gamma'(s_0) = (-\sqrt{2}, 1)$. A direção dele é $\vec{v} = \frac{\gamma'(s_0)}{\|\gamma'(s_0)\|} = (-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$.

- (c)




Figure 23: Curvas de nível da função $f(x, y) = -\sqrt{4 - x^2 - y^2}$ que passa pelo ponto $(0, \sqrt{3})$ (em roxo)


Exercícios

1. Seja $z = f(x, y) = \sqrt{2y - x^2 - y^2}$. Determine:
 - (a) D_f
 - (b) Imf
 - (c) G_f
 - (d) curvas de nível C_k .
2. Seja $z = f(x, y) = 1 - x^2$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ e $x + y \leq 1$. Determine:
 - (a) D_f
 - (b) Imf
 - (c) G_f
 - (d) curvas de nível C_k .
3. Seja a função $z = f(x, y) = \frac{y}{x-2}$. Determine:
 - (a) D_f
 - (b) Imf
 - (c) curvas de nível C_k .
4. Seja a função $z = f(x, y) = \frac{x^2}{x^2+y^2}$. Determine:
 - (a) D_f
 - (b) Imf
 - (c) curvas de nível C_k .
5. Suponha que $T(x, y) = 4x^2 + 9y^2$ (em C°) represente uma distribuição de temperatura no plano xy . Desenhe a isoterma correspondente à temperatura de $36^\circ C$.


6. Uma chapa plana de metal está situada em um plano xy , de modo que a temperatura (em $^{\circ}$) no ponto (x, y) é inversamente proporcional a distância da origem.
- Descreva as isotermas.
 - Se a temperatura no ponto $P(4, 3)$ é 40°C , ache a equação da isoterma para uma temperatura de 20°C .
 - curvas de nível C_k .
7. Seja, $z = f(x, y) = \frac{x^2+y^2}{2y}$.
- Esboce o mapa de contorno de f .
 - Determine uma equação da reta tangente à curva de nível que passa pelo ponto $(0, 6)$ no ponto $(-3, 3)$. Identifique o vetor velocidade.
 - Identifique a curva de nível do item (b) no mapa de contorno do item (a). Esboce a reta tangente e a direção do vetor velocidade no mapa de contorno.

Respostas


1. (a) $D_f = \{(x, y); x^2 + (y - 1)^2 \leq 1\}$ (d) $C_0 : x^2 + (y - 1)^2 = 1$, $C_1 = \{(0, 1)\}$. Se $0 < k < 1$, temos círculos concêntricos de centro $(0, 1)$ e raio $\sqrt{1 - k^2}$.
- (b) $\text{Im}f = [0, 1]$
- (c) $G_f : x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 1, 0 \leq z \leq 1$, semi-esfera.
2. (a) $D_f :$ (b) $\text{Im}f = [0, 1]$



(c) $G_f :$




(d) $C_k :$



3. (a) $D_f = \{(x, y); x \neq 2\} = \mathbb{R}^2 \setminus \{\text{reta } x = 2\}$

(b) $\text{Im}f = \mathbb{R}$


(c) $C_k : y = k(x - 2), x \neq 2$.



4. (a) $D_f = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$

(b) $Im f = [0, 1]$

(c) $C_0 : x = 0, y \neq 0; \quad C_1 : y = 0, x \neq 0; \quad C_k : y = \pm\sqrt{\frac{1-k}{k}}x, \quad x \neq 0, \quad 0 < k < 1.$





5. $c_{36} : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

6. (a) Circunferências com centro em $(0, 0)$

(b) $x^2 + y^2 = 100$

7. (a)

(c)



(b) Reta tangente a C_3 em $(-3, 3)$ é $(-3, 3) + (0, -3)t, \forall t \in \mathbb{R}$. A direção do vetor velocidade é $\vec{v} = (0, -1)$



Superfícies de nível

Objetivos:

- Compreender a noção de superfícies de nível e sua relação com o domínio e imagem da função.
- Calcular e identificar a superfície de nível que passa por um dado ponto.
- Esboçar as superfícies de nível.

Seja $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D \mapsto w = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}$.

Seja $k \in \mathbb{S}_f$. O conjunto $\mathcal{C}_k = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D; f(x_1, x_2, \dots, x_n) = k\} \subset D \subset \mathbb{R}^n$ é dito conjunto de nível de f no nível k . As curvas de nível são o caso particular $n = 2$.

Quando $n = 3$, os conjuntos de nível se denotam por S_k e se chamam superfície de nível de f no nível k .




Figure 24: Relação da superfície de nível com o domínio e a imagem da função

Observação

- (I) Se $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, então $G_f \subset \mathbb{R}^3$, $C_k \subset D \subset \mathbb{R}^2$, $Imf \subset \mathbb{R}$.
- (II) Se $f : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, então $G_f \subset \mathbb{R}^4$, $S_k \subset D \subset \mathbb{R}^3$, $Imf \subset \mathbb{R}$.
- (III) Se $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, então $G_f \subset \mathbb{R}^{n+1}$, $\mathcal{C}_k \subset D \subset \mathbb{R}^n$, $Imf \subset \mathbb{R}$.

Exemplos

1. Seja $f(x, y, z) = x^2 + y^2$. Determine:
 - (a) D_f
 - (b) $\text{Im } f$
 - (c) a superfície de nível que passa pelo ponto $(1, 0, 0)$

Solução

- (a) $D_f = \mathbb{R}^3$
- (b) $\text{Im } f = [0, +\infty[$
- (c) $f(1, 0, 0) = 1$, então o nível da curva é $k = 1$. Daí, $S_1 : x^2 + y^2 = 1$ é a curva desejada. Como essa equação não envolve a variável z , isso significa que qualquer plano horizontal $z = k$ (paralelo ao plano xy) intercepta o G_f segundo a circunferência $x^2 + y^2 = 1$. Assim, o G_f é obtido tomando-se a circunferência $x^2 + y^2 = 1$, no plano xy e deslocando-a paralelamente ao eixo z . A superfície é dita cilindro circular reto.




Figure 25: Superfície de nível $k = 1$ da função $f(x, y, z) = x^2 + y^2$

2. Seja $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$. Determine:

- (a) D_f
- (b) $\text{Im } f$
- (c) S_k , superfícies de nível

Solução

- (a) $D_f = \mathbb{R}^3$
- (b) $\text{Im } f = \mathbb{R}$
- (c) Seja $k \in \text{Im } f = \mathbb{R}$. Então, a superfície de nível correspondente é

$$S_k : x^2 + y^2 - z^2 = k$$

Se $k = 0$, temos $S_0 : x^2 + y^2 - z^2 = 0$ ou $z^2 = x^2 + y^2$. Fazendo $x = 0$, temos $z = \pm|y|$ e fazendo $z = c$, temos $x^2 + y^2 = c^2$. Logo, temos a forma de S_0 que é um cone.

Se $k > 0$, temos $S_k : x^2 + y^2 - z^2 = k$. Fazendo $x = 0$, temos a hipérbole $y^2 - z^2 = k$ no plano yz de vértices $(0, \sqrt{k}, 0)$ e $(0, -\sqrt{k}, 0)$. Fazendo $z = c$, temos a circunferência $x^2 + y^2 = k + c^2$. Assim, temos a superfície S_k , $k > 0$, dita hiperbolóide de uma folha.

Se $k < 0$ ou $-k > 0$, temos $S_k : z^2 \rightarrow x^2 - y^2 = -k$. Fazendo $x = 0$, temos a hipérbole $z^2 - y^2 = -k$ no plano yz de vértices $(0, 0, \sqrt{-k})$, $(0, 0, -\sqrt{-k})$. Fazendo $z = c$, com $c > \sqrt{-k}$ ou $c < \sqrt{-k}$, temos circunferências $x^2 + y^2 = k + c^2$. Assim, temos a superfície S_k , $k < 0$, dita hiperbolóide de duas folhas.




Figure 26: Superfície de nível $k < 0$ (azul), $k = 0$ (amarelo) e $k > 0$ (vermelho) da função $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$

A versão do mapa de contorno para as superfícies de nível seria um gráfico 3D com as superfícies de nível uma dentro da outra:




Figure 27: Gráfico 3D com as superfícies de nível da função $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$

Exercícios

1. Seja $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$. Determine:

- (a) D_f
 (b) Imf
 (c) superfícies de nível
2. A temperatura em uma região D do \mathbb{R}^3 é dada por $T(x, y, z) = \sqrt{36 - 4x^2 - 9y^2 - z^2}$
 Determine:
 (a) a região D
 (b) ImT
 (c) o conjunto de pontos que possuem a mesma temperatura do que o ponto $(0, 1, \sqrt{2})$
 (d) as isotermas
3. Se a voltagem V no ponto $P(x, y, z)$ é dada por

$$V = \frac{6}{(x^2 + 4y^2 + 9z^2)^{\frac{1}{2}}}$$

Determine:

- (a) domínio de V
 (b) ImV
 (c) as equipotenciais

Respostas

1. (a) $D_f : x^2 + y^2 + z^2 > 1$
 (b) $Imf = \mathbb{R}$
 (c) $S_k : x^2 + y^2 + z^2 = 1 + e^k, \quad k \in \mathbb{R}$, esferas concêntricas de raio $\sqrt{1 + e^k}$ e centro na origem.
2. (a) $D = \left\{ (x, y, z); \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{36} \leqslant 1 \right\}$
 (b) $ImT = [0, 6]$
 (c) $S_5 : 4x^2 + 9y^2 + z^2 = 11$
 (d) $S_0 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{36} = 1, \quad S_6 = \{(0, 0, 0)\}, \quad S_k : 4x^2 + 9y^2 + z^2 = 36 - k^2, \quad 0 < k < 6$, elipsoides concêntricos de centro na origem.
3. (a) $D_V = \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$
 (b) $ImV =]0, +\infty[$
 (c) $S_k : x^2 + 4y^2 + 9z^2 = \frac{36}{k^2}, \quad k > 0$, elipsoides concêntricos de centro na origem.





Topologia em \mathbb{R}^n

Objetivos:

- Compreender a noção de bola aberta; identificar conjuntos abertos, fechados, limitados e compactos.
- Identificar se um conjunto é aberto ou fechado a partir do conjunto fronteira.
- Compreender a definição de pontos fronteira e pontos de acumulação.

Definição 1. A bola aberta de centro $P \in \mathbb{R}^n$ e raio $r > 0$ é o conjunto dos pontos $X \in \mathbb{R}^n$ cuja distância ao ponto P é menor do que r . Indicaremos por $B_r(P)$. Assim,

$$B_r(P) = \{x \in \mathbb{R}^n; \|x - p\| < r\}$$

Quando $n = 1$, a bola aberta $B_r(P)$ de centro P e raio r na reta é o intervalo aberto $[P - r, P + r]$.




Figure 28: Bola de centro P e raio $r > 0$ em \mathbb{R}

Quando $n = 2$, a bola aberta $B_r(P)$ de centro P e raio r no plano \mathbb{R}^2 é o disco aberto. Se $P = (a, b)$, então

$$B_r(a, b) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2; \|(x, y) - (a, b)\| = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < r \right\}$$




Figure 29: Bola de centro P e raio $r > 0$ em \mathbb{R}^2

Quando $n = 3$, a bola aberta $B_r(P)$ de centro $P = (a, b, c)$ e raio r no espaço \mathbb{R}^3 é a esfera aberta

$$B_r(a, b, c) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < r\}$$




Figure 30: Bola de centro P e raio $r > 0$ em \mathbb{R}^3

Definição 2. Seja $D \subset \mathbb{R}^n$. Dizemos que D é um conjunto aberto, se dado $P \in D$ existir uma bola aberta $B_r(P) \subset D$.




Figure 31: Conjuntos abertos em \mathbb{R}^2

Os conjuntos \emptyset , \mathbb{R} , \mathbb{R}^2 , \mathbb{R}^3 e todas as bolas abertas são conjuntos abertos.

Definição 3. Seja $F \subset \mathbb{R}^n$. Dizemos que F é um conjunto fechado, se o complementar dele $D = \mathbb{R}^n \setminus F$ for aberto.

Observação:

(I) Os conjuntos

$$\overline{B_r(P)} = \{x \in \mathbb{R}^n; \|x - p\| \leq r\}$$

são fechados. Eles são chamados de bolas fechadas.





Figure 32: Bola fechada em \mathbb{R}

**Figure 33: Bola fechada em \mathbb{R}^2**

(II) Os únicos conjuntos em \mathbb{R}^n abertos e fechados ao mesmo tempo são \emptyset e \mathbb{R}^n .

Definição 4. Seja $D \subset \mathbb{R}^n$. Um ponto $P \in \mathbb{R}^n$ (pertencente ou não a D) se diz ponto de fronteira de D se toda bola $B_r(P)$ interseca a D e também a seu complemento $\mathbb{R}^n \setminus D$. O conjunto formado por todos os pontos fronteira de D é chamado conjunto fronteira de D e denotado por $Fr(D)$.

Observação:

- (I) Um conjunto é fechado se contém todos os pontos de sua fronteira. Por exemplo, as bolas fechadas.
- (II) Se um conjunto contém pelo menos um ponto fronteira, então não é aberto. Por exemplo, o intervalo $]0, 1]$.

Definição 5. Seja $D \subset \mathbb{R}^n$. Dizemos que D é um conjunto limitado, se existir um raio $r > 0$ tal que $D \subset B_r(0)$.

Dizemos que D é não limitado se para qualquer $r > R_0$, existe algum ponto em D que não pertence a $B_r(0)$.

Observação:

- (I) D também seria limitado se existir um raio $r > 0$ tal que $D \subset \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : |x_i| < r, \forall i = 1, \dots, n\}$. Se $n = 2$, esse conjunto seria um quadrado de lado r .
- (II) As bolas abertas e as bolas fechadas são conjuntos limitados.
- (III) O conjunto da Figura 4 (esquerda) é limitado. Já o conjunto da Figura 4 (direita) é não limitado, pois para qualquer $r > 3$ sempre existirá um ponto $(0, r + 1)$ fora da bola $B_r(0)$.

Definição 6. Seja $D \subset \mathbb{R}^n$. Dizemos que D é um conjunto compacto se for fechado e limitado.

As bolas fechadas são compactas, as bolas abertas não o são.

Definição 7. Seja $D \subset \mathbb{R}^n$. Dizemos que $P \in \mathbb{R}^n$ (pertencente ou não a D) é um ponto de acumulação de D (p.a.) se qualquer bola aberta centrada em P contém pelo menos um ponto $x \in D$, $x \neq P$.

Os extremos de um intervalo aberto em \mathbb{R} são pontos de acumulação.

Exemplos

1. Os seguintes conjuntos são abertos:

- (a) interior e exterior de uma elipse




Figure 34: Interior (esquerda) e exterior (direita) de uma elipse

- (b) interior e exterior de um polígono




Figure 35: Interior (esquerda) e exterior (direita) de um polígono

- (c) conjuntos definidos algebricamente por uma desigualdade. Por exemplo, $x^2 - y^2 > 0$ ou $x^2 - y^2 < 0$.




Figure 36: Conjunto dado por $x^2 - y^2 > 0$ (esquerda) e $x^2 - y^2 < 0$ (direita)

- (d) O conjunto $B_r(a, b, c) \setminus \{(a, b, c)\}$




Figure 37: Bola furada em \mathbb{R}^2

2. Os seguintes conjuntos são fechados:

- (a) uma elipse




Figure 38: Elipse

- (b) um polígono




Figure 39: Polígono

- (c) conjuntos definidos algebraicamente por uma igualdade. Por exemplo, $x^2 - y^2 = 0$, $x^2 - y^2 \leq 0$, $x^2 - y^2 \geq 0$, $4 \leq x^2 + y^2 \leq 9$.




Figure 40: Conjuntos dados por $x^2 - y^2 = 0$, $x^2 - y^2 \leq 0$, $x^2 - y^2 \geq 0$, $4 \leq x^2 + y^2 \leq 9$ (respectivamente de esquerda a direita)

3. Os conjuntos definidos por uma igualdade e uma desigualdade. Por exemplo, $4 < x^2 + y^2 \leq 9$ não são nem abertos nem fechados.




Figure 41: Conjuntos dados por $4 < x^2 + y^2 \leq 9$

4. (a) A fronteira de um intervalo (fechado, aberto, aberto por um lado e fechado por o outro) está formada pelos extremos: $Fr([P - r, P + r]) = Fr([P - r, P + r]) = Fr([P - r, P + r]) = Fr([P - r, P + r]) = \{P - r, P + r\}$.






Figure 42: intervalos limitados com mesma fronteira

- (b) A fronteira das bolas abertas e das bolas fechadas em \mathbb{R}^2 são circunferências: $Fr(B_r(a, b)) = Fr(\overline{B_r(a, b)}) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2\}$

Figure 43: Fronteira de bola aberta e de bola fechada em \mathbb{R}^2

- (c) A fronteira das bolas abertas e das bolas fechadas em \mathbb{R}^3 são esferas: $Fr(B_r(a, b, c)) = Fr(\overline{B_r(a, b, c)}) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2\}$

Figure 44: Fronteira de bola aberta e de bola fechada em \mathbb{R}^3

5. Seja D um intervalo aberto de \mathbb{R} . Sejam $P \in D$ e $Q, R \notin D$.




Figure 45: Pontos de acumulação no interior e nos extremos do intervalo

Vemos que $P \in D$ é um p.a. de D , $Q \notin D$ é também um p.a. de D , mas $R \notin D$ não é um p.a. de D .

6. Seja $D =]a_1, c] \cup]c, b[$.




Figure 46: Pontos de acumulação em intervalos furados

Vemos que $c \notin D$ é um p.a. de D .

7. O ponto (a, b) é de acumulação do conjunto $\overline{B_r(a, b)} \setminus \{(a, b)\}$.




Figure 47: Ponto de acumulação da bola fechada furada em \mathbb{R}^2

8. Considere o conjunto D abaixo:




Figure 48: Pontos de acumulação em conjuntos fechados de \mathbb{R}^2

Temos que $P, Q \in D$ são p.a. de D e $R \notin D$ não é p.a. de D .

9. Considere o conjunto D abaixo:




Figure 49: Pontos de acumulação em conjuntos abertos de \mathbb{R}^2


Temos que $P \notin D$ é um p.a. de D , $Q \in D$ é p.a., $R \notin D$ é p.a. e $S \notin D$ não é p.a.

Exercícios


1. Esboçar e determinar se os seguintes conjuntos são abertos, fechados, limitados e/ou compactos. Calcule os conjuntos fronteira.
 - (a) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy \neq 0\}$.
 - (b) $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0\}$.
 - (c) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y < 1 - x^2\}$.
 - (d) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 1 - x^2\}$.
 - (e) $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 1 - x^2\}$.
 - (f) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 3 < x^2 + y^2 < 9\}$.
 - (g) $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 5 \leq x^2 + y^2 \leq 7\}$.
 - (h) $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 5 \leq x^2 + y^2 < 7\}$.

Respostas


1. (a) aberto, não fechado, não limitado e não compacto. $Fr(A) = \{\text{reta } x = 0\} \cup \{\text{reta } y = 0\} = \{0\} \times \mathbb{R} \cup \mathbb{R} \times \{0\}$.




- (b) não aberto, fechado, não limitado, não compacto. $Fr(B) = \{0\} \times [0, +\infty) \cup [0, +\infty) \times \{0\}$.




- (c) aberto, não fechado, não limitado, não compacto. $Fr(C) = \{(t, 1 - t^2) : t \in \mathbb{R}\}$.




- (d) não aberto, fechado, limitado, compacto. $Fr(D) = \{(t, 1 - t^2) : t \in [-1, 1]\} \cup [-1, 1] \times \{0\}$.




- (e) não aberto, fechado, não limitado, não compacto. $Fr(E) = \{(t, 1 - t^2) : t \in \mathbb{R}\}$.




- (f) aberto, não fechado, limitado, não compacto. $Fr(F) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 3\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 9\}$.



- (g) não aberto, fechado, limitado, compacto. $Fr(G) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 5\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 7\}$.



- (h) não aberto, não fechado, limitado, não compacto. $Fr(H) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 5\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 7\}$





Conceito e propriedades de limites

Objetivos:

- Compreender a noção de limites; propriedades dos limites
- existência e unicidade do limite; limites por caminhos;

Sejam $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $P \in \mathbb{R}^n$ um ponto de acumulação de D . Dizemos que o limite de $f(X)$ quando X tende a P é o número L , e escrevemos

$$\lim_{X \rightarrow P} f(X) = L \quad \text{ou} \quad f(X) \rightarrow L, \quad \text{se } x \rightarrow p$$

quando

$$\lim_{\|x-p\| \rightarrow 0} |f(x) - L| = 0$$

Se o limite existir, ele deve ser único.

Observação: Para $n = 2$, temos $P = (a, b)$, $X = (x, y)$. Então,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L \quad \text{ou} \quad f(x, y) \rightarrow L, \quad \text{se } (x, y) \rightarrow (a, b)$$

quando

$$\lim_{\|(x,y)-(a,b)\| \rightarrow 0} |f(x, y) - L| = 0$$




Figure 50: Limite de uma função definida em \mathbb{R}^2

Isso significa que para cada bola aberta B_1 de centro L , existe uma bola aberta B_2 de centro (a, b) , tal que para todo $(x, y) \in B_2 \subset D$ (exceto provavelmente (a, b)) tem-se $f(x, y) \in B_1 \subset Im f$.

Propriedades

Sejam $\lim_{X \rightarrow P} f(X) = L_1$, $\lim_{X \rightarrow P} g(X) = L_2$ e $k \in \mathbb{R}$.

1. $\lim_{X \rightarrow P} (f(X) \pm g(X)) = L_1 \pm L_2$
2. $\lim_{X \rightarrow P} (kf(X)) = kL_1$
3. $\lim_{X \rightarrow P} (f(X) \cdot g(X)) = L_1 \cdot L_2$
4. $\lim_{X \rightarrow P} \frac{f(X)}{g(X)} = \frac{L_1}{L_2}$, se $L_2 \neq 0$.
5. Se $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\lim_{u \rightarrow L_1} h(u) = L$, então

$$\lim_{X \rightarrow P} h(f(X)) = \lim_{u \rightarrow L_1} h(u) = L$$

Limites por caminhos

Seja $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Se existe o limite $\lim_{X \rightarrow P} f(X) = L$, então o valor do limite ao longo de qualquer caminho também é L , isto é,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (a,b) \\ \text{ao longo de } C}} f(x, y) = \lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha(t)) = L,$$

para qualquer curva C parametrizada por $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ e tal que $\lim_{t \rightarrow t_0} \alpha(t) = P$.

Observação:

(I) Temos o seguinte fato em cálculo de uma variável:

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \exists \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

Portanto, se $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ ⇒ $\nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

(II) Temos o seguinte fato em cálculo de várias variáveis:

$$\exists \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L \Leftrightarrow \exists \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (a,b) \\ \text{ao longo de } C}} f(x, y) = L,$$

para toda curva C passando por (a, b) .

Portanto, se C_1 e C_2 são duas curvas passando por (a, b) tais que

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (a,b) \\ \text{ao longo de } C_1}} f(x, y) \neq \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (a,b) \\ \text{ao longo de } C_2}} f(x, y) \Rightarrow \nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)$$

(II) Se acharmos dois (ou três ou mil) caminhos qualquer C_1 e C_2 tais que

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (a,b) \\ \text{ao longo de } C_1}} f(x,y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (a,b) \\ \text{ao longo de } C_2}} f(x,y) = L,$$

jamais poderemos dizer que $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$, pois poderia se dar o caso de encontrar um outro caminho C_3 com $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (a,b) \\ \text{ao longo de } C_3}} f(x,y) \neq L$. Ver Exemplo 7.

Exemplos

1. Se $f(x,y) = c$ (função constante), então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} c = c$
2. Se $f(x,y) = x$, então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} x = a$
3. Se $f(x,y) = y$, então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} y = b$
4. Seja $f(x,y) = 2xy^2 - x^2y + x - y - 3$. Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} f(x,y)$

Solução

Por propriedades de limite, temos

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} f(x,y) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} 2xy^2 - x^2y + x - y - 3 = \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} 2xy^2 - \lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} x^2y + \lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} x - \lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} y - \lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} 3 = \\ &= 2 \cdot 1 \cdot (-1)^2 - 1^2(-1) + 1 - (-1) - 3 = 2 + 1 + 1 + 1 - 3 = 2 \end{aligned}$$

5. Seja $f(x,y,z) = \frac{x^2+y^2+z^2}{x^2-y^2-1}$. Calcule $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,1)} f(x,y,z)$.

Solução

$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,1)} f(x,y,z) = \frac{0+0+1}{0-0+1} = -1$, já que o limite do denominador não se anula.

6. Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{xy}$.

Solução

Não podemos aplicar nenhuma propriedade, pois $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy = 0$. Então, façamos $u = xy$. Como $(x,y) \rightarrow (0,0)$, então $u \rightarrow 0$. Logo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{xy} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u)}{u} = 1$$

7. Seja f a função definida por $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$.

- (a) Calcule o limite de $f(x, y)$ quando (x, y) tende a $(0, 0)$ ao longo de cada um dos seguintes caminhos:
(i) eixo dos x ; (ii) eixo dos y ; (iii) da reta $y = x$.
- (b) Existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$? Em caso afirmativo, qual o seu valor?

Solução

(a)

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (a,b) \\ \text{ao longo do eixo } x}} f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \cdot 0}{t^2 + 0^2} = 0$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (a,b) \\ \text{ao longo do eixo } y}} f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} f(0, t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0 \cdot t}{0^2 + t^2} = 0$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (a,b) \\ \text{ao longo da reta } y=x}} f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t, t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \cdot t}{t^2 + t^2} = \frac{t^2}{2t^2} = \frac{1}{2}$$

- (b) Observe que o limite ao longo dos eixos é 0, pelo que alguém poderia pensar que o $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$ e estaria errado. Pois o limite ao longo da reta $y = x$ da $\frac{1}{2}$. Não adianta calcular o limite ao longo de um milhão de caminhos, sempre pode (ou não) existir um outro caminho com limite diferente. Se ligue!!

Exercícios

1. Seja f a função definida por $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$.

- (a) Calcule o limite de $f(x, y)$ quando (x, y) tende a $(0, 0)$ ao longo de cada um dos seguintes caminhos:
(i) eixo dos x ; (ii) eixo dos y ; (iii) da reta $y = x$.
- (b) Existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$? Em caso afirmativo, qual o seu valor?

2. Calcule, se possível, os seguintes limites:

(a) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{\tan(x^2 + y^2 + z^2)}{x^2 + y^2 + z^2}$

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

(c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$

(d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$

$$(e) \lim_{(x,y,z) \rightarrow (2,1,0)} \frac{(x+y+z-3)^5}{z^3(x-2)(y-1)}$$

$$(f) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \ln (3x^2 + 3y^2)$$

$$(g) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\in (1+xy) \operatorname{sen} xy}{xy}$$

$$(h) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\operatorname{sen} (2x) \tan (xy)}{x^2 y}$$

$$(i) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$(j) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \operatorname{sen}^2 x}{x^2 + y^4}$$

$$(k) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y}$$

Respostas

- | | | | |
|----|------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | (a) (i) 1 ; (ii) -1; (iii) 0 | | |
| | (b) não existe | | |
| 2. | (a) 1 | (d) 2 | (g) 0 |
| | (b) não existe | (e) não existe | (h) 2 |
| | (c) não existe | (f) 0 | (i) 0 |
| | | | (j) 0 |
| | | | (k) não existe |





Cálculo de limites. Continuidade

Objetivos:

- teorema do confronto; teorema do anulamento;
 - coordenadas polares;
 - continuidade
-

Teorema do Confronto: Se $f(x, y) \leq g(x, y) \leq h(x, y)$ em $B_r(a, b)$ e se $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} h(x, y) = L$, então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y) = L$.

Teorema do Anulamento: Se $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = 0$ e $g(x, y)$ é limitada em $B_r(a, b)$, isto é, se $|g(x, y)| \leq M$, $\forall (x, y) \in B_r(a, b)$, então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)g(x, y) = 0$.

Observação

$$(I) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = 0 \iff \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} |f(x, y)| = 0.$$

(II) Podemos calcular o limite passando a coordenadas polares

$$x = \rho \cos \theta \quad y = \rho \sin \theta$$

Por exemplo:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \cos(x^2 + y^2) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho \sin \theta \cos(\rho) = 0,$$

pois $|\rho \sin \theta \cos(\rho)| \leq \rho$ para todo θ .

Continuidade: Sejam $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $P \in D$, ponto de acumulação de D . Dizemos que f é contínua em P se

$$\lim_{x \rightarrow P} f(x) = f(P)$$

Se f for contínua em todos os pontos de D , dizemos que f é contínua.

Propriedades: Sejam $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ contínuas em $P \in D$. Então as seguintes funções também são contínuas em P :

- (a) $f \pm g$
 (b) $f \cdot g$
 (c) $\frac{f}{g}$, desde que $g(P) \neq 0$

Observações:

- (I) Uma função polinomial de duas variáveis é uma soma de termos da forma $cx^n y^m$, com $c \in \mathbb{R}$, inteiros não negativos. Portanto, usando propriedades de funções contínuas, segue que toda função polinomial é contínua em \mathbb{R}^2 .
- (II) Analogamente, as funções polinomiais de n variáveis são contínuas em \mathbb{R}^n .
- (III) Uma função racional é o quociente de duas funções polinomiais. Portanto, toda função racional é contínua nos pontos onde o denominador não se anula, isto é, em seu domínio.

Teorema: Sejam $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : E \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tais que $Im f \subset E$. Se f for contínua em p e g contínua em $f(p)$, então a composta $h = g \circ f$ é contínua em p .




Figure 51: Continuidade da função composta

Exemplos

1. Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \operatorname{sen} \frac{1}{x^2 + y^2}$, se existir.

Solução: Temos

$$0 < \left| x \operatorname{sen} \frac{1}{x^2 + y^2} \right| = |x| \underbrace{\left| \operatorname{sen} \frac{1}{x^2 + y^2} \right|}_{\leq 1} \leq |x|$$

Como $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| = 0 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0$, então pelo Teorema do Confronto, temos
 $\lim \left| x \operatorname{sen} \frac{1}{x^2+y^2} \right| = 0$, donde $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \operatorname{sen} \frac{1}{x^2+y^2} = 0$

2. Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^3}{x^2 + y^2}$, se existir.

Solução: Temos que $0 \leq y^2 \leq y^2 + x^2$, pelo que $\left| \frac{y^2}{y^2 + x^2} \right| \leq 1$. Aliás,
 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y = 0$, então pelo Teorema do Anulamento,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^3}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \frac{y^2}{x^2 + y^2} = 0$$

3. Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \ln(x^2 + y^2)$, se existir.

Solução: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \ln(x^2 + y^2) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho \operatorname{sen} \theta \ln(\rho^2) = 0$, pois

$$|\rho \operatorname{sen} \theta \ln(\rho^2)| \leq \rho \ln(\rho^2)$$

e $\lim_{\rho \rightarrow 0} \rho \ln(\rho^2) = 0$ aplicando L'Hopital.

4. Seja $f(x, y)$ contínua, então $\operatorname{sen}(f(x, y))$, $\ln(f(x, y))$, $\sqrt{f(x, y)}$ são funções contínuas.

5. Seja $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^2y}{3x^2+3y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

Determine o conjunto dos pontos de continuidade de f.

Solução: Observemos que $D_f = \mathbb{R}^2$. Por propriedades de continuidade, segue que f é contínua em $(x, y) \neq (0, 0)$. Ora, Vimos na Aula 4, Exemplo 4, que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$. Logo, f é contínua em \mathbb{R}^2 .

6. Determine o conjunto dos pontos de continuidade de $f(x, y) = \ln \frac{x-y}{x^2+y^2}$.

Solução: O domínio de f é determinado pela desigualdade $\frac{x-y}{x^2+y^2} > 0$, $(x, y) \neq (0, 0)$, donde $x > y$. Então, $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x > y\}$




Figure 52: Domínio função $f(x, y) = \ln \frac{x-y}{x^2+y^2}$

A função f é a composta das funções $h(u) = \ln u$ e $g(x, y) = \frac{x-y}{x^2+y^2}$. Como $g(x, y) = \frac{x-y}{x^2+y^2}$ é contínua em D_f por ser racional e $h(u) = \ln u$ é contínua em \mathbb{R}^+ por ser logarítmica, então a composta $f = h \circ g$ é contínua em D_f .

7. Determine o conjunto dos pontos de continuidade de

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2 + 1, & , \text{ se } x^2 + y^2 \leq 4 \\ 0, & \text{se } x^2 + y^2 > 4 \end{cases}$$

Solução: Temos $D_f = D_1 \cup D_2 \cup C$, onde $D_1 : x^2 + y^2 > 4$, $D_2 : x^2 + y^2 < 4$ e $C : x^2 + y^2 = 4$.

Temos:

- i f é contínua em D_1 , pois $f(x, y) = 0$ (função constante) em D_1 ;
- ii f é contínua em D_2 , pois $f(x, y)$ é uma função polinomial em D_2 ;
- iii Temos $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1 = 4 + 1 = 5$ em C . Seja $(a, b) \in C$.

Então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = 5$ ao longo de C . Seja C_1 uma curva passando por (a, b) e contida em D_1 . Logo, $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = 0 \neq 5$, ao longo de C_1 .

Assim, f não é contínua em C e portanto, o conjunto de continuidade de f é $D_1 \cup D_2 = \mathbb{R}^2 - \{(x, y); x^2 + y^2 = 4\}$.




Figure 53: Continuidade da função composta

Exercícios

1. Calcule, se possível, os seguintes limites:

$$(a) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$(b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^3 - 2x^2y + 3y^2x - 2y^3}{x^2 + y^2}$$

$$(c) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} e^{\frac{x^3}{x^2+y^4}}$$

$$(d) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \arccos \frac{x}{x+y}$$

$$(e) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sec \frac{\pi(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$$

$$(f) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \operatorname{sen}^2 x}{x^2 + y^4}$$

$$(g) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \text{ por coordenadas polares.}$$

2. Sabendo que: $1 - \frac{x^3y^2}{3} \leq \frac{\operatorname{arctan}(xy)}{xy} < 1$. Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\operatorname{arctan}(xy)}{xy}$

3. A função $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$ é contínua em $(0,0)$?

4. A função $f(x,y) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen}(xy)}{xy}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$ é contínua em $(0,0)$?

5. Determine o conjunto dos pontos de continuidade de

$$(a) f(x,y) = \ln \frac{x+y}{x^2-y^2}$$

$$(b) f(x,y) = \sqrt{y - \frac{1}{x}}$$

6. Discuta a continuidade das funções abaixo:

$$(a) f(x,y) = \frac{x^4y^2}{x^8+y^4}, \text{ se } (x,y) \neq (0,0); f(0,0) = 0$$

$$(b) f(x,y) = \frac{\operatorname{sen}(x^2+y^2)}{1-\cos \sqrt{x^2+y^2}}, \text{ se } (x,y) \neq (0,0); f(0,0) = 2$$

$$(c) f(x,y) = \frac{y^4+3x^2y^2+2yx^3}{(x^2+y^2)^2}, \text{ se } (x,y) \neq (0,0); f(0,0) = 0$$

$$(d) f(x,y) = e^{\frac{1}{x^2+y^2-1}}, \text{ se } x^2 + y^2 < 1; f(x,y) = 0, \text{ se } x^2 + y^2 \geq 1.$$

7. Calcule o valor de k para que a função dada seja contínua em $(0, 0)$:

(a) $f(x, y) = (x^2 + y^2) \operatorname{sen} \frac{1}{xy}$, $(x, y) \neq (0, 0)$ e $f(0, 0) = k$

(b) $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{\sqrt{y^2 + 1} - 1}$, $(x, y) \neq (0, 0)$ e $f(0, 0) = k - 4$.


8. Seja $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$, $(x, y) \neq (0, 0)$ e $f(0, 0) = 0$. Determine $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$

Respostas

1. (a) 0

5. (a) $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $y < x$, $x \neq -y$

(b) 0




(c) 1

(d) $\pi/3$

(e) 1

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq \frac{1}{x}, x > 0 \text{ ou } y \leq \frac{1}{x}, x < 0\}$

(f) 0



(g) 0

2. 1.

6. (a) Não é em $(0, 0)$

(b) É em \mathbb{R}^2

(c) Não é em $(0, 0)$

(d) É em \mathbb{R}^2

3. Não

7. (a) $k = 0$

(b) $k = 4$

4. Não

8. 0; -1





Derivadas Parciais

Objetivos:

- definição e interpretação geométrica das derivadas parciais;
- cálculo das derivadas parciais;
- derivada parcial como taxa de variação;

Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função definida no conjunto aberto $D \subset \mathbb{R}^2$. Seja $(a, b) \in D$.




Figure 54: Segmento interseção $C_1 : y = b, x \in I$

Fixando $y = b$, obtemos o segmento interseção $C_1 : y = b, x \in I$. A função $g(x) = f(x, b), x \in I$, é bem definida em C_1 . A derivada de g em $x = a$ seria dada por

$$\begin{aligned} g'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a + h) - g(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x, b) - f(a, b)}{x - a} \end{aligned}$$

se existir o limite. Essa derivada é dita derivada parcial de f em relação a x no ponto (a, b) é indicada por:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \text{ ou } f_x(a, b) \text{ ou } \frac{\partial z}{\partial x}(a, b) \text{ ou } z_x(a, b).$$

Então,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = f_x(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h} = \lim_{n \rightarrow a} \frac{f(x, b) - f(a, b)}{x - a},$$

se o limite existir. Caso contrário diremos que a parcial não existe.

Analogamente, definimos a derivada parcial de f em relação a y , no ponto (a, b) , por

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = f_y(a, b) = \frac{\partial z}{\partial y}(a, b) = z_y(a, b) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(a, b + k) - f(a, b)}{k} = \lim_{y \rightarrow b} \frac{f(a, y) - f(a, b)}{y - b},$$

se o limite existir. Caso contrário diremos que a parcial não existe.

Interpretação geométrica de $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$: Geometricamente, estamos fazendo a restrição de f sobre a reta $y = b$ e olhando para a curva correspondente $f(C_1)$, sobre o gráfico de f . Dessa maneira, o número $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = g'(a)$ é o coeficiente angular da reta tangente à curva $f(C_1)$ no ponto $(a, b, f(a, b))$. Isto é $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \tan \alpha$.

Interpretação geométrica de $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$: Geometricamente, temos que $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$ é o coeficiente angular da reta tangente à curva $f(C_2)$ obtida como a interseção do G_f com o plano $x = a$, no ponto $(a, b, f(a, b))$. Isto é, $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = \tan \beta$.




Figure 55: Segmento interseção $C_2 : x = a, y \in J$ e $C_1 : y = b, x \in I$




Figure 56: Interpretação geométrica das derivadas parciais

Derivadas parciais como taxas de variação: Como $f_x(a, b)$ é a inclinação da reta tangente à curva $f(C_1)$ no ponto $(a, b, f(a, b))$, também pode ser interpretada como a taxa de variação da função f em relação a x no ponto (a, b) (ao longo da curva C_1).

Com efeito, $f_x(a, b)$ é a taxa de variação instantânea da função $g(x) = f(x, b)$, $x \in I$, no ponto $x = a$. Como tal, ela pode ser aproximada por taxas de variação médias:

$$f_x(a, b) \approx \frac{1}{2} \left[\frac{f(a + h_1, b) - f(a, b)}{h_1} + \frac{f(a + h_2, b) - f(a, b)}{h_2} \right],$$

com $a + h_1 < a < a + h_2$.

Analogamente, $f_y(a, b)$ é a taxa de variação da função f em relação a y no ponto (a, b) (ao longo da curva C_2). Como tal, ela pode ser aproximada por taxas de variação médias:

$$f_y(a, b) \approx \frac{1}{2} \left[\frac{f(a, b + k_1) - f(a, b)}{k_1} + \frac{f(a, b + k_2) - f(a, b)}{k_2} \right],$$

com $b + k_1 < b < b + k_2$.

Regra prática para calcular as parciais: Para calcular $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$, faz-se y constante e deriva-se f em relação a x e para calcular $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$, faz-se x constante e deriva-se f em relação a y .

Por exemplo, se $f(x, y) = x^3y^2$, então $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2y^2$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2yx^3$.

Derivadas parciais de funções de três variáveis: Sejam $f : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, D aberto, e $(a, b, c) \in D$. Definimos:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b, c) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x, b, c) - f(a, b, c)}{\Delta x}, \text{ se o limite existir.}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b, c) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(a, b + \Delta y, c) - f(a, b, c)}{\Delta y}, \text{ se o limite existir.}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(a, b, c) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(a, b, c + \Delta z) - f(a, b, c)}{\Delta z}, \text{ se o limite existir.}$$

Na hora de calcular $\frac{\partial f}{\partial z}$, faz-se x e y constantes e deriva-se f em relação a z . Analogamente para calcular $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Exemplos

- Seja $f(x, y) = x$. Calcule $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ pela definição.

Solução

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x + h - x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, y + k) - f(x, y)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{x - x}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} 0 = 0$$

- Seja $f(x, y) = y$. Calcule $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ pela definição.

Solução

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y - y}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, y + k) - f(x, y)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{y + k - y}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} 1 = 1$$

- De acordo com a lei dos gases ideais, a pressão está relacionada com a temperatura e o volume de um gás. Suponha que o volume V seja medido em litros (l) e a temperatura T seja medida em kelvins (K). Use a tabela a seguir para:

		Temperatura K°			
		10,00	30,00	50,00	70,00
Volume L	20,00	10,00	30,00	50,00	70,00
	40,00	5,00	15,00	25,00	35,00
	60,00	3,33	10,00	16,67	23,33
	80,00	2,50	7,50	12,50	17,50

Figure 57: Tabela lei dos gases ideais

- obter uma estimativa da taxa de variação instantânea da pressão em relação à temperatura se a temperatura for 50 K e o volume permanecer constante em 60 l;
- obter uma estimativa da taxa de variação instantânea da pressão em relação ao volume se a temperatura permanecer constante a 30 K e o volume for 40 l;

- (c) A pressão aumenta ou diminui em relação à temperatura? E em relação ao volume?

Solução

(a) Dado que $\frac{\partial P}{\partial T}(T_0, V_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(T_0 + h, V_0)}{h}$, a taxa de variação pode ser estimada considerando a média das taxas de variação média com, por exemplo, $h_1 = 20$ e $h_2 = -20$. Com efeito,

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial T}(50, 60) &\approx \frac{1}{2} \left(\frac{P(50 + 20, 60) - P(50, 60)}{20} + \frac{P(50 - 20, 60) - P(50, 60)}{-20} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{420 - 16.67}{20} + \frac{10 - 16.67}{-20} \right) = \frac{1}{2}(20.17 + 0.33) = 10.25\end{aligned}$$

(b) Dado que $\frac{\partial P}{\partial V}(T_0, V_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(T_0, V_0 + h)}{h}$, a taxa de variação considerada pode ser estimada considerando a média das taxas de variação média com, por exemplo, $h_1 = 20$ e $h_2 = -20$. Com efeito,

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial V}(30, 40) &\approx \frac{1}{2} \left(\frac{P(30, 40 + 20) - P(30, 40)}{20} + \frac{P(30, 40 - 20) - P(30, 40)}{-20} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{10 - 15}{20} + \frac{20 - 15}{-20} \right) = \frac{1}{2}(-0.25 + (-0.25)) = -0.50\end{aligned}$$

(c) Como $\frac{\partial P}{\partial T}(50, 60) > 0$, a pressão aumenta em relação à temperatura quando o volume é constante $V = 60$ e a temperatura pega o valor de 50K. Já em relação ao volume quando a temperatura é constante a $T = 30$ e o volume pega o valor de 40L a pressão diminui, pois $\frac{\partial P}{\partial V}(30, 40) < 0$.

Observamos que, segundo os dados da tabela, quando afixamos o volume e percorremos os valores da temperatura a pressão sempre aumenta. Porem, se fixamos a temperatura e percorremos os valores do volume, a pressão diminui.

4. Seja $f(x, y) = 2xy - 3y$. Calcule

(a) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$

(b) $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$

(c) $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1)$

(d) $\frac{\partial f}{\partial y}(-1, 1)$.

Solução

(a) Mantendo y constante e derivando em relação a x , temos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(2xy - 3y) = \frac{\partial}{\partial x}(2xy) - \frac{\partial}{\partial x}(3y) = 2y - 0 = 2y$$

(b) Mantendo x constante e derivando em relação a y , temos:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(2xy - 3y) = \frac{\partial}{\partial y}(2xy) - \frac{\partial}{\partial y}(3y) = 2x - 3$$

(c) Como $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2y$, para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, então $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = 2$.

(d) Como $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2x - 3$, para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, então $\frac{\partial f}{\partial y}(-1, 1) = -5$.

5. Calcule as derivadas parciais de $z = x^2 \ln(x^2 + y^2)$.

Solução

Mantendo y constante e usando regras de derivação para as funções de uma variável, como $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, temos

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(x^2) \ln(x^2 + y^2) + x^2 \frac{\partial}{\partial x} \ln(x^2 + y^2) = 2x \ln(x^2 + y^2) + x^2 \cdot \frac{\frac{\partial}{\partial x}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \\ &= 2x \ln(x^2 + y^2) + x^2 \cdot \frac{2x}{x^2 + y^2} = 2x \ln(x^2 + y^2) + \frac{2x^3}{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

Analogamente, mantendo x constante, temos

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x^2 \frac{\partial}{\partial y} \ln(x^2 + y^2) = x^2 \cdot \frac{\frac{\partial}{\partial y}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = x^2 \cdot \frac{2y}{x^2 + y^2} = \frac{2x^2 y}{x^2 + y^2}$$

6. Calcule a equação da reta tangente à curva de interseção do paraboloide $z = 2x^2 + 3y^2$ e o plano $x = 1$ no ponto $(1, 2, 14)$.

Solução Observe que a função $f(x, y) = 2x^2 + 3y^2$ é diferenciável no ponto $(1, 2)$ por ser polinomial e que o ponto $(1, 2, 14)$ pertence à interseção de G_f e o plano $x = 1$. Portanto, o coeficiente angular da reta tangente será $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = 6y|_{(1,2)} = 6 \cdot 2 = 12$. Logo, a equação da reta tangente é:

$$\begin{cases} z = 14 + 12(y - 2) \\ x = 1 \end{cases}$$

7. Calcule a equação da reta tangente à curva de interseção da superfície $x^2+y^2+z^2=5$ e o plano $y=0$ no ponto $(2, 0, -1)$.

Solução Como a terceira coordenada do ponto $(2, 0, -1)$ é negativa, consideraremos a função $f(x, y) = -\sqrt{5 - x^2 - y^2}$, que é diferenciável em $(2, 0)$ por ser polinomial. O ponto $(1, 0, -1)$ pertence à interseção de G_f e o plano $y=0$, portanto, o coeficiente angular da reta tangente será $\frac{\partial f}{\partial x}(2, 0) = -2x|_{(2,0)} = -2 \cdot 2 = -4$. Logo, a equação da reta tangente é:

$$\begin{cases} z = -1 - 4(x - 2) \\ y = 0 \end{cases}$$

8. Seja $f(x, y) = \frac{y^3}{x^2 + y^2}$, se $(x, y) \neq (0, 0)$ e $f(x, y) = 0$, se $(x, y) = (0, 0)$. Calcule $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.

Solução

Nos pontos $(x, y) \neq (0, 0)$, aplicamos regras de derivação. Então,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{-y^3 \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-2xy^3}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{3y^2(x^2 + y^2) - y^3 \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{3x^2y^2 + 3y^4 - 2y^4}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{3x^2y^2 + y^4}{(x^2 + y^2)^2}$$

Em $(x, y) = (0, 0)$, usamos a definição. Temos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{k^3}{k^2} - 0}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} 1 = 1.$$

Portanto, temos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \begin{cases} \frac{-2xy^3}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2y^2 + y^4}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

9. Seja $f(x, y, z) = \int_0^{x+y^2+z^4} g(t)dt$, onde $g(3) = 4$. Calcule $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1, 1)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1, 1)$ e $\frac{\partial f}{\partial z}(1, 1, 1)$.

Solução

Aqui, usaremos a seguinte aplicação do Teorema Fundamental do Cálculo: "Se $F(x) = \int_a^{\alpha(x)} f(t)dt$, então $F'(x) = f(\alpha(x)) \cdot \alpha'(x)''$.

Logo,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = g(x + y^2 + z^4) \frac{\partial}{\partial x}(x + y^2 + z^4) = g(x + y^2 + z^4) \cdot 1 = g(x + y^2 + z^4)$$

Assim,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1, 1) = g(1 + 1 + 1) = g(3) = 4$$

Temos,

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = g(x + y^2 + z^4) \frac{\partial}{\partial y}(x + y^2 + z^4) = g(x + y^2 + z^4) \cdot 2y,$$

$$\text{donde } \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1, 1) = g(3) \cdot 2 = 8.$$

Temos,

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = g(x + y^2 + z^4) \frac{\partial}{\partial z}(x + y^2 + z^4) = g(x + y^2 + z^4) \cdot 4z^3,$$

$$\text{donde } \frac{\partial f}{\partial z}(1, 1, 1) = g(3) \cdot 4 = 16$$

10. Seja $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável e seja $f(x, y) = (x^2 + y^2) \phi\left(\frac{x}{y}\right)$.

$$\text{Mostre que } x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 2f.$$

Solução

Temos

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x\phi\left(\frac{x}{y}\right) + (x^2 + y^2)\phi'\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{y}\right) = 2x\phi\left(\frac{x}{y}\right) + (x^2 + y^2)\phi'\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \frac{1}{y},$$

$$\text{donde } x \frac{\partial f}{\partial x} = 2x^2\phi\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{x}{y}(x^2 + y^2)\phi'\left(\frac{x}{y}\right).$$

Temos,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= 2y\phi\left(\frac{x}{y}\right) + (x^2 + y^2)\phi'\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x}{y}\right) \\ &= 2y\phi\left(\frac{x}{y}\right) + (x^2 + y^2)\phi'\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = 2y\phi\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{x}{y^2}(x^2 + y^2)\phi'\left(\frac{x}{y}\right), \end{aligned}$$

onde, $y \frac{\partial f}{\partial y} = 2y^2 \phi\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{x}{y} (x^2 + y^2) \phi'\left(\frac{x}{y}\right)$

Somando as duas expressões das parciais, temos

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 2(x^2 + y^2) \phi\left(\frac{x}{y}\right) = 2f$$

como queríamos mostrar.

11. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável e seja g dada por $g(x, y, z) = f(r)$, onde $r = \|(x, y, z)\|$. Verifique

$$\frac{\partial g}{\partial x} + y \frac{\partial g}{\partial y} + z \frac{\partial g}{\partial z} = rf'(r).$$

Solução

Temos

$$g(x, y, z) = f(r), r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Então,

$$\frac{\partial g}{\partial x} = f'(r) \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = f'(r) \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = f'(r) \frac{x}{r}$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = f'(r) \cdot \frac{\partial r}{\partial y} = f'(r) \cdot \frac{2y}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = f'(r) \frac{y}{r}$$

$$\frac{\partial g}{\partial z} = f'(r) \cdot \frac{\partial r}{\partial z} = f'(r) \cdot \frac{2z}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = f'(r) \frac{z}{r}$$

$$x \frac{\partial g}{\partial x} + y \frac{\partial g}{\partial y} + z \frac{\partial g}{\partial z} = f'(r) \frac{x^2}{r} + f'(r) \frac{y^2}{r} + f'(r) \frac{z^2}{r}$$

$$= f'(r) \frac{x^2 + y^2 + z^2}{r} = f'(r) \frac{r^2}{r} = rf'(r)$$

Como queríamos verificar.

Exercícios

1. Determine as derivadas parciais da função:

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^2 + 3}$

(b) $f(x, y) = \arctan \frac{y}{x}$

(c) $f(x, y) = \int_{x^2}^{y^2} e^{-t^2} dt$

(d) $z = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + y^2} \right)$

(e) $\omega = xe^{x-y-z}$

2. A altura h de ondas em mar aberto depende da velocidade do vento v e do tempo t durante o qual o vento se manteve naquela intensidade. Os valores da função $h = f(v, t)$ são apresentados na seguinte tabela.

		Duração (horas)						
		5	10	15	20	30	40	50
Velocidade do vento (km/h)	20	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	30	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
	40	1,5	2,2	2,4	2,5	2,7	2,8	2,8
	60	2,8	4,0	4,9	5,2	5,5	5,8	5,9
	80	4,3	6,4	7,7	8,6	9,5	10,1	10,2
	100	5,8	8,9	11,0	12,2	13,8	14,7	15,3
	120	7,4	11,3	14,4	16,6	19,0	20,5	21,1

- (a) segundo a tabela, a qual taxa (estimada) varia a altura das ondas em relação à velocidade do vento quando dita velocidade é de 30 km/h e sabendo que o vento se mantém na mesma intensidade por um tempo de 20 horas? Justifique a resposta.
- (b) segundo a tabela, a qual taxa (estimada) varia a altura das ondas em relação ao tempo no qual o vento se mantém na mesma intensidade se dito tempo é de 20 horas e sabendo que a velocidade do vento permanece constante a 30 km/h ? Justifique a resposta.
- (c) nas condições do item (a) e (b), a altura das ondas aumenta ou diminui em relação ao tempo? E em relação à velocidade do vento? Justifique a resposta.
3. Use as derivadas parciais para encontrar, se possível, a equação da reta tangente à curva interseção do plano $x = \pi$ com a superfície $z = \frac{2y}{y + \cos x}$ nos pontos $P(\pi, 2, 4)$, $Q(2\pi, 1, 1)$ e $R(\pi, 0, 1)$.
4. Seja $z = f(x^2 - y^2)$, onde $f(u)$ é uma função diferenciável de uma variável. Verifique que
- $$y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$
5. Seja $f(x, y) = x^3y^2 - 6xy + \phi(y)$. Determine uma função ϕ , de modo que $\frac{\partial f}{\partial y} = 2x^3y - 6x + \frac{y}{y^2+1}$.
6. Seja $f(x, y) = \frac{5xy^2}{x^2 + y^2}$ se $(x, y) \neq (0, 0)$ e $f(x, y) = 0$ se $(x, y) = (0, 0)$. Calcule $f(1, 2) - \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$.

7. Seja $f(x, y) = \frac{x^4}{x^2 + y^2}$, $(x, y) \neq (0, 0)$, $f(x, y) = 0$, $(x, y) = (0, 0)$. Determine $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$.

Respostas

1. (a) $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x^2}{\sqrt[3]{(x^3+y^2+3)^2}}$, $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{\sqrt[3]{(x^3+y^2+3)^2}}$
 (b) $f_x = \frac{-y}{x^2+y^2}$, $f_y = \frac{x}{x^2+y^2}$
 (c) $\frac{\partial f}{\partial x} = -2xe^{-x^4}$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 2ye^{-y^4}$
 (d) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{x^2+y^2+x\sqrt{x^2+y^2}}$
 (e) $\frac{\partial \omega}{\partial x} = (1+x)e^{x-y-z}$, $\frac{\partial \omega}{\partial y} = -xe^{x-y-z}$, $\frac{\partial \omega}{\partial z} = -xe^{x-y-z}$
2. (a) $0,095 \text{ km/h}$
 (b) 0 km/h^2
 (c) Aumenta em relação ao tempo e permanece constante em relação a velocidade do vento.
3. A reta tangente no ponto P é $\begin{cases} z = 8 - 2y \\ x = \pi \end{cases}$ e não existe nos pontos Q e R.
4. $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial f}{\partial y} = -2y$ e $\frac{\partial f}{\partial z} = 0$.
5. $\phi(y) = \frac{1}{2} \ln(1+y^2)$
6. $\frac{12}{5}$
7. $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^5+4x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} \frac{-2x^4y}{(x^2+y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.





Diferenciabilidade. Plano tangente.

Objetivos:

- diferenciabilidade de uma função de duas ou três variáveis;
 - funções de classe C^1 ; condição suficiente para uma função ser diferenciável;
 - equações cartesianas do plano tangente ao gráfico da função em um ponto;
 - equações paramétricas da reta normal ao gráfico da função em um ponto;
-

Diferenciabilidade: Lembrando o conceito de diferenciabilidade em funções de uma variável.

Sejam $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida no aberto $D \subset \mathbb{R}$ e $a \in D$ um ponto no domínio. Dizemos que f é diferenciável em a se o seguinte limite existir

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Temos, portanto

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) &\Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(a+h) - f(a)}{h} - f'(a) \right] = 0 \\ &\Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - f'(a)h}{h} = 0 \Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varepsilon(h)}{h} = 0 \end{aligned}$$

Onde,

$$\varepsilon(h) = f(a+h) - f(a) - f'(a)h$$

Essa definição sugere a seguinte definição de diferenciabilidade para funções de duas variáveis.

Definição 1: Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida no aberto $D \subset \mathbb{R}^2$. Seja $(a, b) \in D$. Dizemos que f é diferenciável em (a, b) se existirem $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$, tais que

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{\varepsilon(h, k)}{\|(h, k)\|} = 0,$$

onde

$$\varepsilon(h, k) = f(a+h, b+k) - f(a, b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)h - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)k.$$

Definição 2: Dizemos que $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável no aberto $A \subset D$ se for

diferenciável em todos os pontos $(a, b) \in A$. Em particular, dizemos que f é diferenciável se for diferenciável no domínio aberto D .

Exemplo: Mostre que $f(x, y) = xy$ é diferenciável em \mathbb{R}^2 .

Com efeito, seja $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, temos $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = b$, $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = a$. Portanto,

$$\begin{aligned}\varepsilon(h, k) &= f(a + h, b + k) - f(a, b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)h - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)k = \\ &= (a + h)(b + k) - ab - bh - ak = ab + ak + bh + hk - ab - bh - ak = hk\end{aligned}$$

Donde

$$\frac{\varepsilon(h, k)}{\|(h, k)\|} = \frac{hk}{\sqrt{h^2 + k^2}} = h \cdot \frac{k}{\sqrt{h^2 + k^2}}$$

Temos

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} h = 0 \quad \text{e} \quad \left| \frac{k}{\sqrt{h^2 + k^2}} \right| = \frac{|k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \frac{\sqrt{|k|^2}}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \sqrt{\frac{k^2}{h^2 + k^2}} \leq \sqrt{\frac{h^2 + k^2}{h^2 + k^2}} = 1$$

Então, pelo teorema do anulamento, temos $\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{\varepsilon(h, k)}{\|(h, k)\|} = 0$ Portanto, $f(x, y) = xy$ é diferenciável em $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Como (a, b) é arbitrário, segue que f é diferenciável em \mathbb{R}^2 .

Teorema 1: Se f é diferenciável em $(a, b) \Rightarrow f$, então f é contínua em (a, b) .

Teorema 2: Sejam $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida no aberto $D \subset \mathbb{R}^2$ e $(a, b) \in D$. Se existirem $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ em um aberto contendo (a, b) e forem contínuas em (a, b) , então f é diferenciável em (a, b) .

Definição 2: Dizemos que f é de classe C^1 no aberto $A \subset D$ se as funções $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ forem contínuas em todos os pontos $(a, b) \in A$.

Observações:

- O limite da Definição 1 é equivalente a

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{f(x, y) - f(a, b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)}{\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}} = 0$$

e a

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(a + \Delta x, b + \Delta y) - f(a, b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)\Delta x - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

- Se uma das derivadas parciais não existir em (a, b) , então f não é diferenciável em (a, b) .

3. Se $\exists \frac{\partial f}{\partial x}(a, b), \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$ e $\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{\varepsilon(h, k)}{\|(h, k)\|} \neq 0$ ou se $\nexists \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{\varepsilon(h, k)}{\|(h, k)\|}$, então f não é diferenciável em (a, b) .
4. Em particular, se para algum caminho C_1 , $\lim_{\substack{(h,k) \rightarrow (0,0) \\ \text{ao longo de } C_1}} \frac{\varepsilon(h, k)}{\|(h, k)\|}$ for diferente de zero ou não existir, então f não é diferenciável em (a, b) .
5. f não é contínua em $(a, b) \Rightarrow f$ não é diferenciável em (a, b) .
6. Se $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, D aberto, for de classe C^1 em D , então f é diferenciável (em todo o domínio D).

Plano tangente e Reta normal: Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida no aberto $D \subset \mathbb{R}^2$ e diferenciável em $(a, b) \in D$.

O plano de equação

$$z - f(a, b) = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)$$

é denominado plano tangente ao G_f , gráfico de f , no ponto $(a, b, f(a, b))$.




Figure 58: Plano tangente a G_f em $(a, b, f(a, b))$

Da equação do plano temos que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - a) - (z - f(a, b)) = 0$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x}(a, b), \frac{\partial f}{\partial y}(a, b), -1 \right)}_{\vec{N}} \cdot \underbrace{(x - a, y - b, z - f(a, b))}_{\text{vetor do plano tangente}} = 0$$

Logo, $\vec{N} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a, b), \frac{\partial f}{\partial y}(a, b), -1 \right)$ é um vetor normal ao plano tangente no ponto $(a, b, f(a, b))$.

A reta que passa por $(a, b, f(a, b))$ e é paralela ao vetor \vec{N} é dita reta normal ao gráfico de f no ponto $(a, b, f(a, b))$. A equação paramétrica da reta normal é:

$$(x, y, z) - (a, b, f(a, b)) = \lambda \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a, b), \frac{\partial f}{\partial y}(a, b), -1 \right), \lambda \in \mathbb{R}$$

Observação: O plano tangente à superfície $z = f(x, y)$ no ponto $P = (a, b, f(a, b))$ contém as duas retas tangentes T_1 e T_2 à curva interseção da superfície com os planos $x = a$ e $y = b$, respectivamente.




Figure 59: O plano tangente contém as duas retas tangentes.

Exemplos

- Seja $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, (x, y) \in \mathbb{R}^2$. f é diferenciável em $(0, 0)$?

Solução

Temos $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}$ não existe.

Logo, pelo item 1 das Observações , concluímos que f não é diferenciável em $(0, 0)$.

- Mostre que a recíproca do teorema 1 é falsa.

Solução

Considere a função $f(x, y) = \frac{y^3}{x^2+y^2}$, $(x, y) \neq (0, 0)$; $f(x, y) = 0$, $(x, y) = (0, 0)$.

Temos $f(x, y) = \frac{y^3}{x^2+y^2} = y \cdot \frac{y^2}{x^2+y^2}$, onde $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y = 0$ e $\left| \frac{y^2}{x^2+y^2} \right| = \frac{y^2}{x^2+y^2} \leq \frac{x^2+y^2}{x^2+y^2} = 1$, donde $\frac{y^2}{x^2+y^2}$ é limitada.

Logo, pelo corolário do teorema do confronto, segue que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$$

Portanto, f é continua em $(0,0)$.

Ora, na aula de Derivadas Parciais, exercício 5, vimos que $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$, $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 1$.

Logo,

$$\frac{\varepsilon(h_1k)}{\|(h_1k)\|} = \frac{f(h_1k) - f(0,0) - 0 \cdot h - 1 \cdot k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \frac{\frac{k^3}{h^2+k^2} - k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \frac{-h^2k}{(h^2 + k^2)\sqrt{h^2 + k^2}} = g(h,k).$$

Consideremos o conjunto $C_1 : h = 0, k \neq 0$. Então, $g(h,k) = g(0,k) = 0$ em C_1 , donde $\lim_{\substack{(h,k) \rightarrow (0,0) \\ \text{ao longo de } C_1}} g(h,k) = 0$.

Consideremos o conjunto $C_2 : k = h, h \neq 0$.

Então, $g(h,k) = g(h,h) = \frac{-h^3}{2h^2\sqrt{2h^2}} = \frac{-h}{2\sqrt{2}|h|}$, donde $\nexists \lim_{\substack{(h,k) \rightarrow (0,0) \\ \text{ao longo de } C_2}} g(h,k)$.

Portanto, $\nexists \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{\varepsilon(h,k)}{\|(h,k)\|}$ e, assim f não é diferenciável em $(0,0)$.

3. $f(x,y) = 3x^2y - 2xy^2 - 5xy + 4x - 2y + 1$ é diferenciável em \mathbb{R}^2 , pois $\frac{\partial f}{\partial x} = 6xy - 2y^2 - 5y + 4$ e $\frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2 - 4xy - 5x - 2$ são funções contínuas em \mathbb{R}^2 .

4. A função $f(x,y) = \cos(x^2 + y^2)$ é diferenciável em \mathbb{R}^2 , pois $\frac{\partial f}{\partial x} = -2x \sin(x^2 + y^2)$ e $\frac{\partial f}{\partial y} = -2y \sin(x^2 + y^2)$ são contínuas em \mathbb{R}^2

5. A função $f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$, $(x,y) \neq (0,0)$, $f(x,y) = 0$, $(x,y) = (0,0)$ é diferenciável em $(0,0)$?

Solução

Seja $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$, $(x,y) \neq (0,0)$ e $C_1 : y = 0, x \neq 0$. Temos $f(x,y) = f(x,0) = 0$ em C_1 . Logo, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$ ao longo de C_1 .

Seja $C_2 : x = 0, y \neq 0$. Temos $f(x,y) = f(0,y) = 0$ em C_2 . Logo, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$ ao longo de C_2 . Seja $C_3 : y = x, x \neq 0$. Temos $f(x,y) = f(x,x) = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$ em C_3 . Logo, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \frac{1}{2}$ ao longo de C_3 . Como os limites não coincidem, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ não existe.

Portanto f não é contínua em $(0,0)$. Logo, pelo teorema 1 , segue que f não é diferenciável em $(0,0)$.

6. Mostre que a função $f(x, y) = \frac{x^4}{x^2 + y^2}$ se $(x, y) \neq (0, 0)$ e $f(x, y) = 0$ se $(x, y) = (0, 0)$ é diferenciável em \mathbb{R}^2 .

Solução

No exercício 7 , da aula de Derivadas Parciais , temos onde

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \begin{cases} \frac{-2x^5 + 4x^3y^2}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} \frac{-2x^4y}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

As funções $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ são contínuas em $(x, y) \neq (0, 0)$, pois são funções racionais.

Em $(x, y) = (0, 0)$, temos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{2x^5 + 4x^3y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2x^5}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{4x^3y^2}{(x^2 + y^2)^2} = 2x \cdot \frac{x^4}{(x^2 + y^2)^2} + 2x \cdot \frac{2x^2y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

onde $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 2x = 0$, e as funções $\frac{x^4}{(x^2 + y^2)^2}$ e $\frac{2x^2y^2}{(x^2 + y^2)^2}$ são limitadas por 1 .

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{-2x^4y}{(x^2 + y^2)^2} = -2y \cdot \frac{x^4}{(x^2 + y^2)^2},$$

onde $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (-2y) = 0$ e a função $\frac{x^4}{(x^2 + y^2)^2}$ é limitada por 1.

Assim, pelo teorema do anulamento, temos $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$

e $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$.

Logo, $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ são contínuas em \mathbb{R}^2 e pelo teorema 2, concluímos que f é diferenciável (em \mathbb{R}^2).

7. Determine as equações do plano tangente e da reta normal ao gráfico de $f(x, y) = 2x^2y$ no ponto $(1, 1, f(1, 1))$.

Solução:

Equação do plano tangente:

$$z - f(1, 1) = \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1)(x - 1) \rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1)(y - 1)$$

onde

$$\begin{cases} f(1, 1) = 2 \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 4xy \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = 4 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2x^2 \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = 2 \end{cases}$$

Logo, a equação do plano tangente é:

$$z - 2 = 4(x - 1) + 2(y - 1) \text{ ou } 4x + 2y - z = 4$$

Equação da reta normal:

$$(x, y, z) = (1, 1, 2) + \lambda(4, 2, -1), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

8. Determine o plano que passa pelos pontos $(1, 1, 2)$ e $(-1, 1, 1)$ e que seja tangente ao gráfico de $f(x, y) = xy$.

Solução

Seja $(a, b) \in D_f = \mathbb{R}^2$. A equação do plano tangente ao G_f no ponto $(a, b, f(a, b)) = (a, b, ab)$ é :

$$z - f(a, b) = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)$$

onde $z = ab + b(x - a) + a(y - b)$ ou $z = bx + ay - ab$.

Como $(1, 1, 2)$ e $(-1, 1, 1)$ estão neste plano, então

$$\begin{cases} 2 = b + a - ab \\ 1 = -b + a - ab \end{cases}$$

$(1) - (2) \Rightarrow 1 = 2b \Rightarrow b = \frac{1}{2}$. Substituindo $b = \frac{1}{2}$ em (1) , temos $2 = \frac{1}{2} + a - \frac{a}{2}$, donde $a = 3$. Assim, a equação do plano tangente é:

$$z = \frac{1}{2}x + 3y - \frac{3}{2} \text{ on } x + 6y - 2z = 3$$

9. Seja $f(x, y) = \frac{x^4y}{x^2+y^2}, (x, y) \neq (0, 0)$ e $f(x, y) = 0, (x, y) = (0, 0)$.

- (a) Calcule $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$.
- (b) f é diferenciável em $(0, 0)$?
- (c) f é contínua em $(0, 0)$.

Solução

- (a) Temos $f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$, $f_y(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} 0 = 0$.

(b) Temos $\varepsilon(h_1k) = f(h, k) - f(0, 0) - f_x(0, 0)h - f_y(0, 0)k = \frac{h^4k}{h^2+k^2} - 0 - 0 \cdot h - 0 \cdot k = \frac{h^4k}{h^2+k^2}$.

Donde,

$$\frac{\varepsilon(h_1k)}{\|(h, k)\|} = \frac{\frac{h^4k}{h^2+k^2}}{\sqrt{h^2+k^2}} = \frac{h^4k}{(h^2+k^2)\sqrt{h^2+k^2}} = h^2 \cdot \frac{h^2}{h^2+k^2} \cdot \frac{k}{\sqrt{h^2+k^2}}$$

onde,

$$\begin{aligned} \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{h^2}{h^2+k^2} \right| &= \frac{h^2}{h^2+k^2} \leq \frac{h^2+k^2}{h^2+k^2} = 1, \quad \left| \frac{k}{\sqrt{h^2+k^2}} \right| = \frac{|k|}{\sqrt{h^2+k^2}} \\ &= \sqrt{\frac{|k|^2}{h^2+k^2}} = \sqrt{\frac{k^2}{h^2+k^2}} \leq \sqrt{\frac{h^2+k^2}{h^2+k^2}} = 1. \end{aligned}$$

Logo, pelo teorema do anulamento, segue que

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{\varepsilon(h, k)}{\|(h, k)\|} = 0$$

portanto, f é diferenciável em $(0, 0)$.

(c) Se f é diferenciável em $(0, 0)$, então f contínua em $(0, 0)$.

10. Considere a superfície S de equação $z = 2x^2 + 2y^2$.

- (a) Determine o ponto $P_0 \in S$, tal que o plano tangente aS em P_0 seja ortogonal ao vetor $V = (0, 1, -\frac{1}{6})$.
- (b) Escreva a equação do plano tangente referido no item (a).

Solução

(a) a equação do plano tangente aS em $P_0 = (a, b, z(a, b)) = (a, b, 2a^2 + 2b^2)$ é:

$$z = z(a, b) + z_x(a, b)(x - a) + z_y(a, b)(y - b)$$

onde,

$$z_x(a, b) = 4x|_{(a,b)} = 4a \quad \text{e} \quad z_y(a, b) = 4y|_{(a,b)} = 4b$$

Temos então,

$$z = 2a^2 + 2b^2 + 4ax - 4a^2 + 4by - 4b^2$$

ou seja,

$$4ax + 4by - z = 2a^2 + 2b^2$$

Daí, concluímos que $(4a, 4b, -1)$ é um vetor ortogonal ao plano tangente a S em P_0 . Como queremos que plano tangente a S em P_0 seja ortogonal ao vetor $V = (0, 1, -\frac{1}{6})$, então

$$(4a, 4b, -1) // \left(0, 1, -\frac{1}{6}\right)$$

ou seja, $(4a, 4b, -1) = \lambda (0, 1, -\frac{1}{6})$, para algum $\lambda \in \mathbb{R}$.

Logo, $4a = 0$, $4b = \lambda$, $-1 = -\frac{\lambda}{6}$. Donde, $a = 0$, $\lambda = 6$ e $b = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$.

Então, o ponto P_0 é dado por $P_0 = (0, \frac{3}{2}, 2, \frac{9}{4}) = (0, \frac{3}{2}, \frac{9}{2})$.

(b) A equação do plano tangente é:

$$6y - z = \frac{9}{2} \quad \text{ou} \quad 12y - 2z - 9 = 0$$

Exercícios

1. Seja $f(x, y) = \frac{3x^5}{x^2 + y^2}$ se $(x, y) \neq (0, 0)$ e $f(x, y) = 0$ se $(x, y) = (0, 0)$.
 - (a) Determine $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$.
 - (b) f é diferenciável em $(0, 0)$? Por quê?
2. Verifique se a função $f(x, y) = x^{\frac{1}{3}} \cos y$ é diferenciável em $(0, 0)$.
3. Determine as equações do plano tangente e da reta normal ao gráfico da função $f(x, y) = xe^{x^2-y^2}$ no ponto $(2, 2, f(2, 2))$.
4. Encontre o ponto onde o plano tangente ao gráfico da função $f(x, y) = x^2y^2 + 2(x - y)$ é horizontal.

Respostas

1. (a) $0; 0$
 (b) É diferenciável em $(0, 0)$
2. f não é diferenciável em $(0, 0)$, pois não existe $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$
3. $z = 9x - 8y$; $(x, y, z) = (2, 2, 2) + \lambda(9, -8, -1)$, $\lambda \in \mathbb{R}$
4. $(-1, 1, -3)$





Aproximação linear de funções

Objetivos:

- diferencial total; estimativa da variação de uma função; cálculo de erro absoluto e relativo;
- aproximação linear de uma função; estimativa de valores da função em um ponto;

Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida no aberto $D \subset \mathbb{R}^2$, diferenciável em $(a, b) \in D$.
Então

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{\varepsilon(h, k)}{\|(h, k)\|} = 0$$

Onde $\varepsilon(h, k) = f(a + h, b + k) - f(a, b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)h - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)k$.

Diferencial: Se define diferencial de f no ponto (a, b) relativamente aos acréscimos h e k como a função

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)h + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)k = \text{diferencial de } f \text{ em } (a, b)$$

que depende de h e k .

Se f é diferenciável em (a, b) , temos

$$\begin{aligned} \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \varepsilon(h, k) &= \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{\varepsilon(h, k)}{\|(h, k)\|} \cdot \|(h, k)\| \\ &= \underbrace{\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{\varepsilon(h, k)}{\|(h, k)\|}}_{=0} \cdot \underbrace{\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \|(h, k)\|}_{=0} = 0. \end{aligned}$$

Logo,

$$f(a + h, b + k) - f(a, b) \simeq \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)h + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)k, \quad \text{se } (h, k) \simeq (0, 0).$$

Pondo $\Delta f = f(a + h, b + k) - f(a, b) = \text{variação de } f \text{ quando se passa de } (a, b) \text{ para } (a + h, b + k)$, obtemos:

$$\Delta f \simeq df, \text{ se } (h, k) \simeq (0, 0)$$

O valor df também pode ser interpretado como o erro total nos valores de $f(x, y)$ se os incrementos h e k medem o erro na medição dos valores x e y respectivamente. O erro relativo é o quociente $|\frac{df}{f(a, b)}|$ e a percentagem de variação é $|\frac{df}{f(a, b)}| * 100\%$.

Observe-se que na notação de $h = \Delta x$, $k = \Delta y$, a diferencial é

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)\Delta y$$

Analogamente, seja $f : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, D aberto em \mathbb{R}^3 , é uma função de três variáveis com derivadas parciais contínuas em D (logo diferenciável). Para cada $(a, b, c) \in D$, definimos a diferencial de f en (a, b, c) relativa aos acréscimos Δx , Δy , Δz por:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b, c)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b, c)\Delta y + \frac{\partial f}{\partial z}(a, b, c)\Delta z$$

Mostra-se que $\Delta f \simeq df$ se $(\Delta x, \Delta y, \Delta z) \simeq (0, 0, 0)$.

Observação:

1. Notação clássica de diferencial

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dy$$

2. Em funções de uma variável $y = f(x)$, a diferencial é definida como $dy = f'(x)dx$, sendo dx a variável independente.
3. Como $\Delta f \simeq df$, temos que se $df > 0$ (respectivamente $df < 0$), a função aumenta (diminui) quando se passa de (a, b) para $(a + h, b + k)$.
4. Se $df = 0$, então a função não varia quando se passa de (a, b) para $(a + h, b + k)$.

Função linearizada: Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida no aberto $D \subset \mathbb{R}^2$, e $(a, b) \in D$. Se existem as parciais $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$, a função

$$L(x, y) = f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)$$

é bem definida e é chamada de função linearizada de f perto de (a, b) .

Se f é diferenciável em (a, b) , temos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{f(x, y) - f(a, b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)}{\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}} = 0$$

e podemos garantir que $f(x, y) \simeq L(x, y)$ para todo (x, y) suficientemente próximo de (a, b) .

Observação:

1. A função $L(x, y)$ é usada para estimar valores de $f(x, y)$ quando os mesmos forem complicados de calcular e também quando não se tem uma expressão explícita de f . Por exemplo quando temos apenas dados experimentais numa tabela e desconhecemos a lei ou modelo.

2. A superfície $z = L(x, y)$ é o plano tangente ao gráfico de f no ponto $(a, b, f(a, b))$.

3. $df = L(x, y) - f(a, b)$

Interpretação geométrica da diferencial: Se $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, então $dy = f'(a)dx$, e geometricamente se corresponde com a distância entre os pontos R e Q da figura abaixo. Em quanto Δy se corresponde com a distância entre os pontos R e P .




Figure 60: Diferencial de uma função de uma variável

Observe que Δy representa a variação da função $f(x)$ e dy representa a variação da função linearizada de f , $L(x)$ perto do ponto $(a, f(a))$, cujo gráfico é a reta tangente a $y = f(x)$ no ponto $(a, f(a))$.

Ora, se $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $z = f(x, y)$, então $dz = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)dx + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)dy$, e geometricamente corresponde à distância do ponto $(a + \Delta x, b + \Delta y, f(a, b))$ ao ponto do plano tangente $(a + \Delta x, b + \Delta y, c)$. Ora, o valor Δz se corresponde com a distância entre os pontos $(a + \Delta x, b + \Delta y, f(a, b))$ e o ponto $(a + \Delta x, b + \Delta y, f(a + \Delta x, b + \Delta y))$ do gráfico $z = f(x, y)$.




Figure 61: Diferencial de uma função de duas variáveis

Observe que Δz representa a variação da função $f(x, y)$ e dz representa a variação da função linearizada de f , $L(x, y)$ perto do ponto $(a, b, f(a, b))$. Daí $c = L(a + \Delta x, b + \Delta y)$ no ponto de variação no plano tangente $(a + \Delta x, b + \Delta y, c)$.

Exemplos

- Calcule a diferencial de $z = \ln(x^2 + y^2)$.

Solução

Temos

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = \frac{2x}{x^2 + y^2} dx + \frac{2y}{x^2 + y^2} dy$$

- Seja $z = xe^{x^2-y^2}$. Calcule um valor aproximado para z , correspondente a $x = 1,01$ e $y = 1,002$.

Solução

A função $z = xe^{x^2-y^2}$ é diferenciável em \mathbb{R}^2 , por $\frac{\partial z}{\partial x}(x, y)$ e $\frac{\partial z}{\partial y}(x, y)$ serem contínuas em \mathbb{R}^2 .

Sejam $(a, b) = (1, 1)$, $h = 0,01$ e $k = 0,002$. Como $(h, k) \simeq (0, 0)$, Então

$$\Delta z \simeq dz$$

Onde $\Delta z = z(1.01, 1.002) - z(1, 1) = z(1.01; 1.002) - 1$,

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}(1, 1)h + \frac{\partial z}{\partial y}(1, 1)k =$$

$$\begin{aligned}
&= [e^{x^2-y^2} + x \cdot 2xe^{x^2-y^2}]_{(1,1)} \cdot (0.01) + [x \cdot (-2y)e^{x^2-y^2}]_{(1,0)} \cdot (0.002) = \\
&= (1+2) \cdot (0,01) + (-2) \cdot (0,002) = 0,03 - 0,004 = 0,026
\end{aligned}$$

Então, $z(1.01, 1.002) - 1 \simeq 0,026$, ou seja $z(1.01, 1.002) \simeq 1,026$

3. A altura de um cone é $h = 20 \text{ cm}$ e o raio da base é $r = 12 \text{ mm}$. Calcule um valor aproximado para a variação, ΔV no volume quando h aumenta de 2 mm e r decresce 1 mm . Estime o erro relativo e a percentagem de variação do volume.

Solução

O volume do cone de altura h e raio da base r é dado por $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, que é uma função diferenciável em \mathbb{R}^2 . Sejam $r_0 = 12, h_0 = 20$.

Como h aumenta de 2 mm , então $\Delta h = 92$ e como r decresce de 1 mm , então $\Delta r = -0,1$. Como $|\Delta r| \simeq 0$ e $|\Delta h| \simeq 0$, então $\Delta V \simeq dV$, onde

$$\begin{aligned}
dV &= \frac{\partial V}{\partial r} \Delta r + \frac{\partial V}{\partial h} \Delta h = \frac{2}{3}\pi r h \Big|_{(12,20)} \cdot \Delta r + \frac{1}{3}\pi r^2 \Big|_{(12,20)} \cdot \Delta h \\
&= \frac{2}{3}\pi \cdot 12 \cdot 20 \cdot (-0,1) + \frac{1}{3}\pi(12)^2 \cdot (0,2) \\
&= -16\pi + 9,6\pi = -6,4\pi
\end{aligned}$$

Assim,

$$\Delta V \simeq -6,4\pi$$

ou seja, a variação ΔV no volume decresce aproximadamente de $6,4\pi \text{cm}^3$.

O erro relativo é, portanto,

$$\frac{dV}{V(12,20)} = \frac{6,4\pi}{1/3\pi \cdot 144 \cdot 20} = 0,007$$

e a percentagem de variação do volume é de $0,7\%$.

4. A altura h de ondas em mar aberto depende da velocidade do vento v e do tempo t durante o qual o vento se manteve naquela intensidade. Os valores da função $h = f(v, t)$ são apresentados na seguinte tabela.

		Duração (horas)						
		5	10	15	20	30	40	50
Velocidade do vento (km/h)	40	1,5	2,2	2,4	2,5	2,7	2,8	2,8
	60	2,8	4,0	4,9	5,2	5,5	5,8	5,9
	80	4,3	6,4	7,7	8,6	9,5	10,1	10,2
	100	5,8	8,9	11,0	12,2	13,8	14,7	15,3
	120	7,4	11,3	14,4	16,6	19,0	20,5	21,1

Use a tabela para

- (a) determinar uma aproximação linear da função altura da onda quando v está próximo de 80 km/h e t está próximo de 20 horas;

Solução

Supondo que a função f é diferenciável, uma aproximação linear da função altura para pontos suficientemente próximos de $(80, 20)$ seria a função

$$L(v, t) = f(80, 20) + \frac{\partial f}{\partial v}(80, 20)(v - 80) + \frac{\partial f}{\partial t}(80, 20)(t - 20)$$

Ora,

$$\frac{\partial f}{\partial v}(80, 20) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(80 + h, 20) - f(80, 20)}{h}$$

E podemos estimar esse valor considerando a média das taxas de variação média com, por exemplo, $h_1 = 20$ e $h_2 = -20$. Com efeito,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial v}(80, 20) &\approx \frac{1}{2} \left(\frac{f(80 + 20, 20) - f(80, 20)}{20} + \frac{f(80 - 20, 20) - f(80, 20)}{-20} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{12.2 - 8.6}{20} + \frac{5.2 - 8.6}{-20} \right) = \frac{1}{2}(0.17 + 0.18) = 0.175. \end{aligned}$$

Analogamente,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial t}(80, 20) &\approx \frac{1}{2} \left(\frac{f(80, 20 + 10) - f(80, 20)}{10} + \frac{f(80, 20 - 5) - f(80, 20)}{-5} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{9.5 - 8.6}{10} + \frac{7.7 - 8.6}{-5} \right) = \frac{1}{2}(0.09 + 0.18) = 0.135. \end{aligned}$$

Assim, a aproximação linear esperada seria

$$L(v, t) = 8.6 + 0.175(v - 80) + 0.135(t - 20)$$

Observação: A estimativa das duas parciais vale 1,5 ponto, se o aluno coloca = em vez de \approx vale até 1. A expressão de $L(v, t)$ vale 2 pontos (incluindo a justificação e a correta formulação da linearizada), se o aluno coloca = em vez de \approx vale 1 pontos.

- (b) estimar a altura das ondas quando está ventando por 24 horas a 84 km/h.

Resposta: Considerando a linearização do item (a),

$$f(84, 24) \approx L(84, 24) = 8.6 + 0.175(84 - 80) + 0.135(24 - 20) = 9.84$$

Portanto, as ondas teriam uma altura de aproximadamente 9.84 metros.

Exercícios

1. Seja $f(x, y) = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$. Determine:

- (a) D_f
- (b) Im_f
- (c) Curvas de nível
- (d) G_f
- (e) o plano tangente e a reta normal ao G_f no ponto $(1, 0, 1)$
- (f) Um valor aproximado para $f(0.99, 0.01)$
- (g) O conjunto dos pontos de continuidade da função

$$g(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2)[f(x, y) - 1], & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$


2. Dê um valor aproximado de $\sqrt{(0.01)^2 + (3.98)^2 + (2.99)^2}$.
3. Determine o erro relativo máximo (aproximado) no cálculo do período T de um pêndulo simples, através da fórmula $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, sendo o erro relativo em l igual a 1% e em g igual a 3%.
4. O ângulo central de um setor circular é 80° e o raio é 20 cm e deseja-se reduzir o ângulo de 1° . Qual deve ser o acréscimo no raio para que a área fique inalterada?
5. A sensação térmica $W(T, v)$ depende da velocidade do vento v e da temperatura T . Use os dados da seguinte tabela para

		Temperatura T (F°)			
		10,00	30,00	50,00	70,00
Velocidade do vento v (milhas/h)	20,00	10,00	30,00	50,00	70,00
	40,00	5,00	15,00	25,00	35,00
	60,00	3,33	10,00	16,67	23,33
	80,00	2,50	7,50	12,50	17,50

- (a) dar uma equação aproximada da lei $W(T, v)$ que determina a sensação térmica a velocidade do vento próxima a 10 milhas/h e temperatura próxima a $30^{\circ}F$.
- (b) estimar a sensação térmica se a velocidade do vento for de 11milhas/h e a temperatura for $29^{\circ}F$.
6. Um modelo para a área da superfície do corpo humano é dado por
- $$S = 72,09w^{0,425}h^{0,725},$$
- onde w é o peso (em quilogramas), h é a altura (em centímetros) e S é a medida em centímetros quadrados. Se os erros nas medidas de uma pessoa, $w=80\text{kg}$ e $h=175\text{cm}$, forem no máximo de 2%, utilize as diferenciais para estimar o erro máximo cometido no cálculo da superfície do corpo.
7. A temperatura do ponto (x, y) de uma chapa é dada por $T(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2} - 12$.
- (a) Determine o domínio de $T(x, y)$ e represente-o no plano xy .
- (b) Determine a equação, da isoterma que contém o ponto $(2, 3)$ e faça o seu esboço.
- (c) Determine o plano $z = ax + by + c$ que melhor se aproxima do gráfico de $T(x, y)$ no ponto $(2, 3)$.
- (d) Calcule um valor aproximado da temperatura em $(1.01, 2.99)$.

Respostas

1. (a) $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ (c) Circunferência de Centro $(0, 0)$ e raio $\sqrt{e^{k-1}}$
- (b) \mathbb{R}



(d)

2. 4.978

3. 2%

4. $\Delta r \simeq 0.25 \text{ cm}$ 5. (a) $W(T, v) \simeq 21 + 1, 2(T - 30) + 0, 6(v - 10).$ (b) $W(29, 11) \simeq 19, 2$

6. 2,3%

(e) $z = 1 + 2(x - 1); (x, y, z) = (1, 0, 1) + \lambda(2, 0, -1), \lambda \in \mathbb{R}$ 7. (a) $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 > 12\}$

(f) 0.98

(b) $k = 0 \Rightarrow c_0 : x^2 + y^2 = 13$ (g) \mathbb{R}^2 (c) $z = 2x + 3y - 13$ (d) $-2.01 - 0.01$ 



Derivadas Parciais de Ordem Superior

Aproximação não linear

Objetivos:

- cálculo de derivadas parciais de ordem superior;
- teorema de Schwarz;
- polinômio de Taylor de ordem 2.

Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, D aberto, diferenciável. Então existem as funções derivadas parciais de primeira ordem:

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}.$$

Suponhamos que as funções $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ sejam diferenciáveis em D . Então, temos as funções derivadas parciais de segunda ordem:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Supondo as funções $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial f}{\partial y \partial x}, \frac{\partial f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ diferenciáveis em D , temos as funções derivadas parciais de 3 ordem:

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}, \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2}, \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial x}, \frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial x}, \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}, \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x \partial y}, \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}, \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}$$

E assim por diante.

Observação: Caso as parciais $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b)$ existam, essa seria sua definição:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(a + h, b) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)}{h}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(a, b + k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)}{k}$$

Definição: Dizemos que f é de classe C^k em D se f tem derivadas parciais de ordem k contínuas em D .

Teorema de Schwarz Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, D aberto. Se f for de classe C^2 em D , então as derivadas parciais mistas são iguais em D :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y), \quad \forall (x, y) \in D$$

Polinômio de Taylor de Ordem 1

Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 no aberto $D \subset \mathbb{R}^2$. Seja $(a, b) \in D$. O polinômio:

$$P_1(x, y) = f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)$$

é dito polinômio de Taylor de ordem 1 de f perto de (a, b) .

Sabemos que $\Delta f \simeq df$ quando $(x, y) \simeq (a, b)$. Logo,

$$f(x, y) - f(a, b) \simeq \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)$$

Se $(x, y) \simeq (a, b)$

Donde,

$$f(x, y) \simeq f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)$$

se $(x, y) \simeq (a, b)$.

Portanto, $f(x, y) \simeq P_1(x, y)$, se $(x, y) \simeq (a, b)$.

Polinômio de Taylor de Ordem 2

Sejam $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 no aberto $D \subset \mathbb{R}^2$ e $(a, b) \in D$. O polinômio

$$P_2(x, y) = f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b) +$$

$$+ \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b)(x - a)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)(x - a)(y - b) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b)(y - b)^2 \right]$$

é dito polinômio de Taylor de ordem 2 de f perto de (a, b) .

Mostra-se que $f(x, y) \simeq P_2(x, y)$ se $(x, y) \simeq (a, b)$.

Observação

- (I) $P_1(x, y) = L(x, y)$, a função linearizada de f perto de (a, b) .
- (II) $P_2(x, y)$ também serve para aproximar os valores da função f em pontos próximos a (a, b) . O erro de aproximação de $P_2(x, y)$ é menor do que o erro de aproximação pela linearizada.
- (III) É aconselhável aproximar por $P_2(x, y)$ quando $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$. Exemplo: $f(x, y) = \cos(x + y)$ em $(0, 0)$.

Exemplos

- Calcule todas as derivadas parciais de 2 ordem de $f(x, y) = \ln(1 + x^2 + y^2)$.

Solução

Temos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{2x}{1 + x^2 + y^2} \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{2y}{1 + x^2 + y^2}$$

Logo,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = \frac{2(1 + x^2 + y^2) - 2y \cdot 2y}{(1 + x^2 + y^2)^2} = \frac{2 + 2x^2 + 2y^2 - 4x^2}{(1 + x^2 + y^2)^2} = \frac{2 - 2x^2 + 2y^2}{(1 + x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{-2x \cdot 2y}{(1 + x^2 + y^2)^2} = \frac{-4xy}{(1 + x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2(1 + x^2 + y^2) - 2y \cdot 2y}{(1 + x^2 + y^2)^2} = \frac{2 + 2x^2 + 2y^2 - 4y^2}{(1 + x^2 + y^2)^2} = \frac{2 + 2x^2 - 2y^2}{(1 + x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-2y \cdot 2x}{(1 + x^2 + y^2)^2} = \frac{-4xy}{(1 + x^2 + y^2)^2}$$

- Seja $u = f(x - at) + g(x + at)$, onde f e g são duas funções quaisquer de uma variável real e deriváveis até a 2º ordem. Verifique que

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Esta equação é conhecida como a equação de onda.

Solução

Derivando u em relação a x , temos:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'(x - at) \underbrace{\frac{\partial}{\partial x}(x - at)}_1 + g'(x + at) \underbrace{\frac{\partial}{\partial x}(x + at)}_1$$

onde $\frac{\partial u}{\partial x} = f'(x - at) + g'(x + at)$.

Logo, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f''(x - at) \underbrace{\frac{\partial}{\partial x}(x - at)}_1 + g''(x + at) \underbrace{\frac{\partial}{\partial x}(x + at)}_1$

onde, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f''(x - at) + g''(x + at) \quad (1)$

Derivando u em relação a t , temos:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = f'(x - at) \underbrace{\frac{\partial}{\partial t}(x - at)}_{-a} + g'(x + at) \underbrace{\frac{\partial}{\partial t}(x + at)}_a$$

onde $\frac{\partial u}{\partial t} = -af'(x - at) + ag'(x + at)$.

Logo, $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -af''(x - at) \underbrace{\frac{\partial}{\partial t}(x - at)}_{-a} + ag''(x + at) \underbrace{\frac{\partial}{\partial t}(x + at)}_a$, donde

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 f''(x - at) + a^2 g''(x + at) \frac{\partial}{\partial t}(x + at), \text{ ou}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 (f''(x - at) + g''(x + at)) \quad (2)$$

De (1) e (2), vemos que $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, como queríamos verificar.

3. Seja $w(x, t) = (a \cos(cx) + b \sin(cx))e^{-kc^2t}$, onde a , b e c são constantes.

Verifique que

$$\frac{\partial w}{\partial t} = k \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}.$$

Esta equação é conhecida como a equação do calor.

Solução

Derivando w em relação a t , temos:

$$\frac{\partial w}{\partial t} = -kc^2 e^{-kc^2 t} (a \cos(cx) + b \sin(cx))$$

Derivando w em relação a x , temos:

$$\frac{\partial w}{\partial x} = e^{kc^2 t} (-ac \sin(cx) + bc \cos(cx))$$

Derivando de novo em relação a x , temos:

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = e^{-kc^2 t} (-ac^2 \cos(cx) - bc^2 \sin(cx)) = -c^2 e^{-kc^2 t} (a \cos(cx) + b \sin(cx))$$

Portanto,

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} = k \left[-c^2 e^{-kc^2 t} (a \cos(cx) + b \sin(cx)) \right] = k \frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2}$$

4. Sejam $f, g : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, D aberto, duas funções de classe C^2 e tais que:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial y} \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{\partial g}{\partial x}$$

$$\text{Prove que } \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 0.$$

Esta equação é conhecida como equação de Laplace.

Solução

Derivando $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial y}$ em relação a x ; e $\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{\partial g}{\partial x}$ em relação a y , temos:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}$$

$$\text{onde, } \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}.$$

Como g é de classe c^2 então, pelo teorema de Schwarz, temos $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}$.

$$\text{Logo, } \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0.$$

Derivando, $\frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{\partial f}{\partial y}$ em relação a x e $\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial x}$ em relação a y , temos:

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 g}{\partial z a} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

$$\text{Logo, } \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

Como f é de classe c^2 , então $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$. Assim, $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 0$.

5. Mostre que a seguinte função é solução da equação do calor, para a, b e c constantes.

$$w(x, t) = (\alpha \cos(cx) + \beta \sin(cx)) e^{-ke^2 t}$$

Solução

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \omega}{\partial t} &= -kc^2 e^{-kc^2 t} (a \cos(cx) + b \sin(cx)) \\
\frac{\partial \omega}{\partial x} &= e^{-ec^2 t} (-ac \sin(cx) + bc \cos(cx)) \\
\frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} &= e^{-k^2 t} (-ac^2 \cos(cx) - bc^2 \sin(cx)) = \\
&= -c^2 e^{-kct} (a \cos(cx) + b \sin(cx)) \\
\frac{\partial \omega}{\partial t} &= k [-c^2 e^{-kct} (a \cos(cx) + b \sin(cx))] = k \frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2}
\end{aligned}$$

Solução

6. Seja $f(x, y) = x^3 + y^3 - x^2 + 4y$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

- (a) Determine $P_1(x, y)$, o polinômio de Taylor de ordem 1, de f em volta de $(1, 1)$.
- (b) Utilizando $P_1(x, y)$, calcule um valor aproximado para $f(x, y)$, sendo $x = 1,001$ e $y = 0,99$.

Solução

- (a) Temos $P_1(x, y) = f(1, 1) + \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1)(x - 1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1)(y - 1)$
 Como $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 - 2x$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3y^2 + 4$, resulta $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = 1$ e
 $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = 7$.
 Então, $P_1(x, y) = 5 + 1(x - 1) + 7(y - 1)$, ou seja, $P_1(x, y) = x + 7y - 3$.
- (b) Como $x = 1.001 \simeq 1$ e $y = 0.99 \simeq 1$, então
 $f(1.001, 0.99) \simeq P_1(1.001, 0.99) = 1.001 + 7 \cdot (0.99) - 3 = 1,001 + 6.93 - 3 = 4.931$.

7. Determine o polinômio de Taylor de ordem 2 de $f(x, y) = x \sin y$, ao redor do ponto $(0, 0)$.

Solução

Temos

$$P_2(x, y) = f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)x + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)y + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0)x^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)xy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0)y^2 \right].$$

Como

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x \cos y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 0 \\
\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= \cos y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = -x \sin y
\end{aligned}$$

$$\text{então, } \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0) = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = 1, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0) = 0.$$

$$\text{Assim, } P_2(x,y) = 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot y + \frac{1}{2} [0 \cdot x^2 + 2 \cdot 1 \cdot xy + 0 \cdot y^2]$$

$$\text{ou seja, } P_2(x,y) = xy$$

8. Use o polinômio de Taylor de ordem 2 de $f(x,y) = \sin x$ na origem para obter uma aproximação de $f(0.1, 0.1)$.

Solução

Como $(0.1, 0.1) \simeq (0,0)$, então

$$f(0.1, 0.1) \simeq P_1(0.1, 0.1) = (0,1)(0,1)$$

ou seja,

$$f(0.1, 0.1) \simeq 0.01$$

Exercícios

1. Calcule todas as derivadas de segunda ordem da função $f(x,y) = x^3y^2 + xy^4$.
2. Calcule todas as derivadas de segunda ordem da função $f(x,y) = xye^{xy^2}$.
3. Calcule todas as derivadas de segunda ordem da função $f(x,y,z) = x^2 \sin(yz)$.
4. Calcule todas as derivadas de segunda ordem da seguinte função no ponto $(0,0)$.

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2+y^2}; & (x,y) \neq (0,0) \\ 0; & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

5. Dizemos que uma função de duas variáveis é harmônica se é de classe C^2 e satisfaz a equação de Laplace:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Mostre que a seguinte função é harmônica

$$k(x,y) = e^x \sin y + e^y \cos x$$

6. Use o polinômio de Taylor de ordem 1 da função $f(x,y) = x^{\frac{1}{4}}y^{\frac{3}{4}}$ no ponto $(1,1)$ para obter uma aproximação de $f(1.1, 0.9)$.
7. Determine $P_2(x,y)$ de $f(x,y) = \ln(1+x+2y)$ ao redor de $(0,0)$.
8. Usando o polinômio de Taylor de 2 ordem para alguma função conveniente, dê o valor aproximado de $(0.95)^{2.01}$ (considere $f(x,y) = x^y = e^{y \ln x}$)

Respostas

1. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6xy^2, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 6x^2y + 4y^3, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2x^3 + 12xy^2.$
2. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = e^{y^2(1+2y^2)}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2xye^{y^2}(3 + 2y^2).$
3. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 \sin(yz), \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2xz \cos(yz), \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} = \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} = 2xy \cos(yz),$
 $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -x^2z^2 \sin(yz), \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} = -x^2yz \sin(yz), \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = -x^2y^2 \sin(yz).$
4. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 1, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0.$
5. sem resposta
6. 0.95
7. $x + 2y - \frac{x^2}{2} - 2xy - 2y^2$
8. 0.90225





Regra da Cadeia e Derivação Implícita

Objetivos:

- vetor gradiente;
- regra da cadeia: derivação de composição de funções;
- derivação implícita; teorema da função implícita.

Vetor Gradiente

Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ que admite derivadas parciais em $(a, b) \in D$. O vetor

$$\nabla f(a, b) = \text{grad}f(a, b) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a, b), \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right)$$

é dito (vetor) gradiente de f em (a, b) .




Figure 62: Vetor gradiente


Seja $f : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ que admite derivadas parciais em (a, b, c) . Então

$$\nabla f(a, b, c) = \text{grad}f(a, b, c) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a, b, c), \frac{\partial f}{\partial y}(a, b, c), \frac{\partial f}{\partial z}(a, b, c) \right)$$

Teorema: Regra da Cadeia (derivada de função composta)

Sejam $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, D aberto, $\vec{r} : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, tais que $\vec{r}(t) \in D$, para todo $t \in I$. Se \vec{r} for diferenciável em t_0 e f diferenciável em $\vec{r}(t_0)$, então a composta $g(t) = f(\vec{r}(t))$ é diferenciável em t_0 e

$$g'(t_0) = \nabla f(\vec{r}(t_0)) \cdot \vec{r}'(t_0)$$

**Figure 63: Composição de funções****Observações**

(I) Se f for diferenciável em $D \subset \mathbb{R}^n$ e \vec{r} diferenciável em $I \subset \mathbb{R}$, então $g(t) = f(\vec{r}(t))$ é diferenciável em I e $g'(t) = \nabla f(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t)$ para todo $t \in I$.

(II) Para $n = 2$, temos $z = f(x, y)$, $\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$ portanto,

$$\nabla f(\vec{r}(t)) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)), \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t)) \right), \quad \vec{r}'(t) = (x'(t), y'(t)) = \left(\frac{dx}{dt}(t), \frac{dy}{dt}(t) \right).$$

Então,

$$g'(t) = \frac{dg}{dt}(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t))x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t))y'(t)$$

ou

$$\frac{dg}{dt}(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)) \frac{dx}{dt}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t)) \frac{dy}{dt}(t)$$

ou, abreviadamente,

$$\frac{dg}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Por abuso de notação, às vezes se escreve $g'(t)$ como $z'(t)$, $\frac{dz}{dt}$ ou $\frac{df}{dt}$.

(III) Para $n = 3$, temos $g(t) = f(\vec{r}(t)) = f(x(t), y(t), z(t))$.

Logo,

$$g'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t), z(t))x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t), z(t))y'(t) + \frac{\partial f}{\partial z}(x(t), y(t), z(t))z'(t)$$

ou, abreviadamente,

$$\frac{dg}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}.$$

Por abuso de notação, às vezes se escreve $g'(t)$ como $w'(t)$, $\frac{dw}{dt}$ ou $\frac{df}{dt}$.

[Uma consequência da regra da cadeia](#)

- (I) Seja $z = f(x, y)$ diferenciável em $D \subset \mathbb{R}^2$, D aberto. Sejam $x = x(u, v)$ e $y = y(u, v)$ diferenciáveis no aberto $E \subset \mathbb{R}^2$, tais que $(x(u, v), y(u, v)) \in D$. Então, a composta

$$F(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$$

é diferenciável em $E \subset \mathbb{R}^2$ e

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial u}(u, v) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x(u, v), y(u, v)) \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(u, v), y(u, v)) \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) \\ \frac{\partial F}{\partial v}(u, v) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x(u, v), y(u, v)) \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(u, v), y(u, v)) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v)\end{aligned}$$

ou, abreviadamente,

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial u} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial F}{\partial v} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}\end{aligned}$$

- (II) Sejam $w = f(x, y, z)$ diferenciável em $D \subset \mathbb{R}^3$, D aberto, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$ diferenciáveis no aberto $E \subset \mathbb{R}^2$, tais que $(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \in D$. Então, a composta

$$\omega = f(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

é diferenciável em $E \subset \mathbb{R}^2$ e, abreviadamente,

$$\begin{aligned}\frac{\partial \omega}{\partial u} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial \omega}{\partial v} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}\end{aligned}$$

Derivação implícita

Definição 1: Uma função $y = g(x)$, $x \in I$ é definida implicitamente pela equação $F(x, y) = 0$ se $F(x, g(x)) = 0$, $\forall x \in I$.

Supondo F e g diferenciáveis, temos pela regra da cadeia:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, g(x)) \frac{dx}{dx} + \frac{\partial F}{\partial y}(x, g(x)) \cdot g'(x) = 0$$

Supondo que $\frac{\partial F}{\partial y}(x, g(x)) \neq 0 \quad \forall x \in I$, temos

$$g'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, g(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, g(x))}, \quad \forall x \in I$$

ou, equivalentemente,

$$g'(x) = -\left(\frac{\partial F}{\partial y}(x, g(x))\right)^{-1} \frac{\partial F}{\partial x}(x, g(x)), \quad \forall x \in I.$$

Problema 1: Encontrar condições para que a equação $F(x, y) = 0$ defina implicitamente uma função diferenciável $y = g(x)$.

A solução do Problema 1 é dada pelo seguinte teorema:

Teorema 1 (da função implícita): Seja $F : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, de classe C^1 no conjunto aberto D . Seja $(x_0, y_0) \in D$, tal que

$$(i) \quad F(x_0, y_0) = 0$$

$$(ii) \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0.$$

Então, existe uma vizinhança I de x_0 e uma função de classe C^1 , $g : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $g(x_0) = y_0$ e $F(x, g(x)) = 0$, $\forall x \in I$.

Definição 2: Uma função $z = g(x, y)$, $(x, y) \in D$ é definida implicitamente pela equação $F(x, y, z) = 0$ se $F(x, y, g(x, y)) = 0$, $\forall (x, y) \in D$.

Supondo F e g diferenciáveis, temos pela regra da cadeia:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x}(x, y, g(x, y)) \frac{dx}{dx} + \frac{\partial F}{\partial y}(x, y, g(x, y)) \frac{dy}{dx} + \frac{\partial F}{\partial z}(x, y, g(x, y)) \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial x}(x, y, g(x, y)) \frac{dx}{dy} + \frac{\partial F}{\partial y}(x, y, g(x, y)) \frac{dy}{dy} + \frac{\partial F}{\partial z}(x, y, g(x, y)) \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases}$$

Logo,

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial z}(x, y, g(x, y)) \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = -\frac{\partial F}{\partial x}(x, y, g(x, y)) \\ \frac{\partial F}{\partial z}(x, y, g(x, y)) \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = -\frac{\partial F}{\partial y}(x, y, g(x, y)) \end{cases}$$

Supondo $\frac{\partial F}{\partial z}(x, y, g(x, y)) \neq 0$, $\forall (x, y) \in D$, temos

$$\begin{cases} \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, y, g(x, y))}{\frac{\partial F}{\partial z}(x, y, g(x, y))}, & \forall (x, y) \in D \\ \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y, g(x, y))}{\frac{\partial F}{\partial z}(x, y, g(x, y))}, & \forall (x, y) \in D \end{cases}$$

ou, equivalentemente,

$$\nabla g(x, y) = - \left(\frac{\partial F}{\partial z}(x, y, g(x, y)) \right)^{-1} \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y} \right)_{(x, y, g(x, y))}, \quad \forall (x, y) \in D$$

Problema 2: Em que condições a equação $F(x, y, z) = 0$ define implicitamente uma função diferenciável $z = g(x, y)$?

A solução do Problema 2 é dada pelo seguinte teorema:

Teorema 2 (da função implícita): Seja $F : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 no conjunto aberto D . Seja $(x_0, y_0, z_0) \in D$, tal que

- (i) $F(x_0, y_0, z_0) = 0$;
- (ii) $\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \neq 0$.

Então, existe uma vizinhança V de (x_0, y_0) e uma função de classe C^1 , $g : V \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $g(x_0, y_0) = z_0$ e $F(x, y, g(x, y)) = 0$, $\forall (x, y) \in U$.

Observação

- (I) O gráfico das função $y = g(x)$ dada pelo Teorema 1 da função implícita está incluído na curva de nível $F(x, y) = 0$.
- (II) O gráfico das função $z = g(x, y)$ dada pelo Teorema 2 da função implícita está incluído na superfície de nível $F(x, y, z) = 0$.

Exemplos

1. Seja $f(x, y) = 2 \arctan \frac{x}{y}$. Calcule $\nabla f(1, 1)$.

Solução

Temos $\nabla f(x, y) = \left(\frac{2 \cdot \frac{1}{y}}{1 + \frac{x^2}{y^2}}, \frac{-2 \frac{x}{y^2}}{1 + \frac{x^2}{y^2}} \right) = \left(\frac{2y}{x^2 + y^2}, \frac{-2x}{x^2 + y^2} \right).$

Assim, $\nabla f(1, 1) = (1, -1)$.




Figure 64: Vetor gradiente de $f(x, y) = 2 \arctan \frac{x}{y}$ no ponto $(1, 1)$

2. Seja $f(x, y, z) = \sqrt{2x^2 + 3y^2 + 4z^2}$. Calcule $\nabla f(-1, 1, 1)$.

Solução

Temos $\nabla f(x, y, z) = \left(\frac{4x}{2\sqrt{2x^2 + 3y^2 + 4z^2}}, \frac{6y}{2\sqrt{2x^2 + 3y^2 + 4z^2}}, \frac{8z}{2\sqrt{2x^2 + 3y^2 + 4z^2}} \right).$

Assim, $\nabla f(-1, 1, 1) = \left(-\frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3} \right)$.

3. Seja $g(t) = f(3 \sen t, e^{t^2})$.

(a) Expresse $g'(t)$ em termos das derivadas parciais de f .

(b) Calcule $g'(0)$, admitindo que $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) = \frac{1}{3}$.

Solução

(a) Temos $g(t) = f(x, y)$ com $x = 3 \sen t$, $y = e^{t^2}$. Pela regra da cadeia, temos:

$$g'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \frac{dy}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)(3 \cos t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)(2te^{t^2})$$

(b) Temos

$$g'(0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(0), y(0))(3 \cos 0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(0), y(0)) \cdot 0 = 3 \frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) = 3 \cdot \frac{1}{3} = 1.$$

4. Suponha que, para todo t , $f(3t, t^3) = \arctan t$, onde $f(x, y)$ é diferenciável em \mathbb{R}^2 .

(a) Calcule $\frac{\partial f}{\partial x}(3, 1)$, admitindo que $\frac{\partial f}{\partial y}(3, 1) = \frac{1}{2}$.

(b) Determine o plano tangente ao gráfico de f no ponto $(3, 1, f(1, 3))$.

Solução

(a) Seja $g(t) = f(x, y)$, com $x = 3t, y = t^3$. Pela regra da cadeia, temos para todo t :

$$g'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \underbrace{\frac{dx}{dt}}_3 + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \underbrace{\frac{dy}{dt}}_{3t^2} = 3 \frac{\partial f}{\partial x}(3t, t^3) + 3t^2 \frac{\partial f}{\partial y}(3t, t^3).$$

Como $f(3t, t^3) = \arctan t$, então $g(t) = \arctan t$. Derivando em relação a t , temos para todo t : $g'(t) = \frac{1}{1+t^2}$, ou seja,

$$3 \frac{\partial f}{\partial x}(3t, t^3) + 3t^2 \frac{\partial f}{\partial y}(3t, t^3) = \frac{1}{1-t^2}.$$

Para $t = 1$, temos:

$$3 \frac{\partial f}{\partial x}(3, 1) + 3 \frac{\partial f}{\partial y}(3, 1) = \frac{1}{2}.$$

Como $\frac{\partial f}{\partial y}(3, 1) = \frac{1}{2}$, então, $3 \frac{\partial f}{\partial x}(3, 1) + \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$, donde $\frac{\partial f}{\partial x}(3, 1) = -\frac{1}{3}$.

(b) A equação do plano tangente é :

$$z = f(3, 1) + \frac{\partial f}{\partial x}(3, 1)(x - 3) + \frac{\partial f}{\partial y}(3, 1)(y - 1),$$

onde $f(3, 1) = \arctg 1 = \frac{\pi}{4}$. Então, temos

$$z = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}(x - 3) + \frac{1}{2}(y - 1).$$

5. Suponha que $f(x, y)$ seja de classe C^2 em \mathbb{R}^2 . Seja $g(t) = f(3t, 2t + 1)$. Expresse $g''(t)$ em termos das derivadas parciais de f .

Solução

Temos $g(t) = f(x, y)$, onde $x = 3t, y = 2t + 1$. Pela regra da cadeia, temos

$$g'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \underbrace{\frac{dx}{dt}}_{=3} + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \underbrace{\frac{dy}{dt}}_{=2} = 3 \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + 2 \frac{\partial f}{\partial y}(x, y),$$

ou seja,

$g'(t) = 3 \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + 2 \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$, onde $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ são funções compostas.

Então, novamente, pela regra da cadeia, temos:

$$\begin{aligned} g''(t) &= 3 \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right) \underbrace{\frac{dx}{dt}}_{=3} + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right) \underbrace{\frac{dy}{dt}}_{=2} \right] \\ &\quad + 2 \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \underbrace{\frac{dx}{dt}}_{=3} + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \underbrace{\frac{dy}{dt}}_{=2} \right] \\ &= 9 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + 6 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) + 6 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) + 4 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) \end{aligned}$$

Como f é de classe C^2 em \mathbb{R}^2 , então pelo Teorema de Schwarz, temos $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y)$.

Logo,

$$g''(t) = 9 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + 12 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) + 4 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y).$$

ATENÇÃO: "Uma vez regra da cadeia, regra da cadeia até morrer"

6. A curva C parametrizada por $\vec{r}(t) = (2t, t^2, z(t))$ está contida no gráfico de $z = f(x, y)$. Sabe-se que $f(2, 1) = 3$, $\frac{\partial f}{\partial x}(2, 1) = 1$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(2, 1) = -1$. Determine a equação da reta tangente a C no ponto $\vec{r}(1)$.

Solução

A equação da reta tangente a C em $\vec{r}(1)$ é dada por:

$$(x, y, z) = \vec{r}(1) + \lambda \vec{r}'(1), \lambda \in \mathbb{R}.$$

Como $\vec{r}(t) = (2t, t^2, z(t))$ está contida no gráfico de $z = f(x, y)$, então $z(t) = f(2t, t^2)$, e portanto, $z(1) = f(2, 1) = 3$. Logo, $\vec{r}(1) = (2, 1, 3)$. Temos $\vec{r}'(t) = (2, 2t, z'(t))$, donde $\vec{r}'(1) = (2, 2, z'(1))$.

Como $z = f(x, y)$, com $x = 2t, y = t^2$, então, pela regra da cadeia, temos

$$z'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \cdot \underbrace{\frac{dx}{dt}}_{=2} + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \cdot \underbrace{\frac{dy}{dt}}_{=2t} = 2 \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + 2t \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

onde,

$$z'(1) = 2 \frac{\partial f}{\partial x}(2, 1) + 2 \frac{\partial f}{\partial y}(2, 1) = 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) = 0.$$

Portanto, $\vec{r}'(1) = (2, 2, 0)$. Assim, a equação da reta tangente é:

$$(x, y, z) = (2, 1, 3) + \lambda(2, 2, 0), \lambda \in \mathbb{R}.$$

7. Seja $z = f(u^2 - v^2, 2uv)$, onde $f(x, y)$ é diferenciável. Expressse $\frac{\partial z}{\partial u}$ e $\frac{\partial z}{\partial v}$ em termos das derivadas parciais de f .

Solução

Temos $z = f(x, y)$, onde $x = u^2 - v^2$, $y = 2uv$. Pela regra da cadeia, temos

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \underbrace{\frac{\partial x}{\partial u}}_{2u} + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \underbrace{\frac{\partial y}{\partial u}}_{2v} = 2u \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + 2v \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \\ &= 2u \frac{\partial f}{\partial x}(u^2 - v^2, 2uv) + 2v \frac{\partial f}{\partial y}(u^2 - v^2, 2uv) \\ \frac{\partial z}{\partial v} &= \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \underbrace{\frac{\partial x}{\partial v}}_{-2v} + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \underbrace{\frac{\partial y}{\partial v}}_{2u} = -2v \frac{\partial f}{\partial x}(u^2 - v^2, 2uv) \\ &\quad + 2u \frac{\partial f}{\partial y}(u^2 - v^2, 2uv). \end{aligned}$$

8. Seja, $z = f(u - 2v, v + 2u)$, onde $f(x, y)$ é de classe C^2 em \mathbb{R}^2 . Expressse $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}$ em termos das derivadas parciais de f .

Solução

Seja $z = f(x, y)$, onde $x = u - 2v$, $y = v + 2u$. Donde, $\frac{\partial x}{\partial u} = 1$, $\frac{\partial x}{\partial v} = -2$, $\frac{\partial y}{\partial u} = 2$, $\frac{\partial y}{\partial v} = 1$.

Pela regra da cadeia, temos

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \frac{\partial y}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + 2 \frac{\partial f}{\partial y}(x, y).$$

Como $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ com $x = u - 2v$, $y = v + 2u$ são funções compostas, então, para derivá-las, usamos a regra da cadeia. Temos, então

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} &= \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right) \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right) \frac{\partial y}{\partial u} \right] \\ &\quad + 2 \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \frac{\partial y}{\partial u} \right] \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) + 4 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y). \end{aligned}$$

Como f é de classe C^2 , então pelo teorema de Schwarz, segue que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y)$.

Logo,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + 4 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) + 4 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y).$$

9. Determine as equações das retas tangente e normal á curva $C : e^{2x-y} + 2x + 2y = 4$ em $(\frac{1}{2}, 1)$.

Solução

Seja $f(x, y) = e^{2x-y} + 2x + 2y$. Logo, $f(\frac{1}{2}, 1) = e^{1-1} + 2 \cdot \frac{1}{2} + 2 = 4$.

Então C é a curva de nível de f no nível 4. Temos $\nabla f(x, y) = (2e^{2x-y} + 2, -e^{2x-y} + 2)$, donde $\nabla f(\frac{1}{2}, 1) = (2e^{1-1} + 2, -e^{1-1} + 2) = (4, 1)$. Sabemos que $\nabla f(\frac{1}{2}, 1)$ é normal a C em $(\frac{1}{2}, 1)$.

Reta tangente: $[(x, y) - (\frac{1}{2}, 1)] \cdot \nabla f(\frac{1}{2}, 1) = 0$, donde $(x - \frac{1}{2}, y - 1) \cdot (4, 1) = 0 \Leftrightarrow 4x - 2 + y - 1 = 0 \Leftrightarrow y = -4x + 3$

Reta normal: $(x, y) = (\frac{1}{2}, 1) + \lambda \nabla f(\frac{1}{2}, 1), \lambda \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (x, y) = (\frac{1}{2}, 1) + \lambda(4, 1), \lambda \in \mathbb{R}$.

10. Determine as equações do plano tangente e da reta normal a superfície $S : xyz + x^3 + y^3 + z^3 = 3z$ no ponto $(1, -1, 2)$.

Solução

Seja $f(x, y, z) = xyz + x^3 + y^3 + z^3 - 3z$.

Logo, $f(1, -1, 2) = -2 + 1 - 1 + 8 - 6 = 0$. Então, S é a superfície de f no nível 0. Temos $\nabla f(x, y, z) = (yz + 3x^2, xz + 3y^2, xy + 3z^2 - 3)$, donde $\nabla f(1, -1, 2) = (-2 + 3, 2 + 3, -1 + 12 - 3) = (1, 5, 8)$.

Sabemos que $\nabla f(1, -1, 2)$ é perpendicular a S em $(1, -1, 2)$.

Plano tangente: $[(x, y, z) - (1, -1, 2)] \cdot \nabla f(1, -1, 2) = 0 \Leftrightarrow (x - 1, y + 1, z - 2) \cdot (1, 5, 8) = 0 \Leftrightarrow x + 5y + 8z = 12$. Reta normal: $(x, y, z) = (1, -1, 2) + \lambda \nabla f(1, -1, 2), \lambda \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (x, y, z) = (1, -1, 2) + \lambda(1, 5, 8), \lambda \in \mathbb{R}$.

11. Mostre que a equação $x^2y + 3y^3x^4 = 4$ define uma função implícita no ponto $(1, 1) : y = g(x)$. Calcule $g'(1)$.

Solução

Seja $F(x, y) = x^2y + 3y^3x^4 - 4$ que é de classe C^1 em \mathbb{R}^2 . Temos:

(i) $F(1, 1) = 1 + 3 - 4 = 0$;

(ii) $\frac{\partial F}{\partial y}(1, 1) = [x^2 + 9y^2x^4]_{(1,1)} = 1 + 9 = 10 \neq 0$.

Logo, pelo teorema da função implícita, existe uma vizinhança I de 1 e uma função de classe C^1 , $g : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $g(1) = 1$ e $F(x, g(x)) = 0$, $\forall x \in I$.

E aplicando a regra da cadeia:

$$g'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, g(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, g(x))}, \quad \forall x \in I$$

Logo,

$$g'(1) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(1, 1)}{\frac{\partial F}{\partial y}(1, 1)} = -\frac{14}{10} = -\frac{7}{5},$$

pois $\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = 2xy + 12y^3x^3$, daí $\frac{\partial F}{\partial x}(1, 1) = 2 + 12 = 14$.

12. Mostre que a equação $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 4$ define uma função implícita diferenciável $z = g(x, y)$ no ponto $(1, 1, 2)$. Calcule $\frac{\partial g}{\partial x}(1, 1)$ e $\frac{\partial g}{\partial y}(1, 1)$.

Solução Seja $F(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz - 4$ que é de classe C^1 em \mathbb{R}^3 . Temos

- (i) $F(1, 1, 2) = 1 + 1 + 8 - 6 - 4 = 0$;
- (ii) $\frac{\partial F}{\partial z}(1, 1, 2) = 3z^2 - 3xy|_{(1,1,2)} = 12 - 3 = 9 \neq 0$.

Logo, pelo teorema da função implícita, existe uma vizinhança V de $(1, 1)$ e uma função de classe C^1 , $g : V \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $g(1, 1) = 2$ e $F(x, y, g(x, y)) = 0$, $\forall (x, y) \in V$.

E aplicando a regra da cadeia:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, y, g(x, y))}{\frac{\partial F}{\partial z}(x, y, g(x, y))}, \quad \forall (x, y) \in D \\ \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y, g(x, y))}{\frac{\partial F}{\partial z}(x, y, g(x, y))}, \quad \forall (x, y) \in D \end{array} \right.$$

Portanto,

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial g}{\partial x}(1,1) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(1,1,2)}{\frac{\partial F}{\partial z}(1,1,2)} = -\frac{3x^2 - 3yz|_{(1,1,2)}}{9} = \frac{1}{3} \\ \\ \frac{\partial g}{\partial y}(1,1) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}(1,1,2)}{\frac{\partial F}{\partial z}(1,1,2)} = -\frac{3y^2 - 3xz|_{(1,1,2)}}{9} = \frac{1}{3} \end{array} \right.$$

Exercícios

1. Suponha que para todo t , $f(t^2, 2t) = t^3 - 3t$, onde $f(x, y)$ é diferenciável. Mostre que $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = -\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2)$.
2. Admita que para todo (x, y) , $x\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - y\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$, onde $f(x, y)$ é diferenciável. Mostre que $g(t) = f(t, \frac{2}{t})$, $t > 0$ é constante.
3. Seja $F(x, y, z) = f\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{z}, \frac{z}{x}\right)$. Mostre que $x\frac{\partial F}{\partial x} + y\frac{\partial F}{\partial y} + z\frac{\partial F}{\partial z} = 0$.
4. Seja $g(x, y) = xf(x^2 + y, 2y, 2x - y)$, onde f é diferenciável. Expresse $\frac{\partial g}{\partial x}$ e $\frac{\partial g}{\partial y}$ em termos das derivadas parciais de f .
5. Suponha que $z = f(x, y)$ é uma função de classe C^1 , tal que $\frac{\partial f}{\partial y}(2, -3) = -1$. Sabe-se que um ponto se desloca sobre o gráfico de $z = f(x, y)$, ao longo de uma curva $\vec{r}(t) = (2 \sin t, -3 + 7 \cos t, z(t))$, onde t representa o tempo. Qual é a componente vertical da velocidade do ponto no instante em que suas coordenadas são $(2, -3, 6)$.
6. Seja $F(r, \theta) = f(x, y)$, onde $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, sendo $f(x, y)$ diferenciável. Verifique que
$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial F}{\partial \theta}(r, \theta) + \sin \theta \frac{\partial F}{\partial r}(r, \theta).$$
7. Se $u = x^m f\left(\frac{y}{x}, \frac{x}{z}, \frac{z}{x}\right)$, onde f é diferenciável. Mostre que $x\frac{\partial u}{\partial x} + y\frac{\partial u}{\partial y} + z\frac{\partial u}{\partial z} = mu$.
8. A distribuição da temperatura de um disco com centro na origem é dada por $T(x, y)$ de classe C^2 em \mathbb{R}^2 . Sabe-se que $\frac{\partial^2 T}{\partial y \partial x} = 0$ e $\frac{\partial T}{\partial y}(x, y) = 2$. Calcule $\frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2}(\rho, \theta)$, sendo $U(\rho, \theta) = T(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$.

9. Seja $\omega = f(x, y)$, onde f é diferenciável, se $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, mostre que

$$\left(\frac{\partial \omega}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \omega}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial \omega}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial \omega}{\partial \theta}\right)^2.$$

10. Seja $v(r, \theta) = u(x, y)$, onde $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. Verifique que

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2}$$

11. Seja $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável em $P_0 = (0, 0, 0)$, tal que $\frac{\partial f}{\partial x}(P_0) = 2$, $\frac{\partial f}{\partial y}(P_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(P_0) = 0$, $f(P_0) = 1$. Defina $g(u, v) = f(u - v, u^2 - v, 3v - 3)$ e calcule a equação do plano tangente ao gráfico de g no ponto $(1, 1, 1)$.

12. Expresse $g''(t)$ em termos das derivadas parciais de f , sendo $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função duas vezes diferenciável e sendo

$$g(t) = f(1 - t, t^2)$$

13. Considere $h(u, v) = f(u^2v^2, 2uv)$ onde $f(x, y)$ é uma função de classe C^2 . Expresse $\frac{\partial^2 h}{\partial u^2}(u, v)$ em termos das derivadas parciais da função f .

14. Calcule $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(1, 1)$ onde $z = f(x, y)$ é uma função de classe C^1 definida implicitamente pela equação $x^3 + y^3 + z^3 = x + y + z$ sabendo que $f(1, 1) = 1$.

15. Determine uma equação do plano tangente e uma equação da reta normal ao hiperboloide de equação $x^2 - 2y^2 - 4z^2 = 10$ no ponto $(4, -1, 1)$.

16. Determine uma reta que seja tangente a curva $x^2 + xy + y^2 = 7$ e paralela a reta $4x + 5y = 17$.

17. Determine um plano que seja tangente a superfície $x^2 + 3y^2 + 2z^2 = \frac{11}{6}$ e paralelo ao plano $x + y + z = 10$.

18. Considere a função $z = \frac{\sqrt[4]{8+x^2+y^2}}{y}$. Determine as equações do plano tangente y e da reta normal ao gráfico da função dada no ponto $(2, 2, 1)$.

19. Considere a curva C intersecção das superfícies de equações $S_1 : x^2 - 2xz + y^2z = 3$ e $S_2 : 3xy - 2yz = -2$. Determine:

- (a) um vetor tangente a C em $(1, -2, 1)$.

- (b) Os pontos do hiperboloide $x^2 + y^2 - z^2 + 12 = 0$, onde o plano tangente é perpendicular ao vetor encontrado no item (a).
20. A equação $\ln(x^2 + y^2 - 1) + e^{xz} = 1$ define uma função $z = f(x, y)$ implicitamente em torno do ponto $Q = (\sqrt{2}, 0, 1)$? E do ponto $P = (\sqrt{2}, 0, 0)$? Calcule, quando possível, $\nabla f(\sqrt{2}, 0)$.
- Solução**
1. sem resposta
 2. sem resposta
 3. sem resposta
 4. $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = f(u, v, \omega) + x \left[2x \frac{\partial f}{\partial x}(u, v, \omega) + 2 \frac{\partial f}{\partial z}(u, v, \omega) \right]$
 $\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = x \left[\frac{\partial f}{\partial x}(u, v, \omega) + 2 \frac{\partial f}{\partial y}(u, v, \omega) - \frac{\partial f}{\partial z}(u, v, \omega) \right],$
onde $u = x^2 + y, v = 2y, \omega = 2x - y.$
 5. 7
 6. sem resposta
 7. sem resposta
 8. $\rho \cos \theta \frac{\partial T}{\partial x}(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) + \rho^2 \sin^2 \theta \frac{\partial T}{\partial x^2}(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$
 9. sem resposta
 10. sem resposta
 11. $2x - 2y - z + 1 = 0$
 12. $g''(t) = f_{xx}(1-t, t^2) - 4tf_{xy}(1-t, t^2) + 4t^2f_{yy}(1-t, t^2) + 2f_y(1-t, t^2).$
 13. $\frac{\partial^2 h}{\partial u^2}(u, v) = 2v^2 f_x(u^2 v^2, 2uv) + 4u^2 v^4 f_{xx}(u^2 v^2, 2u) + 8uv^3 f_{xy}(u^2 v^2, 2uv) + 4v^2 f_{yy}(u^2 v^2, 2uv).$
 14. $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(1, 1) = -3.$
 15. $2x + y - 2z = 5; (x, y, z) = (4, -1, 1) + \lambda(8, 4, -8), \lambda \in \mathbb{R}$
 16. $y - 2 = -\frac{4}{5}(x - 1)$ ou $y + 2 = -\frac{4}{5}(x + 1)$
 17. $x + y + z = \frac{11}{6}$ on $x + y + z = -\frac{11}{6}$
 18. $x - 7y - 16z = -28$
 19. (a) $(3, 2, 4)$
(b) $(6, 4, -8)$ e $(-6, -4, 8)$

20. O ponto Q não verifica a equação implícita; aplicando o teorema da função implícita para P obtemos $\frac{\partial f}{\partial x}(\sqrt{2}, 0) = -2$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(\sqrt{2}, 0) = 0$

