


2023年广东省深圳市生地会考真题试卷及答案

一、单选题 1:本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。在每小题列出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。

福建省福州沿海地区海雾多发。下图示意 2014—2020 年福州地区沿岸各月平均雾日数。结合所学知识，完成下面小题。



1. 福州地区沿岸海雾发生频率最高的季节是 ()
A. 春季 B. 夏季 C. 秋季 D. 冬季
2. 下列活动中，受沿岸海雾影响较大的是 ()
A. 滨海漫步 B. 生蚝养殖 C. 潮汐发电 D. 近海航行

2022 年 5 月下旬，巴西东北部遭遇暴雨侵袭，其中某州持续 6 天出现暴雨。结合所学知识，完成下面小题。

3. 该州此次暴雨的形成过程主要发生在 ()
A. 对流层 B. 平流层 C. 臭氧层 D. 高层大气
4. 该州持续 6 天出现暴雨，易引发的灾害不包括 ()
A. 滑坡 B. 泥石流 C. 洪涝 D. 地震

根据《江门市国土空间总体规划（2020—2035 年）》草案，广东省江门市将推动中国“侨梦苑”华侨华人创新产业聚集区等重大平台建设，推进中国侨都华侨华人总部建设。结合所学知识，完成下面小题。

5. 最适合进驻该创新产业聚集区的企业类型是 ()
A. 水产养殖 B. 日用化工 C. 家具制造 D. 生物医药
6. 江门市建设中国侨都华侨华人总部的优势是当地 ()
A. 人口数量多 B. 华侨华人多 C. 外国人较多 D. 留学人数多

四川省德阳市中江气田埋深达 2000—3000 米。2021 年 8 月，该气田新增探明储量 340.29 亿立方米，将助力川渝地区建设我国首个千亿级天然气基地。结合所学知识，完成下面小题。

7. 中江气田埋深处位于地球内部圈层的 ()


- A. 地核 B. 地壳 C. 上地幔 D. 下地幔

8. 该千亿级天然气基地的建设将有助于当地（ ）

①增加就业机会②提高经济收入③调整能源结构④改变气候类型

- A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

下图为青藏高原 1982—2020 年常住人口城镇化率和城镇总人口变化图。结合所学知识，完成下面小题。



9. 青藏高原常住人口城镇化率增速最快的时段是（ ）


- A. 1982—1990 年 B. 1990—2000 年 C. 2000—2010 年 D. 2010—2020 年

10. 不利于青藏高原可持续发展的城镇化模式是（ ）

- A. 守土固边 B. 绿色生态 C. 快速扩张 D. 文化传承

二、单选题II:本大题共 30 小题，每小题 2 分，共 60 分。在每小题列出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。

11. 2021 年 9 月至 10 月期间，地球、火星位于太阳两侧，且三者近乎处于一条直线（如图），出现了日凌现象。日凌期间，火星探测器与地球的通信会出现不稳定甚至中断，其影响主要来自（ ）



- A. 太阳引力 B. 太阳风 C. 太阳光 D. 极光

《广东新语》记载，“广州海边诸县，皆有沙田，顺德、新会、香山尤多。”前人将沙田的演进描述为鱼游、槽迫、鹤立、草步和围田等阶段。结合所学知识，完成下面小题。

12. 沙田的泥沙主要来自（ ）

- A. 河流 B. 深海 C. 湖泊 D. 沙漠


13. 下列现象中，可加快沙田形成的是（ ）

- A. 全球气候变暖 B. 围垦力度加强 C. 流水速度加快 D. 动物种类增加

14. 沙田的演进主要影响水循环的环节是（ ）

- A. 地表径流 B. 大气降水 C. 地下径流 D. 水汽输送

水土流失是指在外力（水力、风力等）作用下土壤表层侵蚀及失水现象。下图示意 2011 年和 2018 年新疆不同土壤侵蚀强度类型的水土流失面积。结合所学知识，完成下面小题。



15. 总体上看, 2011—2018 年新疆水土流失现象（ ）

- A. 加剧 B. 趋缓 C. 不变 D. 消失

16. 与 2011 年相比, 2018 年新疆水土流失面积增加最大的强度类型是（ ）


- A. 轻度 B. 中度 C. 强烈 D. 剧烈

17. 新疆水土流失治理的可行措施是（ ）

- A. 人工降雨 B. 全面禁牧 C. 陡坡开垦 D. 恢复植被

整土地利用结构; 做好防风沙措施。工矿区、居民点等基本建设区应复垦土地, 恢复植被。

东恰错是青藏高原上的内陆湖, 发育于地面沉降形成的盆地中。图 5 示意 1990 年和 2018 年东恰错的湖岸线分布。结合所学知识, 完成下面小题。



18. 1990—2018 年间, 东恰错湖水（ ）

- A. 输入量大于输出量 B. 输入量小于输出量
C. 输入量等于输出量 D. 两者关系无法确定

19. 据图推测, 甲、乙、丙、丁四地附近坡度最缓的是（ ）

- A. 甲地 B. 乙地 C. 丙地 D. 丁地

于亏损状态, 湖泊面积缩小, 输出量等于输入量, 说明湖泊水的收入与支出达到平衡, 湖泊面积稳定。

广东鼎湖山国家级自然保护区是新中国成立后最早建立的自然保护区，区内蕴藏丰富的动植物资源，被称为“物种宝库”“基因储存库”和北回归线沙漠带上绿洲中的“明珠”。结合所学知识，完成下面小题。

20. 该自然保护区所在地的代表性植被类型是（ ）

- A. 温带落叶阔叶林 B. 热带草原 C. 亚热带常绿阔叶林 D. 热带荒漠

21. 下列活动中，最适宜在该自然保护区开展的是（ ）

- A. 开垦梯田种粮 B. 放生外来物种 C. 调查珍稀物种 D. 开挖矿产资源

江苏拥有 900km 以上的海岸线。近期，国家发改委公布了《江苏沿海地区发展规划(2021—2025 年)》。下图为江苏沿海地区发展总体布局示意图。结合所学知识，完成下面小题。



22. 该区域主发展轴的走向是（ ）

- A. 南北向 B. 西北—东南向 C. 东西向 D. 东北—西南向

23. 陆海联动区将打造服务中西部地区对外开放的重要门户，其依托的主要运输方式是（ ）

- A. 铁路 B. 河运 C. 管道 D. 航空

24. 江海联动区经济发展最突出的优势是（ ）

- A. 海岸线长 B. 港阔水深 C. 水能丰富 D. 通江达海

下图是江西省某农场的稻田不同种养模式平面示意图。I 模式为水稻种植；II 模式为传统稻虾种养：在稻田四周开挖环沟、修筑田埂，台田种水稻，环沟养小龙虾；III 模式为新型稻虾种养：无需开挖环沟，小龙虾在稻田中生长。结合所学知识，完成下面小题。



27. 近年来，较多稻田由 I 模式开发成 II、II 模式，主要是因为（ ）


- A. 耕地面积增加 B. 应对市场需求 C. 交通更加便利 D. 劳动力数量增多

28. 与II模式相比, III模式增加了()

- A. 农田改造成本 B. 农场面积 C. 化肥投入 D. 土壤肥力

山西省某市的城区位于河谷地带。监测显示,当地污染物浓度随大气运动方向转换呈现明显的日变化。

下图为该市城区的海拔高度(单位:米)分布图。结合所学知识,完成下面小题。



- A. 海陆风 B. 山谷风 C. 龙卷风 D. 台风

东莞玩具企业转型生产潮玩玩具,为打造“潮玩之都”助力。潮玩“冰墩墩”外壳的图纸设计、打样、开模、打磨等几十道生产工序均在东莞完成。结合所学知识,完成下面小题。


31. “冰墩墩”外壳几十道生产工序在东莞完成的主要原因是()

- A. 原料丰富 B. 劳动力充足 C. 市场广阔 D. 产业基础好

32. 东莞打造“潮玩之都”最应该采取的措施是()

- A. 完善管理制度 B. 扩大生产规模 C. 加强设计研发 D. 保护生态环境

人口收缩是区域内一定时期(至少持续5年)人口负增长的现象。下图示意2000—2016年广东省各县区常住人口收缩类型分布。结合所学知识,完成下面小题。



33. 广东省常住人口持续收缩县区数量最多的是()

- A. 粤北山区 B. 珠江三角洲 C. 粤东地区 D. 粤西地区

34. 持续收缩县区常住人口减少的主要原因是外出（ ）

- A. 探亲 B. 求学 C. 旅游 D. 就业

“冰天雪地也是金山银山”。我国各地以北京冬奥会为契机,冰雪运动从过去“不进山海关”到“南展西扩东进”,中国冰雪运动的版图发生了深刻的变化。结合所学知识,完成下面小题。

35. 过去冰雪运动“不进山海关”的主要自然因素是（ ）

- A. 地形 B. 水文 C. 气候 D. 植被

36. 从“冰天雪地”转变为“金山银山”的合理路径不包括（ ）

- A. 推广冰雪运动 B. 开展冰雪旅游 C. 开发冰雪资源 D. 加速冰雪融化

内蒙古乌海市是世界葡萄种植的“黄金地带”,所产葡萄含糖量高、品质极佳。2020 年除了大棚种植的葡萄外,当地露天葡萄的单产大幅下降。结合所学知识,完成下面小题。

37. 当地所产葡萄含糖量高的主要原因是（ ）

- A. 降水丰富 B. 热量充足 C. 日温差大 D. 土壤肥沃

38. 2020 年当地露天葡萄单产大幅下降的原因可能是（ ）

- A. 低温冻害影响 B. 市场需求减少 C. 种植规模变小 D. 政策调整影响

在南极的雪坡上经常出现一抹红晕或一片“绿茵”,这主要是由可适应低温、贫营养、高光辐射强度环境的微藻所致。微藻多爆发于动物栖息地附近的冰面,尤其是企鹅聚集地。结合所学知识,完成下面小题。

39. 微藻多爆发在企鹅聚集地附近,是因为该地（ ）

- A. 气温较高 B. 光照较强 C. 降水较多 D. 养分较足

40. 可用于动态监测南极微藻生长范围的技术是（ ）

- A. 地理信息系统 B. 北斗卫星导航系统 C. 遥感 D. 全球定位系统

三、不定项选择题:本大题共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分。在每小题列出的四个选项中,至少有一个选项符合题目要求,少选且正确得 1 分,未选、错选均不得分。

白洋淀是华北平原腹地最大的淡水湖泊。下表为白洋淀某出露良好的地层中,不同时期的河流相和湖泊相沉积物的粒径比重。结合所学知识,完成下面小题。

沉积物粒径比重	砂粒含量(%)	粉砂含量(%)	黏土含量(%)
河流相	21.4	76.3	2.3
湖泊相	13.7	79.9	6.4

41. 与湖泊相沉积物相比,河流相沉积物（ ）

- A. 黏土比重大 B. 颗粒较粗 C. 砂粒比重大 D. 粉砂比重大

42. 不同时期的白洋淀沉积物粒径比重不同,其影响因素有（ ）

- A. 降水强度 B. 地形坡度 C. 水体流速 D. 植被覆盖度

云南省楚雄州东邻昆明市,地处亚热带高原区,花卉生长条件优越。近年来,楚雄州承接昆明市花卉生产转移,花卉产业不断发展壮大。结合所学知识,完成下面小题。

43. 楚雄州的气候特征是（ ）

- A. 气温日较差大 B. 气温年较差大 C. 光照充足 D. 降水量小

44. 与昆明市相比，楚雄州花卉种植的优势条件是（ ）

- A. 资金投入多 B. 种植历史久 C. 人工成本低 D. 地价较便宜

平潭岛位于福建省东部海域，岛上某林区的土壤为红壤，水土流失严重，土壤中的磷严重缺乏。该岛年降水量 900—2100mm，但淡水资源短缺，自然植被稀疏。结合所学知识，完成下面小题。

45. 对比东北平原的黑土，该林区红壤的特点是（ ）

- A. 土质较为疏松 B. 有机质含量低 C. 淋溶作用较强 D. 土壤的碱性强

46. 岛上自然植被稀疏的原因有（ ）

- A. 气候寒冷 B. 降水稀少 C. 蒸发旺盛 D. 土层浅薄

华南蓬火车站地处曼谷市中心区，是泰国最大、最古老的火车站，已于 2021 年停止运行。新建成的邦绥火车站位于曼谷北部郊区。下图示意华南蓬火车站及邦绥火车站位置。结合所学知识，完成下面小题。



47. 华南蓬火车站适宜改建成（ ）

- A. 创意文化园 B. 铁路博物馆 C. 商业综合体 D. 重化工业区

48. 曼谷邦绥火车站的建成有利于（ ）

- A. 提高城市等级 B. 带动郊区发展 C. 减少城区噪声 D. 优化空间配置

泚江发源于云南，汇入澜沧江。自西汉起，泚江两岸人民利用含盐的天然泉水，开发了 50 多处盐井，其中诺邓盐井曾经是滇西最大的盐井，当地人采用诺邓井盐纯手工制成的火腿远近闻名。结合所学知识，完成下面小题。

49. 影响泚江盐井分布的主导因素是（ ）

- A. 市场 B. 交通 C. 植被 D. 资源

50. 诺邓火腿体现了当地的地域文化，其影响因素不包括（ ）

- A. 现代工艺 B. 自然环境 C. 饮食习惯 D. 历史传统

广东省 2023 年第一次普通高中学业水平合格性考试

地理答案

一、单选题 1:本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。在每小题列出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。

【答案】1. A 2. D

【1 题详解】

读图可知，图中春季 3、4、5 月平均雾日数最多，其他季节雾日数较少，最低值出现在 10 月，故 A 正确，BCD 错误。故选 A。

【2 题详解】

沿岸海雾会影响大气的能见度，使大气能见度降低，影响近海航行，D 正确；滨海漫步、生蚝养殖、潮汐发电对大气能见度要求不高，受海雾影响小，ABC 错误。故选 D。

【点睛】海雾是海洋上低层大气中的一种水汽凝结(华)现象，由于水滴或冰晶 (或二者皆有)的大量积聚，使水平能见度降低到 1 公里以下，雾的厚度通常在 200~400 米左右。

【答案】3. A 4. D

【3 题详解】

由所学知识可知，对流层内集中了大气大部分的水汽、固体杂质，且空气下热上冷，以对流运动为主，天气现象复杂多变，有暴雨现象，A 正确；平流层和臭氧层中水汽、固体杂质少，空气下冷上热，以平流运动为主，多晴朗天气，BC 错误；高层大气的水汽、固体杂质极少，大气密度小、极为稀薄，天气现象少，D 错误。故选 A。

【4 题详解】

持续暴雨，在地势起伏较大地区，易发生滑坡，A 不符合题意；在地表松散物质较多地区，易发生泥石流，B 不符合题意；在地势低平地区，易发生洪涝灾害，C 不符合题意；地震主要由地球内力作用引起的，暴雨天气不会引发地震，D 符合题意。故选 D。

【点睛】大气对流层的范围约为地面以上至 12 千米处，对流层内气温随高度的升高而递减，该层大气下热上冷，空气对流运动旺盛，天气现象复杂多变。对流层顶的厚度随纬度和季节而发生变化。自低纬向高纬，对流层顶高度降低、厚度减小；同一地区的对流层顶高度，夏季较高，冬季较低。

【答案】5. D 6. B

【5 题详解】

创新产业园集聚的主要是科技创新企业，技术含量高，生物医药符合，D 正确；水产养殖属于第一产业，技术含量低，A 错误；日用化工，家具制造都属于资源消耗型产业，技术含量低，BC 错误；故选 D。

【6 题详解】

江门市位于我国广东省，对外交通便利，华人华侨众多，是建设华人华侨总部的最大优势，B 正确；人口数量，外国人数，留学生人数等这些都不是建设中国侨都华侨华人总部的主要考虑因素，ACD 错

误；故选 B。

【点睛】高新技术产业以高新技术为基础，从事一种或多种高新技术及其产品的研究、开发、生产和技术服务的企业集合。这种产业所拥有的关键技术往往开发难度很大，但一旦开发成功，却具有高于一般的经济效益和社会效益。高新技术产业是知识密集、技术密集的产业类型。产品的主导技术必须属于已确定的高新技术领域，而且必须包括高新技术领域中处于技术前沿的工艺或技术突破。根据这一标准，高新技术产业主要包括信息技术、生物技术、新材料技术三大领域。

【答案】7. B 8. A

【7 题详解】

地球陆地的地壳厚度在 39-41km，而中江气田埋深为 2—3km，这个深度依然在地壳范围之内，B 正确，地核、上地幔、下地幔都在地壳之下，该气田的深度不能到达，ACD 错误。故选 B。

【8 题详解】

矿产资源的开采不会导致当地气候类型的改变，④错误；开采天然气需要相关基础设施建设，能源开采也需要劳动力，所以会增加就业机会，①正确；天然气资源丰富，可变资源优势为经济优势，提高经济收入，②正确；开采出来的天然气加以应用，可提高天然气在当地能源消费的比重，有利于调整能源结构，③正确。①②③正确，故选 A。

【点睛】地壳是固体地球的最外一圈，主要是由富含硅和铝的硅酸盐岩石所组成的硬壳，其范围从地表到莫霍面。厚度变化较大，大洋地壳较薄，大陆地壳较厚，整个地壳平均厚约 17 千米。

【答案】9. D 10. C

【9 题详解】

图中年份相隔除了 1982—1990 年之外都是为 10 年，其中 2010—2020 年之间常住人口城镇化率由 33.23% 变化为 47.58%，变化幅度为 14.35%，是所有时段中最大的，这说明在 2010—2020 年青藏高原常住人口城镇化率增速最快，D 正确，1982—1990 年虽然时段较短，但是变化幅度很小，所以 ABC 选项错误。故选 D。

【10 题详解】

青藏高原气候高寒，生态脆弱，城镇化不宜快速扩张，快速扩张的城镇化模式不符合区域可持续发展原则，C 正确，ABD 错误。故选 C。

【点睛】随着全球气温升高，拥有大量冰川、湿地、冻土的青藏高原，生态环境已经变得更为脆弱，人类在该区域的经济活动必须充分考虑当地生态的脆弱性。

二、单选题II:本大题共 30 小题，每小题 2 分，共 60 分。在每小题列出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。

11. 【答案】B

【详解】太阳风发射的高能带电粒子会干扰电离层，影响火星探测器与地球的通信，B 正确；太阳引力、太阳光、极光都不会干扰电离层，ACD 错误。故选 B。

【点睛】太阳活动是太阳大气层里一切活动现象的总称，主要有黑子、耀斑、日珥、太阳风等。太阳活动对地球的影响有：扰乱地球大气层，使地面的无线电短波通讯受到影响，甚至会出现短暂的中断；高

能带电粒子扰动地球磁场，产生“磁暴”现象；当高能带电粒子流高速冲进两极地区的高空大气层时，会产生极光现象等。

【答案】12. A 13. B 14. A

【12 题详解】

根据题意可知，沙田形成于海边。沿海地区地形平坦，河流流速减慢，加上海水的顶托作用，泥沙在河流入海口地区大量沉积，A 正确；深海泥沙很难再返回陆地上堆积，B 错误；湖泊湖床低，泥沙沉积，不会再被搬运到沿海地区，C 错误；离干旱半干旱区远，少沙漠沉积物，D 错误。故选 A。

【13 题详解】

人类围垦力度加强，可以促进泥沙淤积，加快沙田的形成，B 正确；全球气候变暖，海平面上升，淹没沿海低地，沙田面积萎缩，A 错误；河流流速加快，侵蚀能力增强，堆积减弱，不利于沙田形成，C 错误；动物种类多与沙田形成关系较小，D 错误。故选 B。

【14 题详解】

沙田的形成演进使湿地面积萎缩，地表径流减少，A 正确；气候较为稳定，沙田演变对区域降水影响较小，B 错误；水汽输送涉及到大气环流，较为稳定，D 错误；地下径流主要与下渗相关，沙田演进使下渗量减小，但总体影响作用弱，C 错误。故选 A。

【点睛】人类活动影响水循环的具体措施：改变地表径流——最主要的影响方式修筑水库、塘坝等拦蓄洪水，增加枯水期径流量，由于水面面积的扩大和地下水水位的提高，可加大蒸发量。跨流域调水、扩大灌溉面积在一定程度上增加了蒸发量，使大气中水汽含量增加，降水量增加。影响地下径流——人类对地下水资源的开发利用、局部地区的地下工程建设都不可避免地地下径流产生影响，如雨季对地下水的人工回灌，抽取地下水灌溉，城市地下铁路的修建破坏地质结构、改变地下水的渗流方向等。影响局地大气降水——如人工降雨。影响蒸发——如植树造林、修建水库，可以增加局部地区的水汽供应量。

【答案】15. B 16. B 17. D

【15 题详解】

由图可知，与 2011 年相比，2018 年的轻度和中度土壤侵蚀强度导致的水土流失面积增加，但强烈、极强烈、剧烈土壤侵蚀强度导致的水土流失面积减少；由所学知识可知，强烈、极强烈、剧烈的土壤侵蚀导致的水土流失危害更大，故总体上看，2011~2018 年新疆水土流失现象趋缓，B 正确，ACD 错误，故选 B。

【16 题详解】

由图可知，与 2011 年相比，2018 年的轻度和中度土壤侵蚀强度导致的水土流失面积增加，中度土壤侵蚀强度导致的水土流失面积增加更多，A 错误，B 正确；强烈和剧烈土壤侵蚀强度导致的水土流失面积减小，CD 错误。故选 B。

【17 题详解】

新疆气候干旱，空气湿度小，不适合人工降雨，A 错误；新疆牧业占比较大，全面禁牧会影响地区社会经济发展，B 错误；陡坡开垦，地表土壤变得疏松，会加剧水土流失，C 错误；恢复植被可以增强植被保

持水土、防风固沙的生态效益，可以减缓新疆地区的水土流失等土地荒漠化现象，D 正确。故选 D。

【点睛】我国土地荒漠化现象严重，不同地区应对土地荒漠化的治理措施不同。内陆河流和山麓冲积扇地区应合理分配河流上、中、下游水资源，发展节水农业。半干旱的草原牧区应合理放牧，加强草场管理。干旱的绿洲边缘地区应发展节水农业，营造绿洲防沙林。半干旱的农垦区周围应扩大林草比重，调整土地利用结构；做好防风沙措施。工矿区、居民点等基本建设区应复垦土地，恢复植被。

【答案】18. A 19. C

【18 题详解】

与 1990 年相比，2018 年的湖岸线向外侧扩展，说明湖泊面积增大，湖水水位升高，水量增多，可推测在此期间，东恰错湖水输入量大于输出量，A 正确，排除 BCD。故选 A。

【19 题详解】

1990 年与 2018 年的湖岸线高度变化相等，二者在丙处的水平距离相差最大，说明丙处附近坡度最缓，C 正确。四地坡度由缓到陡依次为丙、丁、甲、乙，ABD 不合题意。故选 C。

【点睛】输入量大于输出量，说明湖泊中的水处于盈余状态，湖泊面积增大，输入量小于输出量，说明湖泊中的水处于亏损状态，湖泊面积缩小，输出量等于输入量，说明湖泊水的收入与支出达到平衡，湖泊面积稳定。

【答案】20. C 21. C

【20 题详解】

广东鼎湖山位于北回归线附近的亚欧大陆东岸，是亚热带季风气候，发育亚热带常绿阔叶林，C 正确；温带落叶阔叶林主要分布在温带季风气候区和温带海洋性气候区，热带草原分布在热带草原气候区，热带荒漠分布在热带沙漠气候区，均不属于亚热带季风气候区发育的代表性植被类型，ABD 错误。故选 C。

【21 题详解】

开垦梯田种粮和开挖矿产资源会破坏地表植被，不利于保护生物多样性，AD 错误；放生外来物种可能会导致生物入侵，影响本地植被生长，B 错误；调查珍稀物种，有利于进一步保护生物多样性，C 正确。故选 C。

【点睛】自然保护区指对自然界中有代表性的保护对象所在的区域，依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。自然保护区保护的对象主要包括自然生态系统，珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区，有特殊意义的自然遗迹等。建立自然保护区是保护自然环境和生物多样性的有效措施，是维护国家生态安全、促进生态文明、实现经济可持续发展的重要保障。

【答案】22. B 23. A 24. D

【22 题详解】

由图可知，区域主发展轴大致与海岸线平行，结合图中方向标可知，其走向呈西北——东南走向，B 正确。

【23 题详解】

陆海联动区主要依托北部通道，其中心城市是连云港，属于陇海——兰新铁路的东部起点，故依托的主

要运输方式是铁路，A 正确。图中没有标明连云港通往内陆地区的东西流向的河流，B 错误。管道运输具有局限性，只适合运输气态、液态物体，陆海联动区作为服务中西部地区对外开放的重要门户，管道运输无法满足其运输需求，C 错误。连云港航空运输不发达，且航空运输运量小、运费高，不适合作为主要交通方式，D 错误。故选 A。

【24 题详解】

江海联动区位于长江三角洲地区，同时联通有“黄金水道”之称的长江与海洋运输，交通便利，对外联系方便，为经济发展提供重要条件，D 正确。海岸线长只是海运发达的条件之一，不能突出江海联动的全面优势，A 错误。江海联动区所在的沿海地区属于泥质海岸，不具备刚阔水深的条件，B 错误。江海联动区地形平坦，落差小，水能匮乏，C 错误。故选 D。

【点睛】江海联动区临近上海，地理位置优越；可实现江海联运；经济基础雄厚；产业协作关系好。

【答案】25. B 26. C

【25 题详解】

大气的直接热源是地面辐射，空气中的水和二氧化碳吸收地面的长波辐射，B 正确；太阳辐射是短波辐射，不会直接使大气增温，A 错误；大气辐射是大气向外辐射，散热，C 错误；大气逆辐射是大气辐射中指向地面的，是大气散热的过程，D 错误。因此选择 B 项。

【26 题详解】

在高温的天气，着装宽松透气可以及时散热，A 表述正确；减少户外活动可以减少太阳辐射的影响，B 表述正确。坚持室外工作可能导致中暑，C 表述错误；适当补充水分防止水分大量散失，D 表述正确；因此选择 C 项。

【点睛】大气受热过程：太阳暖大地、大地暖大气、大气还大地。太阳辐射是地球上最主要的能量来源。大气的受热过程中大气对太阳辐射具有削弱作用，对地面具有保温作用。

【答案】27. B 28. D

【27 题详解】

不同种养模式下，耕地面积没有变化，A 错误；由传统的水稻种植转为稻虾种养，主要是社会经济发展水平的提高，人们对龙虾的市场需求量增加，B 正确；交通和劳动力数量对农业生产的类型影响不大，CD 错误。故选 B。

【28 题详解】

由材料可知，与 II 模式相比，III 模式无需开挖环沟，农田改造成本低，A 错误；不同模式下，农场面积不变，B 错误；II 模式的龙虾生长在环沟内，III 模式的龙虾生长在稻田内，龙虾的排泄物可以增加土壤肥力，故 III 模式可以减少化肥投入，增加土壤肥力，C 错误，D 正确。故选 D。

【点睛】农业区位因素包括自然因素和社会经济因素。自然因素中包括气候（光照、热量、昼夜温差、降水）、地形、水源、土壤等，社会经济因素包括市场、交通、政策、劳动力、技术等。市场的需求、农产品的价格在很大程度上决定了农业生产的类型和规模，从而影响农业区位的选择。

【答案】29. A 30. B

【29 题详解】

由图中等高线的分布规律可知，图中等高距是 100m，甲地的海拔在 1400~1500m 之间，乙地的海拔为 1000m，丙地的海拔在 1100~1200m 之间，丁地的海拔在 700~800m 之间。四地海拔由高到低的排序为甲>丙>乙>丁，A 正确，BCD 错误。故选 A。

【30 题详解】

山西省不在沿海地区，不受海陆风的影响，A 错误；由材料可知，该市城区位于河谷地带，因谷地和坡地的热力性质差异，白天盛行由山谷吹向山坡的谷风，城区污染物随谷风扩散，浓度降低；夜晚盛行由山坡吹向山谷的山风，城区污染物不易扩散，浓度较高，B 正确；山西省受龙卷风和台风影响小，且龙卷风和台风影响下，污染物扩散，短期内浓度降低，但不会出现明显的日变化，CD 错误。故选 B。

【点睛】山谷风是在天气晴朗的山地区域，风向昼夜间发生反向转变的风，其形成的关键是山坡表面和山谷上方同高度的空气的热力性质差异。白天，山坡比山谷上方同高度的空气增温快，气流上升，气压低，暖空气沿山坡上升，形成谷风。夜晚，山坡比山谷上方同高度的空气降温快，气流下沉，气压高，冷空气沿山坡下沉，形成山风。

【答案】31. D 32. C

【31 题详解】

“冰墩墩”外壳对技术、工艺等要求非常高，而目前，东莞拥有超过 4000 家玩具生产企业、近 1500 家上下游配套企业，玩具产业规模在珠三角城市中位居首位，逐步形成的庞大产业体系，因此东莞制造实力强大，产业基础好，才能独立完成“冰墩墩”外壳几十道生产工序，D 正确。原料、劳动力、市场，其他城市也可以满足这些条件，排除 ABC。故选 D。

【32 题详解】

加强产品设计研发，以创新争取市场，为自身创造独特的竞争优势，同时也树立起企业在业内的品牌形象，这对企业的转型升级颇有助力，C 正确。玩具企业对管理制度、生态环境的要求较小，排除 AD。企业发展到一定阶段，不能一味地追求生产规模扩张，必须要有自己的核心技术，打造高端产品，这样才能避免同质化竞争，抢占行业制高点，B 错误。故选 C。

【点睛】企业发展到一定阶段，不能一味地追求生产规模扩张，必须要有自己的核心技术，打造高端产品，这样才能避免同质化竞争，抢占行业制高点。

【答案】33. A 34. D

【33 题详解】

由图可知，常住人口持续收缩的县区主要在粤北山区和粤东地区，且粤北山区出现人口持续收缩的县区数量多于粤东地区，A 正确，C 错误；珠江三角洲地区和粤西地区没有人口持续收缩的县区，BD 错误。故选 A。

【34 题详解】

探亲 and 旅游属于短时间内的人口流动现象，不会导致至少持续 5 年的人口负增长，AC 错误；由所学区域知识可知，粤北山区经济较为落后，为获得更高的经济收入，人们外出就业，导致常住人口减少，D 正确；相比外出就业，外出求学人数较少，不是导致持续收缩县区常住人口减少的主要原因，B 错误。故选 D。

【点睛】影响人口迁移的主要自然因素有气候、淡水、土壤、矿产资源、自然灾害等。社会经济因素有经济发展水平、交通通信、文化教育、婚姻家庭、政策、政治、军事等。其中经济因素中的就业机会和收入水平是影响当前人口迁移的最主要的因素。

【答案】35. C 36. D

【35 题详解】

开展冰雪运动，需要有山地、大面积稳定的积雪，山海关以南地区，纬度较低，气温较高，冬季冰雪较少，开展冰雪运动的条件较差，C 正确；山海关以南地区也有适合开展滑雪运动的山地等地形，山海关以南地区河流较多，有适合开展冰上运动的水文条件，AB 错误；植被与冰雪运动关系不大，D 错误。故选 C。

【36 题详解】

推广冰雪运动，开展冰雪旅游，开发冰雪资源均有利于将“冰天雪地”的资源优势转化为“金山银山”的经济优势，ABC 不符合题意；加速冰雪融化将破坏冰雪资源，不利于将资源优势转化为经济优势，D 符合题意。故选 D。

【点睛】通过促进旅游业、服务业等第三产业的发展，加大对旅游业、服务业的管理，合理分工与布局，保护环境等均可促进区域的可持续发展。

【答案】37. C 38. A

【37 题详解】

内蒙古乌海市位于我国西北地区，非季风区，降水较少，A 错误；乌海市位于我国西北地区，纬度较高，热量条件较南方地区差，B 错误；乌海市位于西北地区，降水较少，昼夜温差大，有利于糖分的积累，C 正确；材料没有关于乌海市土壤肥沃的信息，且含糖量与土壤肥沃的关系不大，D 错误。故选 C。

【38 题详解】

受低温冻害的影响，葡萄单产大幅下降，A 正确；市场需求减少、种植规模变小、政策调整影响等会导致葡萄种植面积减小，产量降低，但对葡萄单产影响不大，BCD 错误。故选 A。

【点睛】气候因素中的热量（气温）影响作物的种类、分布、产量、复种制度等。气候因素中光照的强弱和时间的长短会影响作物光合作用的强弱，进而影响农业生产。气候因素中的降水特征影响作物种类，农业类型、耕地类型等。气候因素中的昼夜温差影响作物养分的积累，昼夜温差越大，作物积累的养分多，品质好。

【答案】39. D 40. C

【39 题详解】

由材料“微藻多爆发于动物栖息地附近的冰面，尤其是企鹅聚集地”结合四个选项进行分析可知，企鹅聚集地附近，企鹅的排泄物为微藻的生长繁殖提供了较为充足的养分，导致微藻爆发，D 正确；材料没有企鹅聚集地附近冰面与其他冰面关于气温、光照、降水等信息的对比，ABC 错误。故选 D。

【40 题详解】

遥感可以实现对地物信息的实时、动态监测，可以用于实时动态监测南极微藻的生长范围，C 正确；地理信息系统的主要功能是分析、处理地理数据，北斗卫星导航系统和全球定位系统的主要功能是定位、

导航，均不能用于动态监测南极微藻生长范围，ABD 错误。故选 C。

【点睛】遥感技术（RS）能实现地物信息的实时、动态监测。全球卫星导航系统（GNSS、BDS、GPS）可在全球范围内进行实时定位、导航、授时、测速。地理信息系统（GIS）有空间查询与分析功能，可以根据不同目的对相关数据进行叠加分析。

三、不定项选择题：本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题列出的四个选项中，至少有一个选项符合题目要求，少选且正确得 1 分，未选、错选均不得分。

【答案】41. BC 42. ACD

【41 题详解】

由表格可知，与湖泊相沉积物相比，河流相沉积物砂粒比重大、粉砂比重小、黏土比重小，AD 错误，C 正确；由于河流相沉积物中砂粒比重大、粉砂比重小、黏土比重小，故其颗粒较粗，B 正确。故选 BC。

【42 题详解】

河流相沉积物中粒径较大的砂粒占比较大，说明该时期流水侵蚀搬运能力较强，即流水流速较快，降水强度较大，植被覆盖率较低；湖泊相沉积物中粒径较小的黏土占比较大，说明该时期流水侵蚀搬运能力较弱，即流水流速较慢，降水强度较小，植被覆盖率较高；综合上述分析，可知不同时期的白洋淀沉积物粒径比重不同，其影响因素有降水强度、水体流速、植被覆盖度，ACD 正确；由材料“白洋淀是华北平原腹地最大的淡水湖泊”结合所学知识可知，华北平原地形平坦，故不同时期地形坡度差异小，B 错误。故选 ACD。

【点睛】河流的沉积物颗粒大小与河流流速呈正相关：流速越快，沉积物的颗粒越大；流速越慢，沉积物的颗粒越小。

【答案】43. AC 44. CD

【43 题详解】

楚雄州地处高原区，气温日较差大，A 正确；楚雄州地处亚热带高原区，冬季温暖，夏季凉爽，气温年较差小，B 错误；楚雄州地处高原区，海拔较高，空气较为稀薄，大气对太阳辐射的削弱作用弱，光照充足，C 正确；楚雄州属于亚热带季风气候区，总体而言，降水较丰富，D 错误。故选 AC。

【44 题详解】

由材料“近年来，楚雄州承接昆明市花卉生产转移，花卉产业不断发展壮大”可知，相比昆明，楚雄州花卉种植的产业基础较差，初期资金投入较多，后期资金投入差异不大，但资金投入较多不属于种植花卉的优势条件，A 错误；材料没有关于楚雄州花卉种植历史的相关信息，B 错误；楚雄州社会经济发展水平较低，人工成本和地价较低，CD 正确。故选 CD。

【点睛】农业区位因素包括自然因素和社会经济因素。自然因素中包括气候（光照、热量、昼夜温差、降水）、地形、水源、土壤等，社会经济因素包括市场、交通、政策、劳动力、技术等。

【答案】45. B 46. D

【45 题详解】

红壤的黏粒含量很高，质地黏重，其土壤风化度高，呈强酸性，有机质养分贫瘠，A、D 错误，B 正确。淋溶作用较强不属于土壤的特点，C 错误。故选 B。

【46 题详解】

平潭岛位于福建省东部海域，处于亚热带季风气候区，气温较高，A 错误；该岛年降水量 900—2100mm，降水较多，B 错误；蒸发作用本身对植被的影响较小，C 错误；红壤分布在我国南方的亚热带季风气候区，气温高，有机质分解快，加之降水丰富，腐殖质层淋溶作用强，分解快，因此发育较薄，导致自然植被稀疏，D 正确。故选 D。

【点睛】红壤中有机层和腐殖质层发育较薄是因为气温较高和水分较多。根据土壤分层知识可知，因红壤分布在我国南方的亚热带季风气候区，气温高，有机质分解快。加之降水丰富，腐殖质层淋溶作用强，分解快，因此发育较薄。

【答案】47. A 48. B

【47 题详解】

华南蓬火车站地处曼谷市中心区，是泰国最大、最古老的火车站，交通便利，经济发达，人流量大，历史悠久，适宜改建成创意文化园，增加经济收益，A 对；铁路博物馆 占地面积大，经济收益较小，不适合布局在市中心，B 错；该火车站是泰国最大、最古老的火车站，具有历史文化价值，不适宜改建成商业综合体，C 错；位于市中心，重化工业区环境污染严重，D 错。故选 A。

【48 题详解】

新建成的邦绥火车站位于曼谷北部郊区，该火车站的建成有利于带动北部郊区发展，郊区交通更加便利，促进经济发展，B 对；曼谷是泰国首都和最大城市，因此火车站的建成不会提高城市等级，A 错；火车还是要经过城区，城区噪声减少较少，C 错；火车站的建成有利于可以缓解市区交通拥堵状况，但无法优化空间配置，D 错；故选 B。

【点睛】铁路运输是当代最重要的运输方式之一，它的优点是运量较大，速度较快，运费较低，受自然因素影响较小，连续性较好。但是铁路运输也有其缺点，他需要铺设铁道并投入人力物力及时管理维护铁路通道，并且，其耗费的金属材料多，铁路通道占地面积相对广，且不具备像汽车一样一定的灵活性。短途运输的成本较高。

【答案】49. D 50. A

【49 题详解】

由材料“自西汉起，泚江两岸人民利用含盐的天然泉水，开发了 50 多处盐井”可知，影响泚江盐井分布的主导因素是资源，D 正确；由材料“其中诺邓盐井曾经是滇西最大的盐井”可知，市场需求也是当地开发井盐的重要区位因素，但前提条件是当地含盐的天然泉水，即资源，A 错误；含盐的天然泉水附近交通不一定便利，B 错误；植被与盐井关系不大，C 错误。故选 D。

【50 题详解】

由材料“当地人采用诺邓井盐纯手工制成的火腿远近闻名”可知，诺邓火腿纯手工制作，而不是现代工艺，A 错误；由材料“自西汉起，泚江两岸人民利用含盐的天然泉水，开发了 50 多处盐井”可知，当地含盐天然泉水丰富，人们形成了爱吃盐的饮食习惯，从而腌制火腿，BC 正确；由材料“自西汉起，泚江两岸人民利用含盐的天然泉水，开发了 50 多处盐井”和“当地人采用诺邓井盐纯手工制成的火腿远近闻名”可推知当地腌制火腿的历史悠久，D 正确。根据题意，故选 A。

【点睛】文化源于人类对自身和世界的感悟与认知，具有明显的地域性。地域文化具有地域性、多样性、独特性、相对稳定性。地域文化包括物质方面的，如建筑、服饰、饮食等；也包括非物质方面的，如价值观、制度、习俗、语言、艺术等。