


Cálculo III

Cálculo Diferencial de Várias Variáveis



Prof. Reginaldo Demarque

Universidade Federal Fluminense
Instituto de Humanidades e Saúde – RHS
Departamento de Ciências da Natureza – RCN

19 de agosto de 2025



Sumário

- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos
- 4 Superfícies
- 5 Funções Vetoriais
- 6 Funções de Várias Variáveis
- 7 Limite e Continuidade
- 8 Derivadas Parciais
- 9 Extremos de Funções de Várias Variáveis



Sumário

- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos
- 4 Superfícies
- 5 Funções Vetoriais
- 6 Funções de Várias Variáveis
- 7 Limite e Continuidade
- 8 Derivadas Parciais
- 9 Extremos de Funções de Várias Variáveis



Bibliografia



J. Stewart

Cálculo Volume 2

Editora Cengage Learning, 6ª ed., São Paulo, 2011.



G. B. Thomas

Cálculo Volume 2

Editora Pearson, 12ª ed., São Paulo, 2012.



Bibliografia

 Diomara Pinto. Maria Cândida Ferreira Morgado

Cálculo Diferencial e Integral de Funções de Várias Variáveis

Editora UFRJ, 3ª ed., 2005.



Sumário

- 1 Bibliografia
- 2 Introdução**
- 3 Retas e Planos
- 4 Superfícies
- 5 Funções Vetoriais
- 6 Funções de Várias Variáveis
- 7 Limite e Continuidade
- 8 Derivadas Parciais
- 9 Extremos de Funções de Várias Variáveis



Coordendas Polares

Traçar curvas complexas




FIGURA 16

$$r = \sin^2(2,4\theta) + \cos^4(2,4\theta)$$





FIGURA 17

$$r = \sin^2(1,2\theta) + \cos^3(6\theta)$$



Aplicação na engenharia de som

Engenheiros de som usam coordenadas polares para descrever padrões de sons de microfones. Um padrão de captação em forma de **cardioide** captura principalmente a fonte sonora para a qual é apontado, como um cantor ou um instrumento, ao mesmo tempo que reduz a captação de ruído ambiente e sistemas de monitoramento de palco.



Aplicação em Biologia

Em 1953, James Watson e Francis Crick mostraram que a estrutura da molécula de **DNA** é de duas hélices circulares paralelas interligadas.



Sabendo-se o raio da hélice de DNA, o número de voltas e a altura de cada volta, usando o conceito de **comprimento de curvas espaciais**, podemos calcular o comprimento da molécula de DNA.




Movimentos sobre curvas

No ensino médio, aprendemos que uma partícula em um **Movimento Circular Uniforme** tem velocidade constante v , mas para manter sua trajetória em um círculo de raio R , precisa de uma **força centrípeta**, que gera a chamada **aceleração centrípeta**, cuja fórmula é:

$$a_c = \frac{v^2}{R}$$

Contudo, para movimentos em uma curva qualquer, essa aceleração tem uma **forma vetorial**


$$\vec{a} = v'\vec{T} + \kappa v^2 \vec{N}$$




Funções de Várias Variáveis

Topografia

As **curvas de nível** de funções de várias variáveis tem como exemplos de aplicações o estudo topográfico ou das isotermas de regiões.





Produção restrita a um orçamento

A produção total P de certo produto depende do custo x de trabalho empregado e da quantidade y de capital investido. Na década de 1920 Charles Cobb e Paul Douglas obtiveram o seguinte modelo

$$P = bx^{\alpha}y^{1-\alpha},$$


onde b e α são constantes positivas e $\alpha < 1$.



Para uma firma com função de produção e restrição orçamentária dadas por

$$\begin{cases} P = x^{2/3}y^{1/3} \\ x + y = 3.78. \end{cases}$$

Teremos produção máxima $P = 2$ quando $x = 2.52$ e $y = 1.26$



Sumário


- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos**
- 4 Superfícies
- 5 Funções Vetoriais
- 6 Funções de Várias Variáveis
- 7 Limite e Continuidade
- 8 Derivadas Parciais
- 9 Extremos de Funções de Várias Variáveis



Equação Paramétrica de uma Reta

Sabemos que uma reta r pode ser inteiramente descrita por **equação vetorial paramétrica**

$$P = A + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}.$$




onde A é um ponto fixado de r e $\vec{v}$ é um vetor diretor desta reta.



Equação Paramétrica de uma Reta

Sabemos que uma reta r pode ser inteiramente descrita por **equação vetorial paramétrica**

$$P = A + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}.$$




onde A é um ponto fixado de r e $\vec{v}$ é um vetor diretor desta reta.



Equação Paramétrica de uma Reta

Sabemos que uma reta r pode ser inteiramente descrita por **equação vetorial paramétrica**

$$P = A + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}.$$



onde A é um ponto fixado de r e $\vec{v}$ é um vetor diretor desta reta.



Em coordenadas

Se $P = (x, y)$, $A = (x_0, y_0)$ e $\vec{v} = (a, b)$

$$r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Se $P = (x, y, z)$, $A = (x_0, y_0, z_0)$ e $\vec{v} = (a, b, c)$

$$r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Estas equações são chamadas simplesmente de **equações paramétricas da reta** r .





Exemplo


- a Determinar as equações paramétricas da reta r que passa pelos pontos $A = (1, 2, -2)$ e $B = (-1, 4, 2)$.
- b Sejam $A = (0, 1, 8)$, $B = (-3, 0, 9)$ e $r : X = (1, 2, 0) + t(1, 1, -3)$. Determine o ponto C de r tal que A, B e C sejam vértices de um triângulo retângulo com ângulo reto no vértice A .



Equação Cartesiana do Plano no Espaço

Sejam $A = (x_0, y_0, z_0)$ um ponto de um plano em $\mathbb{R}^3$, $\vec{n} = (a, b, c) \perp \pi$, então os pontos $P = (x, y, z)$ do plano devem satisfazer a seguinte equação cartesiana

$$ax + by + cz + d = 0$$





Exemplo

- 1 Determine a equação do plano que passa por $A = (1, 3, 2)$, $B = (3, -1, 6)$ e $C = (5, 2, 0)$.
- 2 Determine o ponto da reta

$$r : \begin{cases} x = 2 + 3t, \\ y = -4, \\ z = 5 + t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

que intercepta o plano $4x + 5y - 2z = 18$.

- 3 Determine a equação do plano que passa pelo ponto $A = (1, 0, 1)$ e é perpendicular à reta $r : X = (-1, 1, 2) + t(-1, 2, 1)$, $t \in \mathbb{R}$.





Para Casa 1

- 1 Determine uma equação para o plano que passa pelos pontos $A = (0, 1, 1)$, $B = (1, 0, 1)$ e $C = (1, 1, 0)$.
- 2 Determine as equações paramétricas da reta dada pela interseção dos planos $x + y + z = 1$ e $x - 2y + 3z = 1$.
- 3 Determine as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto $(1, 0, 6)$ e é perpendicular ao plano $x + 3y + z = 5$.




Coordenadas Polares

Um sistema de **coordenadas polares** é estabelecido da seguinte forma:


- 1 Fixamos um ponto no plano, conhecido como **polo** (ou origem), denotado por O .
- 2 Fixamos uma semi-reta a partir de O , chamada **eixo polar**.

As **coordenadas polares** de ponto P do plano são formadas por um par ordenado (r, θ) , sendo r a distância de P a O e θ o ângulo entre o eixo polar e a reta OP .



Convenções

- Um ângulo é **positivo** se for medido no sentido anti-horário a partir do eixo polar e **negativo** se for medido no sentido horário.
- $(0, \theta)$ representa o **polo** para qualquer valor de θ .
- Se $r < 0$, a coordenada (r, θ) corresponde ao simétrico, em relação à origem, do ponto $(|r|, \theta)$.






Exemplo

Marque os pontos cujas coordenadas polares são dadas

- a $(1, 5\pi/4)$ b $(2, 3\pi)$ c $(2, -2\pi/3)$ d $(-3, 3\pi/4)$






Exemplo

Marque os pontos cujas coordenadas polares são dadas

- a $(1, 5\pi/4)$ b $(2, 3\pi)$ c $(2, -2\pi/3)$ d $(-3, 3\pi/4)$



```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

ax = plt.axes(projection='polar')
angulos=list(range(0, 360, 15))
raios = [1, 2, 3, 4]

# plota os pontos
plt.polar(5*np.pi/4,1, 'g.')
plt.polar(3*np.pi,2, 'b.')
plt.polar(-2*np.pi/3,2, 'k.')
plt.polar(3*np.pi/4,3, 'r.')
plt.polar(3*np.pi/4+np.pi,3, 'r.')

ax.set_thetagrids(angulos)
ax.set_rgrids(raios)
plt.show()
```



Relação entre coordenadas cartesianas e polares

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r^2 = x^2 + y^2$$

O **gráfico de uma equação polar** consiste em todos os pontos P que têm pelo menos uma representação (r, θ) cujas coordenadas satisfaçam a equação.



Exemplo

Esboce a curva que é representada pelas equações polares abaixo.

a $r = 2$

b $\theta = 1$








Exemplo


Esboce a curva que é representada pela seguinte equação polar


$$r = 1 + \cos(\theta) \text{ (cardioide)}$$











Plotando a Cardiode

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

ax = plt.axes(projection='polar')

#plotar o gráfico
theta= np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
r=1+np.cos(theta)
plt.polar(theta, r)

#construir a malha
raios = [0.5,1,1.5,2,2.5]
angulos=list(range(0, 360, 15))
ax.set_thetagrids(angulos)
ax.set_rgrids(raios)

plt.show()
```

Sumário

- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos
- 4 Superfícies**
- 5 Funções Vetoriais
- 6 Funções de Várias Variáveis
- 7 Limite e Continuidade
- 8 Derivadas Parciais
- 9 Extremos de Funções de Várias Variáveis




Superfícies Cilíndricas

Uma **superfície cilíndrica** é aquela gerada por uma reta ℓ que se move ao longo de uma curva plana dada, de modo que a reta ℓ sempre esteja paralela a uma reta fixa. A reta ℓ é chamada de **geratriz** e a curva de **diretriz**.



Exemplo

A equação $z = x^2$ em $\mathbb{R}^3$ representa a seguinte superfície cilíndrica.





Exemplo

Esboce as superfícies

a $y^2 + z^2 = 1$

b $z = 1 - y^2$



Superfícies de Revolução





Figura 2.2 da tese de doutorado [Speckle statistics and beyond: Evolution in curved space and weakly scattering media](#), de Vincent Schultheiß. Licenciado sob CC BY-NC-SA 4.0.



Uma **superfície de revolução** é aquela obtida pela rotação de uma curva plana, chamada de **geratriz**, em torno de uma reta fixa, chamada de **eixo**, que pertence ao mesmo plano da curva.



Quando a superfície é obtida pela revolução de uma curva que pode ser descrita como uma função no plano zx , isto é,

$$r = x(z).$$

Então, a equação da superfície é:

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

A figura anterior é a superfície gerada pela revolução da curva

$$r = \sqrt{1 + z^2}$$



Exemplo

Determine a equação, e faça um esboço, das superfícies de revolução :



- ① geratriz $x^2 + z^2 = 16$, no plano zx , em torno do eixo z .
- ② geratriz $x^2 = 4y$, no plano xy , em torno do eixo y .

Superfícies Quádricas

Uma **superfície quádrica** é o gráfico de uma equação do segundo grau a três variáveis, isto é, uma equação da forma:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0,$$


onde pelo menos um dos coeficientes A, B, C, D, E ou F é **não nulo**.



Forma Padrão

Através de uma rotação e uma translação é possível colocar a **superfície quádrica** em uma das chamadas **forma padrão**.


Elipsoide: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$




Forma Padrão

Através de uma rotação e uma translação é possível colocar a **superfície quádrlica** em uma das chamadas **forma padrão**.


Elipsoide: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$




Hiperboloide de uma folha: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$




Hiperboloide de duas folha: $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$




Cone: $z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$



Paraboloide Elíptico: $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$



Paraboloide Hiperbólico: $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$



Equação	Característica	Classificação
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	3 termos quadráticos = 1 Sem sinal negativo	Elipsoide
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	3 termos quadráticos = 1 1 sinal negativo	Hiperboloide de 1 folha
$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	3 termos quadráticos = 1 2 sinais negativo	Hiperboloide de 2 folha
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$	2 termos quadráticos = ao terceiro	Cone
$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$	1 termo linear = 2 quadráticos com mesmo sinal	Paraboloide Elíptico
$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$	1 termo linear = 2 quadráticos com sinais opostos	Paraboloide Hiperbólico





Exemplo

Reconheça e esboce às quádricas

① $z = 4x^2 + y^2$

② $z = y^2 - x^2$

③ $\frac{x^2}{4} + y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$



$$1. x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$$

$$2. z^2 + 4y^2 - 4x^2 = 4$$

$$3. 9y^2 + z^2 = 16$$

$$4. y^2 + z^2 = x^2$$

$$5. x = y^2 - z^2$$

$$6. x = -y^2 - z^2$$

$$7. x^2 + 2z^2 = 8$$

$$8. z^2 + x^2 - y^2 = 1$$


$$9. x = z^2 - y^2$$

$$10. z = -4x^2 - y^2$$


$$11. x^2 + 4z^2 = y^2$$

$$12. 9x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 36$$


a.




b.




c.




d.




e.




f.




g.




h.




i.




j.




k.



l.



Batata Pringles






Uma antena parabólica reflete sinais para o foco de um paraboloide.




Reatores nucleares têm torres de arrefecimento com a forma de hiperboloides.



Hiperboloides produzem transmissão por engrenagens.



Restaurante Los Manantiales – Félix Candela (México)



Trata-se de quatro paraboloides hiperbólicos idênticos construídos em concreto armado, rotacionados e interseccionados em seu centro.





Vila Velha, praia da costa, ES

Sumário

- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos
- 4 Superfícies
- 5 Funções Vetoriais**
- 6 Funções de Várias Variáveis
- 7 Limite e Continuidade
- 8 Derivadas Parciais
- 9 Extremos de Funções de Várias Variáveis



Definição 1

Uma **função vetorial** é uma função cujo domínio é um conjunto de números reais e cuja imagem é um conjunto de vetores em $\mathbb{R}^n$, denotada por:

$$\begin{aligned}\vec{r}: D \subset \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\longmapsto \vec{r}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t)).\end{aligned}$$

As funções $f_1, \dots, f_n$ são chamadas **funções componentes**.

Example 5.1

- ① $\vec{r}(t) = (t, t), t \in \mathbb{R}.$
- ② $\vec{r}(t) = (t, 1, 0), t \geq 0.$



Definição 2

Sejam $\vec{r}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))$ uma função vetorial com domínio D . Definimos o **limite de $\vec{r}(t)$ quando t tende a $a \in D$** por

$$\lim_{t \rightarrow a} \vec{r}(t) = \left(\lim_{t \rightarrow a} f_1(t), \dots, \lim_{t \rightarrow a} f_n(t) \right),$$

desde que o limite das funções componentes existam.



Exercício

Determine $\lim_{t \rightarrow 0} \vec{r}(t)$, onde $\vec{r}(t) = (1 + t^3, te^{-t})$.



Definição 3

Uma função vetorial $\vec{r}$ é **contínua em a** se $\lim_{t \rightarrow a} \vec{r}(t) = \vec{r}(a)$.

Em vista desta definição, uma função $\vec{r}$ é **contínua em a** se, e somente se, cada uma de suas **componentes é contínua em a** .



Curvas Parametrizadas no plano

Quando uma função vetorial $\vec{r}(t) = (f(t), g(t))$, está definida em um intervalo I da reta e é **contínua**, então o conjunto C de todos os pontos (x, y) do plano tais que

$$x = f(t) \text{ e } y = g(t) \quad (1)$$

quando t varia formam uma **curva no plano**. As equações em (1) são ditas **equações paramétricas de C** , $\vec{r}$ é dita ser uma **parametrização de C** e t é chamado de **Parâmetro**.



Exemplo

Determine as curvas parametrizadas por:

- 1 $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t)), t \in [0, 2\pi]$.
- 2 $\vec{r}(t) = (\cos(2t), \sin(2t)), t \in [0, 2\pi]$.

Veja como plotar curvas parametrizadas usando python [▶ Link](#)



Parametrização de Função

O gráfico de qualquer função $y = f(x)$ pode ser parametrizado de forma natural usando a variável x como parâmetro, da seguinte forma:

$$\vec{r}(t) = (t, f(t)), \quad t \in I.$$



Exercício

Determine uma parametrização para a parábola $y = x^2$.





Para Casa 2

- 1 Determine uma parametrização para o segmento de reta que entre os pontos $(1, 0)$ e $(2, 5)$.
- 2 Determine a curva parametrizada por $\vec{r}(t) = (2 \cos(t), \sin(t))$, $t \in [0, 2\pi]$.



Usando coordenadas Polares para Parametrizar

Se em uma equação polar conseguirmos escrever a coordenada r em função de θ , isto é, $r = f(\theta)$, então podemos usar θ como parâmetro e parametrizar a curva representada pela equação polar da seguinte forma:

$$\vec{\alpha}(\theta) = f(\theta)(\cos \theta, \sin \theta)$$



Exemplo

Uma parametrização da cardioide $r = 1 + \cos \theta$

$$\vec{\alpha}(\theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta) = (1 + \cos(\theta))(\cos \theta, \sin \theta), \quad \theta \in [0, 2\pi].$$





Para Casa 3

Esboce a curva que é representada pelas equações polares abaixo.

1 $r = 2 \cos \theta$

2 $r = \cos 2\theta$ (rosácea de quatro pétalas)



Curvas Parametrizadas no espaço

Quando uma função vetorial $\vec{r}(t) = (f(t), g(t), h(t))$, está definida em um intervalo I da reta e é **contínua**, então o conjunto C de todos os pontos (x, y, z) do plano tais que

$$x = f(t), \quad y = g(t) \quad \text{e} \quad z = h(t) \quad (2)$$

quando t varia formam uma **curva no espaço**. As equações em (2) são ditas **equações paramétricas de C** , $\vec{r}$ é dita ser uma **parametrização de C** e t é chamado de **Parâmetro**.



Exemplo

Determine as curvas parametrizadas por:

- 1 $\vec{r}(t) = (1, t, 2t), t \in (0, 1).$
- 2 $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t), t \in [0, 2\pi].$

Veja como plotar curvas parametrizadas usando python [▶ Link](#)



Hélices

A curva do exemplo anterior é uma **hélice**. Existem vários tipos de hélices, as mais simples são as **hélices circulares com passo constante**, cuja parametrização é dada por

$$\vec{r}(t) = (a \cos(t), a \sin(t), bt),$$

onde a, b são constantes.

As hélices aparecem em diversas aplicações, como por exemplo no formato de molas e no modelo de DNA que é formado por uma dupla hélice.



Parametrização por interseção de superfícies

Muitas curvas no espaço, podem ser parametrizadas via interseção de duas superfícies.



Exemplo

Determine uma equação vetorial que represente a curva obtida pela interseção das superfícies:

- 1 da esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 2z = 3$ com o plano $z = \frac{3}{2}$.
- 2 do cilindro $x^2 + y^2 = 1$ com o plano $y + z = 2$.
- 3 do parabolóide $x^2 + y + z^2 = 1$ com o cilindro $y = x^2$





Para Casa 4

- 1 Determine uma parametrização para o círculo de centro em $(1, 2)$ e raio 3.
- 2 Determine uma parametrização para o segmento de reta ligando o ponto $P = (1, 3, -2)$ ao ponto $Q = (2, -1, 3)$.
- 3 Calcule $\|\vec{r}(t)\|$, onde $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $t \in \mathbb{R}$.
- 4 Mostre que a curva $\vec{r}(t) = (t \cos t, t \sin t, t)$ está contida no cone $z^2 = x^2 + y^2$ e use esse fato para esboçar a curva.
- 5 Determine uma equação vetorial que represente a curva obtida pela interseção dos dois parabolóides: $z = 2x^2 + \frac{y^2}{2}$ e $z = 4 - 2x^2 - \frac{3y^2}{2}$.



Definição 4

A **derivada** de uma função vetorial $\vec{r}$ é definida por:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{r}'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t+h) - \vec{r}(t)}{h},$$

se esse limite existir.

Interpretação Geométrica

O vetor $\vec{r}'(t)$ é um **vetor tangente** à curva parametrizada por $\vec{r}$ no ponto $P = \vec{r}(t)$.



Proposição 5

Se $\vec{r}(t) = (f_1(t), \dots, f_n(t))$, onde f_i , com $i = 1, \dots, n$, são funções deriváveis, então

$$\vec{r}'(t) = (f_1'(t), \dots, f_n'(t))$$



Exemplo

Encontre o vetor tangente unitário no ponto $t = 0$ da curva

$$\vec{r}(t) = (1 + t^3, te^{-t}, \sin(2t)) .$$



Proposição 6

Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ funções vetoriais diferenciáveis, c uma constante e f uma função real. Então,


- 1 $\frac{d}{dt} (\vec{u}(t) + \vec{v}(t)) = \vec{u}'(t) + \vec{v}'(t)$
- 2 $\frac{d}{dt} (c\vec{u}(t)) = c\vec{u}'(t)$
- 3 $\frac{d}{dt} (f(t)\vec{u}(t)) = f'(t)\vec{u}(t) + f(t)\vec{u}'(t)$
- 4 $\frac{d}{dt} (\vec{u}(t) \cdot \vec{v}(t)) = \vec{u}'(t) \cdot \vec{v}(t) + \vec{u}(t) \cdot \vec{v}'(t)$
- 5 $\frac{d}{dt} (\vec{u}(t) \times \vec{v}(t)) = \vec{u}'(t) \times \vec{v}(t) + \vec{u}(t) \times \vec{v}'(t)$
- 6 $\frac{d}{dt} (\vec{u}(f(t))) = f'(t)\vec{u}'(f(t))$ (regra da cadeia)





Exemplo

Mostre que se $\|\vec{r}(t)\| = c$ para todo $t \in I$, então $\vec{r}'(t)$ é ortogonal a $\vec{r}(t)$ para todo $t \in I$.



Comprimento de Arco

Se $\vec{r} = \vec{r}(t)$, com $a \leq t \leq b$, é curva parametrizada e $\vec{r}'$ é contínua, pode-se mostrar que o **comprimento de arco** é dado por:

$$L = \int_a^b \|\vec{r}'(t)\| dt$$



Exemplo

Um planador está voando para cima ao longo da hélice $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$. Qual a distância percorrida ao longo de sua trajetória entre os pontos $(1, 0, 0)$ e $(1, 0, 2\pi)$.



Uma mesma curva C pode ser representada por mais de uma parametrização. Por exemplo,

$$\vec{\alpha}(t) = (\cos(t), \sin(t)), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

e

$$\vec{\beta}(t) = (\cos(2t), \sin(2t)), \quad 0 \leq t \leq \pi$$

ambas representam o círculo unitário com centro na origem.



Exercício

Calcule o comprimento de arco de $\vec{\alpha} = \vec{\alpha}(t)$ e $\vec{\beta} = \vec{\beta}(t)$.



Função Comprimento de Arco

Seja C uma curva parametrizada por $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, onde $\vec{r}'$ é contínua. Definimos a sua **função comprimento de arco** por

$$s(t) = \int_a^t \|\vec{r}'(u)\| du.$$

Note que

$$\frac{ds}{dt} = \|\vec{r}'(t)\| \geq 0,$$

assim $s = s(t)$ é uma **função crescente** e de classe C^1 . Neste caso, s possui uma inversa, denotada por $t = t(s)$.



Parametrização pelo Comprimento de Arco

Isso nos permite reparametrizar a curva C em relação ao comprimento de arco fazendo

$$\vec{r}(s) = \vec{r}(t(s)), \quad 0 \leq s \leq L,$$

onde L é o comprimento final da curva.

É frequentemente útil usar a parametrização em relação ao comprimento de arco, pois este não depende do sistema de coordenadas nem da parametrização.





Exemplo

Reparametrize a hélice circular $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$ utilizando o comprimento de arco a partir do ponto $(1, 0, 0)$.

Quando a curva está parametrizada pelo comprimento de arco, geometricamente isso significa que o ponto $\vec{r}(s)$ é o ponto da curva que está a s unidades de comprimento do início da curva.





Para Casa 5

Seja $\vec{r}(t) = (e^t \sin(t), e^t \cos(t), \sqrt{2}e^t)$ e $P = (0, 1, \sqrt{2})$.

- 1 Encontre a função comprimento de arco da curva medida a partir do ponto P na direção crescente de t .
- 2 Reparametrize a curva com relação ao comprimento de arco começando de P .
- 3 Encontre o ponto a 4 unidades de P ao longo da curva na direção crescente de t .




Vetor Tangente Unitário

Uma parametrização $\vec{r} = \vec{r}(t)$ é chamada **suave** em um intervalo I se $\vec{r}'$ for contínua e $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$ em I .

Se C é uma curva parametrizada por $\vec{r} = \vec{r}(t)$ suave, então o **vetor tangente unitário** é definido por:

$$\vec{T}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|}.$$

O vetor tangente unitário indica a direção da curva e muda de direção muito devagar quando a curva C é razoavelmente reta, mas muda mais rapidamente quando se dobra mais acentuadamente.



A **curvatura** de C em dado ponto é definida como

a taxa de variação da direção do vetor tangente unitário por unidade de comprimento,

em outras palavras,

a medida de quão rapidamente a curva muda de direção no ponto.

Por isso, definimos a curvatura como a norma da taxa de variação do vetor tangente unitário com relação ao comprimento de arco, a saber,

$$\kappa(s) = \left\| \frac{d\vec{T}(s)}{ds} \right\|,$$

onde $\vec{T}$ é o vetor tangente unitário.



Entretanto, na maioria das vezes a curva não está parametrizada pelo comprimento de arco. Neste caso, podemos usar a Regra da Cadeia para obter uma fórmula em termos de um parâmetro qualquer. Se $s = s(t)$ é a função comprimento de arco, então:

$$\frac{d\vec{T}(s(t))}{dt} = \frac{d\vec{T}(s)}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{d\vec{T}}{ds} \|\vec{r}'(t)\|.$$

Logo,

$$\kappa(t) = \frac{\|\vec{T}'(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|}.$$



Exemplo

Calcule a curvatura de um círculo de raio ρ .




Vetor Normal Principal e Binormal

Como $\vec{T}$ é unitário, sabemos que $\vec{T}$ é ortogonal à $\vec{T}'$, portanto definimos o **vetor normal unitário principal** ou simplesmente **vetor normal unitário** como

$$\vec{N}(t) = \frac{\vec{T}'(t)}{\|\vec{T}'(t)\|}.$$

Veremos que este vetor indica a direção que na qual a curva está virando em cada ponto. A partir dele, definimo o **vetor binormal unitário**

$$\vec{B}(t) = \vec{T}(t) \times \vec{N}(t).$$



Estes três vetores formam uma base ortonormal muito importante em geometria diferencial e no estudo de movimento de corpos, chamada de **Triedro de Frenet**.





Exemplo

Determine os vetores normal e binormal da hélice circular

$$\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t).$$



Movimento: velocidade e aceleração

Suponha que uma partícula se mova de forma que seu vetor posição no instante t seja $\vec{r}(t)$. Então vamos denotar por:

- $\vec{v}(t) = \vec{r}'(t)$ é o vetor **velocidade da partícula** no instante t .
- $v(t) = \|\vec{v}(t)\|$ é a **velocidade escalar** da partícula no instante t .
- $\vec{a}(t) = \vec{r}''(t)$ é o vetor **aceleração** da partícula no instante t .
- $a(t) = \|\vec{a}(t)\|$ a aceleração escalar da partícula no instante t .



Podemos mostrar que a aceleração é dada por:

$$\vec{a} = v'\vec{T} + v^2\kappa\vec{N}.$$

Com isso temos as seguintes conclusões:

- O vetor $\vec{B}$ não aparece, ou seja, a aceleração sempre está no plano determinado por $\vec{T}$ e $\vec{N}$, chamado **plano osculador**.
- A componente tangencial da aceleração mede a taxa de variação do módulo da velocidade, isto é, a mudança na velocidade escalar.
- A componente normal é dada pelo quadrado da velocidade escalar e pela curvatura.



Exemplo

Um objeto de massa m que se move em uma trajetória circular com velocidade angular constante ω tem vetor posição dado por $\vec{r}(t) = (\rho \cos(\omega t), \rho \sin(\omega t))$. Determine a força que age sobre o objeto.



Usando a última equação, podemos deduzir a seguinte fórmula para a curvatura.

Teorema 7

A curvatura de uma curva parametrizada suave $\vec{r} = \vec{r}(t)$ é dada por:

$$\kappa(t) = \frac{\|\vec{v}(t) \times \vec{a}(t)\|}{v^3(t)} = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}.$$



Exemplo

Determine a curvatura da cúbica retorcida $\vec{r}(t) = (t, t^2, t^3)$.





Para Casa 6

- 1 Mostre que a curvatura de uma curva plana que tem equação cartesiana da forma $y = f(x)$ é dada por:

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{(1 + [f'(x)]^2)^{3/2}}.$$

- 2 Calcule a curvatura da parábola $y = x^2$ e determine o ponto onde a curvatura é máxima.
- 3 Determine as componentes normal e tangencial da aceleração da partícula que se move segundo a trajetória $\vec{r}(t) = e^{-t} \vec{i} + e^t \vec{j}$.
- 4 Uma partícula se move sobre a parábola $y = x^2$ da esquerda para a direita. Quando ela passa pelo ponto $(2, 4)$, sua velocidade é $v = 3$ m/s e $v' = 7$ m/s². Ache o vetor velocidade e o vetor aceleração neste ponto.



Sumário


- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos
- 4 Superfícies
- 5 Funções Vetoriais
- 6 Funções de Várias Variáveis**
- 7 Limite e Continuidade
- 8 Derivadas Parciais
- 9 Extremos de Funções de Várias Variáveis



Funções de Várias Variáveis

Uma **função real f de n variáveis** é uma relação que associa a cada n -upla $(x_1, \dots, x_n) \in D \subset \mathbb{R}^n$ um único número real $z = f(x_1, \dots, x_n)$. O subconjunto D de $\mathbb{R}^n$ é chamado **domínio** da função f . Podemos denotar a função f por

$$\begin{aligned} f : \quad D \subset \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto z = f(x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$





Exemplo


- 1 A função $V(r, h) = \pi r^2 h$, $r, h > 0$ é uma função de duas variáveis que fornece o volume de um cilindro circular reto de raio da base r e altura h .
- 2 A função $z = f(x, y) = \frac{1}{x-y}$ é uma função de duas variáveis cujo domínio são todos os pontos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tais que $x \neq y$.
- 3 A função $f(x, y, z) = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ é uma função de três variáveis cujo domínio são todos os pontos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tais que $x^2 + y^2 + z^2 \neq 0$, ou seja, $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$.



Gráfico de uma função de duas variáveis

O **gráfico de uma função** $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, denotado por G_f , é o subconjunto do $\mathbb{R}^3$ formado por todos os pontos da forma $(x, y, f(x, y))$, isto é,


$$G_f := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = f(x, y), (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$$



Temperatura abaixo da superfície da Terra

A temperatura w abaixo da superfície da Terra é uma função da profundidade x abaixo da superfície e da época do ano t . Se medirmos x em pés e t como o número de dias decorridos a partir da data esperada da maior temperatura anual da superfície, podemos modelar a variação da temperatura com a função

$$w = \cos(1.7 \times 10^{-2}t - 0.2x)e^{-0.2x}$$





Exemplo

Esboce o gráfico da função $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$.



```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

def f(x, y):
    return 6-3*x-2*y

x =y=np.linspace(-5,5, 25)


X,Y=np.meshgrid(x, y)
Z = f(X, Y)

fig=plt.figure()
ax=plt.axes(projection='3d')

ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_zlabel('z')
ax.plot_surface(X, Y, Z,cmap='viridis')



plt.show()
```





Curvas e Superfícies de Nível


Uma curva ao longo da qual uma função $z = f(x, y)$ tem valor constante é denominada **curva de nível** da função f .



Quando a função f representa a temperatura, as curvas de nível de f são chamadas **isotermas**. Se f representa o potencial elétrico, as curvas de nível de f são ditas **curvas equipotenciais**. A equação da curva de nível ao longo da qual a função assume valor constante k é

$$f(x, y) = k.$$

Se S é a superfície do gráfico de uma função f , um conjunto de curvas de nível de uma função f é dito **um mapa de contorno da superfície S** .





Exemplo


A temperatura em cada ponto (x, y) de uma placa de metal plana é dada, em graus, pela função $T(x, y) = 4x^2 + y^2$. Faça uma mapa de contorno das isotermas.






Exemplo

A temperatura em cada ponto (x, y) de uma placa de metal plana é dada, em graus, pela função $T(x, y) = 4x^2 + y^2$. Faça uma mapa de contorno das isothermas.




(a) Mapa de contorno




(b) Cortes horizontais são curvas de nível elevadas






Mapa topográfico de uma região montanhosa.






Temperatura média do ar ao nível do mar no mês de julho em Fahrenheit





(a) Curvas de nível de $f(x, y) = -xye^{-x^2-y^2}$



(b) Duas vistas de $f(x, y) = -xye^{-x^2-y^2}$







FIGURA 19

(c) Curvas de nível de $f(x, y) = \frac{-3y}{x^2+y^2+1}$





(d) $f(x, y) = \frac{-3y}{x^2+y^2+1}$





Degradê de cores para indicar os níveis. Varia do roxo para o vermelho na ordem crescente.



$$z = xye^{-\frac{1}{2}(x^2 + y^2)}$$



$$z = xy$$




Superfícies de Nível

No caso de funções de três variáveis, um conjunto no qual uma função $f(x, y, z)$ tem valor constante é dita **uma superfície de nível** da função f .



Exemplo

Descreva as superfícies de nível da função $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.





Para Casa 7

- 1 Esboce a região de domínio da função

$$f(x, y) = x \log(y^2 - x)$$

- 2 Determine o domínio e esboce o gráfico da função

$$f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}.$$

- 3 Faça um mapa de contorno da função $f(x, y) = 4 - x^2 - y$ para os níveis 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1 e faça um esboço do gráfico.

- 4 Descreva as superfícies de nível da função $f(x, y, z) = z - x^2 - y^2$.



Sumário

- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos
- 4 Superfícies
- 5 Funções Vetoriais
- 6 Funções de Várias Variáveis
- 7 Limite e Continuidade**
- 8 Derivadas Parciais
- 9 Extremos de Funções de Várias Variáveis



Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função cujo domínio contém pontos arbitrariamente próximos de (a, b) . Usamos a notação

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L,$$

para indicar que os valores de $f(x, y)$ se aproximam do número L quando o ponto (x, y) se aproxima do ponto (a, b) ao longo de qualquer cominho contido no domínio da função f .





Definição 8

Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função cujo domínio contém pontos arbitrariamente próximos de (a, b) . Dizemos que o limite de $f(x, y)$ quando (x, y) tende a (a, b) é o número L , e escrevemos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L,$$

quando para cada $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que se $\|(x, y) - (a, b)\| < \delta$, então $|f(x, y) - L| < \varepsilon$.





Todas as propriedades de limites de funções de uma variável se estendem às funções de várias variáveis. Por exemplo, o limite da soma, diferença, produto ou quociente é a soma, diferença, produto ou quociente dos limites, respectivamente, contanto que esses limites existam e que os denominadores não se anulem.



Exemplo


Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,2)} \left(2x^2y - \frac{3y^2}{x+y} \right).$



Mostrando que um limite não existe

Quando o limite de uma função **existe** em um ponto, então o limite tem que ser **o mesmo ao longo de todos os caminhos** que se aproximam do ponto.

No plano podemos nos aproximar de um ponto (a, b) por **um número infinito de caminhos**, assim se existem dois caminhos diferentes tais que $f(x, y)$ tende a valores distintos, então o limite não existe.






Exemplo

Mostre que o seguinte limite não existe

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$






Exemplo

Mostre que o seguinte limite não existe

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$






Exemplo

Mostre que o seguinte limite existe

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2y}{x^2 + y^2}$$






Exemplo

Mostre que o seguinte limite não existe

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$



ATENÇÃO!!!

- Mesmo que o limite seja igual para uma infinidade de caminhos, isso não garante que o limite exista!
- Basta que ele seja diferente para dois caminhos distintos, para não existir.
- Ele só existe quando é o mesmo em todos os caminhos possíveis.



Exemplo

Mostre que o seguinte limite NÃO existe

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$$



Definição 9

Sejam f uma função real de duas variáveis e (a, b) um ponto do domínio de f . Dizemos que f é **contínua** em (a, b) se

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b).$$


Dizemos que f é contínua em D se f é contínua em todos os pontos de D .





Exemplo

- a Funções racionais são contínuas em todos os pontos de seu domínio.
- b A função $\arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ é contínua em todo o seu domínio pois a composta de funções contínuas também é contínua.





Exemplo

Determine os pontos de continuidade de

$$\text{a) } f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^2y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\text{b) } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Analogamente podemos generalizar estes resultados para funções de mais de duas variáveis quaisquer.





Para Casa 8

- 1 Decida sobre a existência do seguinte limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$.
- 2 Determine os pontos de continuidade da função

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + xy + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- 3 Revise a definição de derivada de função de uma variável $y = f(x)$.



Sumário

- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos
- 4 Superfícies
- 5 Funções Vetoriais
- 6 Funções de Várias Variáveis
- 7 Limite e Continuidade
- 8 Derivadas Parciais**
- 9 Extremos de Funções de Várias Variáveis





Derivadas Parciais

Suponha que a distribuição de temperaturas em uma placa quadrada é descrita pela função


$$f(x, y) = 100 - x^2 - y^2, \text{ com } -5\sqrt{2} \leq x, y \leq 5\sqrt{2},$$

onde a temperatura é medida em $^{\circ}\text{C}$ e o comprimento em metros.




Se fixarmos $y = -3$ e deixarmos x variar livremente, teremos uma função apenas da variável x , cujo gráfico, é uma curva sobre a superfície do gráfico de f .

$$f_1(x) = f(x, -3) = 91 - x^2, \quad -5\sqrt{2} \leq x \leq 5\sqrt{2}$$



Analogamente, se fixarmos $x = 2$ e deixarmos y variar livremente, teremos uma função apenas da variável y , cujo gráfico, é uma curva sobre a superfície do gráfico de f .


$$f_2(y) = f(2, y) = 96 - y^2, \quad -5\sqrt{2} \leq y \leq 5\sqrt{2}$$



Em resumo, temos

$$f_1(x) = f(x, -3) = 91 - x^2, \quad -5\sqrt{2} \leq x \leq 5\sqrt{2}$$


$$f_2(y) = f(2, y) = 96 - y^2, \quad -5\sqrt{2} \leq y \leq 5\sqrt{2}$$



É fácil ver que $f'_1(x) = -2x$. Assim, por exemplo, $f'_1(2) = -4$.

Isso nos diz que a **taxa de variação da temperatura**, no ponto $P = (2, -3)$, é de $-4^\circ\text{C}/\text{m}$ na **direção positiva do eixo x** .

Em outras palavras, se caminhamos sobre a placa, a partir do ponto $P = (2, -3)$, **direção positiva do eixo x** , a temperatura vai cair a uma taxa de $-4^\circ\text{C}/\text{m}$.



Sabemos que a derivada de f_1 em um ponto a é dada por:

$$f_1'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_1(a+h) - f_1(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, -3) - f(a, -3)}{h}.$$



Sabemos que a derivada de g em um ponto a é dada por:

$$f_1'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_1(a+h) - f_1(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, -3) - f(a, -3)}{h}.$$

De modo geral, se fixarmos um ponto genérico $y = b$, fazendo $f_1(x) = f(x, b)$, teremos:

$$f_1'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_1(a+h) - f_1(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h}.$$

Analogamente, se fixarmos um ponto genérico $x = a$, fazendo $f_2(y) = f(a, y)$, teremos:

$$f_2'(b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_2(b+h) - f_2(b)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, b+h) - f(a, b)}{h}.$$



Definição 10

Sejam $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função e $(a, b) \in U$. A **derivada parcial de f em relação a x** no ponto (a, b) é dada por

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h},$$

quando este limite existe. Analogamente, A **derivada parcial de f em relação a y** no ponto (a, b) é dada por

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, b + h) - f(a, b)}{h},$$

quando este limite existe.



Exemplo

Se $f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$, determine $f_x(2, 1)$ e $f_y(2, 1)$.

Analogamente se $f : U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função definida em um aberto U contendo (x_0, y_0, z_0) . As derivadas parciais de f em relação a x , y e z no ponto (x_0, y_0, z_0) são dadas pelos limites

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)}{h},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)}{h},$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0, z_0 + h) - f(x_0, y_0, z_0)}{h},$$

quando estes limites existem.



Exemplo

Se $f(x, y, z) = e^{xy} \log(z)$, determine as derivadas parciais.





Para Casa 9

- 1 Se $f(x, y) = \sin\left(\frac{x}{1+y}\right)$, calcule f_x e f_y .
- 2 Se $f(x, y, z) = x \sin(y - z)$, determine as derivadas parciais.



Derivadas de Ordem Superior

Se $z = f(x, y)$ é uma função, então $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ também são funções de duas variáveis e portanto podemos definir quatro novas funções que são chamadas de **derivadas parciais de segunda ordem de f** , a saber:

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

$$f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

$$f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$



Exemplo

Calcule todas as derivadas parciais de segunda ordem da função

$$f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2.$$



Teorema 11

Se $z = f(x, y)$ é de classe C^2 , então suas derivadas mistas são iguais, isto é,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$



Equações Diferenciais Parciais - EDP

As derivadas parciais ocorrem em **Equações Diferenciais Parciais** que exprimem certas leis físicas. Por exemplo, a EDP

$$u_{xx} + u_{yy} = 0,$$

é chamada de **Equação de Laplace**. As soluções dessa equação são chamadas de **funções harmônicas** e são muito importantes no estudo de condução de calor, escoamento de fluidos e potencial elétrico.



Exemplo

Mostre que a função $u(x, y) = e^x \sin(y)$ é uma solução da equação de Laplace.



A Equação da Onda

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}$$

descreve o movimento de uma onda. Por exemplo, se $u(x, t)$ representa o deslocamento da corda vibrante de um violão no instante t e à distância x de uma das extremidades da corda, então $u(x, t)$ satisfaz a equação da onda. A constante a depende da densidade da corda e da tensão aplicada a nela.



Exemplo

Verifique que $u(x, t) = \sin(x - at)$ satisfaz a equação da onda.





Para Casa 10

- 1 Calcule todas as derivadas parciais de segunda ordem da função $f(x, y) = xy - e^x \cos y$.
- 2 Calcule f_{xxyz} se $f(x, y, z) = \sin(3x + yz)$.



Aproximação Linear em uma variável

Em funções de uma variável sabemos que se $f(x)$ é derivável em x_0 , sabemos que a reta tangente ao gráfico de f no ponto $(x_0, f(x_0))$ é dada por

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Assim, para pequenos acréscimos Δx na quantidade x_0 , o valor de $f(x_0 + \Delta x)$ é aproximadamente $L = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$, com erro

$$E(\Delta x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x,$$

onde $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{E(\Delta x)}{\Delta x} = 0$. Em outras palavras, o erro E é menor que o erro Δx , para valores pequenos de Δx .

Neste caso dizemos que f é diferenciável e que

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

é uma aproximação linear de f no ponto x_0 .



Plano Tangente

Como podemos obter o plano tangente ao gráfico da função $f(x, y) = 9 - x^2 - y^2$ no ponto $P = (1, 2, 4)$?

Fixando $y = 2$ e fazendo x variar, temos a curva sobre o gráfico passando por P

$$\alpha(x) = (x, 2, 5 - x^2), \quad x \in \mathbb{R}.$$

cujo o vetor tangente em P é

$$u = \alpha'(1) = (1, 0, -2).$$

Analogamente obtemos que outro vetor tangente ao gráfico no ponto P é

$$v = (0, 1, -4).$$

Como u e v são LI, sabemos que o produto vetorial é um vetor normal ao plano, daí, obtemos que a equação do plano tangente é

$$2x + 2y + z - 10 = 0.$$



No caso geral, se $z = f(x, y)$, então o **plano tangente** no ponto $P = (x_0, y_0, z_0)$ é dado pela equação

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0). \quad (3)$$

O plano tangente é a **melhor aproximação linear** da função $z = f(x, y)$ nas proximidades do ponto $P = (x_0, y_0, z_0)$ e a função

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

é denominada **linearização** de f no ponto (x_0, y_0) .

Diferentemente do caso unidimensional, para que essa aproximação seja boa, **não é suficiente** que apenas existam as derivadas parciais. Para isso, precisamos definir uma noção de diferenciabilidade análoga.



Definição 12

Uma $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, definida no aberto $U \subset \mathbb{R}^2$, é dita **diferenciável em** $(x_0, y_0) \in U$ quando existem $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ tais que a função erro definida por

$$E(\Delta x, \Delta y) =$$

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y,$$

satisfaz,
$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{E(\Delta x, \Delta y)}{\|(\Delta x, \Delta y)\|} = 0$$

Esta definição diz que uma função diferenciável é aquela para a qual a aproximação linear é uma boa aproximação quando (x, y) está próximo de (x_0, y_0) .





Exemplo

Mostre que $f(x, y) = 2x^2 + y^2$ é diferenciável em $(1, 1)$ e determine a aproximação linear.



Exemplo

Mostre que a função $f(x, y) = x^{1/3}y^{1/3}$, possui derivadas parciais no ponto $(0, 0)$ mas não é diferenciável, isto é, a equação do que seria o plano tangente existe, mas não fornece uma boa aproximação.



Definição 13

Uma função $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, definida em um aberto $U \subset \mathbb{R}^2$, é dita de **classe C^1 em U** quando possui derivadas parciais contínuas em U .

Teorema 14

Se $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ é de classe C^1 em U , então f é diferenciável em U .



Exemplo


Mostre que $f(x, y) = xe^{xy}$ é diferenciável em $(1, 0)$ e encontre sua linearização ali. Em seguida, use a linearização para aproximar $f(1.1, -0.1)$.



Diferenciais


Para uma função diferencial de uma única variável, $y = f(x)$, definimos a diferencial dx como uma variável independente, ou seja, dx pode valer qualquer número real. A diferencial de y é definida como

$$dy = f'(x)dx$$



Para uma função de duas variáveis, $z = f(x, y)$, definimos as diferenciais dx e dy como variáveis independentes. Então, a **diferencial dz** , também chamada de **diferenciação total**, é definida por

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = f_x(x, y) dx + f_y(x, y) dy$$



$$z - f(a, b) = f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$





Exemplo

Foram feitas medidas do raio da base e da altura de um cone circular reto e obtivemos 10 cm e 25 cm, respectivamente, com possível erro nessas medidas de, no máximo, ε cm.

- 1 Use diferenciais para estimar o erro máximo cometido no cálculo do volume do cone.
- 2 Se o raio e a altura forem medidos com erro máximo de 0.1 cm, qual será o erro máximo estimado para o volume? Estime o erro relativo.



Funções de três Variáveis

Aproximações lineares, diferenciabilidade e diferenciais podem ser definidas de maneira análoga para as funções de mais que duas variáveis.

Diferenciabilidade

Uma função $w = f(x, y, z)$ é **diferenciável em (x_0, y_0, z_0)** quando existem as derivadas parciais no ponto (x_0, y_0, z_0) e

$$E(\Delta x, \Delta y, \Delta z) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)\Delta x - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)\Delta y - \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\Delta z,$$

satisfaz,
$$\lim_{(\Delta x, \Delta y, \Delta z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{E(\Delta x, \Delta y, \Delta z)}{\|(\Delta x, \Delta y, \Delta z)\|} = 0$$



Se $w = f(x, y, z)$ é diferenciável em (x_0, y_0, z_0) , então

A **linearização** de f no ponto (x_0, y_0, z_0) .

$$\begin{aligned} L(x, y, z) = f(x_0, y_0, z_0) &+ \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) \\ &+ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) \end{aligned}$$

A **diferencial** dw é definida por

$$dw = \frac{\partial w}{\partial x}dx + \frac{\partial w}{\partial y}dy + \frac{\partial w}{\partial z}dz.$$





Para Casa 11

- 1 Para quais valores de (x, y) , $f(x, y) = \log(x^2 + y^2)$ é diferenciável é diferenciável? Justifique.
- 2 Mostre que $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ não é diferenciável em $(0, 0)$ mas possui derivadas parciais em $\mathbb{R}^2$.



Regra da Cadeia e Vetor Gradiente

Regra da Cadeia 1

Sejam $z = f(x, y)$ uma função diferenciável e $\alpha(t) = (x(t), y(t))$, $t \in I$ também diferenciável, então a função composta $z(t) = f(\alpha(t))$ é diferenciável e

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$



Exemplo

Se $z = x^2y + 3xy^4$, onde $x = \sin(2t)$ e $y = \cos(t)$, determine $\frac{dz}{dt}$ em $t = 0$.




FIGURA 1

A curva $x = \sin 2t$, $y = \cos t$




Regra da Cadeia 2

Sejam $z = f(x, y)$, $x = x(t, s)$ e $y = y(t, s)$ são funções diferenciáveis, então

a
$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$

b
$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}$$



Exemplo

Calcule as derivadas parciais da função $z = e^x \sin(y)$, onde $x = st^2$ e $y = s^2t$



Regra da Cadeia Caso Geral

Sejam $u = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $x_j = x_j(t_1, t_2, \dots, t_m)$ funções diferenciáveis, então

$$\frac{\partial u}{\partial t_i} = \frac{\partial u}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial u}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \dots + \frac{\partial u}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_i} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial t_i}$$



Exemplo

Se $u = x^4y + y^2z^3$, onde $x = rse^t$, $y = rs^2e^{-t}$ e $z = r^2s \sin(t)$, determine $\frac{\partial u}{\partial s}$ quando $r = 2$, $s = 1$ e $t = 0$.





Para Casa 12

- 1 Se $g(s, t) = f(s^2 - t^2, t^2 - s^2)$ e f é diferenciável, mostre que g satisfaz

$$t \frac{\partial g}{\partial s} + s \frac{\partial g}{\partial t} = 0.$$

- 2 O raio de um cone circular reto está aumentando em uma taxa de 4.6 cm/s enquanto sua altura está descendo a uma taxa de 6.5 cm/s. Em qual taxa o volume do cone está variando quando o raio é 300 cm e altura é de 350 cm.



Definição 15

Seja f uma função de n variáveis $x_1, \dots, x_n$ que possui derivadas parciais no ponto $P_0 = (a_1, \dots, a_n)$. O **vetor gradiente** de f em P_0 , denotado por $\nabla f(P_0)$, é o vetor

$$\nabla f(P_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

Usando a definição de vetor gradiente, a regra da cadeia pode ser escrita da forma


$$\frac{dz}{dt} = \nabla f(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t).$$

Teorema 16

Seja $z = f(x, y)$ uma função de classe C^1 definida em um aberto $U \subset \mathbb{R}^2$. O vetor gradiente é normal a qualquer curva de nível da função f nos pontos em que não se anula.



O Teorema anterior também é válido para funções de três variáveis. Neste caso o vetor gradiente é normal à superfície de nível $F(x, y, z) = k$. Este resultado pode ser usado para encontrar plano tangente à superfícies que não estão expressas como gráfico de função.



Exemplo

Determine as equações do plano tangente e da reta normal à superfície S de equação $x^2 + 3y^2 + 4z^2 = 8$ em $(1, -1, 1)$.

Definição 17

A **derivada direcional** de uma função $z = f(x, y)$ em um ponto $P_0 = (x_0, y_0)$ na direção do **vetor unitário** $u = (a, b)$ é definida por

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial u}(P_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(P_0 + hu) - f(P_0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb) - f(x_0, y_0)}{h},\end{aligned}$$

se este limite existir.

Teorema 18

Se $z = f(x, y)$ é diferenciável em $P_0 = (x_0, y_0)$, então

$$\frac{\partial f}{\partial u}(P_0) = \nabla f(P_0) \cdot u.$$

A mesma definição e o último teorema valem para para funções de qualquer número de variáveis.



Exemplo

Determine a derivada direcional da função f no ponto P na direção do vetor v em cada caso:

- 1 $f(x, y) = x^2y^3 - 4y$, $P = (2, -1)$ e $v = (2, 5)$.
- 2 $f(x, y, z) = x \operatorname{sen}(yz)$, $P = (1, 3, 0)$ e $v = (1, 2, -1)$.



Teorema 19

O valor máximo da derivada direcional de uma função diferenciável f é a $\|\nabla f\|$ e ocorre na direção do vetor gradiente ∇f .



Exemplo

- 1 Em que direção a função $f(x, y) = xe^y$ tem a maior taxa de variação? Qual é o valor da maior taxa de variação?
- 2 Seja $T(x, y, z) = \frac{80}{1 + x^2 + 2y^2 + 3z^2}$ a temperatura, em graus Celsius, em um ponto (x, y, z) do espaço. Em que direção no ponto $(1, 1, -2)$ a temperatura aumenta mais rapidamente? Qual é a taxa máxima de aumento?



Propriedades do Vetor Gradiente



Seja f uma função diferenciável de duas ou três variáveis e suponha que $\nabla f(P) \neq 0$.

- A derivada direcional de f em P , na direção de um **vetor unitário** u , é dada por

$$\frac{\partial f}{\partial u}(P) = \nabla f(P) \cdot u$$

- $\nabla f(P)$ aponta na direção em que a taxa de crescimento de f em P é máxima e essa taxa máxima de variação é igual a $\|\nabla f(P)\|$
- $\nabla f(P)$ é perpendicular à curva ou à superfície de nível de f em P .





Diferenciação Implícita

A função $F(x, y) = x^2 + y^2$ tem como curvas de nível círculos centrados na origem.

$$x^2 + y^2 = k, \quad k \geq 0.$$

Sabemos que o círculo não é o gráfico de uma função de uma variável, entretanto, ao isolarmos uma das variáveis, ele pode ser visto como a união de dois gráficos:

$$y = \pm\sqrt{k - x^2} \text{ ou } x = \pm\sqrt{k - y^2}$$

Entretanto, na maioria dos casos não é possível isolar uma das variáveis. Nestes casos, como podemos garantir que um pedaço da curva pode ser vista como gráfico de função? Ou dito de outra forma, como garantir que uma variável pode ser colocada em função das demais?



Teorema da Função Implícita I

Suponha que

- 1 A função $z = F(x, y)$ seja de classe C^1 ;
- 2 $F(x_0, y_0) = 0$ e $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$.

Então, existe uma vizinhança I em torno do ponto x_0 e uma **única** função $y = y(x)$ **também de classe C^1** tais que

$$F(x, y(x)) = 0, \quad \text{para todo } x \in I$$

e vale

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}.$$



Exemplo

Mostre que $x^3 + y^3 - 6xy = 0$ define y como função de x na vizinhança do ponto $(3, 3)$ e calcule $y'(3)$ a derivada neste ponto.

Teorema da Função Implícita II

Suponha que

- 1 A função $F(x, y, z)$ seja de classe C^1 ;
- 2 $F(x_0, y_0, z_0) = 0$ e $\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \neq 0$.

Então, existe uma vizinhança U em torno do ponto (x_0, y_0) e uma **única** função $z = z(x, y)$, **também de classe C^1** , tais que

$$F(x, y, z(x, y)) = 0, \quad \text{para todo } (x, y) \in U$$

e vale

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} \text{ e } \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}}.$$





Exemplo

Verifique que a equação $x^3 + 3y^2 + 8xz^2 - 3z^3y = 9$ define z com função de x e y numa vizinhança do ponto $(1, 0, 1)$ e calcule $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 0)$, $\frac{\partial z}{\partial y}(1, 0)$ e $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}(1, 0)$.



Sumário


- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos
- 4 Superfícies
- 5 Funções Vetoriais
- 6 Funções de Várias Variáveis
- 7 Limite e Continuidade
- 8 Derivadas Parciais
- 9 Extremos de Funções de Várias Variáveis



Valores Extremos de Funções de duas Variáveis

Definição 20

- 1 Dizemos que uma função f de duas variáveis tem um **valor máximo local** no ponto (a, b) se existir uma bola aberta $B_r(a, b)$ tal que $f(a, b) \geq f(x, y)$ para todo $(x, y) \in B_r(a, b)$.
- 2 Dizemos que uma função f de duas variáveis tem um **valor mínimo local** no ponto (a, b) se existir uma bola aberta $B_r(a, b)$ tal que $f(a, b) \leq f(x, y)$ para todo $(x, y) \in B_r(a, b)$.



Teorema 21

Se $f(x, y)$ tem um extremo local em (a, b) e possui derivadas parciais em (a, b) , então


$$\nabla f(a, b) = 0.$$

Um ponto (a, b) tal que $\nabla f(a, b)$ não existe ou $\nabla f(a, b) = 0$ é dito **ponto crítico** ou **ponto estacionário** de f .



Exemplo


Determine os extremos relativos de
 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 6y + 14$





Exemplo

A função $f(x, y) = y^2 - x^2$ tem ponto crítico em $(0, 0)$ mas não possui extremo relativo!



ponto de sela



Foto de Stan Wagon, Macalester College



Se f é uma função de duas variáveis com todas as derivadas de ordem 2 no ponto (a, b) , definimos

$$D^2 f(a, b) = \begin{bmatrix} f_{xx}(a, b) & f_{xy}(a, b) \\ f_{yx}(a, b) & f_{yy}(a, b) \end{bmatrix},$$

chamada **matriz Hessiana** da função f no ponto (a, b) .



Teste da Segunda Derivada

Teorema 22 (Teste da Segunda Derivada)

Seja $z = f(x, y)$ uma função de classe C^2 em uma bola $B_r(a, b)$ tal que $\nabla f(a, b) = (0, 0)$. Neste caso,

- a Se $\det D^2 f(a, b) > 0$ e $f_{xx}(a, b) < 0$, então (a, b) é máximo local.
- b Se $\det D^2 f(a, b) > 0$ e $f_{xx}(a, b) > 0$, então (a, b) é mínimo local.
- c Se $\det D^2 f(a, b) < 0$, então (a, b) é ponto de sela.

Observação 23



Se $\det D^2 f(a, b) = 0$, nada podemos concluir.





Exemplo

Localize e classifique os pontos críticos de $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$.





Para Casa 13

Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 m^2 de papelão. Determine o volume máximo da caixa.



Definição 24

Seja uma função f de duas variáveis definida em um conjunto $U \subset \mathbb{R}^2$.

- 1 Dizemos que f tem um valor **máximo absoluto** em U se existir um ponto $(a, b) \in U$ tal que $f(a, b) \geq f(x, y)$ para todo $(x, y) \in U$. Neste caso, $f(a, b)$ é o **valor máximo absoluto** de f em U .
- 2 Dizemos que f tem valor **mínimo absoluto** em U se existir um ponto $(a, b) \in U$ tal que $f(a, b) \leq f(x, y)$ para todo $(x, y) \in U$. Neste caso, $f(a, b)$ é o **valor mínimo absoluto** de f em U .



Exemplo

- 1 A função $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$ tem máximo absoluto em $\mathbb{R}^2$ no ponto $(0, 0)$.
- 2 A função $f(x, y) = x$ não tem máximo nem mínimo absoluto em $\mathbb{R}^2$.



Topologia no plano

Antes de enunciarmos nosso próximo resultado, precisamos de algumas noções topológicas no plano.

- Um conjunto é dito **limitado** se ele está contido em algum disco.
- A **fronteira** de um conjunto D , denotada por ∂D , é formada por pontos (a, b) tais que qualquer disco aberto com centro em (a, b) contém pontos de D e pontos que não estão em D .
- Um conjunto D de $\mathbb{R}^2$ é dito **fechado** se contém todos os pontos de sua fronteira, onde
- Um conjunto **fechado** e **limitado** é dito ser **compacto**.
- Um conjunto é **aberto** quando seu complementar é fechado.



(a) Conjuntos fechados



(b) Conjuntos que não são fechados



Teorema 25 (Teorema de Weierstrass)

Se f é uma **função contínua** definida em um **conjunto fechado e limitado** D então f **assume valor máximo e mínimo absolutos** em U .

Determinação de Extremos Absolutos

Para determinarmos os extremos absolutos de uma **função contínua** definida em um **conjunto fechado e limitado** D :



- 1 Determinar os valores de f nos pontos críticos de f em D .
- 2 Determinar os valores extremos de f na fronteira de D .
- 3 O maior dos valores dos passos anteriores será o máximo absoluto e o menor deles o valor mínimo absoluto.





Exemplo

Determine os valores extremos da função $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y$ no retângulo $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\}$.




Multiplicadores de Lagrange em duas Variáveis

Teorema 26

Sejam $f(x, y)$ e $g(x, y)$ funções de classe C^1 definidas em um aberto U que contém a curva C de equação $g(x, y) = k$. Se $f(x, y)$ restrita à curva C assume um valor máximo ou mínimo em $(x_0, y_0) \in C$ e $\nabla g(x_0, y_0) \neq \vec{0}$, então existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que



$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0)$$





Exemplo

Determine os valores extremos da função $f(x, y) = xy$ no círculo $x^2 + y^2 = 1$.





Para Casa 14

Determine os pontos da hipérbole $x^2 + 8xy + 7y^2 - 225 = 0$ que estão mais próximos da origem.



Teorema 27

Sejam $f(x, y, z)$ e $g(x, y, z)$ funções de classe C^1 definidas em um aberto U que contém a superfície S de equação $g(x, y, z) = k$. Se $f(x, y, z)$ restrita à superfície S assume um valor máximo ou mínimo em $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in S$ e $\nabla g(x_0, y_0, z_0)$ não é nulo, então existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que


$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0, z_0)$$





Exemplo



Determine os pontos da esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ que estão mais próximos e mais distantes do ponto $(3, 1, -1)$.





Exemplo

Determine os valores extremos da função $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ no disco $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 1\}$.



Teorema 28

Sejam $f(x, y, z)$, $g_1(x, y, z)$ e $g_2(x, y, z)$ funções de classe C^1 definidas em um aberto U que contém a curva C de interseção das superfícies de equações $g_1(x, y, z) = k_1$ e $g_2(x, y, z) = k_2$. Se $f(x, y, z)$ restrita à curva C assume um valor máximo ou mínimo em $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in S$ e $\nabla g_1(x_0, y_0, z_0) \times \nabla g_2(x_0, y_0, z_0)$ não é nulo, então existem $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tais que

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) = \lambda \nabla g_1(x_0, y_0, z_0) + \mu \nabla g_2(x_0, y_0, z_0)$$





Exemplo

Determine o valor máximo da função $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ na curva da interseção do plano $x - y + z = 1$ com o cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

