

## बैंगन

### बैंगन की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन

- खेत को साफ सुथरा रखें जिस खेत में बैंगन की फसल पिछले वर्ष ली हो उसमें बैंगन कदापि न लगाएं ।
- संक्रमित पौधों को नर्सरी से बाहर कर देना चाहिए।
- बैंगन की दो कतारों के बाद एक कतार धनिया या सौंफ की लगाएं ।
- रोपाई के 2 सप्ताह बाद फेरोमोन ट्रैप 4 से 5 प्रति एकड़ लगाएं यदि आवश्यक लगे तो 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ 10-10 मीटर की दूरी पर लगाएं तथा ल्योर को 15 दिन उपरांत बदलते रहे और रोगग्रस्त कल्लो को काटकर खेत से हटाते रहे या गड्ढे में दबा दें ।
- ट्राइकोकार्ड 1 प्रति एकड़ 21 दिन उपरांत 4-5 मीटर की दूरी पर फसल के अंत तक लगाते रहे।
- तीन किलो सड़ी गोबर की खाद में 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर पौधों के संवर्धन के लिए लगभग सात दिनों के लिए छोड़ दें। सात दिनों के बाद मिट्टी में 3 वर्ग मीटर के बेड में मिला दें।
- बुवाई से पहले, बीज को ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम / किलोग्राम बीज की दर से उपचार किया जाना चाहिए।
- निराई समय-समय पर की जानी चाहिए ।