

टमाटर

एकीकृत कीट एवं रोग नियंत्रण

- गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें।
- पौधशाला की क्यारियाँ भूमि धरातल से ऊंची रखें एवं फोर्मेल्डिहाइड द्वारा विसंक्रमण कर लें।
- क्यारियों को मार्च अप्रैल माह में पॉलीथीन शीट से ढके तथा भू-तपन के लिए मृदा में पर्याप्त नमी होनी चाहिए।
- गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाकर क्यारियों की मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए।
- पौधशाला की मिट्टी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल का बुवाई के 2-3 सप्ताह बाद छिड़काव करें।
- पौध रोपण के समय पौध की जड़ों को कार्बेन्डाजिम या ट्राइकोडर्मा के घोल में 10 मिनट तक डुबो कर रखें।
- पौध रोपण के 15-20 दिन के अंतराल पर चेपा, सफेद मक्खी एवं थ्रिप्स के लिए 2 से 3 छिड़काव इमिडाक्लोप्रिड 1 मि.ली./3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। माइट की उपस्थिति होने पर ओमाइट का छिड़काव करें।
- फल भेदक इल्ली एवं तम्बाकू की इल्ली के लिए इमामेक्टिन बेन्जोेट 5 एसजी. 1 ग्राम/2 लीटर या स्पिनोसैड 45 एस. सी. 1 मि.ली./4 लीटर पानी का इस्तमेल करें।