

9 HENGITYSTIEPATOLOGIA

NENÄN JA NENÄNIELUN SAIRAUDET

I. RINIITTI JA SINUIITTI

- A. Nenän limakalvon tulehdus, joka ilmenee aivasteluna, tukkoisuutena ja vuotavana nenänä (nuha).
- B. Rinovirus yleisin infektiivinen aiheuttaja, yleisin syy ylipäättään on allergia.
- C. Allerginen riniitti on tyypin I yliherkkyyssreaktio esimerkiksi siitepölylle (n. 20% väestöstä).
 - 1. Diagnoosi helppo oireiden kulun perusteella, joskus voidaan hyödyntää veri- ja ihopistokokeita (prick-testi)
 - 2. Tulehdus on eosinofiilistä.
 - 3. Potilailla esiintyy usein myös muita allergisia oireita, kuten astmaa tai atooppista ekseemaa.
- D. Sinuiitti tarkoittaa tulehdusta nenän sivuonteloissa.
 - 1. Riniitti ja sinuiitti esiintyvät yleensä samanaikaisesti, jolloin käytetään termiä rinosinuiitti.
 - a. Aiheuttajat pääosin samoja kuin riniitissä.

II. NENÄN POLYPPITAUTI

- A. Polyypit ovat nenän limakalvon hyvälaituisia tulehtuneita pullistumia. (Kuva 9.1.)
 - 1. Pieninä voivat olla oireettomia, mutta suurina voivat tukkia koko sieraimen.
- B. Varmaa syytä ei tiedetä, mutta astmaatikkoilla, allergikoilla ja kroonista rinosinuiittia sairastavilla on suurempi alttius polyypeille.
 - 1. Aspirin-exacerbated respiratory disease (AERD, Samterin triadi) – ASA-yliherkkyys, astma ja nenäpolyypit; liittyy lisäksi vielä krooninen rinosinuiitti
 - a. Polypoosi normaalia vakavampaa; triadi ilmenee jopa 10%:lla astmapotilaista.
 - 2. Lapsilla nenäpolypoosi liittyy kystiseen fibroosiin.

III. NENÄNIELUN JUVENIILI ANGIOFIBROOMA

- A. Harvinainen hyvänlaatuinen side- ja suonikudoksesta koostuva kasvain nenäontelossa.
 - 1. Esiintyy lähes pelkästään nuorilla miehillä (10-20v.).
- B. Tuumorin kasvaessa ilmenee tyypilliset oireet, eli runsaat verenvuodot nenästä (epistaksis) ja hengitysvaikeudet.

IV. NENÄNIELUN KARSINOOMA (NPC)

- A. Nenänielun pintaepiteelistä lähtöisin oleva pahanlaatuinen kasvain.
- B. Harvinainen länsimaissa, mutta hyvin tavallinen Afrikassa ja erityisesti Etelä-Kiinassa.
 - 1. Geneettinen alttius siis todennäköinen; assosiaatio EBV-infektioon on vahva.
 - a. Voidaan havaita EBER in situ -hybridisaatiolla.
 - 2. Länsimaissa tavataan paljon myös HPV-positiivisia nenänielukarsinomia.
- C. Histologisesti havaitaan runsaasti lymfosyyttistä reaktiivista tulehdussolukkoa ja tuumorit voidaan jakaa keratinisoivaan, ei-keratinisoivaan ja erilaistumattomaan muotoon. (Kuva 9.2.)
- D. Metastasoivat usein kaulan imusolmukkeisiin.
- E. N. 60% kolmen vuoden selviytyminen

KURKUNPÄÄ (LARYNX)

I. LARYNGIITTI

- A. Kurkunpään infektiot ovat useimmiten virusinfektioita; yleisiä lapsilla.
- B. Akuutti epiglottiitti:
 - 1. Äkillinen, mahdollisesti hengenvaarallinen, kurkunkannen tulehdus, joka näkyy mansikanpunaisena ja voimakkaana turvotuksena. (Kuva 9.3.)
 - 2. Tyypillisesti ilmenee korkeana kuumeena, nielemiskipuna, kuolan valumisena ja sisäänhengitysvaikeutena (inspiratorinen stridor).
 - a. Stridor tarkoittaa vinkuvaa ja voimakasta lisä-ääntä sisäänhengittäessä.
 - 3. Yleisin aiheuttaja on Haemophilus influenzae b; nykyään harvinainen rokotusten takia.
- C. Laryngotracheobronkiitti (kruppi, valekuristustauti)
 - 1. Hitaasti (päivien kuluessa) kehittyvä; akuuttia epiglottiittia vähemmän vaarallinen ylähengitystieinfektio
 - 2. Tyypillisesti ilmenee matalana kuumeena, äänen käheytenä, hengitysvaikeutena (inspiratorinen stridor) ja haukkuvana yskänä.
 - 3. Yleisin aiheuttaja on parainfluenssavirus.

II. ÄÄNIHUULIKYHMYT

- A. Useimmiten johtuvat äänihuulitraumasta (esim. liiaallinen äänenkäyttö).
- B. Yleensä muutaman millimetrin kokoisia ja bilateraalisia. (Kuva 9.4.)
 - 1. Hyvänlaatuisia; histologisesti koostuvat degeneratiivisesta (myksoidista) sidekudoksesta.
- C. Ilmenevät äänen käheytenä ja paranevat äänenkäytön vähentämisellä.

III. KURKUNPÄÄN PAPILLOOMAT

- A. Kurkunpään hyvänlaatuisia eksofyyttisiä levyepiteelikasvaimia äänihuulilla, joiden aiheuttajia ovat papilloomavirukset HPV 6 ja 11. (Kuva 9.5.)
- B. Papilloomat ovat yleensä yksittäisiä aikuisilla, kun taas lapsilla esiintyvä juveniili papillomatoosi on tyypillisesti useista tuumoreista koostuvaa ja helposti uusiutuvaa.
- C. Ilmenee äänen käheytenä ja saattaa vaikeuttaa hengitystä.
- D. Etenee vain harvoin karsinoomaksi.

IV. KURKUNPÄÄN KARSINOOMA

- A. Lähes kaikki kurkunpään pahanlaatuiset kasvaimet ovat levyepiteelikarsinomia.
- B. Vahva assosiaatio tupakoimiseen, myös alkoholi riskitekijä
- C. Ilmenevät yleensä äänen käheytenä ja siihen usein liittyneenä kaulan lymfadenopatiaa.
- D. Tuumorin sijainti vaikuttaa ennusteeseen (supraglottisessa huonompi kuin glottisessa); ennuste hyvä aikaisessa vaiheessa.

KEUHKOINFEKTIOT

I. KEUHKOKUUME (PNEUMONIA)

- A. Pneumonia tarkoittaa keuhkoparenkyymin infektiota ja on yksi tärkeimmistä kuolemaan johtavista taudeista.
- B. Taustalla useimmiten bakteeri tai virus (harvoin sieni tai alkueläin) sekä jokin altistava tekijä (bakteeripneumoniassa aikaisempi virusinfektio, heikentynyt yskänrefleksi, vähentynyt mukosilaarinen kuljetus, immuunipuutostilat, krooniset keuhkosairaudet, tupakointi, jne.)
 - 1. Yleisimmät syyt infektiolle ovat suunielun sisällön mikroaspiraatio unen aikana ja aerosolipisaroiden hengittäminen ilmasta.
- C. Yleisimmät oireet ovat kuume, yskä, yskökset (märästä johtuen keltavihreää tai verestä johtuen ruosteenväristä) ja infektion pleuraan edettyään hankausääni ja rintakipu.
- D. Mahdolliset komplikaatiot liittyvät yleensä bakteeritauteihin.
 - 1. Pleuran infektio voi johtaa pleuraeffuusion (eksudatiivinen vaihe), jolloin pleuraan kehittyy märkäpesäke eli empyeema.
 - a. Voi hoitamattomana jatkaa fibropurulenttiin ja lopulta organisoituvaan vaiheeseen, jossa pleuratila fibrinotisoituu ja arpeutuu häiriten keuhkon laajenemista ja toimintaa.
 - 2. Kudostuho ja nekroosi voi johtaa keuhkoabskessin muodostumiseen.
 - 3. Bakteereeminen disseminaatio muihin elimiin (sepsis, endokardiitti, meningiitti, jne.)
- E. Diagnosoidaan yleensä kliinisesti, radiologisesti ja laboratoriokokein (yskös- ja veriviljely).
 - 1. Keuhkoauskultaatiossa usein rahinaa, perkussiossa kumea ääni.
- F. Voidaan jakaa mm. alkupaikan ja kasvutavan mukaan.
 - 1. Avohoitokeuhkokuumeessa tartunta on saatu muualta kuin sairaalaympäristöstä, sairaalakeuhkokuume alkaa sairaalassa saadusta infektiosta.
 - a. Sairaalakeuhkokuumeitten aiheuttajia useimmiten gramnegatiiviset sauvat (*Enterobacteriaceae* spp. ja *Pseudomonas* spp.) sekä *S. aureus*.
 - 2. Anatomisen kasvutavan mukaan tyypillisesti jaetaan lobaari-, bronko- ja interstitiaalipneumoniaan.

II. LOBAARIPNEUMONIA (LOHKOKEUHKOKUUME)

- A. Keuhkokudos on raskasta ja tiivistä (konsolidoitunutta) kokonaan tai lähes kokonaan yhden lohkon alueella.
- B. Tyypillisesti bakteeriperäinen infektio (yleisin *Streptococcus pneumoniae*, muita mm. Klebsiella).
- C. Kehityksen vaiheet:
 - 1. Kongestio (1-2 päivää) – Punaviolettia parenkyymin osittaista konsolidaatiota, joka johtuu verisuonten kongestiosta ja eksudaattisesta ödeemasta. (Kuva 9.6.)
 - 2. Punainen hepatisaatio (3-4 päivää) – Punaruskeaa konsolidaatiota, joka johtuu fibriinirikkaasta eksudaatista, neutrofiileista ja punasoluista, jotka täyttävät alveolit. (Kuva 9.7.)
 - 3. Harmaa hepatisaatio (5-7 päivää) – Kudos näyttää harmaalta, joka johtuu eksudaatin punasolujen degradaatiosta ja leukosyytti-infiltraatiosta.
 - 4. Resoluutio (8+ päivää) – T2 makrofagit korjaavat kudoksen ja T2 pneumosyytit toimivat alveolien kantasoluina.

III. BRONKOPNEUMONIA

- A. Keuhkokudoksen läiskittäistä konsolidoitumista, joka keskittyy bronkusten ja bronkiolien sisälle ja ympärille. (Kuva 9.8.)
 - 1. Usein multilobaarista ja bilateraalista.
- B. Aiheuttajia runsas määrä, mm. *Strep. pneumoniae*, Hib, *Staph. Aureus*
- C. Voi edetä lobaaripneumoniaksi.

IV. INTERSTITIAALINEN (ATYYPINEN) PNEUMONIA

- A. Niukat paikallislöydökset ja interstitiumin diffuusi, pääosin mononukleaarinen infiltraatio. (Kuva 9.9.)
 - 1. Alveolitiloissa ei siis yleensä eksudaattia.
- B. Oireet yleensä lievempiä kuin tyyppisessä pneumoniassa (walking pneumonia).
- C. Aiheuttajana useimmiten *Mycoplasma pneumoniae*, varsinkin talvisin armeijassa.
 - 1. Voi komplikaationa johtaa iho-oireisiin ja lievään autoimmuuniin hemolyyttiseen anemiaan.

V. ASPIRAATIOPNEUMONIA

- A. Aspiraatio eli mahan sisällön tai nieltävän aineen pääsy keuhkoihin altistaa pneumonialle.
- B. Nähdään usein tajuttomilla potilailla ja alkoholisteilla.
- C. Keuhkoihin päässyt happama materiaali on hyvin ärsyttävää, mikä aiheuttaa yleensä suunielun anaerobisten bakteerien kanssa nekrotisoivan pneumonian.
- D. Taudin kulku on usein nopea ja vakava; yleinen komplikaatio on oikean puolen alemman lohkon abskessi.
 - 1. Aspiraation aiheuttamat abskessit ovat yleisempiä oikealla puolella, koska oikea pääkeuhkoputki haarautuu vertikaalisemmassa kulmassa.

VI. VIRUSPNEUMONIA

- A. Tyypillisesti interstitiaalinen pneumonia, mutta voi myös yltää alveoleihin ja tuottaa bakteeripneumonian kaltaista konsolidaatiota kuvauksissa, joten vain radiologisilla tutkimuksilla ei voida erottaa bakteeri- ja virusperäistä pneumoniam.
- B. Vaurioittavat respiratorista epiteeliä ja mukosiliaarista kuljetusta altistaen sekundaariselle bakteeripneumonialle.
- C. Aiheuttajia mm.
 - 1. RSV – Yleisin atyyppisen pneumonian syy pienillä lapsilla
 - 2. Influenssavirus – Tärkein bakteeriperäistä keuhkokuumetta edeltävä virusinfektio

VII. KEUHKOTUBERKULOOSI

- A. Yleisin kroonisen pneumonian syy; aiheuttaja *Mycobacterium tuberculosis*.
 - 1. Maailmanlaajuisesti tärkein infektiivinen kuolemanaiheuttaja, Suomessa vain n. 200 tapausta vuodessa.
- B. Primaarituberkuloosivaihe seuraa aikaisemmin altistumattoman potilaan infektiota.
 - 1. Bakteerit leviävät ylälohkon alaosiin/alalohkon yläosiin ja muodostavat granulomatoottisen tulehduksen primaaripesäkkeitä (Ghon focus, 1-1.5cm läpimitaltaan tyypillisesti), joiden keskus kaseaatinekrotisoituu. (Kuva 9.10.)
 - 2. Bakteereita mahdollisesti pääsee läheisiin imusolmukkeisiin; usein hiluksessa.
 - a. Lymfadenopatia ja Ghonin fokus muodostavat yhdessä Ghonin kompleksin.
 - 3. Soluvälitteisen immunitetin kehittyminen yleensä mahdollistaa infektion kontrolloimisen, ja Ghonin kompleksi fibrotisoituu ja kalsifikoituu Ranken kompleksiksi.

4. Kompleksit eivät kuitenkaan ole steriilejä (latentti infektio) ja voivat reaktivoitua potilaan immuunipuolustuksen heikentyessä.
5. Primaarituberkuloosi on yleensä oireeton; latentti infektio voidaan havaita IGRA testillä.
 - a. Mantoux-ihotesti (tuberkuliinikoe) on positiivinen myös BCG-rokotuksen (tuberkuloosirokote) saaneilla, mutta voidaan käyttää määrittämään voiko BCG-rokotusta antaa (jos pos. ei saa antaa).
 - b. Ei voida erottaa käynnissä olevaa infektiota latentista.
- C. Sekundaarituberkuloosi (postprimaarinen) ilmenee usein latentin infektion reaktivoituessa vuosikymmenien jälkeen alkufektioista.
 1. Yleisin aiheuttaja on immuunipuolustuksen heikentyminen AIDS:n seurauksena.
 2. Voimakas immunologinen reaktio johtaa suureen kudostuhoon ja kaseaattinekroosisten kaviteettien muodostumiseen.
 - a. Havaitaan keuhkojen ylimmissä osissa (vrt. primaarivaihe) suurina n. 3-10cm kavitaatioina.
 3. Keuhkotuberkuloosin oireita ovat mm. jatkuva kuumeilu, pitkittynyt verinen yskä, yöhikoilu ja painonmenetys.
 4. Diagnosoidaan yskösten värjäyksellä, geenimonistuksella ja viljelyllä.
 - a. Ziehl-Neelsenin värjäyksessä havaitaan haponkestäviä punaisia sauvoja, mutta herkkyys on huono. (Kuva 9.11.)
 - b. Geenimonistustesti (PCR) on nopea ja merkitsevä, mutta ei negatiivisena sulje pois tuberkuloosia (esim. vähäbakteerinen näyte).
 - c. Viljelytutkimus on diagnostiikan kulmakivi, mutta tulos on todella hidas (4-6vk)
 5. Voi komplisoitua verenkiertoon levitessään miliaariseksi tuberkuloosiksi, joka johtaa minkä tahansa elimen infektoitumiseen (mm. kaulan lymfadeniitti, meningiitti, munuaiset ja selkäranka (Pottin tauti)).

KEUHKOJEN OBSTRUKTIIVISET SAIRAUDET

I. PERIAATTEET

- A. Ryhmä sairauksia, jotka johtuvat ilmasteiden obstruktiosta, mikä estää ilman kulkua keuhkoista ulos.
 1. Keuhkohtaumatauti (COPD), astma ja bronkiektasiat
- B. Diagnoosi perustuu keuhkofunktio tutkimuksiin; spirometriassa tärkeimmät arvot ovat FVC, FEV1 ja näiden suhde. (Kuva 9.12.)
 1. Uloshengitys heikkenee, joten \downarrow FVC ja $\downarrow\downarrow$ FEV1 ja \downarrow FEV1/FVC (FEV%).
 - a. Normaali FEV1/FVC on 4L/5L=80%
 - b. Tutkimukseen liitetään aina bronkodilataatiokoe; varsinkin kun halutaan astmaa diagnosoida.
 2. TLC yleensä kasvaa ilman jäädessä jumiin keuhkoihin.

II. KEUHKOAHTAUMATAUTI (COPD)

- A. Keuhkojen krooninen obstruktiivinen sairaus, jonka lähes ainoa syy on tupakointi.
- B. Kaksi tyypillistä osatekijää: krooninen bronkiitti ja emfyseema.

1. Yleensä ilmenevät yhdessä eikä oireisto ole yleensä selvästi kummankaan yksin aiheuttamaa.
- C. Krooninen bronkiitti tarkoittaa limaa tuottavaa yskää, joka kestää vähintään 3kk ajan kahtena peräkkäisenä vuotena.
1. Tupakansavu (tai ilmansaasteet ja pölyt tietyissä töissä) ärsyttävät bronkusten epiteeliä ja aiheuttavat tulehdusta sekä seinämien limarauhasen hypertrofiaa ja hypersekreetiota.
 - a. Histologisesti havaitaan limarauhasalueen paksuuden kasvamisena suhteessa bronkusten seinämän kokonaispaksuuteen (epiteelin ja ruston välinen paksuus); normaali Reidin indeksi <40%, kroonisessa bronkiitissa >50%. (Kuva 9.13.)
 - b. Kertyvä lima sekä limakalvojen ja keuhkoputkien sileän lihaksen paksuuntuminen vähitellen ahtaavat keuhkoputket.
 2. Keuhkoputkien ahtautuminen estää hiilidioksidin poistumisen ja hapen saannin ja siten voi aiheuttaa syanoosia – ”blue bloaters”. (Kuva 9.14.)
 3. Ahtautuminen lisää myös riskiä infektioille ja cor pulmonalelle.
 - a. Infektiot ovat tärkeä tekijä toistuville pahenemisvaiheille.
- D. Emfyseema eli keuhkolaajentuma tarkoittaa terminaalista bronkiolista distaalisten osien eli asinuksen palautumattoman tuhoutumisen aiheuttamaa laajentumista. (Kuva 9.15.)
1. Alveolipinta-ala vähenee ja elastinen palautuvuus heikkenee, mikä johtaa pienten ilmateiden kollapsiin ja heikkoon kaasujen vaihtoon. (Kuva 9.16.)
 2. Johtuu proteaasien liiaallisesta suhteesta verrattuna antiproteaaseihin.
 - a. Tupakointi (tai ilmansaasteet ja pölyt tietyissä töissä) lisäävät tulehdusta keuhkoissa, jolloin neutrofiilit ja makrofagit vapauttavat proteaaseja.
 - b. Pääosin maksan tuottama alfa₁-antitrypsiini (A1AT) neutralisoi proteaaseja.
 3. Kaksi tärkeintä anatomisen jakautumisen luokitusta ovat sentriasinaarinen (n. 95%) ja panasinaarinen emfyseema. (Kuva 9.17.)
 - a. Sentriasinaarinen emfyseema on yleensä keuhkojen ylälohkoissa ja liittyy tupakointiin.
 - i. Muutokset keuhkoasinusten keskellä eli respiratorisissa bronkioleissa.
 - b. Panasinaarinen emfyseema on yleensä keuhkojen alaosissa ja liittyy A1AT:n puutokseen, jonka aste määrää taudin vakavuuden.
 - i. Maksan tuottama A1AT ei laskostu normaalisti ja kertyy hepatosyyttien endoplasmiseen retikkeliin, mikä aiheuttaa myös maksavauriota. Maksakirroosia voidaan havaita ja biopsiassa pinkkejä, PAS-positiivisia kertymiä hepatosyyteissä. (Kuva 9.18.)
 - ii. PiM on normaali alleeli (PiMM-genotyyppi), PiZ-alleeli aiheuttaa vähentynyttä kiertävää A1AT:tä.
 - iii. PiMZ-heterotsygootit yleensä oireettomia, mutta tupakointi nostaa riskiä emfyseemalle normaalia enemmän.
 - iv. PiZZ-homotsygootille kehittyy usein lapsuudessa kirroosia ja panasinaarisen emfyseeman riski on suuri.
 4. Emfyseeman oireita ovat mm.
 - a. Hengenahdistus ja vähälimainen yskä

- b. Pitkitetty uloshengitys mutristetuilla huulilla – ”pink-puffer”. Kuluttaa runsaasti energiaa ja johtaakin usein painon menetykseen.
- c. Tynnyririnta (kasvanut AP-halkaisija) (Kuva 9.19.)

III. ASTMA

- A. Astmassa on COPD:n tapaan uloshengitysvajausta, mutta se yleensä johtuu lääkityksellä palautuvasta hyperreaktiivisesta kohtauksittaisesta bronkokonstriktiosta.
 - 1. Astman ilmentyminen usein nopea ja kulku vaihteleva, kun taas COPD kehittyy hitaammin ja etenevästi.
- B. Yleisin tyyppi on allerginen (atooppinen) astma, joka alkaa lapsuudessa ja liittyy muihin allergisiin tauteihin (mm. atooppinen ihottuma, riniitti, ruoka- ja lääkeaineallergiat).
- C. Atooppinen astma on tyypin I yliherkkyyssreaktio.
 - 1. Allergeeni indusoi Th2-solujen fenotyyppiä erilaistumista CD4+ T-soluissa.
 - 2. Th2-solut erittävät runsaasti erilaisia sytokiineja, kuten IL-4 (stimuloi IgE:n tuotantoa), IL-5 (eosinofiilien kemotaktantti) ja IL-10 (stimuloi Th2-soluja ja inhiboi Th1-soluja).
 - a. IgE sitoutuu syöttösolujen pinnalle.
 - 3. Allergeenille uudelleen altistuttaessa allergeeni sitoutuu IgE:hen syöttösolujen pinnalla ja aiheuttaa syöttösolujen degranulaatiota sekä leukotrieenien tuotantoa.
 - a. Tuotetut leukotrieenit C4, D4 ja E4 sekä granuloista vapautuva histamiini aiheuttavat bronkokonstriktiota ja lisäävät vaskulaarista permeabiliteettia.
 - b. Inflammaatio kehittyy hitaammin ja on yleensä eosinofiilien tuottaman MBP:n aiheuttamaa (major basic protein).
- D. Diagnosoidaan kliinisesti oireiden ja keuhkojen toimintakokeiden perusteella:
 - 1. Kohtauksittainen hengenahdistus ja hengityksen vinkuna
 - 2. Yöllinen tai aamuun painottuva limainen yskä
 - a. Ysköksissä eosinofiliaa, ohuita ja vieterimäisiä limasäikeitä (Curschmannin spiraaleja) (Kuva 9.20.) ja eosinofiiliperäisiä Charcot-Leydenin kristalleja. (Kuva 9.21.)
 - 3. PEF-mittaus (uloshengityksen huippuvirtaus) ja spirometria varmistavat diagnoosin.
 - a. PEF-arvon (15%) tai FEV1:n (12%) parantuminen bronkodilataation jälkeen tai pieneneminen yli 15% juoksurasituskokeessa.
 - i. COPD:ssa ei klassisesti havaita normaaliin toimintaan palauttavaa bronkodilataatiovastetta, mutta jonkin asteen vaste on kuitenkin yleistä.
- E. Astma voi myös olla ei-allergista, joka on tavallisemmin aikuisten tautimuoto.
 - 1. Aiheuttajia mm. lääkeaineet (aspiriinin aiheuttama AERD), työperäiset hengitettävät aineet ja virusinfektiot (usein rinovirus).
- F. Henkeä uhkaavaa ja heikosti lääkitykseen vastaavaa pahenemisvaihetta kutsutaan status asthmaticukseksi, joka ilmenee akuuttina ja vaikeana hengenahdistuksena, vinkumisena, hypoksemiana sekä hyperkapniana.

IV. BRONKIEKTASIA

- A. Bronkusten ja bronkiolien epänormaalia ja pysyvää laajentumista, joka on emfyseemaa proksimaalisempaa.
- B. Johtuu bronkusten seinämää vaurioittavasta kroonisesta tulehduksesta, mikä aiheuttaa ilmanteiden järeiden menetystä ja ilman loukkuun jäämistä.

- C. Yleisin aiheuttaja on nekrotisoiva bakteeripneumonia, mutta antibioottihoitojen kehittyessä ilmeneminen on vähentynyt. Muita syitä ovat mm.
1. Virus- ja sieni-infektiot – sieni-infektioista *Aspergillus fumigatus* voi aiheuttaa astmaatikoille ja kystisestä fibroosista kärsiville allergisen bronkopulmonaarisen aspergilloosin (ABPA)
 2. Mekaaninen este (kasvain, vierasesine, limatulppa) – esteestä distaalisesti oleva kudokset tulehtuu ja aiheuttaa paikallista bronkiektasiaa.
 - a. Kystinen fibroosi – ionitransportteri CFTR-geenissä mutaatio, joka aiheuttaa liman viskositeetin lisääntymistä ja poistumisen hidastumista. Johtaa laaja-alaiseen bronkiektasiaan.
 3. Liikkumattomien värekarvojen oireyhtymä – moottoriproteiinien, kuten dyneiinin, toiminta on heikkoa ja aiheuttaa liman kertymistä bronkuksiin ja hengitystieinfektioalttiutta.
 - a. Assosiaatio myös hedelmättömyyteen (etenkin miehillä; siittiöiden heikko liikehdintä) ja n. puolella potilaista on täydellinen situs inversus eli tila, jossa sisäelimen ovat asettuneet normaalin peilikuvaksi.
 - i. Kartagenerin oireyhtymä: Liikkumattomien värekarvojen aiheuttama triadi: bronkiektasioita+krooninen sinusiitti+situs inversus (Kuva 9.22.)
- D. Ilmenee yleisimmin pitkittyneenä yskänä, huonohajuisina ja mahdollisesti verisinä (vrt. krooninen bronkiitti) ysköksinä ja hengenahdistuksena.
1. Komplikaatioita ovat hypoksemia ja cor pulmonale sekä sekundaarinen (AA) amyloidoosi.
- E. Todetaan ohutleikketietokonekuvauksella; verikokeet ja yskösnäytteet auttavat syyn selvittelyssä.

KEUHKOJEN RESTRIKTIIVISET SAIRAUDET

I. PERIAATTEET

- A. Ryhmä sairauksia, jotka johtuvat keuhkojen normaalin täyttymisen heikkenemisestä.
1. Ovat yleensä kroonisia interstitiaalisia keuhkosairauksia (keuhkoparenkyymintautteja, ILD), mutta restriktio voi myös johtua ekstraparenkyymisistä syistä, kuten sairaalloisesta lihavuudesta.
 - a. Interstitiaaliset keuhkosairaudet ovat sairauksien ryhmä, jossa havaitaan inflammatorisia ja fibroottisia muutoksia alveolien interstitiumissa ja mahdollisesti ympäröivässä bronkiaalisessa kudoksessa.
 - i. Mm. idiopaattiset interstitiaaliset pneumoniat (IIP), sarkoidoosi ja pneumokonioosit
 2. Paljon obstruktiivisia harvinaisempia.
- B. Spirometria: $\downarrow\downarrow$ FVC, \downarrow FEV1, \uparrow FEV1/FVC (FEV%) (ja \downarrow TLC)
1. FVC:n z-arvo JA VC:n z-arvo on alle -1.65.
- C. Keuhkojen HRTT on tärkein ja ensisijainen diagnostinen keino, mutta joskus tarvitaan keuhkobiopsia tarkkaan diagnoosiin.

II. IDIOPAATTINEN KEUHKOFIBROOSI (IPF)

- A. Tavallisin idiopaattinen interstitiaalinen pneumonia ja siten myös tavallisin interstitiaalinen keuhkosairaus (Suomessa n. 600-800 potilasta, yleensä yli 60v.).
- B. Vaikea ja etenevä keuhkojen interstitiumia fibrotisoiva sairaus.

1. Histologinen muutos on UIP (usual interstitial pneumonia, Kuva 9.23.), jota saattaa esiintyä myös monissa muissakin taudeissa, kuten nivelreumassa, SLE:ssä ja asbestoosissa.
 2. Keuhkojen HRTT:ssä nähdään ”hunajakennokeuhko”. (Kuva 9.24.)
- C. Etiologia tuntematon, mutta liittyynee toistuvaan keuhkovaurioon.
1. Vaurioituneet pneumosyytit vapauttavat TGF-betaa, mikä indusoi fibroosia.
- D. Tyypillisesti ilmenee hengenahdistuksena ja kuivana yskänä.
- E. Tällä hetkellä lääkehoito vain hidastavaa, ainoa lopullinen hoitokeino on keuhkonsiirto.

III. SARKOIDOOSI

- A. Useita elimiä vaurioittava ei-kaseoivasti granulomatoottinen sairaus; yleensä nuorilla aikuisilla (Suomessa n. 500/v)
- B. Etiologia tuntematon; dendriittisolu tunnistaa tuntemattoman antigeeni, jonka se esittelee CD4+-auttaja-T-solulle, joka aktivoituu ja alkaa erittää sytokiinejä ja kemoattraktantteja johtaen granuloomien muodostukseen.
- C. Granuloomien tavallisimmat elinilmentymät:
1. Tavallisimmat löydökset ovat keuhkoportin imusolmukkeissa ja keuhkokudoksessa, mitkä johtavat restriktiiviseen keuhkosairauteen.
 - a. Oireina hengenahdistus ja kuiva yskä.
 - b. Kuvantamisessa keuhkoportin adenopatiaa ja parenkyymin noduksia.
 - c. Granulooman jättisolut sisältävät usein asteroidikappaleita. (Kuva 9.25.)
 2. Ihomuutokset – yleisin muutos on kyhmyruusu (erythema nodosum) (Kuva 9.26.)
 3. Silmämuutokset – yleisin muutos on suonikalvoston tulehdus (uveiitti)
 4. Limakalvomutokset – kuivasilmäisyys, suuhaavaumat, vähentynyt syljeneritys ja sylkirauhasten turvotus (Sjögrenin oireyhtymän kaltainen tila)
 5. Sydänmuutokset – ilmenee eteis-kammiokatkoksena; sarkoidoosin pelätyin komplikaatio on äkkikuolemaan johtava äkillinen rytmihäiriö
 6. Munuaismuutokset – Munuaiskivet ovat yleinen löydös; epiteloidisolujen 1-alfa-hydroksylaasiaktiiviteetti konvertoi D-vitamiinia aktiiviseen muotoon ja aiheuttaa hyperkalsemiaa, mikä johtaa kalsiumoksalaattikivien muodostumiseen.
 - a. Veren kuvassa voidaan siis usein nähdä hyperkalsemiaa, mutta myös ACE-pitoisuuden ja maksaentsyymiarvojen kohonaisuutta.
- D. Yleensä itsestään paraneva lievä tauti, mutta tarvittaessa hoidetaan immunosuppressiivisesti.

IV. PNEUMOKONIOOSIT (PÖLYKEUHKOSAIRAUKSET)

- A. Keuhkojen restriktiivisiä ammattisairauksia, jotka johtavat interstitiaaliseen fibroosiin.
1. Työssä altistutaan pienille partikkeleille, jotka pääsevät hengityksen kautta alveoleihin, jossa alveolaarimakrofagit fagosytoivat ne, vapauttavat välittäjäaineita ja indusoiivat fibroosia.
- B. Tärkeimpiä pneumokoniooseja ovat asbestoosi, silikoosi, hiilityöläisen pneumokonioosi ja beryllioosi.
- C. Asbestin käyttö kiellettiin vuonna 1993, joten nykyään sille altistutaan pääosin purkutöissä. Sairauksia todetaan edelleen n. 30-40 tapausta vuodessa pitkän latenssiajan takia (10-50 vuotta).
1. Pitkäaikainen altistuminen voi johtaa keuhkokudoksen ja pleuran fibroosiin (pleuraplakit). (Kuva 9.27.)

2. Lisää riskiä keuhkosityövälle sekä mesoteliomalle, joka on lähes yksinomaan asbestialtistumiselle spesifinen syöpä.
3. Histologisesti voidaan nähdä pitkiä, kultaruskeita kuitumaisia asbestikappaleita. (Kuva 9.28.)

D. Silikoosi eli kivi- tai hiilipölykeuhko johtuu pitkäaikaisesta altistumisesta kivi- tai hiilipölylle (tavallisimmin kvartsipölylle), mitä tapahtuu mm. kaivos-, maansiirto- ja tunnelinrakennustyössä.

1. Tavallisin muoto on klassinen krooninen kivi- tai hiilipölykeuhko, jossa voidaan havaita ylälokkopainotteista nodulaarista fibroosia ja keuhkoportin imusolmukkeiden kalkkiutumista. (Kuva 9.29.)
2. Kvartsipöly on karsinogeeni sekä silikoosi lisää riskiä tuberkuloosille.
 - a. Kvartsipöly häiritsee fagolysosomiformaatiota makrofageissa, mikä altistaa tuberkuloosille.

E. Hiilityöläisen pneumokonioosi (CWP, BLD) johtuu pitkäaikaisesta altistumisesta hiilipölylle, mitä tapahtuu mm. hiilikaivostyöläisillä.

1. Kehittyy antrakoosin kautta vakavampaan tautimuotoon.
 - a. Antrakoosi tarkoittaa yleensä oireetonta keuhkojen mustaa värjäytymistä, joka johtuu hiilipigmentin kertymisestä makrofageihin, välikudokseen ja imusolmukkeisiin. (Kuva 9.30.)
 - i. Havaitaan jossain määrin kaikilla kaupungeissa asuvilla.
 - b. Jatkuva vakava altistuminen voi johtaa diffuusiin keuhkojen fibroosiin, mikä näyttää hyvin samanlaiselta kuin silikoosi.
 - i. Makroskooppisesti keuhkot ovat hyvin tummat (Black lung disease). (Kuva 9.31.)

F. Beryllioosi johtuu pitkäaikaisesta altistumisesta berylliumille, mitä tapahtuu mm. elektroniikka- ja lentokoneteollisuudessa.

1. Johtaa ei-kaseoivaan granulomatoottiseen tulehdukseen keuhkoissa, keuhkoportin imusolmukkeissa ja myös muissa elimissä (muistuttaa siis sarkoidoosia).
2. Beryllium on karsinogeeni, joten lisää myös keuhkosityövän riskiä.

V. ALLERGINEN ALVEOLIITTI (HYPERSENSITIVITY PNEUMONITIS)

A. Inhaloitujen orgaanisten antigeenien aiheuttama interstitiaalinen pneumonia, joka voi kroonisessa altistumisessa johtaa fibroosiin.

1. Tulehduksessa havaitaan useimmiten ei-nekrotisoituvia granuloomia.

B. Tavallisimpia aiheuttajia ovat bakteerit ja homeet; tavataan useimmiten maanviljelijöillä (farmer's lung eli homepölykeuhko) ja lintujen kanssa työskentelevillä (linnunpölykeuhko).

C. Ilmenee muutama tuntia altistumisen jälkeen kuumeena, yskänä ja hengenahdistuksena.

PULMONAALINEN HYPERTENSIO

I. PERIAATTEET

- A. Keuhkoverenpainetaudissa keuhkovaltimon keskipaine on levossa yli 25mmHg (normaalisti 14mmHg).
- B. Johtaa muutoksiin verisuonten endoteelissä, sileälihassoluissa ja soluvälitilassa.
 - 1. Sisäkerroksen fibrotisoituminen, keskikerroksen hypertrofia ja ulkokerroksen paksuuntuminen.
 - a. Sydänsairauksista johtuva laskimohypertensio aiheuttaa myös näitä muutoksia ja johtaa ns. arterialisaatioon; myöhemmässä vaiheessa verenpaine kohoaa myös keuhkovaltimoissa.
 - 2. Vaikeassa ja pitkäaikaisessa taudissa voidaan tavata pleksiformisia lesioita, jotka ovat uudismuodostuneita pieniä verisuonia, joiden tarkoitus on mahdollistaa verenkulku ahtautuneista keuhkovaltimoista huolimatta; havaitaan histologisesti pienten verisuonten kerääntymistä. (Kuva 9.32.)
 - 3. Kohonnut verenpaine on ateroskleroosin riskitekijä, joten usein havaitaan myös keuhkovaltimorungon ahtautumista ateroskleroosin takia.
- C. Johtaa hoitamattomana sydämen oikean puolen vajaatoimintaan ja lopulta cor pulmonaleen eli keuhkosydänsairauteen.
 - 1. Cor pulmonale tarkoittaa oikean kammion paksuuntumista ja lopullista vajaatoimintaa keuhkojen tai keuhkoverenkierron häiriöiden seurauksena.
- D. Tyypillisiä oireita ovat varsinkin rasituksen aiheuttama hengenahdistus, pyörtyileminen ja rintakipu sekä sydämen oikean puolen vajaatoiminnan oireet (mm. perifeerinen ödeema).
- E. Monia eri mahdollisia etiologioita; pääasiallisesti voidaan jakaa primaarisiin ja sekundaarisiin tapauksiin.

II. PRIMAARINEN KEUHKOVERENPAINETAUTI

- A. Sporadisissa tapauksissa kutsutaan idiopaattiseksi keuhkovaltimoiden hypertensioksi (IPAH), lähisukulaisilla myös todettuna periytyväksi.
- B. Suurella osalla esiintyy BMPR2-geenin inaktivoiva mutaatio, mikä lisää verisuonten sileän lihaksen proliferaatiota.
- C. Tyypillisesti tavataan nuorilla aikuisilla naisilla.

III. SEKUNDAARINEN KEUHKOVERENPAINETAUTI

- A. Muihin tauteihin liittyvä keuhkovaltimotauti (APAH) on IPAH:ta yleisempi.
- B. Tavallisimmat taustalla olevat taudit ovat muut keuhkosairaudet ja happeutumisvajausta, sydäntoiminnan häiriöt (esim. synnynnäinen vasemmalta oikealle oikovirtaus) ja toistuvat organisoituvat tromboemboliat.
 - 1. Keuhkosairaudesta tai happeutumisvajaudesta johtuva - Mm. Keuhkoahdistauti (COPD) ja krooninen altistuminen korkealle ilmanalalle johtavat hypoksemiaan keuhkoissa, mikä johtaa laajaan keuhkoverenkierron vasokonstriktioon ja siten hypertensioon.
 - 2. Sydäntoiminnan häiriöstä johtuva - Vasemmalta oikealle suuntautuva oikovirtaus lisää verivolyymiä keuhkoverenkierrossa ja siten aiheuttaa hypertensiota.
 - a. Tietysti myös vasemman puolen vajaatoiminta aiheuttaa PAH (oikeastaan yleisin syy)

3. Krooninen tromboembolinen keuhkoverenpainetauti (KTEPH) - Akuutti keuhkoembolia ei aina liukene täysin vaan voi organisoitua ja ahtauttaa keuhkovaltimon pysyvästi, jolloin keuhkoverisuonten virtauspinta-ala pienenee – varsinkin embolioiden ollessa toistuvia.

HENGITYSVAJAUS

I. PERIAATTEET

- A. Hengitysvajauksessa kaasujenvaihto alveoleissa tai keuhkotuuletus eli hapen saanti ja hiilidioksidin poistuminen on heikentynyt.
- B. Syynä on kaasujenvaihdon rajapinnan ongelma tai ilmatien tai aktiivisen hengityselimen puutteellinen toiminta.
 1. Kaasujenvaihtohäiriö johtaa hypoksemiaan ja ventilaatiohäiriö hyperkapniaan.
 2. Useimmilla potilailla on sekä kaasujenvaihtohäiriö että keuhkotuuletuksen vaje, sillä kaasujenvaihdon heikentyessä vaadittavan hengitystyön kasvu saattaa ylittää kompensointireservit.
- C. Voidaan jakaa akuuttiin ja krooniseen hengitysvajauteen.
 1. Akuutti voi johtua mm. keuhkokuumeesta ja -pöhostä, keuhkoveritulpasta ja ARDS:tä
 2. Kroonisen yleisin syy on keuhkohtaumatauti, muita ovat mm. hermo-lihassairaudet (esim. myasthenia gravis) ja lihavuus.

II. AKUUTTI/AIKUISEN ÄKILLINEN HENGITYSVAJAUSOIREYHTYMÄ (ARDS)

- A. Keuhkokapillaarien diffuusi tulehdusreaktion aiheuttama endoteelivaurio (DAD, diffuse alveolar damage) häiritsee alveoli-kapillaari -rajapintaa ja siten kaasujenvaihtoa.
 1. Proteiinirunsasta nestettä tihkuu alveolien soluvälitilaan ja sisälle ja muodostaa nekroottisten solujen kanssa kaasujenvaihtopintaa häiritsevän hyaliinimembraanin. (Kuva 9.33.)
 - a. Myös normaali surfaktantin toiminta häiriintyy ja alveolit kollapsoituvat helpommin (alveolaarinen atelektasi).
 2. Tulehdusreaktio aiheuttaa myös keuhkokapillaarien trombotisoitumista (V/Q - jakauman häiriö) sekä aktivoi fibroblasteja aiheuttaen keuhkokudoksen arpeutumista.
 - a. Myös tyypin I ja II pneumosyytit vaurioituvat, joten regeneraation sijasta tapahtuu enemmän reparaatiota arpikudoksella.
- B. Ei ole oma tautinsa, vaan tapahtuu sekundaarisena yhteydessä muuhun vakavaan ei-sydänperäiseen sairauteen, kuten sepsiksen, sokkitilan, myrkytyksen, DIC:n, keuhkotulehduksen tai pankreatiitin seurauksena.
- C. Oireet:
 1. Hengenahdistus, suurentunut hengitystaajuus ja apuhengityslihasten käyttö
 2. Hypoksemiasta johtuvaa syanoosia
 3. Hyperkapniasta johtuvaa päänsärkyä, sekavuutta ja uneliaisuutta
- D. Thoraxkuvauksessa nähdään molemminpuoliset samentumat ilman sydänperäistä keuhkokongestiota.
- E. Hoidetaan taustasairauden hoidolla sekä säästävällä hengityslaittehoidolla, jossa keuhkojen venyttymistä ja jatkuvaa avautumista ja sulkeutumista pyritään minimoimaan.
 1. Hengityslaittehoidossa matala kertahengitystilavuus sekä loppu-uloshengityksen aikainen positiivinen paine (PEEP), joka estää keuhkorakkuloiden kasaan painumista.

III. VASTASYNTYNEEN HENGITYSVAIKEUSOIREYHTYMÄ (NRDS, RDS-TAUTI)

- A. Surfactantin puutteesta johtuva vastasyntyneen hengitysvajaus
 - 1. Surfactantti on T II pneumosyyttien tuottama pintajännitystä heikentävä tekijä, joka muodostaa alveoleihin ohuen kerroksen ja estää niiden kasaan painumista uloshengityksessä.
 - a. Tärkein rakennusosa on fosfatidyylikoliini (lesitiini).
 - 2. Kapillaari-alveolaarikalvon lisääntynyt läpäisevyys mahdollistaa plasmaproteiinien valumisen alveoleihin ja hyaliinimembraanien muodostumisen.
- B. RDS-taudin ilmaantuvuus on kääntäen verrannollinen syntymäikään.
 - 1. Ennen aikaisella vastasyntyneellä surfactanttia ei ole ehtinyt vielä muodostua tarpeeksi; tuotanto alkaa n. vk 28 ja riittävät tasot saavutetaan n. vk 35.
 - a. Ennen lapsen syntymää keuhkojen kehittymistä voidaan seurata lapsiveden lesitiini/sfingomyeliini-suhteella (L/S-suhte), joka on riittävä, jos se on yli 2.
 - i. Nykyään tutkitaan lapsiveden lamellaarikappaleita tutkimalla (kun Am-Lamel >25x10⁹/l (labrasta riippuen), niin L/S on >2)
- C. Myös keisarileikkaus ja äidin diabetes lisäävät riskiä RDS-taudille.
 - 1. Normaalisessa vaginaalisessa synnytyksessä stressireaktio lisää steroidisynteesiä vauvalla, mikä lisää surfactantin tuotantoa.
 - 2. Äidin diabeteksessa äidin korkea verensokeri kulkee sikiöön ja lisää sikiön insuliinintuotantoa (insuliini vähentää surfactantin tuotantoa).
- D. Vastasyntyneellä havaitaan korkea hengitystaajuus, ähkimistä ja syanoosia.
- E. Ehkäistään äidille annetulla kortikosteroidihoidolla ja hoidetaan vastasyntyneellä ylipainehengityshoidolla sekä korvaavalla surfactantilla.

KEUHKOKASVAIMET

I. PERIAATTEET

- A. Lähes kaikki (99%) keuhkojen kasvaimista ovat maligneja.
- B. Suomessa todetaan n. 2700 uutta keuhkosityöpätapausta vuosittain; tyypillisesti havaitaan yli 60-vuotiailla ja hieman useammin miehillä.
 - 1. Keuhkosityövät aiheuttavat eniten syöpäkuolemia maailmassa (5v elossaolo-osuus n. 10-15%).
- C. Tärkein etiologia on tupakointi (85-90% keuhkosityövistä), mutta myös radonsäteily ja asbesti ovat riskitekijöitä.
 - 1. Tupakansavun yksi tärkeimmistä karsinogeenisista aineista ovat polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet), joita syntyy orgaanisen aineen palaessa epätäydellisesti.
 - a. PAH-yhdisteitä syntyy siis myös savustaessa ja grillatessa ruokaa, liikenteessä, energiantuotannossa, alumiinitehtaissa yms. paikoissa ja tilanteissa.
 - b. Keuhkosityövän riski nousee askivuosien mukaan (askivuodet=päivittäisten askien lkm * tupakoinnin kesto).
 - 2. Radon on radioaktiivinen jalokaasu, jota syntyy uraanin hajoamisreaktiossa.
 - a. Tärkein radonin lähde tyypilliselle suomalaiselle on sisäilma, johon radonkaasua on päässyt talon alla olevasta maaperästä.

- b. Suomessa sisäilman radon aiheuttaa n. 300 keuhkosyöpätapausta vuosittain.
- D. Keuhkosyövät ovat usein pitkään oireettomia ja havaitaan vasta levinneessä vaiheessa.
 - 1. Oireet ovat epäspesifisiä ja riippuvat pääosin primaarituumorin koosta, sijainnista ja levinneisyydestä.
 - a. Vena cava superior -syndrooma (yläonttolaskimo-oireyhtymä) syntyy kasvaimen painaessa yläonttolaskimon tukkoon.
 - i. Mm. kasvojen ja käsien ödeema, kaulan verisuonet alkavat pullottaa sekä voidaan havaita positiivinen Pembertonin merkki (kasvojen punotusta ja pöhötystä pitäessä käsiä ylhäällä pään vieressä). (Kuva 9.34.)
 - b. N. phrenicuksen kompressio aiheuttaa pallean paralyysiä ja olkapääkipua; n. laryngeus recurrensin kompressio taas äänen käheyttä.
 - c. Keuhkon yläkärjen kasvain (Pancoastin tuumori, superior pulmonary sulcus tumor) voi painaa useita olkahermopunkosten hermojuuria (olkakipu ja käden heikkous) ja sympaattista hermorunkoa (Hornerin oireyhtymä eli yleensä unilateraalinen ptosis, mioosi ja kasvojen anhidroosi). (Kuva 9.35)
 - d. Keuhkosyövät usein myös aiheuttavat pleuraeffuusiota, joka ilmenee rintakipuna.
 - 2. Epäily herää oireista ja poikkeavasta thoraxkuvasta, jossa voidaan havaita pyörövarjo.
 - a. Myös mm. benignit kasvaimet (useimmiten hamartooma) ja infektiot (esim. tuberkuloosi, aspergilloosi) voivat aiheuttaa pyörövarjon.
- E. Levinneisyysastetta ja sen myötä ennustetta kuvataan TNM-luokituksella, joiden perusteella syövät voidaan jakaa myös asteisiin (I-IV):
 - 1. T- Tumor; primaarikasvaimen koko ja paikallinen tunkeutuminen
 - 2. N- Nodes; paikallisten imusolmukkeiden etäpesäkkeet
 - 3. M- Metastasis; Etäpesäkkeet muualla
 - a. Yleisimmät paikat ovat maksa, luusto, aivot ja lisämunuaiset.
- F. Diagnoosi perustuu histologiseen tai sytologiseen näytteeseen.
 - 1. Keskeisin tutkimus on transtorakaalinen neulanäyte tuumorista paksuneulabiopsiana (voidaan täydentää sytologisilla tutkimuksilla, kuten ohutneulabiopsialla, BAL-näytteellä tai harjaamalla bronkusten seinämiä)
- G. Näytteiden perusteella keuhkosyövät jaetaan kahteen pääluokkaan: pienisoluisen keuhkokarsinoma ja ei-pienisoluiset keuhkokarsinomat.
 - 1. Ei-pienisoluiset keuhkokarsinomat voidaan tavallisesti hoitaa kirurgisesti, kun taas pienisoluisen karsinoma hoidetaan pääasiassa kemoterapialla ja säteilyllä.
 - 2. Immunohistokemialliset tutkimukset auttavat alatyypityksessä ja tarkemman hoidon valinnassa.
 - a. Adenokarsinoomassa voidaan havaita EGFR-mutaatioita tai kromosomin 2 inversio (EML4-ALK -fuusioproteiini), jotka ohjaavat systeemistä terapiaa.
 - b. PD-L1 voi olla ekspressoitu missä tahansa ei-pienisoluisessa karsinoomassa ja ohjaa immunologista hoitoa.

II. PIENISOLUINEN KEUHKOSYÖPÄ

- A. N. 15% kaikista keuhkosyöivistä ovat pienisoluisia karsinoomia.

- B. Erittäin vahva yhteys tupakointiin; tavataankin yleensä vanhoilla tupakoivilla miehillä.
- C. Histologisesti havaitaan heikosti erikoistuneita pieniä soluja, jotka ovat peräisin neuroendokriinisistä Kulchitskyn soluista. (Kuva 9.36.)
- D. Primaarituumorin sijainti on yleensä keuhkojen keskiosassa (sentraalinen), josta se metastasoi aikaisin.
- E. Usein havaitaan myös paraneoplastisia oireyhtymiä, mm.
 - 1. Antidiureettisen hormonin epäasianmukainen erityys (SIADH) – ADH:n liikaeritys aiheuttaa hyponatremiaa
 - 2. Ektooppinen Cushingin oireyhtymä – ACTH:n liikatuotanto aiheuttaa Cushingin oireyhtymän kaltaisia oireita (painonnousu, kuukasvoisuus, akne, proksimaalinen lihasheikkous, hypertensio yms.)
 - 3. Lambert-Eatonin myasteeninen syndrooma (LEMS) – Syöpäsolut tuottavat vasta-aineita hermo-lihasliitoksen presynaptisia kalsiumkanavia vastaan; oireistoon kuuluu proksimaalisten lihasten heikkous ja vaimentuneet heijasteet

III. EI-PIENISOLUINEN KEUHKOSYÖPÄ

A. Adenokarsinooma

- 1. Yleisimpiä primaarisia keuhkosyöpiä (n. 50%); yleisin naisten ja ei-tupakoitsijoiden tyyppi (tupakointi silti tärkein riskitekijä)
- 2. Histologisesti havaitaan usein rauhasmaista tai lepidistä kasvua ja usein musiinia. (Kuva 9.37.)
- 3. Primaarituumorin sijainti yleensä keuhkojen perifeerisissä osissa (perifeerinen).
- 4. Voi olla:
 - a. preinvasiivinen (adenokarsinooma in situ), jossa lieriömäisiä soluja kasvaa pitkin bronkiolien ja alveolien seinämää (Kuva 9.38.)
 - b. minimaalisesti invasiivinen: halkaisijaltaan korkeintaan 3 cm, sen hallitseva kasvutapa on lepidinen, ja invasiivinen alue on kooltaan korkeintaan 5 mm.
 - c. tai invasiivinen, joilla useita erilaisia kasvutapoja; jaetaan vielä non-musinoottiseen ja invasiiviseen musinoottiseen

B. Levyepiteelikarsinooma

- 1. Toiseksi yleisin keuhkokarsinooma; yleisin tupakoivilla miehillä
- 2. Histologisesti havaitaan keratinisaatiota, keratiinihelmiä ja soluvälisiltamuodostusta. (Kuva 9.39)
- 3. Primaarituumorin sijainti yleensä sentraalinen.
- 4. Voi tuottaa PTHrP ja aiheuttaa paraneoplastisen oireyhtymän, johon liittyy mm. hyperkalsemia.

C. Suurisoluinen karsinooma (LCNEC)

- 1. Vain n. 5-10% keuhkokarsinoomista; yleisin tupakoivilla miehillä
- 2. Histologisesti havaitaan huonosti erilaistuneita suuria neuroendokriinisia soluja ja usein nekroosia, mutta ei muita adenokarsinooman tai levyepiteelikarsinooman tyypillisiä piirteitä. (Kuva 9.40.)
 - a. Diagnoosi on poissulkudiagnoosi immunohistokemiaa hyödyntäen.
- 3. Primaarituumorin sijainti vaihtelee, mutta yleensä perifeerinen.

D. Karsinoidituumori

- 1. Alle 5% keuhkosyövistä; voi esiintyä myös alle 20v (kuitenkin yleensä n. 45-55v.), ei liity selkeästi tupakointiin

2. Histologisesti havaitaan hyvin erilaistuneita neuroendokriinisia soluja, jotka ovat kromograniniiniposiivisia. (Kuva 9.41.)
3. Primaarituumorin sijainti vaihtelee, mutta yleensä sentraalinen ja sijaitsevat keutkoputken sisällä.
4. Tyypillisesti matalan maligniasteen tuumori, jonka ennuste on hyvä.
 - a. Voi harvoin aiheuttaa karsinoidisyndrooman (muiden elinten karsinoidituumoreissa yleisempi).
 - i. Tuumori erittää runsaasti serotoniinia, joka aiheuttaa mm. ripulia, kasvojen punoitusta ja takykardiaa.

E. Metastaasit keuhkoihin

1. Yleisempää kuin primaariset tuumorit.
2. Yleisin veriteitse leviävien kasvainten metastasointipaikka; tavallisemmat lähtöpaikat ovat rinta-, maha-suolikanava-, munuais- ja kilpirauhassyövät ja melanooma sekä pään ja kaulan alueen syövät.
3. Kuvauksessa havaitaan multippeleita pyörötuumoreita; immunohistokemia auttaa erottamisessa.

PLEURAN TAUDIT

I. PLEURANESTEKERTYMÄ

- A. Pleuranesteen ylittäessä fysiologisen määrän (10-20ml), ilmenee pleuranestekertymälle tyypillisiä oireita, kuten pistävää kylkikipua ja hengenahdistusta.
- B. Neste voi olla koostumukseltaan joko transudaattia (vähäproteiininen) tai eksudaattia (runsasproteiininen).
 1. Transudaatti syntyy hydrostaattisen paineen kohotessa (esim. sydämen vajaatoiminta) tai onkoottisen paineen laskiessa (esim. nefroottinen oireyhtymä).
 2. Eksudaatti syntyy hiussuonten läpäisevyyden lisääntymisen seurauksena (esim. pleuriitti tai maligniteetti)

II. PNEUMOTHORAX (ILMARINTA)

- A. Keuhkopussiin kertyy ilmaa, mikä hävittää pleuratilän negatiivisen paineen, painaa keuhkon toista puolta kasaan ja aiheuttaa hengenahdistusta ja kipua.
- B. Voi syntyä spontaanisti tai trauman aiheuttamana.
- C. Spontaani ilmarinta syntyy ”sisäkautta” keutkoputkista, kun laajentunut bronkiolin tai alveolin kupla repeää ja vuotaa ilmaa keuhkopussiin.
 1. Voi olla primaarinen (terveissä keuhkoissa tapahtuva) tai sekundaarinen (sairaissa keuhkoissa, esim. tuberkuloosi, maligniteetti, COPD)
- D. Trauma rintakehän läpi päästää ilmaa suoraan ulkoilmasta pleuraan; voi aiheuttaa jänniteilmarinnan (tension pneumothorax), jossa ilmaa pääsee pleuraan mutta ei ulos sieltä (yksisuuntainen läppä).
 1. Kasvava ylipaine on nopeasti henkeä uhkaava ja johtaa nopeasti hoitamattomana kuolemaan.


III. MESOTELIOOMA

- A. Pleuramesotelioma on keuhkopussin maligni kasvain; lähes aina taustalla työperäinen asbestialtistus.
 1. Viive altistuksen ja sairastumisen välillä jopa useita vuosikymmeniä.
- B. Aiheuttaa hengenahdistusta, rintakehän kipuja ja toistuvia pleuraeffuusioita.


Nasal polyps




Kuva 9.1. Nenäpolyppi




Kuva 9.2.1. Nasofaryngeaalikarsinooma, ei-keratinisoiva, erilaistumaton




Kuva 9.2.2. Nasofaryngeaalikarsinooma, keratinisoimaton, erilaistunut




Kuva 9.2.3. Nasofaryngeaalikarsinooma, keratinisoiva




Kuva 9.3. Epiglottiitti




Kuva 9.4. Äänihuulikyhmyt




Kuva 9.5. Laryngeaalipapillomatoosi




Kuva 9.6. Kongestiovaihe



Kuva 9.7. Punainen ja harmaa hepatisaatio




Kuva 9.8. Bronkopneumonia






Kuva 9.9. Interstitiaalinen pneumonia




Kuva 9.10. Ghonin fokus




Kuva 9.11. Ziehl-Neelsen-värjäys




Kuva 9.12. Spirometria




Kuva 9.13. Reidin indeksi



Kuva 9.14. Pinkki puhisija vs sininen turvottaja (Pink puffer vs blue bloater)




Normal Lung - Gross




Emphysematous Lung - Gross


Kuva 9.15. Emfyseema



Kuva 9.16. Emfyseema



Kuva 9.17. Senti- vs. panasinaarinen emfyseema




Kuva 9.18. PASD-värijäys paljastaa hepatosyyttien intrasytoplasmiset kappaleet A1AT-puutoksessa


Seen in patients with **emphysema**

Increased lung compliance

Increased FRC → larger volumes in chest




Kuva 9.19. Tynnyririnta




Kuva 9.20. Curschmannin spiraali (Bronkusimunäyte)




Kuva 9.21. Charcot-Leydenin kristalleja ja eosinofiilejä




Kuva 9.22. Situs inversus



Kuva 9.23. UIP




Kuva 9.24. Hunajakennokeuhkot




Kuva 9.25. Asteroidikappale




Kuva 9.26. Erythema nodosum




Kuva 9.27. Pleuraplakki



Kuva 9.28. Asbestikappaleita (ferruginous bodies)




Kuva 9.29. Silikoosi




Kuva 9.30. Antrakoosi



Kuva 9.31. CWP



Kuva 9.32. Pleksiforminen leesio




Kuva 9.33. ARDS




Kuva 9.34. Vena cava superior -syndrooma; Pemberton sign

Horner's Syndrome


a neurological condition that affects the sympathetic nerve pathway




Kuva 9.35. Hornerin oireyhtymä



Kuva 9.36. SCLC



Kuva 9.37. Keuhkojen adenokarsinooma



Kuva 9.38. Adenokarsinooma in situ





Squamous Cell Carcinoma "Invasive sheets of carcinoma cells with keratinization"	Adenocarcinoma "Gland-related structures of carcinoma cells or carcinoma derived from gland"
	
Two key histologic features: A. Keratin pearl B. Intercellular bridge	A. Glandular, ductal, tubular, acinar, follicular, alveolar B. Cribriform C. Papillary, micropapillary, pseudopapillary D. Solid
Mucin(-), PAS(+), PAS with Diastase(-)	Mucin(+), PAS(+), PAS with Diastase(+)


Figure 1. Simon Harrington et al. *Mar's Textbook of Pathology* 13th Edition, Page 85, CRC Press, International Standard Book Number-13: 978-1-4441-8495-5.



Kuva 9.39. Levyepiteelikarsinooma



Kuva 9.40. Suurisolainen keuhkokarsinoma



Kuva 9.41. Karsinoidituumori, rosettimainen kasvutapa