

Patologian perusteet

Sisällysluettelo

1 SOPEUTUMINEN, SOLUVAURIO JA SOLUKUOLEMA.....	2
2 TULEHDUS JA PARANEMINEN.....	13
3 NEOPLASIA	27
4 HEMODYNAMIIKKA JA SEN HÄIRIÖT	39
5 ANEMIA	51
6 VALKOSOLUJEN HÄIRIÖT.....	67
7 VERISUONIPATOLOGIA	82
8 SYDÄNPATOLOGIA	94
9 HENGITYSTIEPATOLOGIA	111
10 RUOANSULATUSKANAVAN PATOLOGIA	127
11 MAKSA, SAPPITEIDEN JA HAIMAN PATOLOGIA	156
12 MUNUAISTEN JA VIRTSAIDEN PATOLOGIA	178
13 GYNEKOLOGINEN JA RASKAUSAJAN PATOLOGIA	198
14 MIEHEN SUKUELINTEN PATOLOGIA	212
15 ENDOKRIININEN PATOLOGIA.....	226
16 RINTAPATOLOGIA.....	250
17 NEUROPATOLOGIA	259
18 MUSKULOSKELETAALINEN PATOLOGIA	280
19 IHOPATOLOGIA.....	304
KUVAT.....	320

1 SOPEUTUMINEN, SOLUVAURIO JA SOLUKUOLEMA

Sopeutumismuutokset

I. PERIAATTEET

- A. Taudit perustuvat solujen ja kudosten muutoksiin, joiden ajurina toimii soluihin kohdistuva stressi.
- B. Solujen sisäinen tasapaino (homeostaasi) on tarkan säätelyn alaisena, ja soluun kohdistuvan stressin muutos voi johtaa sopeutumismuutoksiin (adaptaatio) sekä pitkittyneenä tai riittävän voimakkaana soluvaurioon ja jopa solukuolemaan.

II. HYPERTROFIA JA HYPERPLASIA

- A. Lisääntynyt stressi (toiminnallinen tarve, kompensointi, hormonivaikutus) johtaa elimen koon kasvuun joko hypertrofialla tai hyperplasialla.
 - 1. Hypertrofia ja hyperplasia molemmat johtavat elimen kasvuun, mutta hypertrofia on solujen koon kasvua ja aoryperplasia solumäärän lisääntymistä.
- B. Hypertrofia ja hyperplasia tapahtuvat usein yhdessä, mutta jakautumattomista soluista koostuvissa kudoksissa (permanentti kudos) ei esiinny hyperplasiaa, vaan ainoastaan hypertrofiaa.
 - 1. Jakautumattomista soluista koostuvia kudoksia ovat esimerkiksi sydänlihas, luurankolihakset ja hermot. (Kuva 1.1.)
 - 2. Hypertrofia vaatii geeniaktivaation, joka lisää proteiinien sekä soluelinten tuotantoa.
 - 3. Hyperplasiassa uusia soluja syntyy kantasolujen jakautumisella.
- C. Voi olla fysiologista tai patologista, esimerkiksi:
 - 1. Fysiologinen hypertrofia: lihaksen kasvaminen kuntoilun vaikutuksesta
 - 2. Patologinen hypertrofia: sydänlihaksen kasvaminen korkean verenpaineen takia
 - 3. Fysiologinen hyperplasia: endometriumien uusiutuminen proliferaatiovaiheen aikana
 - 4. Patologinen hyperplasia voi johtaa dysplasiaan ja lopulta syöpään: endometriumien hyperplasia
 - a. Poikkeuksena hyvänlaatuinen eturauhasen liikakasvu (BPH), joka ei altista eturauhassyövälle.

III. ATROFIA

- A. Vähentynyt stressi (esim. hormonistimulaation väheneminen, lihaksen käyttämättömyys, ravinteiden/verenkierron vähentyminen) johtaa elimen koon kutistumiseen solumäärän vähenemisellä ja solujen pienenemisellä.
 - 1. Solun atrofia tarkoittaa solun pienenemistä, kun taas koko elin voi atrofioidua myös apoptoosin kautta tapahtuvan solumäärän vähentymisellä.
 - 2. Involuutiolla tarkoitetaan ikään tai tiettyihin tapahtumiin liittyvää normaalia elimen surkastumista ja palautumista aikaisempaan kokoon (esim. kateenkorvan surkastuminen aikuisiässä)

- B. Solun pientyminen tapahtuu vähentyneen proteiinisynteesin, autofagian sekä ubikitiini-proteasomijärjestelmän kautta.
1. Ubikitiini-proteasomijärjestelmä: proteiineja merkitään ubikitiinilla, jonka avulla proteasomi tunnistaa hävitettävän kohteen (esim. sytoskeletonin välikokoiset filamentit).
 2. Autofagiassa solun komponentteja suljetaan vakuoleihin, jotka yhdistyvät hydrolyyttisiä entsyymejä sisältävien lysosomien kanssa.
 - a. Hajoitustuotteet toimivat energiana ja substraatteina, jotka ovat tärkeitä, kun normaali ravinteiden saanti on puutoksellista.

IV. METAPLASIA

- A. Stressin muutos aiheuttaa kudoksen kypsän solutyypin muuttumisen uuteen ympäristöön paremmin sopeutuvaksi kypsäksi solutyypiksi.
- B. Tapahtuu kantasolujen uudelleenohjelmoitumisella (transcommitment) sekä transdifferentiaatiolla eli jo kypsien solujen suoralla muuttumisella.
- C. Useimmiten muutos yhdestä epiteelityypistä toiseen, esim. Barretin esofagus
1. Ruokatorven epiteeli on normaalisti ei-keratinisoitua levyepiteeliä, joka kestää ruoan nielemisestä johtuvaa kitkaa.
 2. Refluksi mahasta (GERD) aiheuttaa muutoksen limaa tuottavaksi yksiriviseksi lieriöepiteeliksi (intestinaalinen metaplasia), joka kestää paremmin happoa. (Kuva 1.2.)
- D. A-vitamiini on tarpeellista epiteelien erikoistumiselle ja erikoistuneiden epiteelien ylläpidolle, joten sen puute voi aiheuttaa metaplasiaa.
1. Levyepiteelimetaplasia respiratorisessa epiteelissä, erityisesti tupakoitsijoilla.
 2. Sidekalvon (konjunktiva) ohut levyepiteeli muuttuu kerrostuneeksi keratinisoivaksi levyepiteeliksi (kseroftalmia, kuivat silmät). (Kuva 1.3.)
 3. A-vitamiinia tarvitaan myös immuunisolujen kypsymiseen (kts. ATRA APL:n hoidossa).
- E. Metaplasia ei ole aina epiteelien välistä, myös mesenkymaalinen kudos voi läpikäydä metaplasiaa.
1. Trauma kudokseen voi aiheuttaa luukudoksen muodostumista, esim. myositis ossificans. (Kuva 1.4.)
- F. Voi palautua, jos muutosta ajava ärsyke poistuu.
- G. Jos sinnikäs ärsyke, metaplasia voi altistaa pahanlaatuisille muutoksille.
1. Esimerkiksi:
 - a. Tupakoinnin aiheuttama levyepiteelimetaplasia voi edetä keuhkosityöväksi.
 - b. Barretin ruokatorvi on merkittävä ruokatorven karsinooman riskitekijä.
 2. Poikkeuksena rinnan apokriininen metaplasia, jolla ei ole ollenkaan kohonnutta syöpäriskiä.

V. DYSPLASIA

- A. Usein viittaa kasvainta edeltävään solujen erilaistumisen häiriöön.
1. Esimerkiksi kohdunkaulan intraepiteelinen neoplasia (CIN) on dysplasiaa ja on kohdunkaulan syövän esiaste (Kuva 1.5.).

- B. Kudoksen solujen yhdenmukaisuuden puutos (koko ja muoto vaihtelevat) ja niiden järjestymisen polariteettihäiriö (epiteelin pinnan solut eivät järjesty normaalin epiteelin tapaan)
 - 1. Solujen lisääntynyt jakaantuminen sekä pleomorfia eli tumien suureneminen (kohonnut tuma/sytoplasma -suhde) ja tumien muodonvaihtelu
- C. Yleensä patologinen hyperplasia tai metaplasia edeltää dysplastista muutosta.
- D. Voi palautua, jos ajava tekijä poistuu, mutta dysplasian vaikeusasteen kasvaessa palautumisen mahdollisuus heikkenee.
 - 1. Stressin jatkuessa dysplasia voi yltää lopulta koko epiteelin paksuiseksi (kuitenkin ilman invaasiota), jolloin sitä kutsutaan carcinoma in situksi.

VI. AGENEESI, APLASIA, HYPOPLASIA JA ATRESIA

- A. Eivät varsinaisia sopeutumismuutoksia, vaan kehityksen pysähtymisen eri tasoja.
- B. Ageneesi tarkoittaa elimen tai sen osan muodostumisen täydellistä puutetta. Alkukantaista elinrakennetta ei ole olemassa (esim. munuaisen ageneesi).
- C. Aplasia tarkoittaa solutuotannon epäonnistumista sikiön kehittymisen aikana (esim. kateenkorvan aplasia Catch 22 -oireyhtymässä). Alkukantainen elinrakenne kuitenkin on olemassa.
- D. Hypoplasia on heikkoa solutuotantoa sikiön kehittymisen aikana, mikä johtaa normaalia pienempään elimeen (esim. kivesten hypoplasia Klinefelterin syndroomassa).
- E. Atresia viittaa sikiökehityksen häiriöön, jonka seurauksena on onkalon normaalin aukon umpeuma, esimerkiksi sappiteiden tai sisäelimen lumenin (esim. ruokatorven atresia).

SOLUVAURIO

I. PERIAATTEET

- A. Jos stressi on niin vahva, että solun adaptiivinen kapasiteetti ylittyy, seuraa soluvaurio.
- B. Vaurion aste riippuu stressin laadusta, kestosta, toistumisesta, vakavuudesta sekä solutyypistä.
 - 1. Palautuva soluvaurio: stressi on riittävän heikko
 - 2. Palautumaton soluvaurio ja solukuolema: stressi on vakava
 - 3. Solutyypin vaikutus: esim. neuronit todella herkkiä iskeemiselle vauriolle (muutamia minuutteja), sydänlihas keskinkertaisen kestävä (n. puoli tuntia) ja luustolihakset todella kestäviä (2-3h ilman palautumatonta vauriota)
- C. Yleisiä soluvaurion aiheuttajia ovat hypoksia, toksiinit, infektiot ja inflammaatio, geneettiset mutaatiot sekä ravintopuutokset.

II. HYPOKSIA

- A. Hypoksia voi olla yleistynyttä tai alueellista ja se viittaa hapen puutteeseen kudoksessa.
 - a. Happea tarvitaan aerobiseen oksidatiiviseen fosforylaatioon ja ATP:n tuottoon mitokondrioissa, sillä O₂ on elektroninsiirtoketjussa viimeinen elektronin vastaanottaja.
 - b. ATP:n puute johtaa soluvaurioon.

- c. Hapettomissa oloissa myös tuotetaan runsaasti maitohappoa (on tuotettava energiaa anaerobisella glykolyysillä), jonka kertyminen solussa laskee sen pH:ta johtaen soluvaurioon proteiinidenaturaation ja kromatiinin kimppuutumisen takia.
- B. ATP:ta tarvitaan välttämättömiin solutoimintoihin ja sen puute johtaa solun edeemaan ja kalsiumin kertymiseen solussa.
 - a. $\downarrow$ Na^+/K^+ -ATPaasin toiminta $\rightarrow \uparrow [\text{Na}^+]$ ja $\downarrow [\text{K}^+]$ $\rightarrow$ veden kerääntyminen soluun
 - b. $\downarrow$ Ca^{2+} -ATPaasin toiminta $\rightarrow \uparrow [\text{Ca}^{2+}]$
 - a. Kertynyt kalsiumi voi aktivoida monia sytosolin entsyymejä ja aiheuttaa vaurioita.
- C. Hypoksian aiheuttajia ovat iskemiat, hypoksemia, veren madaltunut hapenkantokyky ja histotoksinen hypoksia.
- D. Iskemia (verettömyys) tarkoittaa kudokseen virtaavan veren puuttetta.
 - a. Syitä verisuonitukos ja laskenut arteriaalinen perfuusio (esim. ateroskleroosi), verenpaineen lasku (sokki) tai laskenut laskimovirtaus (esim. Budd-Chiarin syndrooma).
- E. Hypoksemia tarkoittaa veren vähähappisuutta (valtimoveren happiosapaine alle 60mmHg (8,0 kPa, mikä vastaa keskimäärin happisaturaatiota 89%))
 1. Hengitetyssä ilmassa osa happea (PiO_2 , hengitetyn ilman happiosapaine; FiO_2 on taas happiosuus ilmassa, normaalisti 21%) $\rightarrow$ kulku alveoleihin (PAO_2 , alveolikaasun happiosapaine) $\rightarrow$ diffuusio alveolista plasmaan PaO_2 (arterian hapen osapaine) $\rightarrow$ diffuusio punasoluihin SaO_2 (valtimoiden happisaturaatio eli hapetetun hemoglobiinin määrä veressä)
 2. Pääasiassa hypoksemian aiheuttajat voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: matala alveolikaasun happiosapaine, diffusiohäiriö tai lisääntynyt laskimosekoittuma
 - a. Matala alveolikaasun happiosapaine sisältää hengitetyn ilman matalan hapen osapaineen (esim. korkealla ilmanalalla), matalan happipitoisuuden (FiO_2) ilmassa (esim. suljetussa tilassa hengittäminen) sekä hypoventilaation (esim. hengityskeskuksen lamaantuminen opioidiyliannostuksessa)
 - i. Hypoventilaation (hengitystyö liian hidasta tai ei tarpeeksi syvää) pääpiirre on hyperkapnia (korkea PaCO_2), mutta ventilaatiota tarvitaan myös siihen, että alveoleihin saadaan happea $\rightarrow$ vaikea hypoventilaatio lopulta aiheuttaa matalan alveolikaasun happiosapaineen ja sitä kautta hypoksemiaa
 - b. Diffusiohäiriö : Esimerkiksi pneumoniassa tai keuhkofibroosissa kaasujenvaihtopinta on paksuuntunut, jolloin happi ei pääse verenkiertoon yhtä helposti.
 - i. Pääasiallinen piirre on hypoksemia eikä hyperkapnia, koska CO_2 on 20x liukoisempaa veteen kuin O_2 $\rightarrow$ diffusiohäiriöt eivät häiritse yhtä paljon hiilidioksidin poistoa
 - c. Lisääntynyt laskimosekoittuma: Osa keuhkoverenkierrosta kulkee tuulettumattoman tai huonosti tuulettuvan keuhkokudoksen kautta (matala

V/Q-epäsuhta) ja sunttautuu (oikovirtaa) heikosti hapettuneena sydämen vasemmalle

- i. Suntti eli oikovirtaus voi olla keuhkojen sisäistä tai sydämen sisäistä (ns. oikealta vasemmalle suntti esim. synnynnäisen sydänvian takia); vähähappista verta sekoituu runsashappiseen vereen laskien sen hapen osapainetta.
- d. Ventilaatio-perfuusioepäsuhta eli V/Q-suhteen poikkeaminen tarkoittaa, että alveolin ventilaatio ja sitä ruokkivan kapillaarin verenkierto (perfuusio) eivät ole sopivassa suhteessa, eli joko ventilaatio on liiallista suhteessa alueen perfuusioon (kuollut tila; esim. keuhkoembolian affisioima alue) tai perfuusio on liiallista suhteessa alueen ventilaatioon (esim. ilmatien tukos vierasesineestä johtuen tai COPD:n/astman ahtauttamana)
 - i. Normaalisti huonosti ventiloitujen alueiden verisuonet supistuvat ohjaten verenkiertoa paremmin hapetetuille alueille (vasodilataattorit voivatkin tätä mekanismia häiritsemällä pahentaa hypoksemiaa).
 - ii. Hukkaventilaatio aiheuttaa havaittavaa happeutumishäiriötä yleensä vain laajana.
- F. Veren alentunut hapenkantokyky syntyy hemoglobiiniin liittyvissä poikkeavuuksissa.
 - a. Anemiassa punasolumassan väheneminen (pieni hemoglobiinipitoisuus) johtaa heikkoon hapenkantokykyyn.
 - a. PaO₂ ja SaO₂ ovat molemmat normaaleja.
 - b. Häkämyrkytyksen aiheuttajalla CO:lla korkeampi affiniteetti hemiryhmille kuin hapella ja sitoutuessaan hemoglobiiniin muodostaa karboksihemoglobiinia (COHb), mikä laskee SaO₂ (PaO₂ normaali).
 - a. Tätä ei kuitenkaan voi havaita normaalilla pulssioksimetrillä, sillä mittalaite ei pysty erottamaan COHb ja OHb
 - b. Häkä syntyy hiilen epätäydellisessä palamisessa, joten aiheuttajia esimerkiksi auton pakokaasut ja savun hengittäminen.
 - c. Alussa päänsärky ja huimaus, vaikeassa myrkytyksessä tajuttomuus ja kouristukset.
 - d. Klassinen piirre on ihon ja limakalvojen punaisuus.
 - e. Hoitona 100% hapen hengitys ja vaikeimmissa tapauksissa painekammiossa ylipainehappihoito.
- G. Harvinainen hypoksian syy on histotoksinen hypoksia (kudostoksinen hypoksia), jossa hapen kuljetus kudoksiin ja soluihin on normaali, mutta solut eivät pysty käyttämään happea ATP:n tuottoon (esim. syanidimyrkytys).
- H. Arterioiden päätehaarojen rajapyykkialueet (vedenjakaja-alueet, watershed areas) ovat alttiita hypoksialle vaurioille, esim:
 - a. A. cerebri anteriorin ja median ruokkimien alueiden väli on vaarassa infarktiolle shokissa.
 - b. A. mesenterica superior ja inferiorin rajapyykkialue transversumin loppuosassa ja laskevan koolonin alueella (flexura coli sinistra); a. mesenterica superiorin ateroskleroosi aiheuttaa iskeemistä koliittia.

- c. Subendokardinen kudosa saa normaalistikin vähiten happea sydänkerroksesta, sillä sepelvaltimot kulkevat pinnalta syvälle, ja täten sepelvaltimotaudissa on vaara subendokardiselle iskemialle.

III. PALAUTUVA JA PALAUTUMATON VAURIO

- A. Palautuvan soluvaurion tyypillinen piirre on solun ja soluelinten turpoaminen osmoottisen säätelyn puuttumisen takia (Na^+/K^+ - ja Ca^{2+} -pumppujen pettäminen).
 - a. Sytosolin turpoamisen seurauksena on mikrovillusten katoaminen ja solukalvon kuplaantuminen.
 - b. Proteiinisynteesi vähenee, sillä matalan pH:n ja turpoamisen seurauksen myös RER turpoaa johtaen sen pinnan ribosomien irtoamiseen.
- B. Lopulta solu vaurioituu palautumattomasti ja sen tyypillinen piirre on kalvovaurio.
 - a. Solukalvon vaurioituminen johtaa solunsisäisten entsyymien pääsyn verenkiertoon (esim. troponiini) ja yhä suurempien kalsiumin määrien pääsyyn solun sisälle
 - a. Kalsium aktivoi fosfolipaaseja, proteaaseja, endonukleaaseja ja kaspaseita.
 - i. Fosfolipaasit vaurioittavat solun ja soluelinten kalvoja.
 - ii. Proteaasit vaurioittavat sytoskeletonia.
 - iii. Endonukleaasit vaurioittavat kromatiinia.
 - iv. Kaspasit toimivat apoptoosissa.
 - b. Lysosomien kalvo voi vaurioitua, mikä johtaa hydrolyyttisten entsyymien lisääntyneen pääsyn solulimaan ja niiden aktivoitumisen kalsiumin toimesta.
 - b. Kalsiumin aktivoimat fosfolipaasit lisäävät mitokondrion kalvon permeabiliteettia (kalvopotentialin menetys johtaen oksidatiivisen fosforylaation menetykseen).
 - a. Mitokondrion sisäkalvon vahingoittuminen johtaa voimakkaaseen turpoamiseen ja vakuolisoitumiseen.
 - b. Sytokromi c pääsee solulimaan, mikä aktivoi apoptoosin kaspasien kautta.
- C. Palautumattoman soluvaurion lopputilanne on solukuolema, jonka tyypimpiinä ovat tumavauriot.

SOLUKUOLEMA

I. PERIAATTEET

- A. Palautumaton soluvaurio johtaa solukuolemaan.
- B. Morfologinen tunnusmerkki on tumavaurio ja tuman menetys.
 - 1. Tuma kutistuu ja kromatiini pakkautuu (karyopyknoosi)
 - 2. Tuman hajoaminen pieniksi kappaleiksi (karyoreksis)
 - 3. Tuman liukeneminen (karyolyysi)
- C. Voi tapahtua apoptoosilla tai nekroosilla.

1. Yleensä vakava todella vakava vaurio johtaa nekroosiin, kun taas lievempi vaurio (erit. DNA vauriot) tai jopa normaali prosessi voi johtaa apoptoosiin.

II. APOPTOOSI

A. Ohjelmoitu (eli vaatii ATP) yksittäisten solujen tai soluryhmien kuolema – voi olla patologista tai fysiologista.

1. Jos ATP loppuu kesken apoptoosia, seuraa sekundaarinen nekroosi eli onkoosi, joka on yleinen iskeemisissä vaurioissa.

B. Ei aiheuta ympärilleen tulehdusreaktiota.

C. Morfologia

1. Solu kutistuu ja tuman materiaali tiivistyy (karyopyknoosi)
2. Tuma hajoaa pienemmiksi kappaleiksi (karyoreksis)
3. Solu hajoaa ennen karyolyysiä apoptoottisiksi kappaleiksi, jotka makrofagit hävittävät -> ei tulehdusreaktiota
4. Apoptoottisen solun sytoplasma eosinofiilinen ja tuma syvästi basofiilinen ennen sen hajoamista.

D. Esimerkkejä

1. Normaalia solujen tuhoutumista embryogeneesin aikana
2. Endometrin rauhasen apoptoosi kuukautissyklissä estrogenin ja progesteronin laskiessa
3. Akuutin inflammaation solujen, kuten neutrofiilien, kuolema tulehduksen laskiessa
4. Säteily johtaa DNA-vaurioihin ja siten väärin laskostettujen proteiinien kertymiseen, mikä johtaa apoptoosiin ER-stressin kautta.

III. APOPTOOSIN MEKANISMI

A. Apoptoosin aiheuttaa kaspaasit, jotka aktivoivat proteaaseja ja endonukleaaseja.

1. Proteaasit hajoittavat sytoskeletonin.
2. Endonukleaasit hajoittavat tuman.

B. Sisäinen reitti (mitokondriaalinen)

1. Bcl-2 ja Bcl-xl ovat anti-apoptoottisia molekyylejä, jotka ylläpitävät mitokondrion kalvon yhtenäisyyttä.
2. Kun solussa on liikaa DNA-vaurioita tai se ei saa tarpeeksi kasvutekijöitä tai selvitytymissignaaleja, BH3-sensorit kääntävät mitokondrion vaikuttavien molekyyliden tasapainon Bak ja Bax puolelle.
 - a. Bax ja Bak ovat pro-apoptoottisia molekyylejä, jotka aiheuttavat huokosten syntymistä mitokondrion ja siten saavat sen vapauttamaan sytokromi c:tä.
 - b. Sytokromi c taas aktivoi aloittajakaspaasin, kaspaasi 9:n, joka käynnistää toimeenpanijakaspaasien toteuttaman solukuoleman.

C. Ulkoinen reitti (reseptorivälitteinen)

1. TNFR:t ovat kuolemanreseptoreita, jotka TNF-alfaa sitoessaan aiheuttaa aloittajakaspaasin 8 aktivoitumisen.
2. FAS-perheen reseptorit aiheuttavat FAS-L sitoessaan aloittajakaspaasin 8 aktivoitumisen.

D. Perforiini-grantsyymi-reitti

1. Tappaja T-solut erittävät perforiineja ja grantsyymiä.
2. Perforiini tekee reikiä kohdesoluun ja grantsyymi aktivoi solunsisäisiä kaspaaseja.
3. Esimerkiksi virusinfektoituneiden solujen tuhoaminen

IV. NEKROOSI

- A. Solujen kuolemaa ryhmittäin seuraten vakavaa soluvauriota – aina patologista.
- B. Nekroottinen solukko aiheuttaa ympärilleen tulehdusreaktion.
- C. Solunsisäisiä entsyymejä vuotaa solunulkoiseen tilaan (autolyysi) ja ne voivat toimia merkkiaineina soluvauriosta.
- D. Jaetaan ulkoisten piirteiden mukaan eri luokkiin.

V. NEKROOSIN TYYPIT

A. Koagulaationekroosi

1. Solukko säilyy rakenteeltaan tunnistettavissa eli solujen ääriviivat säilyvät, mutta tumat katoavat. (Kuva 1.6.1. ja 1.6.2.)
 - a. Soluvaurio ja sitä seuraava asidoosi denaturoivat rakenneproteiinit sekä entsyymit, mikä estää solun autolyysin.
2. Kaikkien kudosten (paitsi aivojen) iskeeminen infarkti johtaa koagulaationekroosiin.
3. Infarkti tarkoittaa kudoksen kuoliota, joka johtuu paikallisesta verenkierron häiriöstä, kuten valtimon tukkeutumisesta.
 - a. Infarktialue on yleensä kiilan muotoinen ja kalpea, sillä kahtiajakautuvan suonon haarautumiskohdassa oleva tukos johtaa V-muotoiseen kuolioalueeseen (kärki osoittaa tukokseen).
 - b. Hemorraginen (punainen) infarktio tapahtuu, jos veri pääsee kertymään löyhästi järjestäytyneeseen kudokseen (esim. Keuhkot, kivekset). (Kuva 1.7.)

B. Nestemäinen nekroosi

1. Nekroottisen kudoksen degradaatio johtaa pehmeään ja nestemäiseen ilmenemismuotoon. (Kuva 1.8.)
 - a. Nekroottisten solujen lysosomaaliset entsyymit tai neutrofiilien hydrolyytiset entsyymit hajottavat kudosta.
2. Tyypillistä keskuhermoston iskemiassa, bakteeri- tai sieni-infektioiden aiheuttamissa paiseissa sekä pankreatiitissa.
 - a. Keskushermostossa neurogliasoluista vapautuvat hydrolyytiset entsyymit liuottavat nopeasti nekroottisen kudoksen.
 - b. Akuutissa bakteeri- tai sieni-infektion aiheuttamassa tulehdusreaktiossa paikalle tulee runsaasti neutrofiileja, jotka hävittävät kuolleet solut aiheuttaen paiseen (absessin) eli kudosteloon muodostuneen nestemäisen nekroosin pesäkkeen.
 - c. Pankreatiitissa entsyymaattiseen ruuansulatukseen tarkoitetut entsyymit tuhoavat kudosta (esiintyy myös rasvaneekroosia).

C. Rasvaneekroosi

1. Rasvan tuhoutuminen yleensä johtuen haimatulehduksesta tai traumasta haimaan tai rasvakudokseen.
 - a. Haimatulehduksessa vapautuu fosfolipaaseja ja proteaaseja, jotka hyökkäävät rasvasoluihin ja vapauttavat triglyseridejä, joista haiman lipaasi vapauttaa rasvahappoja.
2. Vapautuneet rasvahapot yhtyvät kalsiumiin ja muodostavat vaaleita kalkkeutuneita alueita (saponifikaatio), mikä aiheuttaa tyypillisen liitumaisen ja valkoisen ulkomuodon. (Kuva 1.9.)

- a. Saponifikaatio on dystrofista kalsifikaatiota, eli kalkkeutumista, joka tapahtuu nekroottisissa kudoksissa normaalin seerumin kalsiumin ja fosfaatin tiloissa.
- b. Metastaattinen kalsifikaatio tapahtuu normaaleissa kudoksissa korkean seerumin kalsiumin ja fosfaatin tiloissa (esim. hyperparatyreoosi johtaa nefrokalsinoosiin).

D. Juustonekroosi

- 1. Nekroosialue näyttää vaalean juustomaiselta, mikroskooppisesti rakenteetonta massaa granulomatoottisen tulehduksen ympäröimänä. (Kuva 1.10.)
 - a. Tyypillistä tuberkuloosissa ja sieni-infektioissa.

E. Fibrinoidi nekroosi

- 1. Vaurio verisuonen seinämään johtaa proteiinien – kuten fibrinien – vuodon seinämään, mikä johtaa voimakkaan vaaleanpunaiseen värjäykseen mikroskooppisesti. (Kuva 1.11.)
- 2. Tyypillistä immuunivälitteisissä verisuonivaurioissa (vaskuliitit) ja malignissa verenpainetaudissa.

F. Gangreeni

- 1. Muumioitunutta kudosta muistuttava koagulaationekroosia, joka on tyypillistä alaraajojen ja suoliston iskemialle. (Kuva 1.12.)
- 2. Jos kuivan gangreenin lisäksi kudokseen tulee bakteeri-infektio, morfologia muuttuu nestemäiseksi (märkä gangreeni).

VAPAIEN RADIKAALIEN AIHEUTTAMA SOLUVAURIO

I. PERIAATTEET

- A. Vapaat radikaalit ovat epävakaita hiukkasia, joilla on yksi pariton elektroni uloimmalla elektronikuorellaan.
 - 1. Pystyvät siis “varastamaan” toiselta molekyyliltä elektronin, jolloin siitä molekyylistä tulee puolestaan vapaa radikaali -> solukuolemaan johtava ketjureaktio.
 - 2. Vaikuttavat pääosin nukleiinihappoihin, proteiineihin ja kalvomolekyyleihin.
 - a. Tumassa aiheuttavat DNA:n oksidaatiota ja kromatiinin hajoutumista reagoimalla tyymiinin kanssa ja aiheuttaen yksiketjuisia katkoksia.
 - b. Edistävät proteiinien ristireaktioita ja aikaansaavat entsyymien inaktivoitumista ja hajoamista.
 - c. Solun ja mitokondrion kalvoilla aiheuttavat lipidien peroksidaatiota, mikä johtaa soluliman $[Ca^{2+}]$ kasvuun ja sytokromi c:n vapautumiseen mitokondriosta.
 - d. Fysiologinen lipidiperoksidation tuote on lipofuskiini (ikäpigmentti). (Kuva 1.13.)
- B. Fysiologinen vapaiden radikaalien tuotanto tapahtuu soluhengityksen oksidatiivisen fosforylaation vaiheessa, kun sytokromi-c-oksidaasi (kompleksi IV) siirtää elektroneja hapelle.
 - 1. Happi O_2 voi vastaanottaa neljä elektronia, mikä muodostaa vettä.

2. Osittainen O₂:n pelkistyminen tuottaa superoksidianionia (O₂⁻), vetyperoksidia (H₂O₂) ja hydroksyyli-radikaalia (OH⁻).

C. Patologinen tuotanto:

1. Korkeiden O₂ konsentraatioiden anto johtaa superoksidien tuottoon.
2. Ionisoiva säteily hajottaa kudoksen veden vedyksi ja hydroksyyliksi.
3. Tulehduksessa NADPH-oksidaasireaktio tuottaa superoksidia neutrofiileissa.
4. Metallit (esim. kupari ja rauta) tuottavat hydroksyyli-radikaaleja (Fentonin reaktio).
5. Lääkkeiden ja kemikaalien metabolisointi P450-systeemillä.
6. Reperfuusio iskeemisen vaurion jälkeen

D. Vapaiden radikaalien eliminaatio:

1. Vapaat radikaalit häviävät yleensä itsestään, sillä ne ovat epävakaita.
2. Mitokondrioissa superoksididismutaasi (SOD) muuttaa superoksidin (O₂⁻) vetyperoksidiksi (H₂O₂).
3. Peroxisomeissa oleva katalaasi kiihdyttää vetyperoksidin hajotusta vedeksi ja O₂.
4. Mitokondrioissa glutatiooniperoksidaasi neutralisoi H₂O₂ sekä hydroksyyliä (OH⁻).
5. Antioksidantit kuten A, C- ja E-vitamiini tai glutationi lahjoittavat yhden omista elektroneistaan vapaalle radikaalille, mutta eivät itse muutu vapaiksi radikaaleiksi.
6. Metallinkuljettajaproteiinit (esim. transferrini, ferritiini ja seruloplasmiini) sitovat vapaita metalliradikaaleja ja estävät niiden vaurioittavan toiminnan.

II. ESIMERKKEJÄ VAPAIEN RADIKAALIEN SEURAUKSISTA

A. Reperfuusio vaurio:

1. Verettömyydestä kärsivillä soluilla ei ole antioksidanttista kykyä, jolloin reperfuusiossa takaisin tuleva happi lisää vapaiden radikaalien määrää ja tuhoaa soluissa.
 - a. Havaitaan esim. sydänlihaksen infarktissa troponiinin nousuna obstruktion avautuessa.

B. Parasetamolin yliannostus:

1. Korkeat annokset johtavat toksisen NAPQI-metaboliitin tuottoon, mikä aiheuttaa maksavaurion toimimalla sekä itse hapettajana että vähentämällä maksan glutationivarastoja (glutationi on antioksidantti).

KERTYMÄSAIRAUDET JA AMYLOIDOOSI

I. PERIAATTEET

- A. Erilaiset aineet voivat aiheuttaa soluvaurioita niiden kertyessä soluihin tai niiden ympäristöön.
- B. Erilaisia solujen sisäisiä kertymiä, jotka aiheuttavat vaurioita ovat mm. rasva- ja kolesterolikertymät (stetatoosi), proteiinikertymät (esim. alfa-1-antitrypsiinin puute maksakirroosissa, prioniproteiinit prionitauksissa, Lewyn kappaleet Parkinsonin taudissa) ja tietyt pigmenttikertymät (esim. hiilikertymät keuhkoissa eli antrakoosi).
- C. Amyloidi taas viittaa epänormaalisti laskostuneiden proteiinien kertymiin solunulkoisessa tilassa, mikä aiheuttaa vaurioita.
 1. Amyloidisäikeille ominaista on beeta-levykonformaatio sekä omenanvihreä kaksoistaitto polarisoidun valon alla (kongopunavärjäyksessä). (Kuva 1.14.)
 2. Amyloidoosi voi olla paikallista tai systeemistä.

II. SYSTEEMINEN AMYLOIDOOSI

- A. Systeeminen amyloidoosi viittaa amyloidin kertymiseen useisiin elimiin; voidaan jakaa primaariseen ja sekundaariseen amyloidoosiin.
- B. Primaarinen (AL-) amyloidoosi johtuu plasmasolujen proliferatiivisesta häiriöstä (esim. multippeli myelooma), mikä johtaa kevytketjuproteiinien liikatuottoon ja niistä derivoitujen proteiinien eli AL-proteiinien kerääntymiseen.
 - 1. Vapaita monoklonaalisia kappa- tai lambdakevytketjuja kutsutaan Bence Jones -proteiineiksi.
- C. Sekundaarinen (AA-) amyloidoosi syntyy akuutin vaiheen proteiinista, seerumin amyloidi A eli SAA:sta derivoitujen proteiinien eli AA-proteiinien kertyessä kudoksiin.
 - 1. Liittyy pääasiassa kroonisiin tulehdus- ja infektiosairauksiin ja tiettyihin maligniteetteihin.
- D. Kliiniset ilmentyvät vaihtelevat affisioituneiden elimien mukaan, mm.
 - 1. Munuaiset (yleisin kertymäpaikka) – aiheuttaa proteinuriaa ja mahdollisesti jopa nefroottisen oireyhtymän
 - 2. Sydän – restriktiivinen kardiomyopatia, johtumis- ja rytmihäiriöt
 - 3. Kieli – kielen suureneminen
 - 4. Verisuonet – vuototaipumus (heikentää suonon seinämää)
 - 5. Suolisto – mm. imeytymishäiriöt
 - 6. Maksa ja perna – hepatosplenomegalia
- E. Diagnoosi perustuu näytepalaan itse vioittuneesta elimestä; hyvä seulontatutkimus on vatsan alueen ihonalaiskudoksen rasva-aspiraatio.
- F. Amyloidia ei pystytä poistamaan elimestä, joten hoito perustuu immunosuppressioon ja tarvittaessa elinsiirtoihin.

III. PAIKALLINEN AMYLOIDOOSI

- A. Tiettyyn kohde-elimeen tai -kudokseen kohdistuvaa amyloidin kertymistä.
- B. Transtyretiinikertymät
 - 1. Normaalia transtyretiinistä koostuvat kertymät ovat yleisiä yli 80-vuotiailla erityisesti sydämessä (seniili sydänamyloidoosi); voivat aiheuttaa restriktiivistä kardiomyopatiaa, mutta ovat yleensä asymptoottisia.
 - 2. Transtyretiinikertymät voivat johtua myös perinnöllisistä transtyretiiniä koodaavan geenin mutaatioista, mitkä johtavat mutatoituneen transtyretiinin kertymiseen tiettyyn kudokseen (ATTRm); tavallisin ilmenemismuoto on polyneuropatia, mutta mm. sydän- tai munuaissairaus voi olla joissakin tapauksissa pääasiallinen oire.
- C. Endokriininen amyloidi
 - 1. Tiettyissä endokriinikasvaimissa ja endokriinisissa sairauksissa voidaan havaita paikallista amyloidoosia.
 - 2. Kilpirauhasen medullaarinen karsinoma – kasvainsolujen tuottama kalsitoniini kertyy kasvaimeen
 - 3. Tyypin II diabetes – Langerhansin saarekkeissa voidaan havaita amyliinin (IAPP) kertymiä
- D. A-beeta₂-M-amyloidoosi
 - 1. Pitkäaikaisessa dialyysihoidossa olevilla potilailla; beeta-2-mikroglobuliinia kertyy niveliin (mm. rannekanavaoireyhtymä, isojen nivelten seudun kipu ja luukystat).
- E. Alzheimerin tauti

1. A β -amyloidia kertyy aivoihin ja aivoverisuonten ympärille; derivoitu beeta-amyloidiprekursoriproteiinista (β -APP).
2. β -APP:a koodaava geeni sijaitsee kromosomissa 21, joten Downin oireyhtymä on vahvasti liitoksissa varhaisin alkavaan Alzheimerin tautiin (<40v.)

2 TULEHDUS JA PARANEMINEN

TULEHDUKSESTA YLEISESTI

I. INFLAMMAATIO

- A. Tulehdusreaktion tarkoituksena on saattaa tulehdussoluja, nestettä ja plasman proteiineja verenkierrasta kudokseen.
- B. Jaetaan akuuttiin (neutrofiilit pääroolissa) ja krooniseen (lymfosyytit pääroolissa) tulehdukseen. (Kuvat 2.1.1. ja 2.1.2)

AKUUTTI INFLAMMAATIO

I. PERIAATTEET

- A. Edeema ja neutrofiilit kudoksessa ovat tyypilliset piirteet.
- B. Akuutin tulehduksen aiheuttaja on yleensä joko infektio tai nekroosi (myös vierasmateriaalit, neoplasia, autoimmuunitaudit ja allergiat).
- C. Nopeaa (minuutteja/tunteja) ja epäspesifiä, sillä synnynnäinen immunitetti toimii välittäjänä.

II. SYNNYNNÄINEN IMMUNITEETTI

- A. Ennen kuin taudinaiheuttaja voi aiheuttaa immuunivasteen, tulee sen läpäistä ulkoiset suojamme – ihon tai ruuansulatuskanavan/hengityskanavan/virtsan- ja sukuelinten limakalvon.
- B. Seuraava suojaava järjestelmä on synnynnäinen immunitetti, joka toimii sekä nopeana suojaajana että hankitun immunitetin aktivoijana ja ohjaajana.
 1. Monosyytit kiertävät veressä; ekstravaskulaarisessa tilassa niistä tulee kudismakrofageja.
 2. Kudismakrofagit ovat eri nimisiä eri kudoksissa
 - a. Maksa – sinusoidien Kupfferin solut
 - b. Perna – sinusoidien retikkelisolut
 - c. Imusolmukkeet – sinushistiosyytit
 - d. Iho – Langerhansin solut
 - e. Aivot – mikroglia
- C. Kudoksissa makrofagit tunnistavat invasoituneiden patogeenien ”vaaramolekyylejä” eli PAMPeja (Pathogen Associated Molecular Pattern) Tollin kaltaisilla reseptoreillaan (TLR), jotka ovat PRReja (Pattern-recognition receptor); monilla muilla immuunisoluilla, kuten dendriittisoluilla ja lymfosyyteillä on myös TL-reseptoreita.
 1. LPS (lipopolysakkaridi) on tyypillinen PAMP Gram-negatiivisten bakteerien pinnalla; makrofagien TLR:n koreseptori CD14 tunnistaa LPS:n.

- a. Patogeeneja, joilla ei ole spesifistä PAMP, voidaan tunnistaa niiden aiheuttamien soluvaurioiden kautta; vaurioituneet solut vapauttavat DAMP (damage-associated molecular pattern).
 2. Patogeenin tai vaurion tunnistanut makrofagi lisää fagosytoositoimintaansa ja solukalvonsa MHCII molekyylejä sekä tuottaa IL-1, IL-6, IL-8 ja TNF (tumor necrosis factor); johtuu NfκB-transkriptiotekijän aktivoitumisesta.
 - a. IL-1, IL-8 ja TNF toimivat neutrofiilien saamisessa kudokseen (käydään läpi tarkemmin pian).
 - b. IL-6 stimuloi akuutin vaiheen proteiinien synteesiä maksassa (esim. CRP) ja neutrofiilien tuotantoa luuytimessä.
 - ii. Akuutin vaiheen/faasin proteiinit ovat maksan tuottamia proteiineja, joiden pitoisuudet muuttuvat suuresti akuutin tulehduksen aikana verrattuna normaalitilaan.
- D. Arakidonista happoa vapautuu vaurioissa fosfolipidikalvoilta entsyymien fosfolipaasi A2 toimesta, jonka jälkeen siihen vaikuttaa syklo-oksigenaasi- (COX) tai 5-lipoksigenaasientsyymit.
1. COX1 ja COX2 tuottavat prostaglandiineja (PG); COX2 pääasiassa aktivoituu tulehduksessa, kun COX1 toimii jatkuvasti.
 - a. PGI₂, PGD₂ ja PGE₂ välittävät vasodilataatiota (rentouttavat verisuonten sileää lihasta) ja lisääntyntä verisuonten läpäisevyyttä (endoteelisolut supistuvat, jolloin niiden väliin syntyy aukkoja).
 - b. PGE₂ välittää myös kipua ja kuumetta.
 - c. Tromboksaani A₂ (TXA₂, pääasiassa COX1 tuottamaa) välittää lisääntyntä verihitulehduksen aggregaatiota sekä verisuonten tonusta, kun taas prostasykliini (PGI₂) välittää näiden vähenemistä.
 2. 5-lipoksigenaasi tuottaa leukotrieeneja (LT)
 - a. LTC₄, LTD₄, LTE₄ välittää vasokonstriktiota, hengitysteiden sileän lihaksen kontraktiota ja limatuotantoa sekä lisääntyntä verisuonten permeabiliteettia.
 - b. LTB₄ on neutrofiilien kemokiini ja aktivoija.
- E. Komplementtijärjestelmä - n. 50 eri proteiinin muodostama systeemi, joka toimii taudinaiheuttajien tuhoamisessa ja kehon puhtaanapidossa sekä viestijänä muille immuunisysteemin osille. Komplementtijärjestelmä tulee aktivoida, ennen kuin se voi toimia.
1. Komplementtijärjestelmän lopullinen toiminta ei riipu sen aktivaatioreitistä, sillä kaikki kolme tietä yhdistyvät C3-vaiheessa johtaen solutuhokompleksin (MAC) muodostumiseen.
 - a. Klassinen reitti
 - i. IgG- tai IgM-luokan vasta-aineet sitoutuvat antigeeneihinsä -> C1 voi sitoutua vasta-aineeseen ja aktivoitua -> Pilkkoo C4 ja C2 muodostaen C4b2b (C3-konvertaasi)
 - b. Oikotie
 - i. Keholle vieraat pinnat, kuten mikrobit, toimivat aktivoijina.
 - ii. C3 pilkkoutuu spontaanisti tai lektiini-/klassisessa reitissä C3b:ksi -> C3b sitoutuu mikrobin pinnalle -> proteiini B sitoutuu C3b:hen -> proteiini D

pilkkoo palan proteiini B:stä, mikä jättää jälkeensä molekyylin C3bBb (C3-konvertaasi)

c. Lektiinitie

- i. Patogeenien pinnalla on usein mannoosia, johon mannoosia sitova lektiini (MBL) voi sitoutua -> MASP1 ja MASP2 sitoutuvat MBL:ään muodostaen C1-like complexin -> Kompleksi voi pilkkoa C4 ja C2 muodostaen C4b2b (C3-konvertaasi)
 - ii. MBL:n puutokset ovat melko tavallisia (n. 5% väestöstä), ja ne johtavat varhaislapsuuden hieman lisääntyneeseen infektioalttiuteen, joka korjautuu vasta-ainemuodostuksen käynnistyttyä 1-2 vuoden iässä.
2. C3-konvertaasit pilkkovat C3:a C3a:ksi ja C3b:ksi -> C3b yhdistyy C3-konvertaasiin muodostaen C3bBb3b (C5-konvertaasi) oikotiessä ja C4b2b3b (C5-konvertaasi) klassisessa ja lektiini-itiessä.
- a. C3b (ja iC3b) on myös tärkeä opsonisoija eli se päällystää kohdepinnan ja auttaa neutrofiilejä sekä makrofageja tunnistamaan ja tuhoamaan kohteen fagosytoosilla.
3. C5-konvertaasi pilkkoo C5 C5a:ksi ja C5b:ksi -> C5b liittyy komplementtiproteiineihin C6-C9 muodostaen MAC:n (membrane attack complex).
- a. C3a, C4a ja C5a toimivat anafylatoksiineina eli ne laukaisevat syöttösolujen degranulaatiota, mikä johtaa histamiinin välittämään vasodilataatioon ja kohonneeseen suonten permeabiliteettiin.
 - b. C5a lisää myös neutrofiilien kemotaksista.
4. MAC on siis solukalvolle muodostunut kompleksi, joka muodostaa reiän taudinaiheuttajan pinnalle tuhoten sen.
- a. Puutokset myöhäisistä komplementtiproteiineista (C5-C9) johtaa heikkoon MAC:n tuotantoon ja siten altistaa mm. *Neisseria*-infektioille.

III. TULEHDUKSEN PIIRTEET

- A. Akuutti tulehdus aiheuttaa verenkierron ja tulehdussolujen toiminnan muutoksia.
- B. Rubor (punotus) ja calor (kuumotus) johtuvat vasodilataatiosta, mikä aiheuttaa lisääntynyttä verenvirtausta tulehdusalueelle.
 1. Lisääntynyt verenvirtaus aiheuttaa kapillaarien täyttymistä punasoluilla (staasi eli pysähtyminen).
 2. Histamiini, prostaglandiinit, bradykiniini ja NO vaikuttavat.
 - a. Hyytymistekijä XII (Hageman-tekijä) aktivoi kiininijärjestelmän: Prekallikreiini aktivoidaan kallikreiiniksi, joka pilkkoo bradykiniinin HMWK:sta (high-molecular-weight kininogen).
- C. Tumor (turvotus)
 1. Verisuonten seinämien lisääntynyt läpäisevyys aiheuttaa proteiinipitoisen nesteen tihkumisen interstitiaaliseen kudokseen postkapillaarisista pikkulaskimoista (venuli).
 - a. Histamiini aiheuttaa endoteelisolujen supistumista.
 - b. Suora vaurio endoteeliin voi aiheuttaa lisääntynyttä läpäisevyyttä.
 - c. Ekstravaskulaarikudokseen päässyt proteiinipitoinen neste on eksudaattia, joka laimentaa bakteerien toksineja sekä tuo opsoneja (IgG, C3b) auttamaan fagosytoosissa.

- D. Dolor (kipu)
 - 1. PGE2 herkistää hermopäätteitä bradykiniinin ja muiden kipuvälittäjien vaikutukselle.
- E. Functio laesa (toiminnan vaje) – esimerkiksi käden selluliitin takia vaikeaa sulkea nyrkiksi.
- F. Varsinkin infektioissa ilmenee myös kuumetta.
 - 1. Immuunisolun (esim. makrofagi) tunnistettua pyrogeenin (esim. LPS) se tuottaa sytokiineja, kuten IL-1, IL-6 ja TNF, jotka lisäävät COX-aktiiviteettia hypotalamuksessa indusoiden PGE2 tuotantoa.
 - 2. PGE2 vaikuttaa hypotalamuksen lämmönsäätelyneuroneihin nostaen kehon tavoitelämpötilaa.
 - 3. Eroaa hypertermiasta, joka useimmiten johtuu pitkittyneestä altistumisesta kuumille olosuhteille, eikä kehon tavoitelämpötila ole noussut.
- G. Tulehduksen osoittaminen
 - 1. Leukosytoosi - tyyppi ja runsaus riippuu tulehduksen aiheuttajasta; myös mm. luukasvaimet ja leukemia voivat johtaa kohonneeseen valkosolumäärään.
 - 2. Maksan tuottamien akuutin vaiheen proteiinien määrä
 - a. CRP (C-reaktiivinen proteiini) on käyttökelpoinen tulehduskoe, sillä sen määrä kasvaa jo 6-12 tunnissa tulehduksen alusta.
 - i. Opsonisoija, aktivoi komplementtia ja helpottaa fagosytoosia.
 - ii. Mitattua arvoa voidaan käyttää bakteeri- ja virusinfektioiden erottamisessa toisistaan.
 - b. Ferritiini sitoo rautaa estäen sen käytön mikrobien metaboliassa.
 - c. Seerumin amyloidi A (SAA) rekrytoi immuunisoluja tulehduspaikalle sekä indusoi ekstrasellulaarista matriksia tuhoavia entsyymejä.
 - d. On myös ”negatiivisia” akuutin vaiheen proteiineja, joiden pitoisuudet laskevat tulehduksessa (esim. albumiini, transferriini).
 - 3. Taudin aktiivisuuden seurannassa mittarina toimiva lasko (senkka) kuvastaa punasolujen laskeutumisnopeutta potilaan omassa plasmassa.
 - a. Kohoaa tulehduksessa, sillä lisääntynyt fibrinogeeni (myös akuutin vaiheen proteiini) aiheuttaa punasolujen aggregaatiota (rouleaux), jolloin tiheämmin liimautuneet punasolut vajoavat nopeammin.

IV. AKUUTIN TULEHDUKSEN KEHITYMINEN – NEUTROFIILIN EKSTRAVASAATIO

- A. Neutrofiilit ovat akuutin inflammaation ensisijaiset valkosolut.
 - 1. Perifeeriset veren neutrofiilit jaetaan kahteen ryhmään: veressä kiertäviin ja jo valmiiksi endoteeliin tarttuneisiin (marginated pool, pääasiassa pernassa, maksassa, luuytimessä ja keuhkoissa).
- B. Tulehdussolujen ja endoteelin toiminta muuttuu niin, että valkosolut (neutrofiilit akuutissa tulehduksessa) pääsevät verisuonista tulehtuneeseen kudokseen (ekstravasaatio).
- C. Vaihe 1 – Marginalisoituminen
 - 1. Aikaisin inflammaatiossa verenvirtaus hidastuu tulehdusalueella (staasi), mikä johtaa leukosyyttien kulun keskittymisen suonen reunoille.
- D. Vaihe 2 – Kieriminen (valkosolut kierivät endoteelin pintaa pitkin)
 - 1. Pikkulaskimoiden endoteelin sekä valkosolujen pinnoilla esiintyy selektiinejä, jotka ovat adheesiomolekyylejä.

2. Leukosyyttien pinnalla on Sialyl-Lewis^x, kun taas pikkulaskimoiden endoteelillä on E- ja P-selektiinejä.
 - a. P-selektiini vapautuu intrasellulaarisista Weibel-Paladen kappaleista histamiinin vaikutuksesta.
 - b. E-selektiinia tuotetaan endoteelisoluissa TNF ja IL-1 vaikutuksesta.
 3. Näiden selektiinien ja Sialyl-Lewis^x:n heikot interaktiot hidastavat leukosyyttien kulkua.
- E. Vaihe 3 – Valkosolujen liike pysähtyy ja ne takertuvat endoteeliin (adheesio)
1. Leukosyyttien tiukkaa adheesiota endoteeliin välittää integriinit.
 2. Kemokiinien aktivoimien leukosyyttien $\beta 2$ -integriinit muuttuvat korkea-afiiniteettiseen muotoon (kuten LFA-1 eli CD11/CD18) ja tarttuvat endoteelin adheesiomolekyyleihin, kuten ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1).
 - a. TNF ja IL-1 lisäävät endoteelin CAM-tuotantoa.
 - b. C5a ja LTB4 aktivoivat leukosyyttien integriinit tarttuvaan muotoon.
 3. Adheesiota voi häiritä kortikosteroidit ja periytyvä leukosyytiadheesiosin puutos (LAD).
 - a. Yleisin LAD tyyppi on LAD-I, jota sairastavilla $\beta 2$ -integriinigeeni on mutatoitunut, jonka seurauksena integriinialaysikkö CD18 puuttuu tai sen ilmeneminen on vähentynyt.
 - b. Ilmenee toistuvina infektioina, joihin ei liity märkämuodostusta vaikka veren granulosityttimäärä on pysyvästi normaalia suurempi sekä napanuoran tyngän irtoamisen viivästymisenä.
- F. Vaihe 4 – Valkosolut tunkeutuvat endoteelin läpi (diapedeesi eli transmigraatio)
1. Kulku endoteelin läpi tapahtuu pääasiassa postkapillaarisissa pikkulaskimoissa tulehduksen takia suurentuneiden endoteelisoluvälien läpi työntymällä.
 2. PECAM-1 (CD31) sekä leukosyyttien että endoteelin pinnalla välittää diapedeesiin vaadittuja sitoutumistapahtumia.
- G. Vaihe 5 – Valkosolut liikkuvat kohti tulehduspesäkettä (kemotaksis)
1. C5a, LTB4, IL-8 ja bakteerien reaktiotuotteet (erit. f-met peptidit) ovat tärkeimmät kemoattraktantit.
- H. Vaihe 6 – Leukosyytit aktivoituvat ja toimivat fagosytoosissa
1. Fagosytoosi on kolmivaiheinen prosessi: (1) sisäänotettavan kappaleen tunnistaminen ja siihen kiinnittyminen, (2) nieleminen ja fagosytoitavan vakuolin muodostus sekä (3) tappo tai degradaatio fagolysosomissa.
 2. Neutrofiileillä on solukalvorseptoreita opsoneille IgG ja C3b, joiden kautta mikrobien tai vieraiden kappaleiden tunnistaminen helpottuu.
 3. Kiinnitettyään itsensä tuhottavaan kappaleeseen, fagosyytin aktiinisäikeiden polymerisaation kautta solukalvoon muodostuu ulokkeita (pseudopodit), jotka ympäröivät kappaleen ja lopulta muodostelma kuroutuu irti solukalvolta ja jää solun sisälle (fagosomi).
 4. Fagosomiin yhdistyy hajottavia entsyymejä sisältäviä lysosomeja, jolloin muodostuu fagolysosomi.
 - a. Autosomaalisesti resessiivisesti periytyvässä Chédiak-Higashin oireyhtymässä fagolysosomien muodostuminen on estynyt, sillä lysosomeja siirtelevien mikrotubulusten toiminta on häiriintynyt (LYST-geenin mutaatio).

- b. Ominaisia piirteitä ovat osittainen albinismi, verenvuototaipumus, toistuvat bakteeritulehdukset, neutropenia ja erilaiset neurologiset oireet, kuten perifeerinen neuropenia
 - c. Diagnoosi morfologinen – jättijyväsia leukosyyteissä.
- 5. Syödyn kappaleen tuhoamiseen osallistyy reaktiiviset happi- ja typpiradikaalit sekä lysosomaaliset entsyymit.
- I. Vaihe 7 – Intraseellulaarinen fagosytoidun kappaleen tuhoaminen
 - 1. Tehokkain hajoitusreitti hyödyntää happiradikaaleja ja on siten riippuvainen hapestasta.
 - 2. Happiradikaaleja (ROS) tuotetaan ”oxidative burst”-reaktiossa, jonka aloittaa NADPH-oksidaasi (fagosyyttioksidaasi) fagolysosomissa.
 - a. $O_2 \rightarrow O_2^{\bullet -}$ (superoksidi); NADPH-oksidaasi katalysoi
 - b. $O_2^{\bullet -} \rightarrow H_2O_2$ (vetyperoksidi); SOD (superoksididismutaasi) katalysoi
 - i. H_2O_2 on jo mikrobien tappaja, mutta ei tehokkain.
 - c. $H_2O_2 \rightarrow HClO$ (hypokloorihapoke); MPO (myeloperoksidaasi) katalysoi
 - i. H_2O_2 voidaan muuttaa myös $OH^{\bullet}$, joka on myös tehokas tuhoaja.
 - ii. Ei enää osa ”respiratory burst”:a.
 - 3. O_2 -riippumaton tappaminen tapahtuu leukosyyttien rakkuloiden entsyymeillä, mutta on vähemmän tehokasta kuin hapestasta riippuvaiset reitit.
 - a. Leukosyytit pystyvät myös erittämään näitä rakkulaentsyymeitä, mikä voi johtaa kudostuhoon.
 - 4. Krooninen granulomatoottinen tauti (CGD) on X- tai autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä NADPH-oksidaasin toiminnan heikentyminen.
 - a. Johtaa heikkoon happiriippuvaiseen tuhoamiseen, sillä superoksidin ja siten H_2O_2 sekä $HClO$ tuotanto on vähäistä.
 - b. Ilmenee toistuvina vaikeina infektioina ja granuloomien muodostumisella; aiheuttajia erityisesti katalaasi-positiiviset mikrobit, esim. *S. Aureus* ja *Aspergillus*.
 - i. Katalaasia tuottavat organismit pystyvät hajottamaan vähäisenkin H_2O_2 :n, jolloin niiden tuhoaminen on heikkoa.
 - c. Diagnoosi Nitroblue tetrazolium- (tai nykyään dihydrorodamiini-oksidaatio) määrityksillä, jotka mittaavat neutrofiilien NADPH-oksidaasikompleksin superoksidituotantoa.
 - i. DHR-testissä (B-NeutOks) dihydrorodamiini-123:a lisätään verinäytteeseen.
 - ii. Jos NADPH-oksidaasi on toiminnallinen, DHR hapettuu, mikä voidaan havaita virtausytometriassa fluoresenssina.
 - 5. MPO puutos on yleensä oireeton, sillä vaikka $HOCl$:n tuotto ei ole tehokasta; H_2O_2 riittää tuhoamaan suurimman osan taudinaiheuttajista.
 - a. Oireisena ilmenee yleisinä infektioina, erityisesti *Candida albicans*.

V. AKUUTIN TULEHDUKSEN HISTOPATOLOGIA

- A. Vaikka akuutin inflammaation morfologiset tyypipiirteet ovat pienien verisuonten laajeneminen sekä leukosyyttien ja nesteen kertyminen kudokseen, eri tulehduksen aiheuttajat saavat eri kudoksissa aikaan hieman eri morfologioita.
- B. Seroosi ja fibrinoottinen tulehdus
 - 1. Ruumiinonteloa verhoavilla pinnoilla, kuten vatsaontelon mesoteelilla, pleuratilassa ja perikardiumilla.

- a. Myös epiteelivaurioissa (esim. rakkulat auringon polttamalla iholla)
- 2. Seroosin tulehdusreaktio johtaa vähäsoluisen effuusionesteen (transudaatti) kertymisen onteloon. (Kuva 2.2.)
- 3. Jos tulehdus aiheuttaa vaikean vaurion, verisuonten permeabiliteetti kasvaa niin suureksi, että fibrinogeenia vuotaa ontelotilaan, jolloin syntyy fibrinoottinen tulehdus.
 - a. Effuusionesteellä on siis korkea proteiinipitoisuus (eksudaatti).
 - b. Fibrinoottinen tulehdus voi johtaa kiinnikkeisiin ja elimen toiminnanvajaukseen (esim. fibrinoottinen perikardiitti). (Kuva 2.3.)
 - i. Fibrinogeeni muuttuu fibriiniksi, joka stimuloi fibroblasteja aiheuttaen arpeentumista.
- C. Märkäinen (purulentti/suppuratiivinen) tulehdus ja paise
 - 1. Kudokseen tai ruumiinonteloon kertyy märkää eli elävistä ja kuolleista neutrofiileistä, kudospääteistä ja mikrobeista koostuvaa sameaa eksudaattia.
 - a. Stafylokokit tyypillisiä aiheuttajia.
 - 2. Paise (absessi) muodostuu, kun pyogeeninen bakteeri aiheuttaa kudokseen märkäontelon. (Kuva 2.4.)
 - a. Paiseen reunoilla tapahtuu granulaatiokudosmuodostusta johtaen sidekudoksiseen kapseliin.
 - b. Kapseli rajoittaa tulehduksen leviämistä.
- D. Haavautuva (ulseroituva) tulehdus
 - 1. Ulkus eli haavauma johtuu tulehtuneen ja nekroottisen kudoksen irtoiluun elimen pinnalta.
 - a. Tapahtuu vain, kun nekroosi ja sitä seuraava tulehdus tapahtuu elimen tai kudoksen pinnalla tai sen läheisyydessä. (Kuva 2.5.)
 - i. Yleensä GI-kanavan mukoosapinnoilla.

VI. AKUUTIN TULEHDUKSEN SEURAUKSET

- A. Akuutilla tulehduksella voi olla neljä seurausta: (1) resoluutio, reparaatio joko (2) regeneraatiolla/(3) arpikudoksella tai (4) tulehduksen kroonistuminen.
 - 1. Neutrofiilit houkuttelevat tulehdusprosessin edetessä vaurioalueelle enemmän makrofageja, jotka ohjaavat inflammaation seurauksia.
 - 2. Neutrofiilit ovat lyhytikäisiä ja ne korvataan tulehduspesäkkeessä makrofageilla n. 48h jälkeen.
- B. Resoluutiossa tulehdus paranee ilman pysyviä vaurioita.
 - 1. Neutrofiilit eliminoituvat apoptoosilla, makrofagit poistavat tulehdusalueen jätteet ja tuottavat anti-inflammatorisia sytokiineja (esim. IL-10 ja TGF- β).
- C. Regeneraatiiossa vaurioituneet tai kuolleet solut korvautuvat uusilla.
 - 1. Uusiutumiskyky riippuu kudoksesta – ihmisen solutyypit jaetaan kolmeen luokkaan: labiilit, stabiilit ja uusiutumattomat.
 - a. Labiilit kudokset ovat sikiökehityksen jälkeenkin jatkuvasti uusiutuvia ja tämä uusiutumiskyky perustuu kantasoluihin. Vaurioituvat helposti, mutta myös korvautuvat nopeasti uudella.
 - i. Luuydin (hematopoieettiset kantasolut)
 - ii. Ruuansulatuskanavassa (kantasolut suoliston mukoosan kryptissa) (Kuva 2.6)
 - iii. Iho (kantasolut basaalikerroksessa) (Kuva 2.7.)

- b. Stabiilit kudokset eivät normaalisti uusiudu vaan niiden solut ovat solukierron ulkopuolella G₀-tilassa, mutta vaurio voi aiheuttaa kantasolujen jakautumista.
 - i. Maksan solukko
 - ii. Munuaisten tubulusepiteeli
 - c. Uusiutumattomat kudokset menettävät jakautumiskykynsä sikiökehityksen päätyttyä eikä voi siten korvautua vaurion jälkeen.
 - i. Keskus- ja ääreishermoston neuronit
 - ii. Sydänlihassolut
 - iii. Luurankolihasilla hyvin rajallinen uusiutumiskyky.
- D. Arpireaktio tapahtuu, kun vaurio tapahtuu uusiutumattomassa kudoksessa (esim. sydäninfarkti) (Kuva 2.8.) tai tuhoaa uusiutumiskykyisissä kudoksissa kantasolut (esim. syvä dermikseen yltävä haava ihossa tuhoaa paikalliset kantasolut).
 - 1. Arpireaktio koostuu inflammaatio- (6-48h), granulaatio- (3pv-2vk) ja muovautumisvaiheista (2vk-vuosia).
 - 2. Esim. haavassa tulehduksen tuomat neutrofiilit hajottavat mahdolliset mikrobit (6h-48h), jonka jälkeen makrofagit tulevat paikalle ja jatkavat mikrobien sekä kuolleiden solujen siivoamista.
 - 3. M2 makrofagit sekä muut tulehdussolut erittävät kasvutekijöitä, jotka aiheuttavat angiogeneesia (uusien verisuonien syntymistä) sekä epiteelin ja fibroblastien proliferaatiota.
 - a. Muodostuu granulaatiokudos, joka koostuu kapillaareista, fibroblasteista ja myofibroblasteista löyhässä ekstrasellulaarimatriksissa. (Kuva 2.9.)
 - b. Verisuonen endoteelin kasvutekijä (VEGF) stimuloi sekä endoteelisolujen migraatiota että proliferaatiota johtaen angiogeneesiin.
 - c. Fibroblastien kasvutekijä (FGF) stimuloi myös endoteelisolujen proliferaatiota.
 - d. Verihiutalekasvutekijöillä (PDGF) auttaa angiogeneesissa värväämällä sileälihassoluja ja perisytyttejä stabiloimaan uusia suonia sekä lisää fibroblastien proliferaatiota.
 - e. TGF-β on tärkein sytokiini sidekudosproteiinien tuotannolle, ja se stimuloi fibroblastien migraatiota ja proliferaatiota, vähentää ekstrasellulaarimatriksin hajotusta sekä hillitsee inflammaatiota (anti-inflammatorinen).
 - 4. Fibroblastit tuottavat reparaation alussa tyypin III kollageenia, joka korvataan kestävämmällä tyypin I kollageenilla joka silloittuu yhä vahvemaksi formaatioksi.
 - a. Tyyppi I yleisin (luu, iho, jänne), tyyppi II (rusto), tyyppi III (tyypin I rinnalla erityisesti sisäelimissä), tyyppi IV (tyvikalvo)
 - b. Matriksin metalloproteiinaasit (MMP) hajottavat lopulta ylimääräisen ekstrasellulaarimatriksin, esimerkiksi kollageenaasi hajottaa tyypin III kollageenia.
 - i. Kollageenaasi vaatii sinkkiä kofaktorikseen.
 - 5. Jotkut fibroblastit erikoistuvat myofibroblasteiksi, jotka tulehdusreaktiota ohjaavien sytokiinien ja kollageenin tuoton lisäksi pystyvät kuromaan muodostunutta väliaineverkostoa ja siten sulkevat haavaa (arpi aina kutistuu).

6. Arven vetolujuus muuttuu haava-alueen parantuessa:
 - a. Tikkien poiston jälkeen n. 10%
 - b. Toiminnan palautuessa (2kk) n. 40%
 - c. Lopulta saavutetaan hieman alkuperäistä heikompi taso, n.80%

VII. PARANEMISTA HÄIRITSEVÄT TEKIJÄT

- A. Heikon paranemisen yleisin syy on haavan infektio.
 1. Diabetes mellitus voi häiritä verenkiertoa ja immuunisolujen toimintaa ja siten lisätä infektoita.
- B. Ravinto, kuten C-vitamiinin, kuparin ja sinkin puutteet.
 1. C-vitamiinia ja kuparia tarvitaan kollageenin synteesiin ja linkittymiseen.
 - a. C-vitamiini on tärkeä kofaktori kollageenin muodostamiseen tarvittavien proliinin ja lysini hydroksylaatioissa.
 - b. Kupari on kofaktori lysyylioksidaasille, joka katalysoi ristiksidosten muodostumista kollageenisäikeiden välille.
 2. Sinkki on kofaktori kollageenaasille, jota tarvitaan tyypin III kollageenin muuttamisessa tyypin I kollageeniksi.
- C. Tiedetyt lääkkeet, kuten glukokortikoidit voivat toimia anti-inflammatorisina tekijöinä ja estää TGF- β tuotantoa ja siten fibroosia.
- D. Syvissä, verinahkaan ulottuvissa, haavoissa voidaan tavata arven liikakasvua, jolloin syntyy hypertrofinen arpi tai keloidi.
 1. Hypertrofinen arpi on ihosta koholla, mutta kasvaa alkuperäisen haavan alueelle sekä tyypillisesti madaltuu kuukausien ja vuosien kuluessa. (Kuva 2.10.)
 - a. Kollageenisäikeet järjestäytyneet yhdensuuntaisesti ihon epiteelin kanssa.
 2. Keloidi ylittää alkuperäisen haavan rajat eikä regressoidu. (Kuva 2.11.)
 - a. Kasvaa yleensä korvalehdille, kasvoille, kaulalle ja yläraajoille.
 - b. Vahva geneettinen alttius, esiintyy eniten tummaihoisilla ja kiinalaisilla.
 - c. Kollageenisäikeet ovat paksuja ja sattumanvaraisesti suuntautuneita.

KROONINEN TULEHDUS

I. PERIAATTEET

- A. Jos tulehduksen aiheuttajaa ei saada poistettua, kudokseen kertyneet makrofagit eivät poistu kudoksesta, vaan tuottavat kroonista tulehdusta (viikkoja-vuosia) aktivoimalla T-soluja.
- B. Krooninen tulehdus voi seurata akuuttia tulehdusta tai se voi syntyä vähitellen ilman selkeitä alkureaktion merkkejä.
- C. Tarkkaa rajaa akuutin ja kroonisen tulehduksen välille on vaikeaa määritellä. (Kuva 2.1. ja 2.1.2.)
 1. Akuutti inflammaatio: neutrofiili-infiltraatio, turvotus ja suonimuutokset
 2. Krooninen inflammaatio: mononukleaaristen solujen infiltraatti (lymfosyytit, plasmakolut ja makrofagit), kudostuho ja korjausyritykset (angiogeneesi, fibroosi)
- D. Aiheuttajia ovat mm.
 1. Sinnikäs infektio (vaikeasti hävitettävä patogeeni)
 2. Vierasmateriaali (esim. implantit)
 3. Immuunijärjestelmän häiriöt (autoimmuunitaudit ja allergiat)
 4. Kasvaimet

II. T-LYMFOSYYTIT

A. Tuotetaan luuytimessä ja kypsyvät kateenkorvassa.

1. Kypsyvät joko CD4-positiivisiksi auttajasoluiksi tai CD8-positiivisiksi tappajasoluiksi.
 - a. CD4 ja CD8 toimivat T-solureseptorin (TCR) koreseptoreina.
 - b. CD4 sitoutuu MHCII- ja CD8 MHCI-luokan molekyyleihin.

B. Aktivaatio vaatii kaksi erillistä signaalia:

1. CD4/CD8 ja TCR sitoutuminen MHC-antigeeni-kompleksiin
 - a. MHCI esittelee solun sisällä tuotettuja proteiineja
 - i. Esiintyy kaikilla paitsi punasoluilla.
 - b. MHCII esittelee solun ulkoa fagosytoitujen kappaleiden proteiineja
 - i. Esiintyy vain antigeenia esittelevillä soluilla.
2. Toinen signaali:
 - a. Auttajasoluilla T-solun CD28 ja antigeenia esittelevän solun B7 interaktio
 - i. Makrofagit, dendriittisolut ja B-solut ovat antigeenia esitteleviä soluja.
 - b. Tappajasoluilla IL-2, jota aktivoituneet auttajasolut tuottavat.

C. Aktivoituneet CD4+ T-solut erittävät sytokiineja, jotka auttavat makrofagien ja B-solujen toiminnassa.

1. TH1-solut erittävät soluvälitteistä immuniteettiä auttavia sytokiineja.
 - a. TNF ja IFN γ aktivoivat makrofageja
 - b. IL-2 aktivoi NK- ja sytotoksisia T-soluja
2. TH2-solut erittävät humoraalista immuniteettiä välittäviä sytokiineja.
 - a. IL-4 IL-5, IL-10 ja IL-13
3. TH17-solujen tuottavat sytokiinit houkuttelevat paikalle neutrofiileja ja monosyyttejä.
 - a. IL-17, IL-21 ja IL-23
4. TH1- ja TH17-solut tärkeitä siis bakteereita ja viruksia vastaan sekä autoimmuunitaudeissa, kun taas TH2-solut ovat tehokkaita parasiittejä vastaan ja toimivat allergioissa.

D. Aktivoituneet CD8-positiiviset tappajasolut tappavat TCR-MHCI-interaktiolla tunnistaviaan soluja aktivoimalla niissä apoptoosin.

1. Erittävät perforiinia ja grantsyymi B:tä kohdesolun pinnalle ja lopulta grantsyymi B pääsee solun sisälle aktivoiden apoptoosin.
2. Fas-välitteisessä tapossa FasL tappajasolun pinnalla sitoutuu kohdesolun Fas-reseptoriin johtaen apoptoosiin.

III. B-LYMFOSYYTIT

A. Tuotetaan sekä kypsyvät luuytimessä.

B. Aktivaatio vaatii kaksi erillistä signaalia:

1. B-solureseptorit (BCR, solukalvolle kiinnittyneitä vasta-aineita) tunnistaa antigeenin.
2. Auttaja-T-solun CD40L sitoutuu B-solun CD40
 - a. On myös olemassa T-soluista riippumatonta aktivaatiota, joka vaatii vain antigeenin tunnistamisen; aiheuttaa vain IgM:n tai IgD:n tuotantoa.

C. Aktivaatio aiheuttaa IgM tuottoa sekä myöhemmin luokanvaihdon seurauksena IgA, IgE tai IgG.

1. CD40L-CD40-interaktio saa auttaja-t-solun erittämään interleukiineja, jotka ohjaavat luokanvaihdon suuntaa.

D. IgA suojaa limakalvoja taudinaiheuttajilta sekä erittyy äidinmaitoon.

E. IgE suojaa loisilta sekä osallistuu allergisten reaktioiden syntyyn.

1. Ohjaa allergiareaktioita aiheuttaen syöttösolujen degranulaatiota.

F. IgG toimii opsonisoijana ja komplementin aktivoijana (samoin kuten IgM) sekä pystyy kulkemaan istukan läpi.

IV. GRANULOMATOOTTINEN TULEHDUS

A. Kroonisen tulehduksen alaluokka, jonka tyypillisenä piirteenä on granulooma eli epiteloidisolujen kerääntymä, jota yleensä ympäröi lymfositteja ja Langhans-tyyppiset jättisoluja.

1. Eiteloidisolut ovat aktivoituneita makrofageja, joilla on runsas pinkki sytoplasma.
2. Jotkut aktivoituneet makrofagit saattavat yhdistyä muodostaen Langhans-tyyppisen jättisolun.

B. Immunogranulooma

1. Tyypillisesti syntyy, kun T-soluja aktivoivaa patogeenia ei pystytä hajottamaan.
2. Makrofagit esittelevät partikkelin antigeenejä CD4+ lymfositteille.
3. Makrofagi tuottaa IL-12, joka saa auttajasolun erikoistumaan TH1-alaluokan soluksi.
4. TH1-solu tuottaa sytokiineja, kuten IL-2 (aktivoi T-soluja) ja IFN- γ :aa (aktivoi makrofageja).
5. Aktivoidut makrofagit lopulta muuttuvat epiteloidi- ja jättisoluiksi.

C. Vierasesinegranulooma

1. Syntyy, kun makrofagit eivät pysty fagosytoimaan kudokseen joutunutta vierasmateriaalikappaletta.
2. Makrofageista kehittyvät epiteloidisolut ympäröivät kappaleen ja pyrkivät eristämään sen muusta kudoksesta.

D. Jaetaan myös sen mukaan, onko granuloomilla keskustassaan nekroottista kudosta vai ei.

a. Kaseationekroosin tyypillinen piirre on granulooma ja sen sisäinen sisäinen nekrotisoitunut alue. (Kuva 2.12.)

i. Klassisesti tyypillistä tuberkuloosille.

b. Ei-kaseoivilla granuloomilla ei ole nekroottista ydintä. (Kuva 2.13.)

i. mm. vierasainegranuloomat (esim. talkki), sarkoidoosi, Crohnin tauti, jotkut autoimmuunitaudit (esim. GPA)

AUTOIMMUUNITAUDIT

I. PERIAATTEET

A. Sairauksia, joissa immuunijärjestelmä kohdistuu virheellisesti omia kudoksia vastaan ja aiheuttaa kudostuhoa.

B. Johtuvat immunologisen toleranssin häiriöistä; toleranssi tarkoittaa kykyä välttää reagoimista elimistön omiin rakenteisiin.

1. Autoreaktiivisia lymfositteja tuetaan jatkuvasti luuytimessä, jonka jälkeen toleranssi muodostuu ensin sentraalisesti ja myöhemmin perifeerisesti.
2. Luuytimessä kehittyneet T-solut kehittävät toleranssin sentraalisesti kateenkorvassa.
 - a. Positiivinen selektio – tunnistaako T-solu kortikaalisen kateenkorvan epiteelisolun (cTEC) MHC-molekyylin?

- b. Negatiivinen selektio – jos T-solu sitoutuu voimakkaasti oman MHC-molekyylin ja oman peptidin yhdistelmään, solu kuolee apoptoottisesti.
 - i. AIRE-geenin puuttuminen johtaa APECED-oireyhtymään.
- 3. B-solut käyvät läpi negatiivisen selektion luuytimessä ja voivat myös myöhemmin aktivoituessaan T-solujen ohjaamina muokata antigeenireseptoreitansa ja vasta-aineidensa spesifisyyttä.
- 4. Perifeerinen toleranssi sisältää lymfosyyttien eristämisen kudosan-tigeeneista, anergia (antigeenin tunnistus ilman kostimulaatiota) ja apoptoosi (jatkuva aktivaatio johtaa FasL-Fas-välitteiseen solukuolemaan, AICD).
 - a. Fas-apoptoosireitin mutaatiot voivat johtaa autoimmuuniin lymfoproliferatiiviseen oireyhtymään (ALPS).
- 5. Autoimmunitettia vähentää lisäksi säätelijä-T-solut (Treg), jotka hillitsevät muiden T-solujen toimintaa periferiassa.
 - a. Ilmentävät FOXP3-transkriptiotekijää; FOXP3-mutaatiot johtavat IPEX-oireyhtymään.
- C. Autoimmuunisairaudet ovat huomattavan paljon yleisempiä naisilla; estrogeenillä saattaa olla autoreaktiivisten B-solujen apoptoosia estävä funktio.
- D. Tautien laukeamiselle altistavat perinnölliset tekijät ja niiden yhteydessä mm. infektiot tai kudოსvauriot.
 - a. Tärkeimmät perinnölliset tekijät ovat HLA-antigeenit.
 - b. Infektiot ja kudოსvauriot voivat johtaa paikalla olevien immuunisolujen tarkoittamattomaan aktivaatioon mikrobin ja isäntäpeptidien samankaltaisuuden takia (molecular mimicry).
- E. Ennen taudin puhkeamista voidaan todeta jo immunisoitumiseen viittaavia merkkejä, kuten autovasta-aineita ja autoreaktiivisia T-soluja.

II. SYSTEEMINEN LUPUS ERYTEMATOSUS (SLE, HAJASIROTTEINEN PUNAHUKKA)

- A. Useita elimiä affisioiva reumasairauksiin kuuluva krooninen autoimmuunisairaus; Suomessa n. 1600 sairastavaa.
 - 1. 90% potilaista naisia ja tyypillisesti todetaan 17-55 -vuotiailla; joskus myös lapsilla tai vanhuksilla.
- B. Patogeneesille on tyypillistä tyypin III yliherkkyyssreaktion (antigeeni-vasta-ainekompleksien sitoutuminen ja kertyminen soluihin ja kudoksiin) aiheuttamat kudოსvauriot.
 - 1. SLE:n tunnuspiirre on useiden eri vasta-aineiden muodostuminen; johtuu huonosti siivotusta apoptoottisesta kudოსjätteestä, joka aktivoi autoreaktiivisia lymfosyyttejä.
 - 2. Dendriitit ”syövät” vasta-aine-antigeeni-komplekseja, jotka vahvistavat TLR:ien kautta immuunivastetta, mikä johtaa vasta-aineiden lisääntyneeseen tuotantoon.
 - 3. Vasta-aine-antigeeni-kompleksit voivat kertyä eri kudoksiin ja aktivoida komplementtia.
 - a. Kompleksien poistaminen perustuu komplementin toimintaan; aikaisten komplementtiproteiinien puute (esim. C1q, C4 ja C2) altistaa SLE:lle.
- C. Oireet kehittyvät yleensä hitaasti; oireiden pahentumisvaiheet ja remissiot ovat yleisiä.
 - 1. Ensioireita ovat tavallisesti kuumeilu, imusolmukkeiden suurentuminen, väsymys, laihtuminen ja Raynaud’n ilmiö.

- a. Usein jo alkuvaiheessa munuaiskerästulehdus; diffuusi proliferatiivinen glomerulonefriitti on yleisin ja vakavin vauriomuoto.
 2. Nivelsärkyä ja -turvotusta esiintyy lähes kaikilla
 3. Monimuotoisia iho-oireita – klassisesti punainen perhosenmuotoinen ihottuma molemmissa poskissa tai diskoidi ihottuma; erityisesti auringonvalolle altistuessa (Kuva 2.14.)
 4. Limakalvohaavautumia – erityisesti suussa tai nenänielussa; yleensä kivuttomia
 5. Kardiovaskulaariset oireet - sydän- tai keuhkopussintulehdus, Libman-Sacks endokardiitti, kiihtynyt ateroskleroosi
 6. Mielialan ja tiedonkäsittelyn häiriöt (delirium, psykoosi) ja jopa epileptiset kohtaukset
 7. Anemiaa, trombosytopeniaa ja/tai leukopeniaa
 - a. Johtuvat tyypin II yliherkkyyssreaktiosta.
 8. Lisääntynyt laskimo- ja valtimotukosten riski ja raskauskomplikaatiot.
 - a. Liittyvät fosfolipidivasta-aineisiin; n. 30-40% potilaista.
 - i. Antikardiolipiini – väärä positiivinen VDRL ja RPR -syfilisseuloissa
 - ii. Anti-beeta-2-glykoproteiini I
 - iii. Lupusantikoagulantti – väärin koholla oleva PTT
 - b. Antifosfolipidioireyhtymässä havaitaan hyperkoagulaatiivinen tila fosfolipidi-vasta-aineista johtuen; tapahtuu yleensä primaarisesti.
 - E. Diagnoosi perustuu oirekuvaan sekä laboratoriolöydöksiin, jotka pisteytetään ja lasketaan yhteen.
 - a. SLE-diagnoosin asettamiselle tumavasta-aineet (ANA) ovat edellytys.
 - b. Yllä mainitut oireet pisteytetään eri painoarvoilla.
 - c. Laboratoriolöydöksistä pisteytettäviä ovat antifosfolipidivasta-aineet, komplementtiproteiinit ja SLE:lle spesifit vasta-aineet.
 - i. Komplementtiproteiineista matala C3 ja/tai C4 lasketaan pisteisiin.
 - ii. Anti-dsDNA- ja anti-Sm-vasta-aineet ovat SLE:lle spesifejä, mutta eivät ole kovin sensitiivisiä (n. 60-70% ja 30% vastaavasti).
 - F. Monet eri lääkeaineet voivat laukaista SLE:n kaltaisen oireyhtymän (drug induced lupus); lääkkeen lopettaminen yleensä johtaa remissioon.
 - a. Aiheuttajia ovat mm. prokainamidi, hydralatsiini ja kinidiini.
 - b. Antihistoni-vasta-aineet ovat tyypillisesti koholla.
 - c. Ei tyypillisesti vaikuta keskushermostoon tai munuaisiin.
 - G. Hoidossa tärkeää on ihon suojaaminen auringonvalolta ja infektioiden välttäminen; lääkehoito riippuu taudin aktiivisuudesta ja affisioituneista elimistä.
 - a. Vaikeusasteesta riippuen hydroksiklorokiini on ensisijainen lääkehoito.
 - b. Aktiivisissa vaiheissa glukokortikoidit tärkeässä roolissa; myös muita immunosuppressiivisia lääkkeitä voidaan käyttää tarvittaessa.
 - H. 10-vuotiselossaoloennuste on n. 85-90%; tärkeimmät kuolinsyyt ovat infektiot, munuaisten vajaatoiminta ja kardiovaskulaariset taudit (erit. kiihtynyt ateroskleroosi).
- III. SJÖGRENIN OIREYHTYMÄ
- A. Reumasairauksiin kuuluva krooninen autoimmuunitauti, jolle on tyypillistä sylki- ja kyynelrauhasten krooninen tulehdus ja tuhoutuminen.

- B. Patogeneesille on tyypillistä ympäristötekijän laukaisema lymfosyyttivälitteinen (tyypin IV yliherkkyys) avoeritteisten rauhasen tulehdus ja niiden fibrotisoituminen.
- C. Taudin oirekuvalle ovat tyypillisiä sicca-oireet, jotka johtuvat limakalvojen kuivumisesta.
 - 1. Kuivat silmät (keratokonjunktiviitti, kseroftalmia) – silmien kirvely ja roskan tunne
 - 2. Kuiva suu (kserostomia) - nielemisvaikeudet ja lisääntynyt hampaiden reikiintyminen sekä ientulehdukset
 - 3. Voivat johtaa kornean tai suun haavautumiseen.
- D. Voi olla primaarista tai sekundaarista.
 - 1. Sekundaarisessa muodossa oireyhtymä liittyy toiseen reumaattiseen sairauteen, erityisesti reumatoidiin artriittiin; primaarisessakin muodossa reumatekijä on kuitenkin usein havaittavissa.
- E. Laboratoriotutkimuksissa löydetään potilaasta riippuen erilaisia vasta-aineita.
 - 1. ANA- (80%) ja erottelussa (ENA) anti-RNP-vasta-aineet ovat keskeisimmät löydökset.
 - a. Anti-RNP-vasta-aineista tavataan taudille tyypillisiä SS-A- (anti-Ro, 70-90%) ja SS-B- (anti-La, 50-70%) vasta-aineita.
 - 2. Anti-RNP-vasta-aineet voivat kulkea istukan läpi ja aiheuttaa sikiölle synnynnäisen sydänblokin tai lupuksen.
- F. Kohonnut riski MALT-lymfoomalle.

IV. SYSTEEMINEN SKLEROOSI (SKLEROODERMA)

- A. Reumasairauksiin kuuluva autoimmuunitauti, jolle on tyypillistä useiden elinten fibroosi.
- B. Patogeneesille tyypillistä on kudosten vaurioituminen, fibroblastien aktivoituminen ja kollageenin kertyminen.
 - 1. Laukaisevan tekijän oletetaan olevan autoimmuunivaurio pieniin verisuoniin, joka johtaa inflammaatioon, vasokonstriktioon ja kasvutekijöiden erittymiseen.
 - 2. Jatkuvat vauriot ja tulehdukset johtavat fibroosiin, joka on aluksi perivaskulaarista, mutta etenee kudosten iskeemisten vaurioiden avittamana laajalti ympäröiviin elimiin.
- C. Systeeminen skleroosi voidaan jakaa rajoittuneeseen ja yleistyneeseen muotoon; vain ihoa affisioivaa tautia kutsutaan lokalisoiduksi sklerodermaksi. On myös olemassa systeemistä skleroosia ilman ihoaffisioitumista.
- D. Rajoittuneessa systeemisessä skleroosissa iho kovettuu vain rajoitetulla alueella (tyypillisesti kasvoilla ja sormissa) ja sisäelinmuutokset ovat lieviä ja myöhäisiä.
 - 1. Kutsutaan myös CREST-oireyhtymäksi: calcinosis, Raynaud phenomenon, esophageal dysmotility, sclerodactyly, telangiectasia (kalsinoosi, Raynaud'n ilmiö, ruokatorven hypomotiliteetti, sklerodaktylia, teleangiektasiat). (Kuva 2.15)
- E. Yleistyneessä (diffuusissa) systeemisessä skleroosissa ihomuutoksia havaitaan koko vartalolla ja sisäelinvauriot ovat laajoja ja varhaisemmin kehittyviä.
 - 1. Yleisimmin affisioituneet elimet ovat verisuonet, GI-kanava, keuhkot, munuaiset ja muskuloskeletaalin järjestelmä.
 - a. Verisuonet – Raynaud'n oire (tavallisin ensioire)
 - b. GI-kanava – ruokatorven jäykistyminen (nielemisvaikeudet ja närästys), ummetus, ulosteen karkailu
 - c. Keuhkot – pulmonaalinen hypertensio ja keuhkojen interstitiaalinen fibroosi, hengenahdistus

- d. Munuaiset – malignin hypertension kaltaisia muutoksia; munuaisten vajaatoiminta, proteinuria ja hypertensio, sklerodermakriisi on vaikein komplikaatio
 - e. Muskuloskeletaalin – nivel- ja lihaskipu esiintyy usein
- G. Tuma-vasta-aineet ovat positiiviset lähes kaikilla potilailla; erottelussa tärkeimmät ovat sentromeeri-vasta-aineet (rajoittunut systeeminen skleroosi) ja RNA-polymeraasi III sekä topoisoмераasi-I (Sc-70) vasta-aineet (yleistynyt systeeminen skleroosi).
- V. SEKAMUOTOINEN SIDEKUDOSTAUTI (MCTD)
 - A. Autommuunisairaus, jossa on piirteitä useista muista autoimmuunisidekusosairauksista, erityisesti SLE:stä, systeemisestä skleroosista ja polymyosiitista.
 - 1. Yleisin yksittäinen oire on valkosormisuus.
 - B. Ominaispiirre on korkeat anti-U1-ribonukleoproteiini-vasta-ainepitoisuudet.

3 NEOPLASIA

NEOPLASIAN PERUSTEET

- I. TERMISTÖ
 - A. Neoplasia tarkoittaa klonaalista, kontrolloimatonta soluproliferaatiota, joka on seurausta solun geneettisestä mutaatiosta.
 - 1. Klonalisuudella viitataan siihen, että kaikki neoplastiset solut ovat yhden mutatoituneen solun jälkeläisiä.
 - a. Esimerkiksi B-solujen klonalisuus voidaan määrittää Ig-kevyen ketjun fenotyypin suhteen avulla.
 - i. Jokainen B-solu esittää kevyttä ketjua, joka on joko kappa tai lambda; normaali suhde on 3:1.
 - ii. B-solukon hyperplasiassa suhde säilyy normaalina (polyklonaalinen), neoplasiassa (esim. lymfooma) suhde kasvaa tai laskee (monoklonaalinen).
 - 2. Solut eivät ole kuitenkaan kaikki samanlaisia, sillä syöpäsolukossa tapahtuu jatkuvasti sattumanvaraisia mutaatioita.
 - B. Neoplastiset kasvaimet (tuumorit) jaetaan benigneihin ja maligneihin (hyvän- ja pahanlaatuisiin).
 - 1. Benignit tuumorit kasvavat yleensä hitaasti ja erottuvat selvästi ympäröivästä kudoksesta.
 - a. Pysyvät siis lokalisoituneina eivätkä metastasoi.
 - 2. Malignit tuumorit kasvavat yleensä nopeasti ja invasoivat ympäröivään kudokseen.
 - a. Primaarikasvaimen eli alkuperäisen tuumorin solut pystyvät myös siirtymään muualle elimistöön ja muodostaa etäpesäkkeen (metastasointi).
 - b. Sekundaarikasvain tarkoittaa etäpesäkkeitä tai kasvaimia, jotka ilmaantuvat uudestaan alkuperäiseen kudokseen kirurgisen hoidon jälkeen.

3. Syöpä tarkoittaa maligneja kasvaimia.
- C. Rajalaatuisilla kasvaimilla on joitain maligneja piirteitä, mutta käyttäytyminen ei ole selkeästi pahanlaatuista.
- D. Kasvaimet nimetään niiden erilaistumissuunnan eli sen perusteella, millaista kudosta tuumorit tuottavat.
1. Hyvänlaatuisten kasvainten nimessä yleensä jälkiliite -ooma.
 2. Pahanlaatuisten kasvainten jälkiliite vaihtelee.

Taulukko 3.1: Kasvainten nimeäminen

Taulukko 1. Esimerkkejä hyvän- ja pahanlaatuisten kasvainten nimeämisestä.

Lähtökudos		Hyvänlaatuisia kasvajmia	Pahanlaatuisia kasvajmia
Epiteeli	Levyepiteeli	Papillooma	Levyepiteelikarsinooma
	Lieriöepiteeli tai rauhasepiteeli	Adenooma	Adenokarsinooma
	Uroteeli	Papillooma	Uroteelikarsinooma
Mesenkymaalinen eli tukikudos	Sidekudos	Fibrooma	Fibrosarkooma
	Rasvakudos	Lipooma	Liposarkooma
	Rusto	Kondrooma	Kondrosarkooma
	Luu	Osteooma	Osteosarkooma
	Poikkijuovainen lihas	Rabdomyooma	Rabdomyosarkooma
	Sileälihas	Leiomyooma	Leiomyosarkooma
	Verisuonet	Hemangiooma	Angiosarkooma
	Aivokalvot	Meningeooma	Anaplastinen meningeooma
	Mesoteeli	Adenomatoidi tuumori	Mesotelioma
Hermokudos	Gliasolut	–	Gliooma, glioblastooma, astrozytooma, oligodendrogliooma
	Perifeeriset hermot	Schwannooma, neurofibrooma	Maligni perifeerinen hermotuppiuomori
Hematopoieettinen	Luuydin	–	Leukemia
	Imukudos	–	Lymfooma
Itusolut	Munasolu, siittiö tai niiden esiaste	Teratooma, kypsä	Teratooma, epäkypsä
		–	Seminooma, dysgerminooma, embryonaalinen karsinooma
Embryonaalinen solukko	Epäkypsä hermokudos	–	Neuroblastooma
	Epäkypsä munuaiskudos	–	Nefroblastooma
	Epäkypsä verkkokalvo	–	Retinoblastooma

KARSINOGENEESI

I. PERIAATTEET

- A. Syövän synty on monen vaiheen prosessi, joka pohjautuu useiden geneettisten muutosten kertymiseen solussa niin, ettei niitä pystytä korjaamaan, mutta ne eivät aiheuta suoraan solukuolemaa.
 - 1. Muutokset voivat kohdistua proto-onkogeeneihin, kasvunrajoitegeeneihin, apoptoosin säätelijägeeneihin sekä kasvainsolujen ja normaalien solujen interaktioita välittäviin geeneihin.
 - 2. Muutokset johtavat kontrolloimattomaan solujen kasvuun ja erilaistumiseen.
- B. Mutaatiot voidaan jakaa matkustajamutaatioiksi (passenger) ja ajurimutaatioiksi (driver).
 - 1. Matkustajamutaatiot eli toissijaiset mutaatiot eivät vaikuta kasvaimen kasvuun.
 - a. Voivat kuitenkin tietyissä olosuhteissa olla hyödyllisiä tuumorille, esim. lääkeresistenssiä aiheuttamalla.
 - 2. Ajurimutaatiot vaikuttavat ”syöpägeeneihin” ja suorasti aiheuttavat kasvaimen syntyä ja kasvua.
- C. Mutaatiotyyppejä ovat esim. pistemutaatio, uudelleenjärjestäytyminen, deleetio ja geenimonistumat.
 - 1. Myös epigeneettiset muutokset voivat vaikuttaa syövän muodostumiseen.
 - a. Promootterialueiden metylaatio voi hiljentää kasvunrajoitegeenejä.
- D. DNA-vaurioita aiheuttavat tekijät ovat karsinogeenejä eli ne lisäävät riskiä kasvaimille.
 - 1. Voivat olla kemikaaleja (esim. tupakansavu), onkogeenejä mikrobeja (esim. HPV) tai fysikaalisia (esim. ionisoiva säteily)

II. MUUTOSTEN KOHDEGEENIT

- A. Proto- eli esionkogeeni tarkoittaa normaalia geeniä, joka mutatoituneena tai yliekspressoituneena kiihdyttää solun kasvua.
 - 1. Näin mutatoitunutta proto-onkogeeneä kutsutaan onkogeeneiksi.
- B. Kasvunrajoitegeenit
 - 1. Normaalissa solussa kasvua vaimentava funktio ja estää syövän tunnusmerkkien ilmentymistä.
- C. Apoptoosin säätelijägeenit
 - 1. Epätasapainot apoptoosia suosivien ja elossapysymistä edistävien signaalien välillä johtavat apoptoosin estymiseen.
- D. Kasvainsolujen ja normaalien solujen interaktioita välittävät geenit
 - 1. Tietyt geenit säätelevät tuumorisolujen tunnistamista ja mutaatiot niissä voivat häiritä immuunifunktiota kasvainta vastaan.

Syövän ominaispiirteet

I. PERIAATTEET

- A. Kaikissa syövässä on kahdeksan (8) tunnusmerkkiä, jotka mahdollistavat syövän kasvun.
 - 1. Omien kasvusignaalien tuottaminen ja ylläpitäminen
 - 2. Riippumattomuus kasvunrajoitetekijöistä
 - 3. Solukuoleman välttäminen
 - 4. Loputon jakautumiskyky
 - 5. Oman verisuonituksen edistäminen
 - 6. Ympäristöön tunkeutuminen ja etäpesäkkeiden lähettäminen
 - 7. Immuunipuolustuksen välttäminen

8. Poikkeava metabolia

B. Kasvua ja leviämistä edistävät inflammaatio ja genomin epävakaus.

II. Omien kasvusignaalien tuottaminen ja ylläpitäminen

A. Perustuu proto-onkogeenien gain-of-function mutaatioihin, jotka tekevät niistä onkogeeneja.

B. Onkogeenit voidaan jakaa kasvutekijöihin, kasvutekijäreseptoreihin, signaalinvälittäjiin, transkriptiotekijöihin ja solusyklin säätelijöihin.

1. Kasvutekijät aikaansaavat solujen kasvua ja proliferaatiota.
 - a. Yleensä solut eivät tuota samaa kasvutekijää, jolle ne ovat itse reaktiivisia, mutta tämä toiminta saattaa häiriintyä syövässä muodostaen autokriinisilmukan (esim. PDGF astrozytomaalissa).
2. Kasvutekijäreseptorit vastaanottavat kasvutekijöiden signaalin ja välittävät sen signaalinvälittäjien kautta eteenpäin.
 - a. Reseptoreita aktivoivat mutaatiot tai yliekspressiot lisäävät kasvua stimuloivaa signaalia, esim:
 - i. ERBB1 yliekspressio keuhkojen levyepiteelikarsinomaissa
 - ii. ERBB2 (HER2) yliekspressio rintasyövässä
 - iii. KIT pistemutaatio gastrointestinaalisessa stroomakasvaimessa (GIST)
3. Signaalinvälittäjät sijaitsevat reseptorista alavirtaan ja välittävät tiedon sen aktivaatiosta tumaan.
 - a. RAS on G-proteiini, joka on normaalisti sitoutuneena kasvutekijäreseptoriin GDP-sitoutuneessa inaktiivisessa muodossa.
 - i. Kasvutekijän sitoutuminen reseptoriin johtaa GDP:n vaihtoon GTP:hen, joka aktivoi RAS:n.
 - ii. Aktivoitu RAS stimuloi alavirtaan mahdollisesti kahta eri viestipolkua: RAF/ERK/MAPK ja PI3K/AKT.
 - iii. Nämä vievät viestin tumaan, jossa ne vaikuttavat transkriptiotekijöihin, kuten MYC.
 - iv. RAS:n aktivoitumistila on normaalisti lyhytaikainen, sillä RAS-proteiinin oma GTPaasi-aktiviteetti (GTPase activating protein, GAP) hajottaa GTP:n takaisin GDP:ksi.
 - v. GTPaasi-aktiviteettia heikentävät RAS-geenin pistemutaatiot pidentävät aktiivista tilaa johtaen jatkuvaan kasvusignalaatioon (esim. GAP:n, kuten NF1:n mutaatio neurofibromatoosissa).
 - vi. RAS on yleisin onkogeeni (n. 30% kaikista kasvaimista).
 - vii. Mutaatioita voi myös olla RAS-reitin haaroissa: esim. aktivoivat BRAF-mutaatiot MAPK-viestitiessä
 - b. ABL on tyrosiinkinasaasi, jota normaalisti hiljennetään solunsisäisillä mekanismeilla.
 - i. t(9;22) translokaatio tuottaa BCR-ABL-hybridiproteiinia (Philadelphia-kromosomi).

- ii. Tämä aiheuttaa jatkuvaa tyrosiinikinaasiaktiivisuutta, joka stimuloi kaikkia RAS-reitin signaaleja.
 - iii. Yhteydessä KML ja joihinkin ALL
- 4. Transkriptiotekijät käynnistävät ylemmän signaalin määrittämän geeniluennan ja siten RNA:n ja proteiinien muodostamisen.
 - a. MYC aktivoi mm. monia kasvua kannustavia geenejä, kuten CDK:ita (solusyklin säätelijöitä).
 - b. esim. c-MYC:n t(8;14) translokaatio johtaa MYC:n ylituotantoon ja on yhteydessä Burkittin lymfoomaan.
- 5. Solusyklin säätelijät (sykliinit ja sykliinistä riippuvat kinaasit) edistävät solusyklin siirtymistä vaiheesta toiseen.
 - a. Solusykli koostuu interfaasista (G1, S ja G2) ja mitoosista (M).
 - i. Solusyklin ulkopuolella oleva solu on lepotilassa (G0).
 - ii. G1-vaiheessa syntetisoidaan DNA:n kahdentumiseen tarvittavia komponentteja.
 - iii. S-vaiheessa DNA kopioidaan.
 - iv. G2-vaiheessa solu valmistautuu tuman jakautumiseen (M).
 - v. Tärkeät tarkastuspisteet ovat G1/S- ja G2/M-transitiot.
 - b. Sykliinit ja niistä riippuvat kinaasit (CDK) kompleksoituvat ja fosforyloivat solusykliä edistäviä proteiineja.
 - c. esim. CDK4- tai sykliini D-geenien gain-of-function mutaatiot edistävät G1/S-tarkastuspisteen läpi etenemistä.
 - i. CCND1:n (sykliini D) t(11;14) translokaatio yhteydessä manttelisolulymfoomaan.
 - ii. CDK4-amplifikaatioita esiintyy erityisesti melanoomissa.

III. Riippumattomuus kasvunrajoitetekijöistä

- A. Normaalisti kasvunrajoitegeenit (tuumorisuppressorigeenit) tuottavat proteiineja, jotka estävät ja rajoittavat solunjakautumista ja kasvua, esim. p53 (kaikkein yleisin mutaatiokohde syövissä) ja RB.
- B. Molemmat kasvunrajoitegeenin alleelit pitää inaktivoitua, jotta kasvunrajoitevaikutus poistuisi (kaksivaihe- eli Knudsonin two-hit-hypoteesi).
 - 1. Kasvainkudoksessa siten vallitsee alleelivaurion suhteen homotsygotia (heterotsygotian menetys, LOH).
- C. Retinoblastoomageeni (RB) tuottaa RB-proteiinia, joka säätelee siirtymistä G1-vaiheesta S-vaiheeseen.
 - 1. Aikaisin G1-vaiheessa RB on aktivoitunut (hypofosforyloitunut) ja sitoo E2F-transkriptiotekijöitä.
 - 2. Kasvutekijäsignaali johtaa sykliini D/CDK4-kompleksien aktivaatioon, jolloin ne fosforyloivat RB:tä vapauttaen E2F, mitä seuraa S-vaiheeseen siirtymistä säätelevien geenien transkriptio.
 - a. Kompleksin toimintaa säätelee CDK-inhibiittori p16 (CDKN2A-geeni), jonka deleetiot ja mutationaaliset inaktivaatiot ovat todella yleisiä kasvaimissa.

3. Kaksivaihehypoteesin mukaan molemmat RB-geenit tulee olla toimintahäiriöllisesti mutatoituneet tai deletoituneet, jolloin E2F on jatkuvasti vapaa ylläpitäen säätelämätöntä solunjakautumista.
 - a. Perinnöllisessä retinoblastoomassa (verkkokalvon varhaissolusyöpä) genomissa on valmiiksi RB1-geenivirhe, jolloin vaaditaan vain yksi somaattinen ”isku” lisää terveeseen alleeliin.
- D. TP53-kasvunrajoitegeeni tuottaa transkriptiotekijää p53, joka säätelee siirtymistä G1-vaiheesta S-vaiheeseen.
 1. Normaalitilassa p53-määrät ovat vähäisiä, sillä MDM2-entsyymi ubikitinnoi p53:a ohjaten sitä proteasomeihin hajotettavaksi.
 - a. Myös amplifikoiva mutaatio MDM2-geenissä voi siten johtaa heikkoon p53-toimintaan.
 2. Solun stressitilanteet (esim. DNA:n vauriot) aktivoivat p53, joka pysäyttää solusyklin ja aloittaa DNA:n korjausprosessit.
 - a. p53 lisää esim. CDKN1A (p21) transkriptiota
 - b. p21 estää sykliini-CDK-komplekseja ja siten RB:n fosforylaatiota, mikä johtaa solusyklin pysähtymisen G1-vaiheeseen.
 3. Jos DNA:n vaurio on palautumaton, p53 joko ohjaa solun pysyvään senesenssiin tai käynnistää apoptoosin ja estää siten haitallisen mutaation leviämisen jälkeläissoluihin.
 - a. p53 lisää proapoptoottisten geenien, kuten BAX:n transkriptiota, mikä johtaa apoptoosiin (kts. apoptoosin mekanismi)
 4. Perinnöllinen inaktivoiva mutaatio TP53:ssa aiheuttaa Li-Fraumenin (SBLA) syndrooman, jossa esiintyy toisen alleelin ituratamutaatio.
 - a. Kaksivaihehypoteesia seuraten mahdollisuus maligniteeteille kasvaa runsaasti (25x riski), sillä vain toisen alleelin tulee vaurioitua satunnaisesti.
 - b. Ilmenee alttiutena useille eri syöville, kuten sarkoomille, rintasyövälle, leukemioille ja lisämunuaisen kuorikerroksen karsinoomille (SBLA).

IV. SOLUKUOLEMAN VÄLTÄMINEN

- A. Tuumorisoluissa on usein mutaatioita apoptoosia säätelevissä geeneissä.
 1. Syöpäsoluihin vaikuttaa monia rasitteita, kuten kasvusignaalihäiriöitä, ER-stressin laukaisevia poikkeavasti laskostuneita proteiineja ja liiallisen kasvun aiheuttamaa hypoksiaa.
- B. Apoptoosin säätely tapahtuu BCL2-perheen proteiinien eli apoptoosin estäjien (esim. BCL-XL, BCL2) ja edistäjien (esim. BAX, BAK) tasapainon kautta.
 1. Myös TP53-mutaatiot voidaan laskea solukuoleman välttämismekanismiin, sillä p53:n toiminta ohjaa apoptoottisten geenien transkriptiota.

2. Apoptoosia estävän BCL2:n yliekspressio todetaan noin puolessa ihmissyövästä, joista klassinen esimerkki on follikulaarinen lymfooma.
 - a. t(14;18) johtaa lisääntyneeseen BCL2, mikä suojaa B-lymfosyyttejä apoptoosilta.
 - b. Tämä johtaa B-lymfosyyttien kertymiseen imusolmukkeisiin.

V. LOPUTON JAKAUTUMISKYKY (SENESENSIN VÄISTÖ)

- A. Normaalisti somaattiset solut voivat jakautua vain rajallisen määrän kertoja (Hayflickin raja), jonka jälkeen ne siirtyvät replikaativiseen senesenssiin.
 1. Kromosomien päissä olevat toistojaksot eli telomeerit toimivat mm. DNA:n replikaation aloituskohtina ja ne lyhenevät solun jakautuessa.
 2. Lopulta DNA:n replikaatio ei enää käynnisty, mikä johtaa senesenssiin.
- B. Normaalisti ainoastaan sukusoluissa ja kantasoluissa ilmenee telomeraasientsyymiä (TERT), joka ylläpitää telomeerien pituutta.
 1. Telomeraasientsyymi on yleensä aktivoitunut syövässä.

VI. OMAN VERISUONITUKSEN EDISTÄMINEN

- A. Syöpäsolukko, kuten normaalitkin solut, vaativat selvitäkseen ja kasvaakseen ravinteita ja happea.
 1. Kasvain pystyy kasvaa vain noin 1-2 mm³ kokoiseksi ilman angiogeneesia (uusien verisuonten muodostuminen jo olemassa olevista verisuonista), sillä diffuusio ei välitä ravinteita pidemmälle.
 - a. Vaskulogeneesi tarkoittaa täysin uusien verisuonten kehittymistä endoteelin prekursorisoluista.
- B. Angiogeeninen käänne tarkoittaa sitä, että angiogeneesiä suosivien kasvutekijöiden vaikutus ylittää estävien tekijöiden vaikutuksen.
 1. Hapen puute kasvaimessa stabiloi transkriptiotekijä HIF1 α :n, joka lisää angiogeneesiä suosivien kasvutekijöiden (esim. VEGF, FGF, PDGF) luentaa.
 2. p53 indusoi angiogeenin estäjien synteesiä, joten p53:n menetys tai inaktivoivat mutaatiot suosivat angiogeneesiä.
- C. Kasvainten verisuonitus eroaa normaalista.
 1. Verisuonet ovat helposti läpäiseviä (rikkinäinen tyvikalvo), mikä auttaa metastasoinnissa.

VII. YMPÄRISTÖÖN TUNKEUTUMINEN (INVAASIO JA ETÄPESÄKKEIDEN LÄHETTÄMINEN (METASTASOINTI))

- A. Ekstrasellulaarimatriksiin invaasio
 1. Epiteliaaliset solut muuttuvat mesenkymaalisiksi eli epäkypsän tukikudossolun kaltaisiksi (epiteeli-mesenkyymitransitio, EMT).
 - a. Solujen välinen adheesio heikentyy E-kadheriinin menetyksen kautta.
 - i. Normaalisti E-kadheriini toimii solujen välisenä ”liimana” rajoittaen niiden kasvua ja liikkumista (kasvun kontakti-inhibitio).
 2. Irronneet kasvainsolut tarttuvat tyvikalvon laminiineihin ja hajoittavat tyvikalvon (pääosin tyypin IV kollageenia) proteaaseilla.
 3. Syöpäsolut hajoittavat ECM:ää ja kulkevat sen läpi interaktioilla ECM:n rakenteiden avulla.
 4. Syöpäsolut saavuttavat imu- tai verisuonen.
- B. Tunkeutuminen suoniin (intravasaatio) ja ohjautuminen muualle elimistössä

1. Tuumoreiden metastasointipaikka on usein ennustettavissa primaarituumorin sijainnin perusteella.
 - a. Monet tuumorit ekstrasoiutuvatkin ensimmäiseksi kohtaamassaan hiussuonistossa.
 - b. Joillakin tuumoreilla esiintyy elintropismia eli ne metastasoituvat suosivasti tiettyyn elimeen.
 - i. Johtuu syöpäsolun pinnan reseptoreiden ja määräpaikan endoteelin ligandien vuorovaikutuksesta.
 - ii. Esim. eturauhassyövän metastaasit luuhun
2. Karsinoomat metastasoivat yleensä imusuoniteitse.
 - a. Ensimmäiset etäpesäkkeet havaitaan siksi yleensä kasvaimen elintä tyhjentävissä imusolmukkeissa.
3. Sarkoomat ja muutamat karsinoomat metastasoivat yleensä verisuoniteitse:
 - a. Munuaissolukarsinooma
 - b. Hepatosellulaarinen karsinooma
 - c. Follikulaarinen kilpirauhassyöpä
 - d. Korionkarsinooma

VIII. IMMUUNIPUOLUSTUKSEN VÄLTTÄMINEN

- A. Syöpää vastaan kehittyä immuunivaste, mutta se ei yleensä riitä hallitsemaan syövän kasvua.
- B. Mutatoituneet geenit tuottavat tuumoriantigeenejä eli syöpäsoluille tyypillisiä molekyylejä, joita vasta-aineet ja T-solureseptorit tunnistavat.
 1. Immuunipuutokset lisäävät riskiä syöville.
- C. Nopeasti kasvaessaan tuumorisoluja kuolee, jolloin dendriittisolut fagosytoivat niitä ja kulkevat imusolmukkeisiin esittelemään tuumoriantigeenejä tappaja-t-soluille.
 1. Dendriittisolut siis aktivoivat CD8+- T-soluja MHC I-interaktiolla eli tapahtuu ”cross-presentaatiota” (yleensä endogeenisesti tuotettu proteiini esitellään MHC I:n avulla).
 2. Tappaja-t-solut kulkevat tuumorin luokse ja hyökkäävät kyseistä syöpäantigeenia ilmentäviä soluja vastaan.
 3. T-soluilla ei kuitenkaan todennäköisesti ole massiivista roolia tuumorien valvomisessa, sillä aktivoimattomat T-solut eivät pääse kudoksiin helposti, eikä tuumorisoluilla yleensä ole tarpeellisia ko-stimulaattoreita pinnallaan; kasvainsolujen jatkuva mutatoituminen myös heikentää niiden tunnistamista.
- D. Syöpäsolut kuitenkin välttelevät mahdollista T-lymfosyyttien hyökkäystä vähentämällä MHC I-molekyylien ilmentymistä pinnallaan, jolloin tappaja-t-solut eivät pysty tunnistamaan syöpäsoluja.
 1. Normaalisti NK-solujen tappotoimintaa inhiboi MHC I-molekyyli, joten näiden vähentyessä NK-solut aktivoituvat ja tappavat syöpäsolun.
- E. Kasvain tuottaa usein välittäjäaineita, jotka ohjaavat kertyneiden valkosolujen muuttumista anti-inflammatoriseen suuntaan ja edistävät syövän kasvua.
 1. Treg (CD4-säätelijä-T-solu) erittävät TGF-betaa ja IL-10, jotka tuottavat immunosuppressiivisen ympäristön, jossa CTL:t eivät toimi tehokkaasti.
 2. M2-makrofagit lisäävät angiogeneesia ja häiritsevät lymfosyyttien toimintaa.
- F. Syöpäsolut voivat ilmentää pinnoillaan koinhibitorisia molekyylejä.
 1. Syöpäsolut PD-L1 sitoutuu PD-1 T-lymfosyyttien pinnalla jarruttaen niiden toimintaa.

- G. Kasvaimet voivat tuottaa paljon entsyymiä indoleamiini 2,3-dioksygenaasi (IDO), joka metaboloii tryptofaania, joka on tarpeellinen aminohappo T-solujen proliferaatiolle ja toiminnalle.

IX. TULEHDUS SYÖVÄN EDISTÄJÄNÄ

- A. Infiltoivat syövätkä aiheuttavat kroonisen tulehdusreaktion, joka auttaa syövän kasvussa sekä voi ilmentyä myös systeemisesti (esim. kroonisen taudin anemia ja kakeksia).
1. Kakeksia tarkoittaa erityisesti syöpäsairauksien yhteydessä havaittavaa progressiivista luurankoliuksen ja rasvakudoksen menetystä sekä heikkoutta ja toimintakyvyn laskua.
 - a. Johtuu pääosin tulehdussolujen erittämistä sytokiineista, kuten TNF-alfa, joka laskee ruoanhalua ja lisää perusaineenvaihduntaa.
 2. Leukosyytit ja strooman solut erittävät kasvutekijöitä, jotka stimuloivat proliferaatiota ja angiogeneesiä.
 3. Tulehdussolujen vapauttamat proteaasit rikkovat solu-solu- ja solu-ECM-kontakteja vapauttaen kasvun kontakti-inhibition vaikutuksen sekä helpottaen invaasiota ECM:n läpi.
 - a. Myös esim. TGF-beta auttaa invaasiassa edistämällä epiteeli-mesenkyymin transitiota.

X. POIKKEAVA METABOLIA

- A. Syöpäsolujen metabolian pääpiirteet ovat korkea glukoosin kulutus ja tämän fermentaatio maitohapoksi hapekkaissakin ympäristöissä.
1. Tätä kutsutaan aerobiseksi glykolyysiksi (Warburg effect), sillä normaalisti aerobisissa olosuhteissa soluhengityksen aloittava glykolyysi etenee sitruunahappokiertoa.
 2. Energiantuotannon kannalta epätehokasta, mutta syntyvät glukoosin metaboliatuotteet ovat syöpäsoluille tärkeitä raaka-aineita, jotka mahdollistavat nopean kasvun ja proliferaation.
 3. Onkogeneeni- tai vähentynyt tuumorisuppressorisignaalointi mahdollistaa metabolian muokkauksen, esim. PI3K/AKT-reitin aktivoituminen lisää GLUT-transportteita lisäten glykolyysiä.

XI. GENOMIN EPÄVAKAUS JA DNA:N KORJAUSKEINOT

- A. Häiriöt geenin kopiointi- ja korjausmekanismeissa aiheuttavat epävakausta genomissa ja lisäävät siten riskejä syöpien muodostumiselle.
1. Ovat siis edellytyksiä yllä olevien kahdeksan tunnusmerkin kehittymiselle, sillä ne mahdollistavat mutaatiot toisissa geeneissä solunjakautumisen aikana.
- B. Replikaatiossa tapahtuneet pistemutaatioista johtuvat virheet (emäspariumavirhe, mismatch) korjaavat proteiinit, kuten MLH1, MSH2 tai MSH6 (mismatch-repair).
1. Synnynnäinen toisen alleelin mutaatio MMR-geeneissä ja toinen somaattinen hankittu mutaatio johtaa geenivirheiden kertymiseen.
 2. Kertyneet mutaatiot on helppo tunnistaa mikrosatelliiteista (DNA:n toistojaksoja) ja niiden pituuksien muuttumista kutsutaan mikrosatelliitti-instabiliteetiksi (kts. HNPCC).
- C. Ulkoinen säteily tai happiradikaalit voivat aiheuttaa yhden DNA-juosteen katkoksia, ja näiden korjausmekanismi on emäksenkorjaus (base excision repair, BER).

- D. Pyrimidiinitähteiden ristositoutumien (estää normaalia DNA:n replikaatiota) korjausmekanismi on nukleotidinpoistokorjaus (nucleotide excision repair, NER).
1. UV-säteily aiheuttaa erityisesti tymidiinidimeerejen muodostumista.
 2. Xeroderma pigmentosumissa esiintyy NER-entsyymien perinnöllisiä häiriöitä, mitkä altistavat auringonvalon aiheuttamille ihosyöville.
- E. DNA:n kaksoissäievauriot ovat joko kaksoissäiekatkoksia tai säikeiden silloittumisia (crosslinking).
1. Voidaan korjata joko yhdistämällä homologiset päät (HR) tai ei-homologiset päät (NHEJ).
 - a. NHEJ:ssa katkenneet päät yhdistetään toisiinsa, mikä altistaa DNA:n kadolle ja translokaatioille, jotka voivat toimia haitallisina muutoksina.
 - b. HR:ssä käytetään toista ehjää kromosomia mallina korjaukselle, mikä johtaa matalaan virheriskiin verrattuna NHEJ:hin.
 2. ATM-geenin perinnölliset mutaatiot johtavat häiriintyneeseen kaksisäievaurioiden tunnistamiseen ja siten niiden heikkoon korjaamiseen.
 - a. Ataksia-telangiektasiassa ATM-geenin autosomaalisesti resessiivinen mutaatio:
 - i. Neurologiset oireet (tasapainovaikeudet), jotka johtuvat pikkuaivojen atrofiasta.
 - ii. Telangiektasiat (laajentuneita verisuonia) silmän sidekalvoille ja auringolle alttiilla ihoalueilla
 - iii. Lisääntynyt infektioherkkyys, joka johtuu B- ja T-solujen kehityksen häiriöistä ja siten matalista IgA-, IgG- ja IgE-tasoista.
 - iv. Kohonnut riski syöville (erit. leukemioille ja lymfoomille)
 - v. Kohonnut AFP-arvo
 - vi. Harvinainen, Suomessa n. 1/100 000 lasta

KLIINiset OMINAISUUDET

I. MAKROSKOOPPISET PIIRTEET

- A. Kasvaimet erotellaan benigneiksi ja maligneiksi yleensä mikroskooppisen tutkimuksen pohjalta, mutta myös kliiniset havainnot voivat antaa vihjeitä laadusta:
1. Yleisesti ottaen hyvänlaatuiset kasvaimet ovat paikallisia, hidaskasvuisia, viereisestä kudoksesta hyvin erottuvia (säännöllinen rajapinta normaalikudokseen), helposti liikuteltavissa ja joustavia.
 2. Pahanlaatuiset taas vastoin ovat infiltroivia, nopeakasvuisia, huonosti erottuvia, tarttuvat ympäröiviin kudoksiin ja ovat kovempia kosketukselle.

II. HISTOPATOLOGINEN ANALYYSI

- C. Histopatologisen tutkimuksen perusteella tehty diagnoosi kutsutaan patologisanatomiseksi diagnoosiksi (PAD).
- D. Benignien kasvainten solukko yleensä muistuttaa lähtökudosta niin histologisesti että sytologisesti (hyvin erilaistunut):
1. Ei invaasiota, eikä siten metastasointipotentiaalia
 2. Korkea järjestäytymisaste (organisoidun kasvutyyli) ja yhdenmukaiset solut
 3. Säännölliset tumat ja solumuoto

4. Matala tuma/sytoplasma-suhde
 5. Vähäinen mitotoottinen aktivisuus
- E. Malignien kasvainten solukko on yleensä huonosti erilaistunut:
1. Invasoi ja siten voi metastasoida
 - a. Kyky lähettää etäpesäkkeitä on pahanlaatuisuuden tärkein erottava piirre.
 2. Huonosti järjestäytynyttä
 3. Soluatiypiaa (tumien muutokset)
 4. Korkea tuma/sytoplasma-suhde
 5. Korkea mitotoottinen aktiivisuus
- F. Huonosti erilaistunut solukko voi olla vaikea tunnistaa, mutta immunohistokemialliset tyypitykset auttavat; esim. nämä välikokoiset filamentit auttavat erotuksessa.
1. Keratiini – epiteeli
 2. Vimentiini - mesenkyymi
 3. Desmiini – Lihas
 4. GFAP – neuroglia (CNS – oligodendrosyytit, astrosyytit, ependymisolut, mikroglia; PNS – Schwannin solut, satelliittisolut)
 5. Neurofilamentti – neuronit

III. ERILAISTUMISASTE JA LEVINNEISYYS

- A. Prognosin eli ennusteen arvioimiseksi voidaan luokitella kasvaimet erilaistumisasteen (gradus) ja levinneisyyden (stage) mukaan.
1. Levinneisyydellä on suurempi merkitys ennustearvion kannalta.
- B. Kasvainten gradeeraus perustuu erilaistumisasteen määrittämiseen.
1. Yleensä 2-4-portainen luokittelu (low-grade/high-grade tai gradus 1-3/4):
 - a. Gradus 1 – pienin, pahanlaatuisuusaste eli kudoksen hyvin erilaistunut (muistuttaa alkuperäiskudosta), mitoosifrekvenssi on pieni ja tuma-atypia on vähäistä
 - b. Graduksen noustessa erilaistuminen huonontuu, mitoosifrekvenssi kasvaa ja tumapleomorfia voimistuu.
- C. Levinneisyys eli stage kuvailee primaarikasvaimen kokoa ja levinneisyyttä; perustuu TNM-luokitukseen:
1. T = Tumor (T0-T4)
 - a. Viittaa primaarikasvaimen kokoon tai invaasion syvyyteen.
 2. N = regional lymph Nodes (N0-N3)
 - b. Viittaa paikallisten imusolmukemetastaasien esiintymiseen.
 3. M = Metastasis (M0-M1)
 - c. Viittaa kaukometastaasien esiintymiseen.
 4. Jos x numeron tilalla (esim. pNx), tarkoittaa se tilannetta, jossa arviointia ei toteuteta tai se on mahdotonta.
- D. Kaikille syöville tehdään cTNM (kliininen levinneisyysluokittelu) ja kaikille poistetuille myös pTNM (patologinen luokittelu)

IV. SYÖVÄN KASVAINMERKKIAINEET

- A. Verestä määritettävät kasvainmerkkiaineet auttavat diagnostiikassa ja seurannassa, mutta eivät yleensä toimi yksinään syövän diagnoosina.

- B. Käyttöön liittyy myös paljon häiriötekijöitä, sillä esimerkiksi tulehdustaudit voivat nostaa arvoja (esim. PSA prostatitiitissa).

III. SYTOLOGIA

- A. Histologisten kudosleikkeiden tutkimisen lisäksi voidaan ottaa solunäyte eli sytologinen näyte.
- B. Näytteistä voidaan erityisesti tarkastella yksittäisten solujen morfologiaa, kuten tumien koon, muodon ja värjäytyvyyden sekä sytoplasman muutoksia.
1. Usein luokittelussa käytetään Papanicolaoun papaluokkia (0-5)
 - a. 0 = Riittämätön/epäedustava näyte
 - b. 1 = Hyvänlaatuinen, normaali sytologia
 - c. 2 = Atyyppinen, mutta ei maligni (reaktiivisia soluja, esim. inflammaatio, sädehoito, metaplasia)
 - d. 3 = Lievästi epäilyttävä, mutta epävarma maligniteetti
 - e. 4 = Vahva epäily maligniteetista
 - f. 5 = Varmasti pahanlaatuinen
- C. Irtosolunäytteissä tutkitaan epiteelipinnoilta irtoavaa solukkoa (sivelynäyte/eritenäyte).
1. Yleisimpiä ovat esim. kohdunkaulan syövän seulontatutkimus ja virtsan sytologinen tutkimus verivirtsaisuuden selvittelyssä ja rakkosyövän seurannassa.
- D. Ohutneulanäytteitä voidaan ottaa kaikista elimistä paitsi aivoista, mutta tavallisesti käytetään kaulakymyjen erotusdiagnostiikassa.
1. Tarkka näytteenotto tärkeää, sillä suurten kasvainten keskusosa saattaa olla nekroosissa, jolloin keskustaa kannattaa välttää (myös reunanäytteet saattavat olla riittämättömiä ympäröivän turvotuksen takia).
 2. Metodin ongelmana on usein riittämätön näyte, joten sijalle on tullut monissa tilanteissa paksuneulanäyte, joka on histologinen kudosnäyte.
 - a. Paksuneulanäytettä hyödynnetään erityisesti rinnan, eturauhasen ja maksan tuumoridiagnostiikassa.

EPIDEMIOLOGIA

I. SYÖPÄTILANNE (2021)

- A. Syöpä on suomalaisten toiseksi yleisin kuolinsyy.
- B. Syöpämäärät ovat kasvussa, mutta ennuste paranee samalla.
- C. Miehet:
- a. Ilmantuvuus:
 - i. 1. Eturauhassyöpä (5217)
 - ii. 2. Paksu- ja peräsuolisyöpä (2109)
 - iii. 3. Keuhkosityöpä (1756)
 - b. Kuolleisuus:
 - i. 1. Keuhkosityöpä (1491)
 - ii. 2. Eturauhassyöpä (976)
 - iii. 3. Paksu ja peräsuolisyöpä (745)
- D. Naiset:

- a. Ilmaantuvuus:
 - i. 1. Rintasyöpä (5105)
 - ii. 2. Paksu- ja peräsuolisyöpä (1717)
 - iii. 3. Keuhkosityöpä (1102)
 - b. Kuolleisuus
 - i. 1. Rintasyöpä (914)
 - ii. 2. Keuhkosityöpä (855)
 - iii. 3. Paksu- ja peräsuolisyöpä (633)
- E. Keuhkosityövän ennuste on niin huono, koska toteamisvaiheessa sairaus on yleensä levinnyt niin, että leikkaushoito ei toimi.

4 HEMODYNAMIIKKA JA SEN HÄIRIÖT

VERENKIERTO

- I. HYDROSTAATTINEN JA OSMOOTTINEN PAINE
 - A. Hiuksuonissa tapahtuvaa ravintoaineiden, kaasujen ja kuona-aineiden vaihtoa säätelee verisuonten hydrostaattinen paine ja plasman kolloidosmoottinen paine.
 - 1. Hydrostaattinen paine aiheuttaa nesteen kulkua suonesta ulos soluvälitilaan.
 - a. Valtimokapillaareissa tämä on kolloidosmoottista painetta korkeampi, päinvastoin laskimokapillaareissa.
 - 2. Plasmaproteiinien aiheuttama kolloidosmoottinen paine imee nestettä takaisin suoneen.
 - B. Valtimokapillaarien suhteessa korkea hydrostaattinen paine ja laskimopillaarien korkea kolloidosmoottinen (onkoottinen) paine tasapainottavat toisiaan, jonka takia kapillaaristossa vain pieni määrä nestettä jää soluvälitilaan.
 - 1. Soluvälinesteen lisääntyessä sitä tihkuu imusuoniin.
 - 2. Edeema seuraa, jos imusuoniston nesteenpoistokapasiteetti ylittyy.
 - a. Edeeman aiheuttajia ovat kohonnut hydrostaattinen paine, matala onkoottinen paine, imunestekierron tukkeutuminen, natriumin ja veden retentio sekä tulehdus.
 - C. Hydrostaattista painetta voi nostaa esim. heikko laskimopaluutoiminta sydämen vajaatoiminnan yhteydessä tai valtimoiden dilataatio tulehduksessa.
 - D. Hyperemiassa ja kongestiossa kudoksen verisuonissa on normaalia runsaammin verta.
 - 1. Hyperemia on aktiivinen prosessi, joka johtuu valtimoiden laajentumisesta ja sitä seuraavasta runsaasta virtauksesta.
 - 2. Kongestio taas on passiivinen tapahtuma, jota aiheuttaa vähentynyt laskimopaluu.
 - 3. Kudoksen väri eroaa tilanteiden välillä: hyperemiassa punainen (hapettunutta verta), kongestiossa sinipunainen (syanoosi).
 - E. Plasman kolloidosmoottista painetta laskee plasmaproteiinien, yleensä albumiinin, menetys (esim. nefroottinen syndrooma), heikko tuotanto (esim. kirroosi tai aliravitsemus) tai plasman laimeneminen (esim. vesimyrkytys).

- F. Soluväliin tiheä neste on joko transudaattia tai eksudaattia.
1. Transudaatti (niukkaproteiininen, kirkas) syntyy kohonneen hydrostaattisen paineen tai matalan onkoottisen paineen seurauksena.
 2. Eksudaatti (runsasproteiininen, samea) syntyy tulehduksessa, kun kapillaarien permeabiliteetti lisääntyy.
- G. Tulehdukset, kasvaimet tai imusolmukkeiden poisto voivat häiritä imunestekiertoa ja siten soluvälinesteen poistoa, mikä aiheuttaa turvotusta.
- H. Lisääntynyt Na⁺ veressä (esim. munuaisten vajaatoiminta) kasvattaa verivolyymia, sillä vesi seuraa natriumia osmoottisesti.
1. Verivolyymin lisääntyminen nostaa hydrostaattista painetta ja laskee onkoottista painetta, mikä voi johtaa edeemaan.

VERENVUODOSTA JA HEMOSTAASISTA YLEISESTI

I. VERENVUOTO JA HEMOSTAASI

- A. Verisuonen rikkoutuminen aiheuttaa hemorragiaa, joka keräytyessä kudokseen muodostaa hematooman.
1. Ihon tai limakalvon hematoomat lajitellaan niiden läpimitan perusteella:
 - a. Petekkia = 1-2mm
 - b. Purppura = 3-10mm
 - c. Ekkymoosi = 1-2cm (mustelma)
- B. Ihonalainen mustelma muuttaa väriään ajan kuluessa hajoamistuotteiden mukaisesti:
1. Sinipunainen (hemoglobiini) -> vihreä (biliverdiini) -> keltainen (bilirubiini) -> keltaisenruskea (hemosideriini)
- C. Vaurioitunut verisuoni korjataan hemostaasilla eli veren fysiologisella hyytymisellä:
1. Primaarisessa hemostaasissa verihiutaleiden ja endoteelin vuorovaikutus muodostaa heikon verihiutaletulpan.
 2. Sekundaarisessa hemostaasissa tulppa stabiloidaan hyytymisketjun kautta.
 3. Hyytymän pilkkominen (fibrinolyysi) alkaa jo hemostaasin yhteydessä.

NORMAALI HEMOSTAASI

I. NORMAALI PRIMAARINEN HEMOSTAASI

- A. Vaihe 1 – Vaurioituneen verisuonen vasokonstriktio
- a. Vähentää verenvirtausta vaurioituneelle alueelle.
 - b. Refleksiivinen neurogeeninen mekanismi ja endoteeliin paikallinen erityis endoteelisoluista välittävät supistumista.
- B. Vaihe 2 – Trombosyyttien tarttuminen endoteelinalaisiin rakenteisiin (adheesio)
1. Endoteelivaurio paljastaa suonenseinämän von Willebrandin tekijää (vWf) ja kollageenia.
 - a. vWf on peräisin endoteelisolujen Weibel-Paladen kappaleista ja trombosyyttien alfa_{IIb}β₃-reseptoreista.
 2. vWf tarttuu kollageeniin
 3. Trombosyytit sitoutuvat vWf-tekijään GpIb-reseptoreillaan
- C. Vaihe 3 – Trombosyyttien degranulaatio
1. Sitoutuminen saa aikaan trombosyyttien konformaation muutoksen ja degranulaation.

2. Trombosyytit vapauttavat TXA₂, alfarakkuloistaan esim. fibrinogeeniä, vW-tekijää, verihiutaletekijä 4:ää (PF₄) ja hyytymistekijää V, kun taas deltagranuloistaan ADP:tä, kalsiumia ja serotoniinia.
- D. ADP sitoutuu trombosyyttien P₂Y₁₂-reseptoriin, mikä lisää GPIIb/IIIa-reseptoreiden ilmenemistä trombosyyttien pinnalla sekä vähentää cAMP-muodostusta trombosyyteissä, mikä kannustaa niiden aktivaatiota.
- E. Kalsiumia tarvitaan koagulaatiokaskadiin.
- F. Verihiutaleiden COX-1 muodostaa TXA₂, joka toimii aggregaatiota kannustavana tekijänä (lisää GPIIb/IIIa-reseptorikompleksia).

D. Vaihe 4 – Aggregaatio

1. Verivirrasta tulevat uudet trombosyytit tarttuvat adheroituneisiin trombosyytteihin eli aggregoituvat GPIIb/IIIa-reseptoreiden ristisidoksilla, joissa fibrinogeeni toimii välikätenä.
2. Muodostuu löyhä verihiutaletulppa, joka ei yksinään riitä tyrehtyttämään isoja verenvuotoja.
 - a. Sekundaarinen hemostaasi vahvistaa verihiutaletulpan hyytymiskaskadin kautta.

II. NORMAALI SEKUNDAARINEN HEMOSTAASI

A. Sekundaarinen hemostaasi perustuu hyytymistekijöiden välittämään hyytymiskaskadiin.

1. Maksa tuottaa hyytymistekijöitä ja ne kiertävät verenkierrossa inaktiivisessa muodossa.

B. Kaskadi voidaan jakaa ulkoiseen, sisäiseen ja yhteiseen reittiin.

C. Ulkoinen aktivaatioreitti riippuu nimensä mukaisesti tekijöistä (TF), jotka ovat verenkierron ulkopuolella:

1. Hyytymiskaskadi aktivoituu, kun verisuonivaurio paljastaa kudostekijää (TF eli hyytymistekijä III tai tromboplastiini).
2. TF aktivoi ja sitoutuu hyytymistekijään VII -> TF-VIIa-kompleksi
3. TF-VIIa-kompleksi aktivoi kudostekijän X -> Xa jatkuen yhteiseen reittiin

D. Sisäinen aktivaatioreitti ei vaadi verenkierron ulkopuolisia tekijöitä, vaan subendoteelinen kollageeni pystyy toimimaan stimulusena.

1. Subendoteelinen kollageeni aktivoi hyytymistekijän XII -> XIIa
2. XIIa aktivoi XI -> XIa
3. XIa aktivoi IX -> IXa
4. IXa sitoutuu VIIIa-vWf-kompleksiin ja aktivoivat X -> Xa jatkuen yhteiseen reittiin
 - a. Verenkierrossa vW-tekijä sitoutuu tekijään VIII, ja suoja sitä proteolysiltä lisäten tekijän VIII puoliaikaa moninkertaisesti.

E. Yhteinen reitti:

1. Xa sitoutuu Va, jotka protrombinaasikompleksina muuttavat protrombiinia trombiiniksi
2. Trombiini muuntaa verihiutaletulpan ja veren fibrinogeeniä (hyytymistekijä I) fibriiniksi.
3. Trombiini aktivoi XIII:tä, joka vahvistaa hyytymää polymerisoimalla fibriinimonomeerit fibriinipolymeeriksi (stabiili fibriini).

III. FIBRINOLYYSI

- A. Fibrinolyttisen järjestelmän tarkoitus on rajoittaa hyytymän kokoa sekä poistaa hyytymä paranemisen tapahduttua.

- B. Endoteelisoluista erittyy plasminogeenin kudosaaktivaattoria (tPA), joka muuttaa plasminogeenia plasmiiniksi.
 - 1. Prostatektomian yhteydessä vapautuva urokinaasi voi aktivoida plasminogeenia, joka voi johtaa verenvuotoihin lisääntyneen fibrinogeenin pilkkomisen takia.
- C. Plasmiini pilkkoo fibriniä, seerumin fibrinogeenia ja hyytymistekijöitä (erit. FXIII).
- D. Maksan tuottama alfa-2-antiplasmiini inaktivoi plasmiinin lopettaen fibrinolyysin.

PRIMAARISEN HEMOSTAASIN HÄIRIÖT

I. YLEISESTI PRIMÄÄRISEN HEMOSTAASIN HÄIRIÖISTÄ

- A. Verihiutaleiden toimintahäiriöt tai puute (kvalitatiivinen vs kvantitatiivinen) aiheuttavat ongelmia primaarisessa hemostaasissa.
- B. Ilmenevät kliinisesti limakalvojen ja ihon verenvuotoina.
- C. Primaarisen hemostaasin laboratoriotestit:
 - 1. B-Trom (trombosyyttien lukumäärä); aikuisilla viitearvot 150-360x10⁹/l; alle 50 aiheuttaa lisääntyneitä vuotovaaraa (<20 jo erikoissairaanhoidon päivystyksellistä arviota vaativa).
 - a. Mm. maksasairaudet, runsas alkoholin käyttö, raskaus ja virusinfektiot voivat vähentää määrää.
 - b. Osana myös sekä B-TVK (täydellinen verenkkuva) että B-PVKT (perus-/pieni verenkkuva).
 - 2. Veren sivelyvalmiste auttaa trombosyyttiluvun tarkistamisessa sekä mahdollistaa trombosyyttien koon tarkastelun.

II. IMMUNOLOGINEN TROMBOSYTOPENIA (IDIOPAATTINEN TROMBOSYTOPENINEN PURPPURA, ITP)

- A. Autoimmuunisairaus, joka ilmenee trombosytopeniana eli verihiutaleiden määrän vähäisyytenä ja vaihtelevan vahvuisena vuototaipumuksena.
- B. Pernan plasmasolut tuottavat IgG-vasta-aineita trombosyyttien antigeenejä (esim. GPIIb/IIIa) vastaan.
 - 1. Tuotanto voi olla primaaria tai sekundaarista (esim. lääkkeet, SLE, HBV, HIV)
- C. Vasta-aineet tarttuvat trombosyytteihin, mikä ohjaa pernan makrofagit tuhoamaan merkityt trombosyytit -> trombosytopenia.
- D. Jaetaan trombosytopenian keston mukaan akuuttiin (<3kk), persistoivaan (3-12kk) ja krooniseen (>12kk) muotoon:
 - 1. Akuutti muoto on yleensä itsestään rajoittuva ja tavataan useimmiten lapsilla viikkoja virusinfektion jälkeen.
 - 2. Tila kroonistuu useimmiten aikuisilla, erityisesti 20-40v. naisilla.
 - a. Joidenkin lähteiden esim. Ambossin mukaan ITP yleisintä >55v. naisilla ja joskus (SketchyIM) mainitaan myös bimodaalinen jakauma 20-30v. naiset ja >70v. miehet.
- E. Diagnostiikka:
 - 1. Trombosyyttimäärä on alle 100x10⁹/l, diagnoosivaiheessa usein alle 10x10⁹/l
 - 2. Normaali TT ja aPTT, sillä koagulaatiokaskadi ei ole häiriintynyt
 - 3. Luuytimessä normaali tai lisääntynyt megakaryopoieesi
 - a. Ei välttämätön tutkimus, mutta suositeltu yli 60-vuotiaille, jos ensilinjan hoito ei toimi (myelodysplastisen oireyhtymän riski).
- F. Hoito:
 - 1. Ensilinjan lääkehoitona ovat glukokortikoidit (erit. deksametasoni).
 - 2. Toisen linjan hoito ovat pernan poisto tai rituksimabi-infuusiot.

- a. Pernan poisto poistaa vasta-ainelähteen ja trombosyyttien tuhoamispaikan, käytetään uusiutuvassa ITP:ssä.
- b. Rituksimabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu B-solujen CD20-antigeeniin ja aiheuttaa niiden tuhoutumista. Vähentää siten anti-trombosyytti-vasta-aineiden tuotantoa.

3. Useimmiten seuranta riittää, kun B-Trom $> 30 \times 10^9/l$

III. (TYYPIN 2) HEPARIININ AIHEUTTAMA TROMBOSYTOPENIA (HIT)

- A. N. 3-5% fraktioimattoman hepariinin käyttäjistä kokee vähintään kohtalaista trombositopeniaa 1-2 viikon käytön jälkeen.
- B. Hepariini-PF4-komplekseja vastaan tuotetaan IgG-vasta-aineita, jotka voivat sitoutua myös verihiutaleiden pinnalle.
 1. Pernan makrofagit tuhoavat merkattuja verihiutaleita.
 2. Johtaa myös verihiutaleiden aktivaatioon, aggregaatioon ja siten tromboosien muodostumiseen (protromboottinen tila trombositopeniasta riippumatta).

IV. TROMBOOTTISET MIKROANGIOPATIAAT

- A. Tromboottisiin mikroangiopatioihin kuuluu tromboottinen trombositopeeninen purppura (TTP) ja helomyyttis-ureeminen syndrooma (HUS)
 1. Molempien tunnusmerkki on pilkkoutumishemolyysi eli verisuonen sisällä tapahtuvaa punasolujen pilkkoutumista punasolufragmenteiksi (skistosyytti eli kypäräsolu).
 2. Johtuu mikrotrombien muodostuksesta, joihin osuessaan punasolut vaurioituvat ja leikkautuvat vaihtelevan kokoisiksi ja muotoisiksi skistosyyteiksi.
- B. TTP:n selvästi yleisin tautimuoto on hankittu (95%), joka puhkeaa yleensä aikuisiässä.
 1. ADAMTS13-metalloproteiinaasin matala aktiivisuus, joka hankitussa taudissa johtuu anti-ADAMTS13-IgG-vasta-aineista.
 - a. Normaalisti ADAMTS13 pilkkoo vW-tekijän multimeerejä pienemmiksi monomeereiksi, mikä estää tarpeettomien hyytymien muodostumisen verenkierrossa.
 2. von Willebrandin multimeerejä kerääntyy verisuonissa ja aiheuttavat mikrotrombooseja.
- C. HUS taas ilmenee tavallisimmin lapsilla ja johtuu yleensä infektiosta.
 1. Tyypillinen tautimuoto liittyy E. coli-infektioon (erit. EHEC-serotyyppi O157:H7), joka leviää kontaminoituneen lihan tai veden välityksellä.
 2. EHEC erittää Shiga-toksiinia, joka vaurioittaa endoteeliä, joka johtaa mikrotrombien muodostumiseen.
 - a. Usein aiheuttaa myös glomerulusvaurioita ja niistä johtuvan munuaisten vajaatoimintaa (yleisin lasten akuuttiin munuaisten vajaatoimintaan johtava sairaus).
- D. TTP vs HUS löydökset useimmiten:
 1. HUS:
 - a. Mikroangiopaattinen hemolyyttinen anemia
 - b. Trombositopenia
 - c. Akuutti munuaisten vajaatoiminta (AKI)
 - d. Ripuli/ verinen ripuli
 2. TTP:

- a. Mikroangiopaattinen hemolyyttinen anemia
 - b. Trombosytopenia
 - c. Akuutti munuaisten vajaatoiminta (AKI)
 - d. Kuume
 - e. Neurologiset oireet (kouristukset, kaksoiskuvat, sekavuus, yms.)
- E. Diagnostisesti punasolujen pilkkoutuminen varmistetaan verensivelyvalmisteesta, josta voidaan laskea skistosyyttien osuus (>5%).
 - 1. TT ja aPTT ovat normaalit, sillä hyttymiskaskadi ei ole häiriintynyt.
 - 2. TTP:n diagnoosin varmistaa matala ADAMTS13-aktiivisuus

SEKUNDAARISEN HEMOSTAASIN HÄIRIÖITÄ

I. SEKUNDAARISEN HEMOSTAASIN JA FIBRINOLYYSIN LABORATORIOKOKKEET

A. Tromboplastiiniaika (P-TT)

1. Mittaa ulkoisen (VII) ja yhteisen hyttymisjärjestelmän (II, X) toimintaa, tarkemmin ottaen siis K-vitamiiniriippuvaisten hyttymistekijöiden II, VII ja X yhteisvaikutusta; FIX on myös K-vitamiiniriippuvainen mutta ei sisälly TT-tulokseen.
 - a. Suomessa käytetään Owrenin metodia, kun taas lähes kaikkialla muualla käytetään Quickin metodia (pl. muut pohjoismaat, Japani ja Benelux-maat).
 - b. HUOM! Muissa maissa testistä käytetään termiä protrombiiniaika, joten englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään termiä PT. TT on englanninkielisessä kirjallisuudessa trombiiniaika (suomalainen lyhenne Trombai).

B. Aktivoitu partiaallinen tromboplastiiniaika (P-APTT)

1. Mittaa sisäisen (XII, XI, IX, VIII) ja yhteisen hyttymisjärjestelmän (II, V, X, I) toimintaa.
2. Käytetään erityisesti hepariinihoidon ja muiden antikoagulaatiohoitojen seurannassa.

C. International normalized ratio (P-INR)

1. Lasketaan tromboplastiiniajan tuloksesta ja kertoo, kuinka paljon hitaammin potilaan veri hyttyy verrattuna normaaliin TT-aikaan.
2. Käytetään erityisesti varfariinihoidon seurannassa.

D. D-dimeeri (P-FiDD)

1. D-dimeeri on fibriinin (ei fibrinogeenin) hajoamistuote eli sen arvo kohoaa fibrinolyysin seurauksena.
2. Käytetään esim. SLT, KE ja DIC tutkimisessa.

II. YLEISESTI SEKUNDAARISEN HEMOSTAASIN HÄIRIÖISTÄ

- A. Sekundaarisen hemostaasin häiriöt johtuvat yleensä hyttymistekijöiden puutteista tai häiriöistä.
- B. Ilmenevät yleensä isompina ja syvempinä verenvuotoina kuin primaarisen hemostaasin häiriöt, esim. verenvuotoina lihaksiin ja niveliin tai kirurgisten leikkauksen jälkeisinä verenvuotoina.

III. HEMOFILIA

- A. Hemofiliat ovat X-resessiivisesti periytyviä verenvuototauteja, jotka perustuvat hyytymistekijöiden puutoksiin.
1. Hemofilia A:ssa puute hyytymistekijästä VIII (yleisin)
 2. Hemofilia B:ssä puute hyytymistekijästä IX
 3. Hemofilia C:ssä puute hyytymistekijästä XI (selvästi harvinaisin; autosomissa resessiivisesti)
- B. Ilmenevät yleensä mustelmataipumuksena sekä spontaaneina tai vähäisen trauman jälkeisinä verenvuotoina, jotka kohdistuvat erityisesti niveliin (hemartroosi), lihaksiin ja pehmytkudoksiin.
1. Hemofilia A ja B ovat kliinisesti mahdottomat erottaa, mutta B on paljon harvinaisempi.
 2. Toistuvat hemartroosit samaan niveleen voivat aiheuttaa rampauttavaa artropatiaa.
- C. Diagnostiikka:
1. Kohonnut aPTT, normaali TT; aPTT korjautuu sekoittamalla normaalia plasmaa potilaan näytteeseen
 2. Matalat FVIII- tai FIX-aktiivisuustasot; potilaan plasman vaikutus tunnetuun FVIII- tai FIX-puutosplasmaan.
- D. Hoitona FVIII- tai FIX-korvaushoito eli annetaan puuttuvaa hyytymistekijää.
1. Jos aiemmin hyvä hoitovaste menetetään, tulee epäillä hyytymistekijävasta-aineiden muodostumista (yleisempää hemofilia A:ssa, n. 25% potilaista).
 - a. Harvinainen ei-perinnöllinen hemofilia, hankittu hemofilia, syntyy kehon tuottaessa autovasta-aineita jotain hyytymistekijää vastaan.

IV. K-VITAMIININ PUUTE

- A. K-vitamiini aktivoituu maksassa epoksidaasientsyymillä (VKOR) katalysoimana, ja aktivoitu K-vitamiini gammakarboksyloi hyytymistekijöitä II, VII, IX, X sekä proteiineja C ja S.
1. Gammakarboksylaatio on välttämätön vaihe näiden tekijöiden toiminnassa, joten K-vitamiinin puute johtaa verenvuototaipumukseen.
- B. Tavataan usein vastasyntyneillä sekä esim. sairaalapotilaalla, jolla imeytymistä häiritsevä suolistosairaus tai laajakirjoinen antibioottihoito.
1. Vastasyntyneillä suolisto ei ole vielä kolonisoitunut K-vitamiinia tuottavilla bakteereilla.
 - a. Vastasyntyneille annetaankin ennaltaehkäisevästi K-vitamiinipistos, joka estää vastasyntyneen verenvuototaudin.
 2. Imeytymistä häiritsevä suolistosairaus johtaa rasvaliukoisten vitamiinien puutteeseen (A-, D-, E- ja K-vitamiini ovat rasvaliukoisia).
 3. Pitkäkestoinen laajakirjoinen antibioottihoito tuhoaa suoliston K-vitamiinia tuottavia bakteereita.

V. MUUT SYYT

- A. Yleisimmät hemostaasin häiriöt liittyvät maksan tai munuaisten vajaatoimintaan.
1. Maksa tuottaa hyytymistekijät ja toimii K-vitamiinin aktivaatiopaikkana, joten maksan vajaatoiminta esimerkiksi kirroosin seurauksena aiheuttaa vuototaipumusta.
 2. Portaalihypertensio johtaa splenomegaliaan ja sitä kautta verihiutaleiden varastoitumiseen pernaan.

- a. Maksan tuottama trombopoietiini voi myös olla vähässä, joten verihiutaleiden tuotanto voi olla heikkoa.
- 3. Toisaalta maksakirroosipotilaiden luonnollisten antikoagulanttien (esim. antitrombiinin ja proteiini C:n) tuotanto on heikkoa sekä vaurioitunut maksa putsaa verta vähemmän tehokkaasti aktivoituneista hyytymistekijöistä; lisäävät riskiä trombooseille.
- B. Munuaisten krooninen vajaatoiminta johtaa uremiaan ja siten ureemiseen trombosytopeniaan.
 - 1. Ureemiset toksinit häiritsevät trombosyyttien toimintaa ja siten hemostaasia.
 - a. Enemmänkin primaarisen hemostaasin syy.

SEKÄ PRIMAARISEN ETTÄ SEKUNDAARISEN HEMOSTAASIN YHTEISHÄIRIÖ

I. VON WILLEBRANDIN TAUTI

- A. Von Willebrandin tauti on yleisin perinnöllinen verenvuototauti (Suomessa potilaita noin 2 000)
- B. Jaetaan kolmeen eri päätyyppiin (1-3), joista tyypin 1 on yleisin sekä lieväasteisin.
 - 1. Tyyppi 1 (60-80%) – vW-tekijän puute
 - 2. Tyyppi 2 (15-30%) – vW-tekijän toiminnallinen häiriö
 - 3. Tyyppi 3 (5-10%) – vW-tekijän vakava puute tai täydellinen uupuminen
- C. Tyyppi 1 ilmenee usein lievinä verenvuotoina limakalvoilla ja iholla, yleisimpinä oireina siis mustelmataipumus, epistaksis (nenäverenvuoto) ja naisilla menorragia.
- D. Tyypin 1 diagnostiikka:
 - 1. Verenvuototaipumuksen arvioimiseksi tarkoitetut testit, kuten trombosyyttien määrä, INR, TT ja aPTT ovat lähes aina normaaleja, mutta aPTT voi olla pidentynyt.
 - a. vW-tekijä normaalisti stabiloi hyytymistekijää VIII, joten vW-tekijän ollessa vähäistä FVIII:n puoliintumisaika pienenee.
 - b. Spesifinen laboratoriodiagnoosi tehdään hyytymistekijäaktiivisuusmääritysten (P-vWF-Akt, P-vWFCB, p-FVIII) sekä vW-tekijän pitoisuuden (P-vWF-Ag) ja rakenteen mukaan (multimeerianalyysi).
 - i. Diagnostiset kriteerit edellyttävät kaikilla vuoto-oiretta ja kahta poikkeavaa vWF-aktiivisuustulosta (yleensä alle 40 % normaalista)
 - c. Voidaan käyttää myös PFA-laitetta kuten muiden primaarisen hemostaasin häiriöiden tutkimisessa. Vasteet heikentyneet.
- E. Hoitomahdollisuuksia lievässä tautimuodossa:
 - 1. Traneksaamihappo – antifibrinolyytti
 - 2. Desmopressiini – vapauttaa kudosten Weibel-Paladen kappaleisiin varastoitunutta vW-tekijää
 - 3. Vakavammassa tautimuodossa korvaushoito (vW-tekijä ja mahd. myös FVIII)

II. DISSEMINOITUNUT INTRAVASKULAARINEN KOAGULAATIO (DIC-OIREYHTYMÄ, DIK)

- A. Veren laaja-alainen kiihtynyt patologinen hyytyminen, jonka seurauksena trombeja muodostuu systeemisesti.
 - 1. Useat mikrotrombit voivat aiheuttaa pääte-elinten iskemiaa ja infarkteja.
 - a. Voi johtaa monielinvaurioon, jossa usean elimen toiminta hiipuu.
 - 2. Trombosyyttien ja hyytymistekijöiden kuluminen sekä fibrinolyysin aktivaatio trombien muodostuksesta johtuen aiheuttaa verenvuotoja (konsumptiivinen koagulopatia).

- B. Kyseessä ei ole itsenäinen sairaus, vaan voi syntyä useiden eri laukaisevien tekijöiden komplikaationa (laaja endoteelivaurio tai endoteelin dysfunktio johtaa hyperkoagulatiiviseen tilaan):
1. Sepsis – Bakteerien erittämät endotoksiinit indusoivat endoteelisoluja tuottamaan kudostekijää.
 2. Trauma – Suuri kudოსvaurio johtaa tulehdukseen ja kudostekijän vapautumiseen.
 3. Obstetrinen komplikaatio (esim. istukan ennenaikainen irtoaminen) – Kudostekijä istukassa tai lapsivedessä aktivoi hyytymistä.
 4. Maligniteetti (erityisesti adenokarsinoomat ja akuutti promyelosyyttinen leukemia):
 - a. Kasvainsolukon erittämät interleukiinit ja TNF indusoivat kudostekijän erityistä endoteelisolukosta.
 - b. Kasvaimet voivat vapauttaa nekroottista kudosta tai kudოსentsyymejä, jotka aktivoivat hyytymistä.
 - c. Adenokarsinoomien tuottama musiini toimii myös hyytymistä edistävänä tekijänä.
 - d. APL:ssä promyelosyyttien primaariset granulat voivat päästä verenkiertoon ja aktivoida hyytymiskaskadin.
- C. Diagnostiikka:
1. Trombosyytit ja fibrinogeeni matalat
 2. TT matala (koska ilmoitetaan aktiivisuusprosentteina) ja aPTT kohonneet
 3. D-dimeerit korkealla (paras seulontakoe)
 4. Mikroangiopaattinen hemolyyttinen anemia (skistosyyttejä) verensivelyvalmisteessa
- D. Hoito:
1. Tärkeintä on hoitaa perussy ja pitää huolta perustoiminnoista.
 2. Vuotavalle potilaalle tai korkean vuotoriskin potilaalle trombosyyttitiivisteitä ja jääplasmaa.

TROMBOOSI

I. PERIAATTEET

- A. Tromboosi tarkoittaa patologisen verihyytymän muodostumista, mikä obstruktoi verenkiertoa.
1. Yleisin sijainti on alaraajojen syvät laskimot (SLT), mutta sekä laskimo- että valtimoverenkierron tromboosit ovat mahdollisia.
- B. Vichowin triadi kuvastaa tromboosin kolmea riskitekijäluokkaa eli endoteelivauriota, veren lisääntynyt hyytymistäipumusta ja veren virtauksen muutoksia.

II. ENDOTEELIVAUURIO

- A. Endoteelivaurio paljastaa subendoteelista kollageenia ja vW-tekijää, sekä häiritsee endoteelin antitromboottisia toimintoja.
- B. Ehjä endoteeli toimii pääasiassa antitromboottisesti vaikuttamalla sekä verihiutaleisiin, hyytymistekijöihin että fibrinolyyysiin.
1. Ehjä endoteeli estää verihiutaleiden kontaktin subendoteelisen kollageenin ja vW-tekijän kanssa sekä tuottaa lukuisia tekijöitä, jotka estävät trombosyyttien aktivaatiota ja aggregaatiota (PGI₂, NO, adenosiinidifosfataasi).
 2. Endoteelisolujen erittämä tPA muuttaa plasminogeenia plasmiiniksi, joka pilkkoo fibrinogeenia ja tuhoaa koagulaatitekijöitä.

- C. Endoteeli erittää ja esittää pinnallaan myös hyytymistekijöiden toimintaa estäviä tekijöitä, kuten hepariinisulfaattia, trombomoduliinia ja kudostekijätien estäjää (TFPI)
1. Hepariinisulfaatti endoteelin pinnassa aktivoi antitrombiini III:a, joka inaktivoi trombiinia ja hyytymistekijöitä IXa, Xa, XIa ja XIIa.
 2. Trombomoduliini endoteelin pinnassa ohjaa trombiinia aktivoimaan proteiini C:tä (vaatii proteiini S:n kofaktoriksi).
 - b. Aktivoitunut proteiini C/proteiini S-kompleksi estää hyytymistekijöitä Va ja VIIIa.
 - c. Proteiini C ja S ovat hyytymistekijöiden tapaan maksan tuottamia.
 3. TFPI vaatii myös proteiini S:n kofaktorikseen, ja inaktivoi hyytymistekijää VIIa ja Xa:ta.
- D. Mm. hypertensio, ateroskleroosi, aneurysmat, vaskuliitit, homokystinuria ja tupakointi ovat riskitekijöitä endoteelivaurion tuottamalle tromboosille.

III. VEREN LISÄÄNTYNYT HYYTYMISTAIPUMUS

- A. Yleensä muutokset hyytymistekijöissä tai niiden estäjissä aiheuttaa lisääntynyttä taipumusta tromboosin kehittymiselle; voivat olla primaarisia eli perinnöllisiä tai sekundaarisia eli hankinnaisia (yleisempiä).
- B. Yleisin perinnöllinen tukosalttiustila (trombofilia) on faktori V Leiden, eli hyytymistekijä V:n geenivirhe, joka tekee FV:stä epäherkän sitä hajoittavalle proteiini C:lle.
1. N. 3% suomalaisista
 2. Ilmenee (kuten muutkin lisääntyneen hyytymistaipumuksen perinnölliset taudit) syvinä laskimotukoksina (SLT) nuorena iässä.
- C. Protrombiinin mutaatio G20210A on toiseksi yleisin perinnöllinen tukosalttiustila.
1. Lisää protrombiinin geeniekspressiota, mikä lisää trombiinin määrää.
- D. Perinnölliset puutokset antikoagulantteissa, kuten AT III:n ja proteiinien C/S puutokset.
1. Lisää riskiä varfariinin aiheuttamalle harvinaiselle ihonekroosille, joka johtuu ihonalaisen rasvakerroksen laskimoiden ja kapillaarien trombooseista.
 - a. Proteiinilla C on lyhyt puoliaika verrattuna hyytymistekijöihin II, IX ja X.
 - b. Varfariini estää näiden kaikkien gammakarboksylaatiota
 - c. Jos proteiineista C ja S on jo ennen hoitoa puutetta, muodostuu hoidon alkaessa vahvasti tromboottinen tila, sillä proteiineja C ja S ei ole lähes ollenkaan estämässä vielä jäljellä olevia hyytymistekijöitä.
- E. Yhdistelmäehkäisytablettien käyttö ja raskaus ovat yleisiä hankinnaisia tukosalttiustiloja.
1. Estrogeeni lisää hyytymistekijöiden synteesiä.

IV. VEREN VIRTAUKSEN MUUTOKSET

- A. Verenkierron turbulenssi ja staasi lisäävät tromboosiriskiä.
1. Normaalisti verenvirtaus on laminaarista, mikä pitää verihiutaleet ja muut solut suonien lumenin keskellä endoteelistä kaukana.
- B. Aiheuttajia ovat esimerkiksi:
1. Liikkumattomuus – Pitkäkestoinen paikallaanolo, kuten pitkät lennot tai pitkä vuodehoito, heikentävät laskimopaluuta ja siten lisäävät laskimotrombien riskiä.

2. Sydäninfarkti – Huonosti supistuva kammionseinämä johtaa veren paikalliseen staasiin ja siten seinämänmyötäisiin hyytymiin (muraalinen trombi).
3. Sydänläppien deformaatiot ja infektiot aiheuttavat turbulenttia virtausta ja siten altistavat läppätrombooseille (vegetaatio).
4. Arrytmiat, kuten eteisvärinä, voivat häiritä normaalia supistumista, mikä johtaa staasin kautta hyytymiin.

V. TROMBIEN PIIRTEET

- A. Ruuminavauksessa tavatuista trombeista on mahdollista päätellä, ovatko ne elinaikaina vai kuoleman jälkeen (agonaalinen trombi) syntyneitä.
- B. Elinaikana syntyneelle trombille on ominaista Zahnin linjat ja kiinnittyminen verisuonen seinämään.
 1. Zahnin linjat muodostuvat kalpeista verihiuta- ja fibriinikerroksista ja tummista punasolukerroksista, jotka voidaan tunnistaa mikroskopoinnissa. (Kuva 4.2.)
 - a. Kerrosteisuus on selkeämpää valtimo- kuin laskitrombeissa veren virtauksen aktiivisuuden takia.
 - i. Laskimotrombit sisältävät myös valtimotrombeja enemmän punasoluja (punaiset trombit vs valkeat trombit).

EMBOLIA

I. PERIAATTEET

- A. Trombeille voi tapahtua pääasiassa neljä eri asiaa kasvamisen lisäksi: dissoluutio, organisaatio, rekanalisaatio tai embolisaatio.
 1. Dissoluutio – Fibrinolyysin aktivaatio (joko fysiologinen tai lääkkeiden avulla) voi mahdollisesti tuhota nuoren trombin kokonaan, mutta vanhat (muutama tunti) vastustavat jo lyysiä.
 - a. Esim. alteplaasia (trombolyytti) ei yleensä käytetä enää 4,5 tuntia aivohalvauksien alkamisen jälkeen.
 2. Vanhemmat trombit organisoituvat haavan paranemisprosessin kaltaisesti granulaatiokudoksen ja uusien hiussuonirakenteiden avulla, ja lopulta jäljelle jää vain vaskularisoitu fibroottinen massa verisuonen seinämässä.
 - a. Verisuonen lumeni voi avautua eli rekanalisoitua, jos proliferoituvat verisuonet hajottavat arpikudosta ja yhdistyvät suuremmiksi verisuoniksi.
 3. Embolisaatio tarkoittaa trombin irtoamista ja kulkemista verenkierron mukana uuteen paikkaan tulpaksi (tromboembolia).
- B. Embolus on siis verenkierron mukana siirtynyt minkä tahansa massan muodostama tulppa.
 1. Tromboembolia eli irronnut trombi on yleisin aiheuttaja (99%).
- C. Muita mahdollisia materiaaleja emboluksille ovat esim. kolesteroliembolia, rasvaembolia, ilmaembolia ja amnionembolia.
 1. Kolesteroliembolia on peräisin valtimon seinämän rikkoutuneesta ateroomasta.
 2. Rasvaembolia syntyy yleensä luunmurtuman seurauksena, kun luuytimen rasvaa vapautuu ja kulkee verenkierron kautta keuhkokapillaareihin ja jopa aivojen pieniin suoniin.

- a. Rasvapartikkelit tukkivat sekä suoraan että trombosyyttien aggregaatiota aiheuttamalla verisuonia.
 - b. Ilmenee dyspneana, neurologisina oireina ja petekkiaihohtumana erityisesti rinnan alueella.
3. Ilmaemboliassa verenkiertoon pääsee tai syntyy kaasukuplia. Voi tapahtua esimerkiksi kirurgisissa leikkauksissa (kuten laparoskooppisissa suoliston leikkauksissa) tai sukeltajantaudissa (dekompressiotauti).
 - a. Korkeassa paineessa sukeltajan verenkiertoon ja kudoksiin liukenee paljon typpikaasua.
 - b. Jos nousu takaisin pinnalle toteutetaan liian nopeasti, tätä tyypeä ei ehditä hengittää ulos ja sukeltajan verenkiertoon ja kudoksiin syntyy kuplia.
 - c. Ilmenee nivel- ja lihaskipuina (bends), hengityksen vaikeutena (chokes) ja jopa keskushermoston häiriintymisellä.
 - d. Hoidetaan puhtaan happen hengittämisellä ja painekammiohoidolla.
4. Amnionembolia voi syntyä synnytyksen yhteydessä, kun amnionnestettä vapautuu äidin verenkiertoon (harvinaisia, n. 1/40 000 synnytystä).
 - a. Ilmenee hengenahdistuksena, syanoosina, sokkina ja lopulta kouristuksina ja tajuttomuutena.
 - b. Alkuoireista selvinneille yleensä kehittyy keuhkoedeema ja DIC (amnionnesteen materiaali on trombogeenistä).
 - c. 80% tapauksista fataaleja.

II. KEUHKOEMBOLIA

- A. Lähes aina tromboembolioita, yleensä alaraajalaskimosta lähtöisin (SLT).
 1. Laskimoissa syntyvät tromboemboliat jäävät lopulta keuhkoverenkiertoon (ellei ole eteisväliseinän aukkoa, joka mahdollistaisi paradoksaalisen embolian).
- B. Pienet emboliat päätyvät pieniin keuhkovaltimohaaroihin eivätkä aiheuta kliinisesti merkittäviä oireita (itsestään rajoittuvia)
 1. Lisäksi, keuhkoja ”ruokkii” kaksi eri valtimostoa (pulmonaariset sekä bronkiaaliset valtimot), joten vaikka pieni embolia tukkisi pienen valtimon, tämän valtimon ruokkima alue ei infarktoituisi.
- C. Keskikokoiset ja suuret emboliat tukkivat keskikokoisia keuhkovaltimoita, ja aiheuttavat normaalisti hemorragian ilman infarktia.
 1. Jos potilaalla on valmiiksi kompromisoitu bronkusten verenkierto (vasemman kammion vajaatoiminta), voi seurata myös infarkti (punainen, kiilanmuotoinen).
 2. Ilmenevät hengenahdistuksena, veriyskänä, pleuriittisena rintakipuna ja pleuraalisena effuusiona.
 3. Vahvasti epäiltäessä keuhkoemboliaa voidaan tehdä spiraalitietokonekromografia tai alaraajojen kaikututkimus.
 4. D-dimeerit ovat koholla.
- D. Jos embolia on erityisen kookas, pystyy se jäädä ratsastamaan keuhkovaltimoiden runkohaaraan (satulaembolia).
 1. Voi johtaa oikean kammion akuuttiin ylikuormitukseen (akuutti cor pulmonale) ja äkkikuolemaan.

- E. Keuhkoembolioilla on suuri uusiutumiskiriski ja usein toistuvat keuhkoemboliat voivat organisoituessaan aiheuttaa pulmonaalista hypertensiota.

III. VALTIMOVERENKIERRON EMBOLIAT

- A. Systeemiset tromboemboliat ovat yleensä (80%) peräisin sydämen vasemman puoliskon muraalisista trombeista.
- B. Yleensä kulkevat alaraajoihin (75%), joskus aivoihin (10%).

5 ANEMIA

ANEMIA

I. PERIAATTEET

- A. Veren punasolumassa tai hemoglobiinin määrä on matala, jolloin hapen kuljetus huononee.
- B. Ilmenee hypoksiana ja oireet ovat sitä voimakkaammat, mitä vaikeampi ja nopeammin kehittynyt anemia on (hiljalleen kehittyneen oireet voivat olla hyvin vähäisiä).
1. Heikkous, väsymys, pääkipu ja hengenahdistus
 2. Kalpeus (erityisesti alasilmäluomen sisäpuoli vaaleampi kuin normaalisti)
 3. Hemolyysin yhteydessä ikterus ja sappikivet
- C. Punasolumassaa on vaikeaa mitata, joten voidaan ottaa perusverenkuva B-PVKT, joka näyttää mm. hemoglobiinin (B-Hb), hematokriitin (B-Hkr) ja veren punasolujen määrän (B-Eryt).
1. B-Hb alaraja miehillä 134g/l, naisilla 117 g/l
 2. Hematokriitti ilmoittaa, kuinka suuri tilavuusosuus verestä on punasoluja (miehet 39-50%, naiset 35-46%)
 3. B-Eryt-arvoa ei juuri käytetä, mutta sen kautta voidaan laskea punasoluindeksiä (E-MCV, E-MCH, E-MCHC, E-RDW)
- D. Punasoluindeksiä MCV (punasolujen keskitilavuus) voidaan käyttää anemian luokitteluun punasolujen koon perusteella.
1. Mikrocyttäärinen (/syyttinen) (MCV < 80fl)
 2. Normocyttäärinen (MCV = 80-100fl)
 3. Makrocyttäärinen (MCV > 100fl)
- E. Anemiat voidaan jaotella myös syntyvän perusteella:
1. Punasolujen tuotantohäiriöistä johtuvat
 2. Punasolujen lisääntyneestä menetyksestä johtuvat (verenvuoto/hemolyysi)

MIKROSYTTISET ANEMIA

I. PERIAATTEET

- A. Mikrocyttiset anemiat ovat anemioita, joissa punasolujen keskitilavuus on alle 80 fl.
- B. Johtuvat hemoglobiinin vähäisestä tuotannosta.
1. Erythroblasti jakautuu yhä pienemmiksi tytarsoluiksi lopulta tuottaen kypsän punasolun.
 2. Jos hemoglobiinin tuotanto on vähäistä, punasolun esiaste jakautuu yhden "ylimääräisen" kerran.
 - a. Tavoitteena on ylläpitää sopiva hemoglobiinkonsentraatio punasolussa.

C. Hemoglobiini tuotetaan hemistä ja globiinista.

1. Hemi koostuu raudasta ja protoporfyrinistä.
2. Puute mistä tahansa näistä rakennusosista voi aiheuttaa mikrosyyttistä anemias.

D. Mikrosyyttisiä anemioita ovat raudanpuuteanemia, tulehdusanemia (kroonisen taudin anemia), sideroblastinen anemia (perinnöllinen) ja talassemiat.

II. RAUDANPUUTEANEMIA

A. Raudanpuute on anemian tavallisin syy.

1. Kehittyneissä maissa johtuu useimmiten lisääntyneestä verenhukasta (runsas kuukautiset/GI-kanavan verenvuodot).
 - a. Fertiili-ikäisillä naisilla kuukautisvuoto selittää suurimman osan raudanpuuteanemioista.
 - b. Miehillä/Postmenopausaalisilla naisilla raudanpuute on aina poikkeavaa ja useimmiten johtuu suolistoverenvuodosta tai malabsorptiosta (esim. keliakia)
 - i. Myös gastrektomian jälkeen ilmenee malabsorptiota, joka voi aiheuttaa normaalisti riittävällä ravinnollakin raudanpuutetta.
2. Kehitysmaissa erityisesti ravintopuutokset taustalla; myös suolistolaiset yleinen aiheuttaja.

B. ↓ rauta -> ↓ hemi -> ↓ hemoglobiini -> ↓ mikrosyyttinen anemia

1. Rautaa elimistössä miehillä keskimäärin 3,5g ja naisilla 2,5g; normaalisti menetetään 1-2mg/vrk (mukoosan ja ihon epiteelisolujen normaali menetys).
 - a. Suurin osa raudasta on hemoglobiinissa.

C. Rauta imeytyy ohutsuolen alkuosassa.

1. Hemirauta (Fe^{2+} kiinnittyneenä proteiinikompleksiin, liharuoasta) imeytyy helposti ja kulkeutuu duodenaaliseen enterosyyttiin hemitransportterin.
 - a. Ei-hemirauta (Fe^{3+} , kasviksista) muuttuu ferriraudaksi (Fe^{2+}) duodenumissa duodenaalisen sytokromi b:n katalysoimana.
 - i. Kulkee enterosyyttiin DMT1-transportterin kautta.
 - b. Mahahappo ja vitamiini C:n auttavat raudan imeytymisessä.
 - i. Hapan ympäristö lisää ferriraudan muuttamista ferriraudaksi ja estää ferriraudan oksidaatiota ferriraudaksi (ohutsuolen alkuosa on hapan mahahappojen takia -> suurin osa imeytymisestä duodenumissa ja proksimaalisessa jejunumissa).
2. Enterosyytit kuljettavat raudan ulos solusta verenkiertoon ferroportiinin kautta.
 - a. Maksan tuottama hepsidiini sitoutuu ferroportiiniin GI-mukoosassa ja makrofageissa inhiboiden raudan absorptiota.
 - i. Suuri rautapitoisuus plasmassa sekä tulehdus lisää hepsidiinin määrää.
 - b. Jos ei pääse siirtymään plasmaan, se säilötään mukoosan soluissa ferritiininä, joka eritetään ulosteiden mukana mukoosan solujen kuollessa.

3. Verenkierrrossa rauta kulkee sitoutuneena maksan tuottamaan transferriiniin, joka kuljettaa sen mm. maksaan, luuytimeen ja makrofageihin.
4. Raudan varastomuoto on pääosin ferritiini.
 - a. Vapaat rautaionit muodostavat helposti vapaita radikaaleja Fentonin reaktion kautta, joten ne tulee säilöä sitoutuneessa muodossa.

D. Diagnostiikka:

1. Veren sivelyvalmisteessa hypokromisia ja mikrosyyttisiä punasoluja (alkuvaiheissa saattaa olla normosyyttinen vielä). (Kuva 5.1.)
 - a. Kun verenkuvaa-analysointilaitteiden tuottama tieto on lisääntynyt, on veren sivelyvalmisteen käyttö anemiadiagnostiikassa vähentynyt.
2. Raudanpuute todetaan verikokeilla:
 - a. Seerumin rauta (S-Fe) – Kuvaa verenkierrossa transferriiniin sitoutuneen raudan määrää
 - i. Aiemmin käytetty, mutta hyvin herkkä ulkoisille tekijöille; nykyään käytössä vain rautamyrkytyksen tutkimisessa.
 - b. Transferriinireseptori (P-TfR) – Kuvastaa transferriinin vastaanottajamolekyylien määrää (suurin osa luuytimen punasoluja tuottavassa solukossa).
 - i. Koholla raudanpuutteessa.
 - c. Transferriinisaturaatio (fS-TfFeSat) – Kuvaa, kuinka suuri osa mitatusta transferriinista kuljettaa rautaa (norm. n. 1/3).
 - i. Raudanpuutteessa saturaatio matala (vrt. transferriinireseptorien määrään joka koholla)
 - ii. Indikaatio hemokromatoosiepäilyissä ja -seurannassa, käytetään hyvin usein myös raudanpuutediagnostiikassa (erityisen hyvä funktionaalisen raudanpuutteen diagnosoimiseen; ota ainakin CKD- tai HFrEF-potilailla).
 - d. Ferritiini (P-Ferrit) – Elimistön rautavarastojen mittari
 - i. Herkin biokemiallinen mittari raudanpuutteelle on samanaikainen transferriinireseptorin pitoisuuden suureneminen ja ferritiinipitoisuuden pieneneminen.
3. Akuutin vaiheen reaktiot häiritsevät tulkintaa.
 - a. Ferritiinipitoisuus nousee tulehduksessa, jonka vuoksi suuri ferritiinipitoisuus ei välttämättä poissulje raudanpuutetta.
 - b. TfR taas ei muutu akuutin vaiheen reaktioiden seurauksena, jonka vuoksi se on erityisen hyödyllinen raudanpuuteanemian tutkimisessa.
4. Reaktiivinen trombosytoosi yleistä raudanpuutteelle.
 - a. Anemia -> ↑ EPO -> erytropoieesi vähäistä raudanpuutteen takia -> EPO stimuloi trombopoieesia, joka ei vaadi samalla tavalla rautaa
 - b. Mahdollisesti raudalla on myös trombopoietiniin (TPO) tuotantoa inhiboiva vaikutus -> raudanpuutteessa hepatosyytit tuottavat enemmän TPO -> ↑ trombopoieesi

E. Muita mahdollisia kliinisiä havaintoja tyypillisten anemiaoireiden lisäksi:

1. Hauraat kynnet ja koilonykia (lusikkakynsi) (Kuva 5.2.)
2. Pica-oireet eli halu syödä ravinnottomia aineita, kuten savea tai betonia

3. Suupielten haavaumat (angulaarinen keiliitti) sekä kielen atrofisen tulehdus (glossiitti, sileä kieli)
 4. Levottomat jalat -oireyhtymä
- F. Hoito toteutetaan rautalääkityksellä, joka yleensä korjaa anemian muutamassa kuukaudessa.
- III. TULEHDUSANEMIA (KROONISEN TAUDIN ANEMIA)
- A. Usein kutsutaan myös kroonisen taudin anemiaksi, sillä on yhteydessä kroonisiin tulehdustiloihin (krooniset infektiot, tulehdussairaudet ja syöpätaudit).
1. Yleisin anemiatyyppi sairaalapotilailla; toiseksi yleisin anemia ylipäätään Suomessa.
- B. Tulehdussairauksissa vapautuvat sytokiinit vähentävät erytropoietiinin (EPO) tuotantoa ja lisäävät maksassa hepsidiinin tuotantoa.
1. Hepsidiini estää ferroportiinia suolistossa (imeytyminen vähenee) ja makrofageissa, joka estää raudan siirron makrofageilta punasolujen esiasteille - > punasolujen tuotanto heikkoa.
- C. Diagnostiikka:
1. Varsinkin alkuvaiheissa voi olla normosyyttinen ja normokrominen, mutta kehittyessään pidemmälle hypokromia ja mikrosyyttinen morfologia voivat muodostua.
 - a. Tulehdusanemia on yleisin normosyyttinen anemia; normosyyttinen ja normo-/hypokrominen muoto on siis paljon yleisempää kuin mikrosytääriseksi asti kehittyminen.
 2. Ferritiini koholla, transferriinireseptori normaali ja rautakylläisyys matala (ja hepsidiini koholla, ei kuitenkaan mitata yleensä). Tulehdusarvot La ja CRP tyypillisesti koholla.
 - a. Ei retikulosytoosia.
 - b. Vertaa raudanpuuteanemiaan, jossa P-TfR koholla ja P-Ferrit matala (ja hepsidiini matala).
 - i. Jos anemia on mikrosyyttinen, mitään pitkäaikaissairautta ei ole löydettävissä eikä laskokaan ole suurentunut, raudanpuuteanemia on hyvin todennäköinen
 - ii. On myös kombinoitu muoto, jossa P-TfR koholla ja P-Ferrit tyypillisesti viitealueella (ja hepsidiini koholla). Tulehdusanemia etenee todennäköisemmin mikrosytääriseksi, jos sen yhteydessä on myös raudanpuutetta.
- D. Hoitona taustahäiriön hoito.
- IV. SIDEROBLASTINEN ANEMIA
- A. Protoporfyriinin synteesin häiriö aiheuttaa anemiasa.
- B. Protoporfyriinin synteesi tapahtuu useassa eri vaiheessa.
1. Aminolevuliinihapposyntaasi (ALAS) muuttaa sukkinyyli-CoA:n ja glysiinin aminolevuliinihapoksi (ALA); ALAS vaatii B6-vitamiinin kofaktorikseen.
 2. ALAD muuttaa ALA:n porfobilinogeeniksi
 3. Porfobilinogeeni muutetaan protoporfyriiniksi.
- C. Ferrokelataasi yhdistää raudan protoporfyriiniin punasolujen esiasteiden mitokondrioissa.

1. Jos protoporfyriinistä on puutetta, rauta kertyy mitokondrioihin.
 2. Raudantäytteiset mitokondriot muodostavat punasolun esiasteen tuman ympärille renkaan (rengassideroblasti). (Kuva 5.3.)
- D. Synnynnäinen on hyvin harvinainen (ALAS-entsyymipuute), hankinnaiset voivat johtua monista eri syistä:
1. Alkoholismi (muista poiketen yleensä makrosyyttinen) – estää ALAS ja vaurioittaa mitokondrioita; yleisin aiheuttaja.
 2. Lyijymyrkytys – estää ALAD ja ferrokelataasia
 3. B6-vitamiinin puute (usein tuberkuloosissa käytetyn isoniatsidihoidon sivuvaikutus) – kofaktori ALAS-entsyymille
- E. Laboratorihavainnot:
1. Korkea ferritiini, seerumin rauta sekä transferriinisaturaatio (näyttää siis hyvin samanlaiselta kuin hemokromatoosi).

V. TALASSEMIAT

- A. Talassemiat ovat perinnöllisiä häiriöitä alfa- tai beetaglobiinin tuotannossa.
1. Globiinia tarvitaan hemoglobiinin tuotantoon, joten puute globiinissa johtaa Hb:n puutteeseen ja mikrosytääriseen anemiaan.
 2. Yleisiä Välimeren alueella ja Afrikassa sekä Intiassa, uskotaan suojaavan malarialta.
- B. Aikuisten yleisin hemoglobiini, HbA, on tetrameeri, joka koostuu kahdesta alfaketjusta ja kahdesta betaketjusta.
1. HbA₂ on paljon vähäisemmissä määrissä havaittava (2-3%) aikuisen hemoglobiini, joka koostuu kahdesta alfaketjusta ja kahdesta deltaketjusta.
 2. HbF on normaali sikiön hemoglobiini, joka koostuu kahdesta alfaketjusta ja kahdesta gammaketjusta.
- C. Talassemioissa HbA:n muodostuminen on heikkoa, mikä johtaa mikrosyyttisten ja hypokromisten punasolujen tuotantoon.
- D. Alfatalassemioissa vika johtuu geenideleetio(i)sta alfa globiinigeeneissä.
1. Normaalisti kaksi alfa globiinigeeniä on kummassakin kromosomissa 16.
 2. Yksi deleetio -> oireeton
 3. Kaksi deleetiota -> lievä anemia ja kohonnut punasolujen määrä
 4. Kolme deleetiota (HbH-tauti) -> vakava anemia
 - a. Beetaketjujen suhteellinen ylimäärä johtaa beetatetrameerien muodostumiseen (HbH), mikä vaurioittaa punasoluja.
 5. Neljä deleetiota -> Letaali (hydrops fetalis), sillä kaikki hemoglobiini on gammaketjujen tetrameeterejä (Bartsin hemoglobiinia).
- E. Beetatalassemia johtuu pistemutaatioista beetaglobiinigeeneissä.
1. Normaalisti yksi beetaglobiinigeeni kummassakin kromosomissa 11
 2. Beetatalassemia minorissa (β, β^+) vain toinen mutatoitunut -> beetaketjujen ja siten HbA:n tuotto vähenee
 - a. Yleensä oireeton ja kohonnut punasolujen määrä; maalitaulusoluja verisivelyssä (Kuva 5.4.)
 3. Beetatalassemia majorissa (β^0, β^0) molemmat geenit ovat vioittuneita eikä beetaketjuja muodostu lainkaan.

- a. Ylimääräiset alfaketjut aggregoituvat ja aiheuttavat punasolujen hajoamisen (pääasiassa ekstravaskulaarista).
- b. Vastasyntynyt oireeton, koska HbF on protektiivinen muutaman kuukauden ajan syntymän jälkeen.
- c. Luuydintila laajenee massiivisesti (jopa 10-15x) punasolutuotannon kiihtyessä yrittäen korjata kehittyvää anemiasa -> maxillan pullistuminen ja tyypilliset maaoravamaiset kasvot. (Kuva 5.5.)
- d. Myös luuytimen ulkopuoliset kudokset yrittävät tuottaa punasoluja (ekstramedullaarinen hematopoiesi), mikä johtaa hepatosplenomegaliaan.
- e. Korkea riski aplastiselle kriisille parvovirus B19 -infektioissa.
 - i. PVB19 infektoi erytrosyyttien esiasteita, mikä aiheuttaa niiden apoptoosia ja estää punasolutuotantoa.
 - ii. Punasolutuotannon ollessa valmiiksi heikkoa, aiheuttaa PVB19-infektio nopeasti punasolujen vakavan puutteen.

MAKROSYTTINEN ANEMIA

I. PERIAATTEET

- A. Makrosyyttiset anemiat ovat anemioita, joissa punasolujen keskitilavuus on yli 100fl.
- B. Johtuvat yleensä folaatin tai B12-vitamiinin (kobalamiini) puutteesta (megaloblastinen anemia)
- C. Folaattia (B9-vitamiini) ja B12-vitamiinia tarvitaan DNA:n synteesiin.
- D. Folaatin tai B12-vitamiinin puute häiritsee DNA:n synteesiä.
 - 1. Tymidiinin puute aiheuttaa häiriöitä nopeasti jakautuvissa soluissa.
 - 2. Kehittyvien punasolujen jakautuminen häiriintyy ja ne jakautuvat yhden kerran "liian vähän"; osa jopa joutuu apoptoosiin, mikä vähentää punasolujen määrää lisää.
 - 3. Granulosyyttien jakautuminen häiriintyy myös -> hypersegmentoidut neutrofiilit
 - a. Normaalisti neutrofiileilla on 3-4 lohkoa, mutta megaloblastisissa anemioissa usein yli 5. (Kuva 5.6.)
 - 4. Usein havaitaan myös GI-kanavan epiteelisolujen megaloblastisia muutoksia, sillä ne ovat jatkuvasti ja nopeasti jakautuvia.

II. FOLAATIN PUUTE

- A. Folaatin (B9-vitamiini) tärkeimmät lähteet ovat vihreät kasvikset, maksa ja maito.
- B. Folaatti ei kestä pitkään korkeita lämpötiloja ja kulkeutuu helposti keittäessä keittoveteen, joten folaatin puutteelle yleisin syy on ravinnon heikkous.
 - 1. Elimistön folaattivarastot kestävät vain noin 2-3 kuukautta.
 - 2. Myös lisääntynyt tarve (raskaus), puutteellinen imeytyminen (suolistosairaudet, alkoholi) ja monet lääkkeet (esim. fenytoiini, metotreksaatti, trimetopriimi) voivat aiheuttaa puutetta.
- C. Kliiniset havainnot ja laboratoriolöydökset:
 - 1. Sivelnäytteessä makrosyyttisiä punasoluja ja hypersegmentoituneita neutrofiileja
 - 2. Glossiitti
 - 3. Folaattipitoisuus (fS-Folaat) voidaan määrittää, epäselvissä tilanteissa homokysteiinin mittaaminen auttaa.

- a. Homokysteiini on folaatin ja B12-vitamiinin puutteessa lisääntyvä metaboliatuote.
- i. Metyylimalonaattipitoisuudet normaalit.

III. B12-VITAMIININ PUUTE

- A. B12-vitamiini eli kobalamiini on vesiliukoinen vitamiini, jonka tärkeimmät lähteet ovat liha- ja maitotuotteet.
 - 1. Syljen amylaasit vapauttavat B12 eläinproteiineista, jonka jälkeen se sitoutuu syljen haptokorriiniin (HC, R-binder).
 - 2. HC-B12-kompleksi kulkee duodenumiin, jossa haiman proteaasit vapauttavat B12.
 - 3. B12 sitoutuu mahalaukun parietaalisolujen erittämään sisäiseen tekijään (intrinsic factor, IF).
 - 4. IF-B12-kompleksi kulkee distaaliseen ileumiin, jossa se voidaan absorboida.
 - 5. B12 on veressä sitoutunut joko transkobalamiini 1:een (haptokorriini, inaktiivinen) tai 2:een (kuljettaa soluihin eli biologisesti aktiivinen)
- B. B12-vitamiinia on runsaasti saatavilla eri raaka-aineista ja se kestää kokkauksen kuumia lämpötiloja, joten heikon ravinnon seurauksena vain tarkat vegaanit ovat riskialttiita B12:n puutteen puutteelle.
 - 1. Maksan B12:n varastot kestävät myös todella pitkään, minkä takia puutteen muodostumisessa saattaa kestää vuosia.
- C. B12-vitamiinin puute johtuu yleensä puutteellisesta imeytymisestä.
 - 1. Yleisin syy on parietaalisolujen autoimmuuninen tuhoutuminen, mikä johtaa sisäisen tekijän puutteeseen.
 - a. Seurauksena on pernisiöosi anemia.
 - b. Myös kehittyvä hypoklorhydia häiritsee imeytymistä (mahahappo auttaa B12-vitamiinin pilkkoutumista eläinproteiineista irti).
 - 2. Myös H. pylori voi aiheuttaa atrofista gastriittia johtaen B12:n heikkoon imeytymiseen.
- D. Muita syitä heikolle imeytymiselle ovat mm. haiman eksokriininen vajaatoiminta tai distaalisen ileumin vauriot.
 - 1. Haiman proteaaseja tarvitaan vapauttamaan vitamiini HC-B12-kompleksista.
 - 2. Ileumi voi vaurioitua esimerkiksi Crohnin taudissa.
 - 3. Metformiini häiritsee B12:n imeytymistä -> pitkäaikaisessa käytössä kannattaa seurata B12-tasoa
 - 4. Lapamatoinfektiossa (Diphyllobothrium latum) mato kilpailee B12-vitamiinista.
- E. Kliiniset havainnot ja laboratoriolöydökset:
 - 1. Sivelynäytteessä makrosyyttisiä punasoluja ja hypersegmentoituneita neutrofiileja
 - 2. Glossiitti
 - 3. S-B12-TC2 (B12 sitoutuneena transkobalamiini II:een) matala, epäselvissä tilanteissa homokysteiinin (koholla) mittaaminen auttaa.
 - a. Metyylimalonaatti koholla (vrt. folaattipuutokseen)
 - 4. Folaattipuutteen poiketen B12-puute voi esiintyä myös neuropsykiatrisina ja neurologisina oireina.

- a. B12 puutteessa kertyy runsaasti metyyylimalonaattia, joka häiritsee myelinisaatiota ja siten aiheuttaa neurologisia puutosoireita, kuten selkäytimen subakuuttia kombinoitua degeneraatiota (värinäätunnon ja proprioception häviämistä, ataksiaa ja spastisuutta).
- b. Neuropsykiatrisesti voi ilmetä masennuksena ja kognition heikkenemisenä (heikko muisti).

NORMOSYYTTINEN ANEMIA

I. PERIAATTEET

- A. Normosyyttiset anemiat ovat anemioita, joissa punasolujen keskitilavuus on normaali eli n. 80-100fl.
- B. Johtuvat joko perifeerisestä tuhoutumisesta (hemolyysi), vähäisestä tuotannosta tai akuutista ulkoisesta menetyksestä.
 1. Retikulosyyttien määrä auttaa etiologian määrittämisessä.
 2. Yleisin normosytäärinen anemia on kroonisen taudin anemia (voi edetä mikrosytääriseksi).

II. RETIKULOSYYTIT

- A. Punasolut kehittyvät hematopoieettisista kantasoluista.
- B. Retikulosyytit ovat punasolujen epäkypsiä muotoja, jotka voidaan havaita sivelynäytteessä kypsiä punasoluja suurempina soluina, joilla on hieman sininen sytoplasma. (Kuva 5.7.)
- C. Retikulosyyttien viitearvot (E-Retik) ovat 0,6-2% (Tykslab) verenkierron punasoluista ja absoluuttisina arvoina B-Retik 28-91 x E9/l.
 1. Retikulosyyttien lopullinen kypsyminen verenkierrossa tapahtuu n. 24-48h niiden vapautumisesta luuytimestä verenkiertoon.
 2. Punasolujen elinaika on noin 120 päivää.
- D. Jos luuydin toimii normaalisti aneemisessa tilassa, se lisää punasolujen tuotantoa, jonka vuoksi E-Retik kohoaa yli viiterajojen.
 - a. Retikulosytoosia havaitaan myös anemian hoitovasteen (rautalääkitys, B12-vitamiini) seurauksena sekä luuytimen toipuessa sytostaattihoidosta.
- E. E-Retik voi olla anemiassa kuitenkin keinotekoisesti koholla, sillä matala punasolujen määrä nostaa retikulosyyttien osaa punasoluista.
 1. Retikulosyyttiosuuden ja verenkuvan arvojen perusteella voidaan laskea ns. retikulosyyttien tuotantoindeksi (B-Retind), joka suhteuttaa retikulosyyttimäärän anemian asteeseen.
 - a. B-Retind > 3,0 -> tehokas luuytimen vaste (hyperproliferatiivinen anemia) ja lisääntynyt punasolujen kulutus (hemolyysissä)
 - b. B-Retind < 2,0 -> heikko luuytimen vaste (hypoproliferatiivinen anemia) ja riittämätön punasolutuotanto
 - c. B-Retind ei kaikkialla käytössä (esim. Fimlab laskee automaattisesti, jos Hb alle viitealueen, mutta Tykslab ei), mutta voi laskea itsekin.
 - i. Käytännössä katsotaan vain B-Retik tai E-Retik, eikä tarvitse laskea tuotantoindeksiä.

III. PERIFEERINEN TUHOUTUMINEN (HEMOLYYSI)

- A. Hemolyysi voi tapahtua joko veressä (intravaskulaarinen hemolyysi) tai retikuloendoteliaalisolukossa (ekstravaskulaarinen hemolyysi).

B. Intravaskulaarisessa hemolyysissä punasolujen tuhoutuminen tapahtuu verisuonien sisällä, ei retikuloendoteliaalisissa elimissä.

1. Voi johtua mekaanisista voimista (esim. vahva verenvirtauksen turbulenssi) tai biokemiallisista/fyysisistä tekijöistä, jotka vaurioittavat punasolun kalvoa (esim. komplementin tarttuminen)
2. Havainnot:
 - a. Hemoglobinemia, hemoglobinuria, hemosiderinuria
 - i. Hemoglobiini suodattuu virtsaan, jossa se voi reabsorboitua nefronin tubulusten soluihin ja metaboloitua edelleen raudaksi.
 - ii. Tämä rauta kertyy hemosideriiniksi, joka tubulussolujen hilseillä päätyy virtsaan -> mahdollinen raudan puute hemolyysin jatkuessa pitkään.
 - b. Matala seerumin haptoglobiini
 - i. Haptoglobiini sitoo hemolyysissä vapautuvan hemoglobiinin.
 - ii. Haptog-Hb-kompleksi on suuri eikä erity elimistöstä munuaisten kautta, joten haptoglobiini yrittää estää raudan menetystä.
 - iii. Maksan ja pernan RES-solut tuhoavat kompleksin nopeasti.
 - c. P-LD koholla
 - d. Luuytimen hyperplasia ja retikulosytoosi

C. Ekstravaskulaarisessa hemolyysissä retikuloendoteliaalisysteemin makrofagit tuhoavat punasoluja pernassa, maksassa ja imusolmukkeissa.

1. Hajonneista punasoluista vapautuu hemoglobiinia, jota makrofagit myös hajottavat.
 - a. Globiini -> aminohapoiksi
 - b. Hemi -> raudaksi ja protoporfyriniiksi
 - c. Protoporfyrini -> konjugoimaton bilirubiini, joka sitoutuu seerumin albumiiniin ja kulkee maksaan, jossa se konjugoituu ja erittyy sappeen.
2. Havainnot:
 - a. Anemiaa splenomegalian yhteydessä (pernan fagosyytit kasvavat ja lisääntyvät kohonneen työmäärän seurauksena)
 - b. Hyperbilirubinemia ja ikterus (kroonisesti voi myös johtaa sappikivitautiin)
 - c. Hieman matala seerumin haptoglobiini
 - d. P-LD koholla
 - e. Luuytimen hyperplasia ja retikulosytoosi

IV. AKUUTTI VERENVUOTO

- A. Menettäessä runsaasti verta esimerkiksi liikenneonnettomuudessa kärsittyjen haavojen kautta, menetetään aluksi samaan tahtiin sekä plasmaa että punasoluja.
- B. Soluvälineste yrittää korvata tämän menetyksen ja kulkeutuu verisuoneen.
 1. Tämä laimentaa veren ja aiheuttaa anemian oireet.
- C. Syntyneen normosyyttisen anemian vasteena EPO:n erityös tehostuu, minkä seurauksena retikulosyyttien tuotantoindeksi nousee n. 3-5vrk jälkeen (huippu n. 7-10vrk) kuluttua.
- D. Eroaa kroonisista verenvuodoista (esim. menorragia, suolistosyöpä), jotka aiheuttavat raudanpuuteanemiaa (aluksi normosyyttinen, mutta kehittyy mikrosyyttiseksi).

NORMOSYYTTISIÄ ANEMIOITA PÄÄOSIN EKSTRAVASKULAARIN HEMOLYYSIN SEURAUKSENA

I. PERINNÖLLINEN SFEROSYTOOSI

A. Suomen yleisin periytyvä hemolyyttinen anemia (seulomalla lieviä ja subkliinisiä tapauksia on taudin esiintyvyydeksi Pohjois-Euroopassa arvioitu 1/2000).

B. Perinnöllinen häiriö punasolun kalvon proteiinitukirangassa (spektriini, ankyriini, Band 3).

1. Proteiinien viat aiheuttavat mikrovesikkelien muodostumista kalvolle.

Mikrovesikkeitä irtaava itsestään mekaanisen stressin seurauksena sekä pernan makrofagien toimesta (tunnistavat epänormaaleja kalvomuodostelmia ja aspiroivat ne pois).

a. Lopulta punasoluista tulee pallomaisia (sferosyytit); yleensä punasolut ovat kiekkomaisia (kaksoiskovera kiekko).

2. Pallomaisten punasolujen kulku pernan mikroverenkierron läpi vaikenee ja ne jäävät jumiin sinusoideihin.

3. Pernal makrofagit tuhoavat punasolut, mikä johtaa ekstravaskulaariseen hemolyysiin ja anemiaan.

C. Havainnot:

1. Sivelyvalmisteissa pallomaisia punasoluja (sferosyyttejä), joissa ei nähdä normaalia keskikalpeusaluetta. (Kuva 5.8.)

a. MCHC koholla, LD koholla, haptoglobiinipitoisuus pienentynyt, retikulosytoosi, virtaussytometriassa mahdollinen reagoiminen Band 3 proteiinin kanssa (-> jatkotutkimuksena rajatilanteissa osmoottisen resistenssin tutkiminen).

2. Splenomegalia, ikterus ja kohonnut riski sappikiville.

3. Kohonnut riski parvovirus B19 aiheuttamalle aplastiselle kriisille.

D. Hoito:

4. Pernal poistoa yritetään viivästyttää vähintään 6 ikävuoteen saakka (keltaisuuden valohoito ja punasolusiirrot anemian hoitoon), sillä vakavan infektion riski laskee vanhetessa.

a. Sferosyytit eivät itsessään aiheuta anemiaa, vaan niiden heikko kulku ja tuhoutuminen pernassa on ilmiön taustalla.

b. Pernal poisto hoitaa anemiaa.

i. Sferosyytit tosin säilyvät; voidaan myös nähdä Howell-Jollyn kappaleita, sillä ei enää ole pernan makrofageja poistamassa tumafragmenttijäänteitä punasoluista.

II. SIRPPISOLUTAUTI

A. Maailman yleisin perinnöllinen hemolyyttinen anemia ja perinnöllinen hemoglobiinin rakenteellinen häiriö.

1. Autosomaalisesti resessiivinen muutos hemoglobiininen beetaketjussa.

2. Geeniä kantaa Afrikassa malarian endeemisillä alueilla jopa 30% väestöstä.

a. Yksikin alleeli suojaaa malarialta (heterozygote advantage)

3. Sirppisoluanemia ilmenee, kun henkilö perii kaksi epänormaalia geeniä, mikä johtaa HbS:n tuotantoon (normaalisti HbA).

a. Jos vain yksi poikkeava geeni -> sickle cell trait, HbSA; yleensä oireeton.

- i. Rankassa urheilussa ja dehydraatiossa kohonnut riski lämpöhalvaukseen ja rhabdomyolyysiin.
 - b. On myös mm. yhdistelmätautimuotoja, joissa voi olla yksi sirppisolumutaatio (S) ja sen lisäksi beetatalassemiamutaatio / HbC-mutaatio.
- B. Deoksigenoituneena HbS muodostaa polymeerejä, jotka venyttävät ja vääntävät punasolun sirppimäiseksi vaurioittaen punasolun kalvoa. (Kuva 5.9.)
 - 1. Reoksigenoitueessaan sirppisolut voivat aluksi palata normaaliin muotoonsa, mutta usean sirppiytymiskerran jälkeen jäykästä, sirppiytyneestä muodosta tulee pysyvä.
 - 2. Sirppiytymistä tehostaa hypoksemia, dehydraatio ja asidoosi.
 - a. Nesteytys on hoidon kulmakivi.
 - 3. HbF suojaa sirppiytymiseltä, minkä takia taudin oireet ilmenevät vasta muutaman kuukauden iässä.
- C. Vaurioituneet punasolukalvot aiheuttavat taudin oireet.
 - 1. Vaurioituneet punasolut eivät kulje pernan läpi hyvin, jolloin RES-makrofagit tuhoavat ne.
 - a. Seuraa anemia, ikterus ja kohonnut riski sappikiville.
 - 2. Ilmenee myös intravaskulaarista hemolyysiä, sillä punasolun kalvovauriot voivat johtaa suoraan punasolujen tuhoutumiseen.
 - a. Havaitaan maalitaulusoluja (target-cell) ja haptoglobiinin väheneminen.
 - 3. Anemia aiheuttaa luuytimen hyperplasiasia (maaoravakasvot) ja ekstramedullaarista hematopoiesia (hepatomegalia)
- D. Palautumattomasti sirppiytyneet punasolut voivat tukkia pieniä verisuonia ja kapillaareja.
 - 1. Käsi-jalkaoireyhtymä (daktyliitti) ilmenee, kun sirppisoluja kerääntyy käsien ja jalkojen pieniin verisuoniin.
 - a. Ilmenee käsien ja jalkojen kivuliaana turpoamisena; yleisin merkki pienillä lapsilla (<5v.).
 - 2. Pernan vaso-okklusio voi aiheuttaa autosplenektomian (infarktoitunut perna, joka kutistuu ja fibrotisoituu).
 - a. Toimimaton perna lisää riskiä kapsuloituneiden bakteerien infektiolle (H. influenza tyyppi b, Meningokokki, Strep. pneumo)
 - i. Infektiot tärkein kuolinsyy varhaislapsuudessa.
 - b. Nähdään varhain Howell-Jollyn kappaleita (punasoluja, joissa on basofiilisiä tuman jäännöksiä). (Kuva 5.10.)
 - 3. Keuhkokriisi on yleisin syy, jonka takia sairaalaan tullaan.
 - a. Keuhkon suonet tukkeutuvat ja johtavat voimakkaaseen rintakipuun.
 - b. Yleensä ilmenee pneumonian yhteydessä, sillä keuhkotulehdus laajentaa keuhkojen verisuonia hidastaen verenkiertoa, mikä helpottaa sirppisolujen aiheuttamaa tukkiutumista.
 - i. Infektiot ja niiden lisäämät sirppisolukomplikaatiot (erityisesti keuhkokriisi) ovat yleisin kuoleman syy.
- E. Diagnosointi tapahtuu sirppisolujen havaitsemisella sivelynäytteestä tai Hb-elektroforeesilla, joka osoittaa eri hemoglobiinien määrät.
 - 5. SS-sirppisolanemiassa >90% hemoglobiinista on HbS

6. SA-kantajilla <40% HbS

- F. Hoidetaan erikoissairaanhoidossa; tärkein lääkitys on hydroksiurea (lisää HbF)
7. Jokaiselle annetaan ns. pernanpoistorokotteet (meningokokki, Hib, pneumokokki).

III. HbC-TAUTI

- A. Autosomissa väistävasti periytyvä beetaketjun mutaatio.
1. Harvinaisempi hemoglobinopatia kuin sirppisolutauti.
- a. Voi ilmetä sirppisoluanemian kanssa -> HbSC, joka on lievempi muoto kuin sirppisoluanemia (SS)
- B. Ilmenee lievänä anemiana johtuen pääosin ekstravaskulaarisesta hemolyyysistä.
1. HbC on ”jäykempää” kuin normaali hemoglobiini -> jää kiinni pernan sinusoideissa -> makrofagit tuhoavat.

NORMOSYYTTISIÄ ANEMIOITA PÄÄOSIN INTRAVASKULAARISEN HEMOLYYYSIN SEURAUKSENA

I. PAROKSYSMALINEN NOKTURNAALINEN HEMOGLOBINURIA (PNH)

- A. PNH (t.m. kohtauksittainen yöllinen hemoglobiinivirtsaisuus) on hankinnainen hemolyyttinen anemia, jonka aiheuttaa mutaatio verisolujen kantasolujen PIG-A-geenin mutaatio.
8. Kaikkien näiden verisolujen solukalvolta puuttuvat glykosyylifosfatidyyli-inositolimolekyylit (GPI).
9. Komplementin toimintaa hillitsevät molekyylit, kuten DAF ja MIRL ankkuroituvat solukalvoon GPI:n kautta ja estää C3-konvertaasin muodostumista.
10. DAF:n puute solukalvolla altistaa solut (erityisesti punasolut) komplementtivälitteiselle suonensisäiselle hemolyyysille.
- B. Intravaskulaarinen hemolyyysi tapahtuu jaksottaisesti, erityisesti unen aikana.
2. Veren pH laskee unessa, sillä hengityksen hidastuessa CO₂ retentio kasvaa, mikä aiheuttaa lievää respiratorista asidoosia.
3. Kaikkia verisoluja tuhotaan (pansytopenia), mutta punasolut ovat eniten vaarassa.
- a. Trombosytopenia altistaa verenvuodoille, valkosolujen vähyys tulehduksille.
4. Intravaskulaarinen hemolyyysi aiheuttaa hemoglobinemiaa ja hemoglobinuriaa erityisesti aamuisin; hemosiderinuriaa voidaan tavata päiviä hemolyyysin jälkeen (voi aiheuttaa lievää raudanpuutetta ja lopulta mikrosytääristä anemiamia).
- C. Pelätyin komplikaatio on tromboosi, yleensä vatsa-alueella erityisesti portaali- tai maksalaskimossa.
1. Verihiutaleiden tuhoutuessa ne vapauttavat sisältöään verenkiertoon indusoiden tromboosia.
2. N. 5-15% potilaista kehittyy leukemia (useimmiten AML).
- D. Nykyään taudin hoitoon käytössä ekulitsumabi (C5-vasta-aine), joka estää MAC:n muodostumisen.
- II. GLUKOOSI-6-FOSFAATTIDEHYDROGENAASIN (G6PD) PUUTOS
- A. Maailman yleisin entsyymipuutteisuus (yli 400milj. ihmistä), mutta Suomessa harvinainen; X-resessiivisesti perinnöllinen.
- B. G6PD:n puute altistaa soluja vapaiden radikaalien aiheuttamille vaurioille.

1. Pelkistynyt glutationi neutralisoi vapaita radikaaleja, kuten H_2O_2 , mutta samalla oksidoituu.
 2. Glutathionireduktaasi pelkistää oksidoituneen glutathionin takaisin toimivaan muotoonsa hyödyntämällä NADPH:n vetyä ($NADPH \rightarrow NADP^+$)
 3. G6PD pelkistää $NADP^+$:n takaisin NADPH:ksi.
 4. G6PD:n puute: $\downarrow$ NADPH $\rightarrow$ $\downarrow$ pelkistynyt glutathioni $\rightarrow$ H_2O_2 :n aiheuttamat oksidatiiviset vauriot $\rightarrow$ intravaskulaarinen hemolyysi
- C. G6PD:n geenin mutaatio aiheuttaa G6PD:n lyhentynyttä puoliintumisaikaa.
1. Punasolujen lisääntynyt tuhoutuminen suojaa malarialta.
 2. Vakavaa puutosta esiintyy etenkin Välimeren maissa ja Lähi-idässä, lievempää muotoa Afrikassa.
- D. Oksidatiivinen stressi vaurioittaa hemoglobiinimolekyylejä.
1. Denaturoituneet hemoglobiinikappaleet saostuvat Heinzin kappaleiksi, jotka voivat vaurioittaa punasolujen kalvoja suoraan tai aktivoida makrofagit punasolua vastaan.
 - a. Pernan makrofagit ”puraisevat” osan punasolusta, jossa se havaitsee Heinzin kappaleen, jättäen jäljelle ”bite-solun”. (Kuva 5.11.)
 - b. Bite-solut jäävät kiinni pernassa ja tuhoutuvat ekstravaskulaarisesti.
 - i. Hemolyysi on kuitenkin pääosin intravaskulaarista.
 2. Oksidatiivista stressiä lisää infektiot, lääkkeet (esim. primakiini, sulfametoksatsoli) ja härkäpavut (favapavut; tauti tunnetaan myös nimellä favismi).
- E. Ilmenee hemoglobiinuriana, ikteruksena ja selkäkipuna yleensä tuntien-päivien kuluessa lisääntyneen oksidatiivisen stressin jälkeen.
- F. Diagnosoidaan tutkimalla punasoluentensyymien aktiivisuutta, jolloin voidaan havaita G6PD:n puutos.

III. IMMUNOHEMOLYYTTISET ANEMIA (IHA)

- A. Jaetaan autommuuni- ja alloimmuunimekanismilla syntyneisiin; autoimmuunihemolyyttinen anemia (AIHA) on yleisin muoto.
1. Perinnölliset kliinisesti havaittavat hemolyyttiset anemiat ovat suomalaisilla harvinaisia; useimmiten hemolyyttiset anemiat ovat immunoheemolyyttisiä.
- B. AIHA jaetaan lämmen- (WAHA) tai kylmävasta-aine (CAHA/CAD) AIHaksi.
1. Lämminvasta-aine AIHA on yleisin tyyppi (80%).
- C. WAHA voi tapahtua idiopaattisesti (primaarinen) tai sekundaarisesti ja on yleensä ekstravaskulaarista.
1. IgG sitoutuu punasoluihin keskiruumiin lämpimissä olosuhteissa; IgG:n kuorruttamat punasolut tuhoetaan pernassa.
 - a. Osittainen tuhoutuminen johtaa sferosyyttien muodostumiseen.
 2. Sekundaarisesti yhteydessä SLE (yleisin syy), KLL ja useisiin lääkkeisiin (esim. penisilliinit ja kefalosporiinit).

- a. Penisilliini toimii hapteenina, joka sitoutuu punasolukalvolle, jolloin vasta-ainetta tuotetaan lääke-punasolukompleksia vastaan.
 - i. Toinen tapa lääkkeen aiheuttamalle AIHA:lle on esim. alfa-metyylidopalla (myös NSAIDeilla kuten erityisesti mefenaamihapolla): indusoi autovasta-aineiden tuotannon punasoluja vastaan (ei siis kompleksia vastaan).
 3. Hoidetaan aiheuttavan lääkkeen lopettamisella ja immunosuppressiolla kortikosteroidein; IVIG voidaan käyttää tilapäiseen helpotukseen.
 - a. Vaikeissa tapauksissa mahdollisesti splenektomialla.
- D. CAHA (CAD) johtuu tavallisesti IgM-tyypin vasta-aineista, jotka aiheuttavat intravaskulaarista sekä ekstravaskulaarista hemolyysiä.
 1. IgM sitoutuu punasoluihin ja aktivoivat komplementtia erityisesti raajoissa kylmemmissä olosuhteissa.
 2. Komplementtikaskadi voi pysähtyä C3-vaiheeseen IgM:n irrottua lämpimissä olosuhteissa (C3b- (ja C3d) kuorrutetut punasolut tuhoetaan / osittain syödään maksassa ja pernassa) tai jatkua MAC:n muodostukseen, joka tuhoaa punasolut intravaskulaarisesti.
 3. IgM voi myös ristisitoa punasoluja ja aiheuttaa niiden agglutinaatiota sekä verisuonten tukkeutumista, mikä voi johtaa Raynaud'n ilmiöön.
 4. Suurin osa on primaarista, mutta esim. Mycoplasma pneumoniae- tai mononukleoosi-infektio voivat aiheuttaa väliaikaisen kylmäagglutiniinien tuoton.
 5. Yleensä hoitoa ei vaadita, kylmälle altistumisen välttäminen tärkeää.
- E. Alloimmunohemolyysissä vasta-aineet syntyvät vierasta punasoluantigeenia vastaan (verensiirto, vastasyntyneen hemolyyttinen tauti).
 1. Vastasyntyneen hemolyyttisen taudin (erythroblastosis fetalis; nähdään tumallisia punasoluja perifeerisessä veressä merkinä ekstramedullaarisesta hematopoiesista) takia kaikkien äitien ABO- ja RhD-veris ryhmä sekä punasoluvasta-aineet tukitaan ensimmäisellä neuvolakäynnillä.
 - a. Klassisesti puhutaan RhD-välitteisestä vastasyntyneen hemolyyttisestä taudista.
 - i. Myös muut punasoluantigeenit (mm. Rhc, Kell, ABO) voivat aiheuttaa, mutta RhD-välitteinen on vakavin ja yleisin.
 2. Jos äiti on RhD-negatiivinen ja vauva RhD-positiivinen:
 - a. Ensimmäisessä raskaudessa äiti altistuu synnytyksen aikana vauvan RhD-antigeeneille ja muodostaa niitä vastaan anti-D IgG-vasta-aineita.
 - b. Seuraavissa raskauksissa nämä vasta-aineet kulkevat istukan läpi sikiön verenkiertoon -> jos sikiö on RhD-positiivinen, vasta-aineet johtavat punasolujen tuhoutumiseen (hemolyysi).
 - c. Ilmenee vastasyntyneellä ikteruksena, hengitysvaikeuksina ja mahdollisesti immuuniperäisenä hydrops fetalisena.
 3. Synnytyksen jälkeen annetaan 72h kuluessa anti-D-immunoglobuliinia, joka tuhoaa äidin verenkiertoon päässeet punasolut ja vähentää äidin RhD-immunisoitumista.

F. Tärkein erotusdiagnostinen tutkimus on suora antiglobuliinitesti eli suora Coombsin koe, joka on pääsääntöisesti positiivinen immunologisissa ja negatiivien ei-immunologisissa hemolyytisissä anemioissa.

1. Suora Coombsin koe tunnistaa vasta-aineet ja/tai komplementtitekijät C3c/C3d, jotka ovat sitoutuneet punasolujen antigeeneihin.
 - a. Punasolut pestään ja ne inkuboidaan anti-IgG-, anti-IgM- ja anti-C3-vasta-aineiden kanssa.
 - b. Jos punasolujen pinnalla on valmiiksi vasta-aineita, anti-vasta-aineiden lisääminen aiheuttaa punasolujen agglutinaatiota.
2. Epäsuora Coombsin koe tunnistaa vasta-aineet, jotka eivät ole sitoutuneet punasolujen antigeeneihin.
 - a. Tutkittavaan seerumiin lisätään anti-IgG-vasta-aineita ja punasoluja.
 - b. Jos seerumissa on etsittäviä vasta-aineita, ne sitoutuvat lisättyihin punasoluihin, jolloin anti-IgG-vasta-aineet aiheuttavat näiden punasolujen agglutinaatiota.
 - c. Ei paljoa käyttöä hemolyysin tutkimisessa, mutta auttaa verensiirtojen sopivuus- eli ristikokeissa ja raskaiden äitien seulonnessa vastasyntyneen hemolyyttisen taudin tutkimisessa.

IV. PILKKOUTUMISHEMOLYYSI

- A. Punasolut vaurioituvat verenkierron ja muodostavat pieniä ja vaihtelevan muotoisia punasolufragmentteja (skistosyyttejä). (Kuva 5.12.)
- B. Pienien suonien mikroangiopaattiset muutokset (MAHA, mikroangiopaattinen hemolyyttinen anemia), kuten mikrotrombit (TTP, HUS, DIC, HELLP) sekä suurten suonien muutokset (makroangiopaattinen hemolyyttinen anemia), kuten läppäviat ja -proteesit voivat aiheuttaa pilkkoutumishemolyyysiä.

V. MALARIA

- A. Anopheles-lajin hyttysen levittämä Plasmodium-suvun alkueläin, joka infektoi punasoluja.
 1. Plasmodium falciparum aiheuttaa vakavimman tautimuodon; n. 90% kaikista malariatapauksista.
- B. Plasmodian elinkaari alkaa hyttysen imiessä ihmisen verta, jolloin sen syljen mukana siirtyy sporotsoiitteja ihmisen verenkiertoon.
 1. Sporotsoiitti kulkeutuu maksaan, jossa se tunkeutuu hepatosyytteihin ja alkaa lisääntymään niissä suvuttomasti.
 2. Kustakin sporotsoitiista syntyy tuhansia skitsontteja, jotka lisääntyessään hajottavat maksasolun ja pääsevät verenkiertoon (kutsutaan nyt merotsoiitiksi).
 3. Merotsoiitit tunkeutuvat punasoluihin ja jatkavat niissä jakautumista (suvuttomasti tai suvullisesti)
 - a. Suvuton jakautuminen -> kutsutaan nyt trofotsoiitiksi ja kypsyy skitsontiksi, joka lopulta rupturoi punasolun -> infektoi uusia punasoluja
 4. Suvullisesti jakautuvat plasmodit muodostavat gametosyyttejä, jotka voivat siirtyä verenkierron hyttysen piston aikana, jolloin alkaa uusi sporotsoittimuotojen kehitysvaihe hyttysessä ja hyttynen voi infektoida toisen ihmisen.
 5. Falciparumin itämisaika on vähintään 7vrk, yleensä 2-4vk.

- C. Punasolujen hajoessa ilmenee malarialle tyypillisin oire eli kuume, joka nousee yleensä horkkamaisesti vilunväristyksin.
1. Falciparum-malariassa kuume usein sahaavaa tai jatkuvaa ilman tarkkaa rytmiä, kun taas muilla lajeilla säännöllisempi rytmi.
 - a. P. vivax ja P. ovale – n. 48h tunnin välein
 - b. P. malariae – n. 72h välein
 - c. P. knowlesi – n. 24h välein
- D. P. falciparum pystyy infektoimaan kaikenikäisiä punasoluja toisin kuin muut lajit, joten sen taudinkuvan vakavuus johtuu siitä, että se pystyy infektoimaan paljon suuremman osan punasoluista (yli 10% parasitemia hengenvaarallinen).
1. Loiset muuttavat punasolun ominaisuuksia niin, että ne muodostavat helpommin tukoksia hiussuoniin, joka voi johtaa monielinvaurioon (esim. munuaisten vajaatoiminta, keuhkoödeema).
 - a. Fataali falciparum malaria yleensä johtuu aivojen mikroverenkierron tukoksista (aivomalaria).
- E. Perna myös poistaa infektoituneita punasoluja sekä tuottaa patogeenispesifisiä lymfosyyttejä, joten malariassa havaitaan myös splenomegaliaa ja ekstravaskulaarista hemolyyysiä.

TUOTANTOHÄIRIÖSTÄ JOHTUVAT ANEMIA

- I. PERIAATTEET
- A. Anemiat, jotka johtuvat punasolujen heikosta tuotannosta luuytimessä, tunnistetaan matalista retikulosyyteistä.
- B. Etiologioita:
1. Mikroosyyttisten ja makrosyyttisten anemioiden aiheuttajat
 2. Munuaisten vajaatoiminta – peritubulaariset interstitiaaliset solut tuottavat liian vähän EPO:a
 3. Vaurio punasolujen esiastesoluihin tai luuydintä täyttävät sairaudet (leukemiat, lymfoomat, luuydinmetastaasit) – voi johtaa anemiaan tai pansytopeniaan
 4. Hypotyreooosi – suorat imeytymishäiriöt, hidastunut luuytimen toiminta, erytropoietiinin tuotannon vähentyminen, verenvuodot (menorragia, vW-tekijän puutos), autoimmuunina yhteys pernisiöösiin anemiaan ja keliakiaan...
- II. PARVOVIRUS B19
- A. Parvorokko (erythema infectiosum) on terveellä lapsella yleensä lievä rokkotauti, joka ilmenee alussa lievänä flunssana ja noin viikon kuluttua ihottumavaiheena.
- B. Parvovirus B19 infektoi punasolujen esiasteita, tuhoaa ne ja pysäyttää erytopoieesin 7-10 vuorokaudeksi.
1. Johtaa vakavaan ja äkilliseen anemiaan (aplastinen kriisi, puhdas punasoluaplasia), jos potilaan punasolujen elinikä on lyhentynyt (esim. sferosytoosia tai hemolyyttistä anemiaa sairastavilla)
- C. Tervettä lasta ei yleensä hoideta, sillä infektio on yleensä itsestään rajoittuva.
1. Aplastisessa kriisissä voidaan tarvita verensiirtoja.
- III. APLASTINEN ANEMIA
- A. Kantasoluvaurio voi aiheuttaa luuytimen solukkuuden voimakasta pienentyntymistä, mikä johtaa pansytopeniaan.
- B. Voi olla hankinnainen tai perinnöllinen.

1. Hankinnaiset kantasoluvauriot voivat johtua lääkkeestä (esim. karbamatsapiini), säteilyvauriosta tai infektiosta (esim. hepatiitti, EBV)
 2. Perinnöllisistä yleisin syy on Fanconin anemia, joka johtuu DNA:n korjausmekanismia häiritsevästä BRCA-mutaatiosta.
- C. Luuydinbiopsiassa luuydin on täynnä rasvaa ja hematopoieettisista soluista tyhjä.
- D. Vaikeassa tautimuodossa nuoremmat potilaat (alle 40v) hoidetaan ensisijaisesti kantasolusiirrolla; ennen siirtoa vaativat yleensä punasolu- ja trombosyytti-siirtoja.
1. Vanhemmat potilaat ja ne, joille ei löydy luovuttajaa, saavat immunosuppressiivista lääkettä, joka hävittää luuydintä tuhoavat T-solut.

IV. SYÖPÄ LUUYTIMESSÄ

- A. Syöpä luuytimessä (leukemiat, lymfoomat ja metastaasit) syrjäyttää normaalia luuydintä (myelophthisic anemia) ja siten estää hematopoiesiaa -> pansytopenia.
1. Rinta-, keuhko- tai eturauhassyövän metastaasit ovat yleisimpiä.
- B. Sivelynäytteessä havaitaan pisanamuotoisia punasoluja ja erytroidi- sekä granulosityttiesiasteita (leukoerythroblastosis). (Kuva 5.13.)

6 VALKOSOLUJEN HÄIRIÖT

LEUKOPENIA JA LEUKOSYTOOSI

I. PERIAATTEET

- A. Hematopoiesi jakautuu kahteen pääluokkaan CD34+ -hematopoieettisesta kantasolusta. (kts. kuva)
- B. Normaali valkosolujen määrä veressä aikuisilla on 3.4-8.2 E9/l
1. Leukopenia – matala valkosolujen määrä (<1.5-2.5x E9/l)
 2. Leukosytoosi – runsas valkosolujen määrä (>8.2)
 3. Leukopenia tai leukosytoosi yleensä johtuu yhden tietyn solulinjan määrän vähenemisestä tai kasvusta.

II. LEUKOPENIA

- A. Yleisin leukopenian syy on neutropenia eli neutrofiilien vähäinen määrä.
- B. Neutropenia aiheuttaa immuunipuutetta, joka altistaa erityisesti bakteeri- ja sieni-infektioille.
1. Riski bakteeri-infektioille ei ole suuri, jos neutrofiilien määrä on yli 1.0 x E9/l.
 2. Kun neutrofiileja on vähän tai ei lainkaan, infektioiden paikantamisessa saattaa olla vaikeuksia (märkkää, tulehdusnestettä ja turvotusta ei kehity).
- C. Neutropenia voi syntyä joko vähentyneellä tuotannolla luuytimessä, poikkeavalla jakaantumisella verenkierrossa tai lisääntyneellä kudoshakuisuudella ja tuhoutumisella.
1. Lääketoksisuus (esim. kemoterapia alkyloivilla aineilla) – Vaurio kantasoluihin vähentää valkosolujen tuotantoa, erityisesti neutrofiilien.
 - a. Jos potilaalla on odottamaton lääkkeen (esim. klotapiini) aiheuttama todella vaikea hengenvaarallinen neutropenia, tilaa nimitetään agranulosytoosiksi, joka tarkoittaa, että neutrofiilimäärä on hyvin pieni, usein alle 0.2 E9/l.

2. Infektiot (esim. virusinfektiot ja mykobakteeri-infektiot) – Monet virusinfektiot aiheuttavat neutrofiilien lisääntyntä tuhoutumista ja tuotannon vähentymistä; mykobakteeri saattaa häiritä neutrofiilien tuotantoa infektoimalla myös luuytimen.
 - a. Vaikeat infektiot (esim. gramnegatiivinen sepsis) voivat myös aiheuttaa neutropeniaa lisäämällä neutrofiilien kulkua kudoksiin.
 - i. Yleensä kuitenkin bakteeri-infektiot johtavat neutrosytoosiin.
3. Pernan liikatoiminta (hypersplenismi; lisääntynyt verenvirtaus tai splenomegalia) lisää neutrofiilien marginaatiota pernan runsaasti haaroittuneessa verisuoniverkostossa.
4. GM-CSF tai G-CSF voidaan käyttää tuotannon tehostamiseen.

D. Lymfopenia tarkoittaa kiertävien lymfosyyttien puutetta.

1. Immuunipuute (esim. CATCH-22 tai HIV)
2. Korkean kortisolipitoisuuden tila (esim. eksogeeniset kortikosteroidit tai Cushingin oireyhtymä) – indusoi lymfosyyttien apoptoosia ja estää proliferaatiota
3. Autoimmuuninen tuhoutuminen (esim. SLE)
4. Säteily – lymfosyytit ovat yksiä kehon herkimpiä soluja radiaatiolle

III. LEUKOSYTOOSI

A. Neutrofiilinen leukosytoosi on tila, jossa on kohonnut neutrofiilien määrä. Syitä ovat:

1. Akuutin inflammaation aiheuttajat eli bakteeri-infektio tai kudoksetuho – indusoivat marginoitujen neutrofiilien ja luuytimen neutrofiilien vapautumista
 - a. Myös epäkypsiä neutrofiileja vapautuu (left shift).
 - i. Epäkypsillä neutrofiileilla on kypsiä vähemmän Fc-reseptoreita (CD16).
2. Korkean kortisolipitoisuuden tila – Neutrofiilien adheesio heikkenee, mikä johtaa marginoitujen neutrofiilien vapautumiseen.

B. Monosytoosissa kiertävien monosyyttien määrä on lisääntynyt.

1. Krooninen inflammaatio sekä maligniteetti ovat tyypillisiä aiheuttajia.

C. Eosinofiliassa kiertävien eosinofiilien määrä on lisääntynyt.

1. Allergiset reaktiot, loisinfektiot ja Hodgkinin lymfooma ovat tyypillisiä aiheuttajia.

D. Basofiliassa kiertävien basofiilien määrä on lisääntynyt.

1. Harvinainen, nähdään yleensä myeloproliferatiivisissa neoplasmissa (esim. KML).

E. Lymfocytoosissa kiertävien lymfosyyttien määrä on lisääntynyt. Syitä ovat:

1. Virusinfektiot – T- lymfosyyttien (parakorteksi) hyperplasia
2. Bordetella pertussis -infektio (hinkuyskä) – Bordetella -bakteerit tuottavat lymfocytoosia kannustavaa tekijää (LPF, lymphocytosis promoting factor), joka estää lymfosyyttien pääsyä verestä imusolmukkeisiin.

IV. MONONUKLEEOSI ("PUSUTAUTI")

A. Mononukleoosi on yleensä EBV:n (harvoin myös muiden virusten, kuten CMV) aiheuttama kuumetauti, jossa useimmiten ilmenee myös nielurisatulehdus, yleinen imusolmukkeiden suureneminen sekä oireeton maksatulehdus. (Kuva 6.1.)

1. EBV (Epstein-Barr virus) välittyy syljen mukana ("pusutauti" tai "suutelutauti") ja ilmenee tyypillisimmin teineillä-nuorilla aikuisilla (15-25v).
 - a. Tartuntaikä vaikuttaa eniten oireiden ilmaantumiseen (vanhemmilla oireet voimakkaammat); lähes kaikki saavat EBV-tartunnan, mutta alle 1/5 sairastaa tyypillisen mononukleoosin.

- b. Läheiset eivät ole tartuntavaarassa -> ei tarvitse eristää.
- B. Infektio etenee suunielun epiteelisolujen läpi alla piileviin imukudoksiin (nielu- ja kitarisat), jossa virus infektoi B-soluja.
 1. Infektoidut B-solut aktivoituvat ja proliferoituvat useiden virusproteiinien takia.
 2. Nämä B-solut tuottavat heterofiilisiä vasta-aineita, joita voidaan hyödyntää vieritesteissä.
 3. Virus jää piilemään B-muistisoluihin (latenssivaihe) ja voi reaktivoitua stressin tai immuunipuutosten (esim. HIV) vaikutuksesta.
 - a. Nostaa myös riskiä syöville (erit. Burkittin lymfooma ja nenänielun karsinoma) erityisesti immuunipuutteellisilla.
- C. Infektoituneet B-solut esittelevät ahkerasti virusantigeeneja T-soluille, minkä seurauksena syntyy voimakas CD8+-T-soluvaste infektoituneita B-soluja vastaan; tappaja-T-soluproliferaatiosta seuraa:
 1. Laaja-alainen lymfadenopatia – T-solujen hyperplasia imusolmukkeen parakorteksissa
 2. Splenomegalia – T-solujen hyperplasia periarteriaalisessa lymfaattisessa solukossa (PALS, periarterial lymphatic sheath)
 - a. Pernan repeämisen riskin takia kontaktiurheilu kielletään ainakin 3vk ajaksi.
 3. Atyyppinen tai reaktiivinen lymfositosis – Atyyppisessä lymfositosisissa valkosolujen erottelulaskennassa yli 50% lymfosyyttejä ja näistä yli 10% on epätyypillisiä (tyypin 2 Downeyn soluja). (Kuva 6.2.)
- D. Diagnosointi:
 1. Infektio voidaan seuloa heterofiilisiin vasta-aineisiin perustuvilla vieritesteillä.
 - a. Heterofiiliset vasta-aineet aiheuttavat lampaan ja hevosen punasolujen agglutinaatiota.
 - i. CMV:n aiheuttamassa mononukleosisissa agglutinaatiota ei tapahdu.
 2. Spesifinen EBV-serologia vieritestejä luotettavampi (EBV:n kapsidiantigeenin eli VCA-vasta-aineet)

HEMATOLYMFROIDIT NEOPLASIA

- I. PERIAATTEET
 - A. Valkosolujen neoplasiat ovat lähes kaikki maligneja, ja ne jaotellaan morfologian, solulinjan, erilaistumisasteen ja geenilöydösten mukaan.
 - B. Syövän alkuperän perusteella neoplasiat voidaan jakaa kolmeen karkeaan luokkaan: lymfoidit, myeloidit ja histiosyyttiset neoplasiat.
 1. Lymfoideihin neoplasioihin kuuluu leukemioita, non-Hodgkin- ja Hodgkin-lymfoomat sekä myeloomat (plasmasolusyöpä).
 2. Myeloideihin neoplasioihin kuuluu leukemioita sekä myelodysplastisia oireyhtymiä ja myeloproliferatiivisia neoplasioita.
 3. Histiosyyttisiin neoplasioihin kuuluu makrofagien ja dendriittisolujen kasvaimet.

AKUUTTI LEUKEMIA

- I. PERIAATTEET
 - A. Leukemiat voidaan jakaa myelooisiin ja lymfoideihin sekä akuutteihin ja kroonisiin.
 - B. Akuutissa leukemiassa luuytimeen kertyy epäkypsiä verisoluja eli blasteja.

1. Akuutin leukemian diagnoosirajana on >20% blasteja luuydinnäytteen tumallisista soluista.
- C. Leukemiasolut valtaavat tilaa ja luuydin täyttyy blasteista, jolloin niitä työntyy usein myös vereen, mikä aiheuttaa korkean valkosolujen määrän (vrt. lymfoomat).
 1. Blastit voidaan erottaa sivelynäytteestä: ne ovat suuria ja niillä on helposti nähtävissä oleva vaalea tumajyvänen ("rei'itetty" tuma)
- D. Luuytimen täyttyessä normaali hematopoieesi vähenee, mikä aiheuttaa nopeasti ilmenevää ("akuuttia") anemiasia, trombositopeniasia ja neutropeniasia.
 1. Diagnoosilla kiire, oireiden ilmennyttyä etenee nopeasti.
 2. Diagnosoidaan luuydin- ja verinäytteiden perusteella.
- E. Akuutti leukemia jaetaan akuuttiin lymfoblastiseen leukemiaan (ALL) ja akuuttiin myeloidiseen leukemiaan (AML).

II. AKUUTTI LYMFATAATTINEN LEUKEMIA (AKUUTTI LYMFBLASTILEUKEMIA, ALL)

- A. ALL tarkoittaa lymfoidin solulinjan neoplastisten esisatesolujen eli lymfblastien kertymistä luuytimeen (>20%).
- B. Lapsuuden yleisin syöpäsairaus (n. 50/v Suomessa), suurin osa sairastuu alle 4-vuotiaana.
 1. Moninkertainen riski Downin oireyhtymässä.
- C. Veren sivelynäytteessä havaitaan lymfoblasteja, joita on yleensä vaikea erottaa myeloblasteista morfologisesti.
 1. Lymfblastit ovat värjäyksessä positiivisia tumaentsyymille TdT (terminaalinen deoksinukleotiditransferaasi).
 - a. TdT on DNA-polymeraasi, joka lisää variaatiota vasta-aineiden tuotannossa.
 2. TdT puuttuu myeloblasteista ja kypsistä lymfosyyteistä.
- D. Jaotellaan B-ALL- ja T-ALL-alaluokkiin pintarakenteisiin perustuvalla virtausytometrialla.
- E. Epäkypsien B-solujen akuutti leukemia (B-ALL) on yleisin ALL:n tyyppi (n. 85%).
 1. Laboratoriotutkimuksissa havaitaan TdT-positiivisia lymfoblasteja, joilla on pintarakenteina CD10 (CALLA), CD19 ja CD20.
 2. Hoidetaan kemoterapialla (solunsalpaajilla), yleensä todella hyvä vaste (jopa 80% saavuttaa remission).
 - a. Lymfblastit vastustavat hoitoa muutamissa paikoissa kehoa, joihin sytostaateilla on huono penetraatio (kivekset, keskushermosto) -> pojilla hieman huonompi ennuste hoidon kannalta.
 - i. Vaatiikin yleensä kohdistettua hoitoa näille alueille, mikä voi johtaa pojilla myöhemmin steriliteettiin.
 - b. Karyotyyppitys voi auttaa prognoosin selvittämisessä:
 - i. t(12;21) (TEL-AML1) on yleisin uudelleenjärjestyminen lapsilla; hyvä prognoosi.
 - ii. t(9;22) (BRC-ABL, Philadelphia-kromosomi) havaitaan yleisemmin aikuisten ALL:ssä, mutta harvoin myös lapsilla; huono prognoosi.
- F. Epäkypsien T-solujen akuutti leukemia (T-ALL) on harvinaisempi ALL:n muoto ja ilmenee tyypillisesti teinipojilla.
 1. Poiketen B-ALL:sta T-ALL yleensä aiheuttaa mediastinaalisen (tyymisen) massan muodostumisen.
 - a. Kutsutaan usein akuutiksi lymfoblastiseksi lymfoomaksi.

2. TdT-positiivisia lymfoblasteja, joilla on pintarakenteina markkereita CD2-CD8.
 - a. Muistisääntönä: matalat CD:t (alle 10) T-soluilla, korkeammat CD:t B-soluilla.

III. AKUUTTI MYELOOINEN LEUKEMIA (AML) ja MYELOYDYSPLASTISET OIREYHTYMÄT

- A. AML = Myeloidin solulinjan esiasteiden eli blastien (tai promyelosyyttien) kertymistä luuytimeen (>20%).
- B. Yleisempi aikuisilla, ilmaantuvuuden mediaani-ikä on 60 vuotta.
- C. Veren sivelynäytteessä havaitaan myeloideja blasteja, jotka voidaan erottaa ALL:n lymfoblasteista morfologisesti, vain jos blastisoluista löytyy Auerin sauvoja (patognomoninen löydös).
 1. Auerin sauvat ovat myeloperoksidaasin (MPO) krystallisoituneita aggregaatteja, jotka havaitaan punaisena värjäytyvinä sauvoina myeloblastien sytoplasmassa. (Kuva 6.3.)
 - a. MPO:n vapautuminen blasteista voi aiheuttaa DIC.
 2. Myeloblastit voidaankin värjäyksessä tunnistaa sytoplasmisen MPO:n värjäytymisestä.
- D. Luokitellaan mahdollisen geneettisen muutoksen tai erilaistumisasteen perusteella sekä pintarakenteita hyödyntämällä, kliinisesti tärkein alaluokka on akuutti promyelosyyttinen leukemia (APML, APL).
- E. APML:n määrittää t(15;17) translokaatio, joka tuottaa PML-RARA-fuusiogeenin.
 1. Kromosomin 17 retinoiinihapporeseptori-alfa-geenin translokaatio aiheuttaa epänormaalien retinoiinihapporeseptorien esiintymisen malignien solujen pinnalla.
 - a. Estää promyelosyyttien (blasteja) normaalin kypsymisen ja aiheuttaa kertymistä luuytimeen, mikä aiheuttaa akuuttia leukemias.
 2. Hoidetaan "all-trans"-retinoiinihapolla (ATRA) eli tretinoinilla, joka on A-vitamiinin johdannainen.
 - a. Auttaa blasteja kypsymään normaalisti.
 3. DIC yleinen komplikaatio, sillä promyelosyyteissä voi olla poikkeuksellisen paljon Auerin sauvoja (ns. Faggot-kimppuja).
- F. Myelodysplastiset oireyhtymät (MDS) ovat ryhmä myeloidien solujen esiasteiden häiriöitä, jotka aiheuttavat tehotonta hematopoiesiaa ja dysplasiaa luuytimessä.
 1. Ilmenevätkin yleensä sytopenioina ja niille tyypillisinä oireina ja riskeinä.
 2. Dysplastiset solut täyttävät luuytimen, mutta blastien määrä ei ylitä 20 prosenttia.
 - a. Muuttuu helposti AML:ksi (>20% blasteja); ajatellaan "pre-leukemiana", joka mutaatioita kerryttäessään muuttuu lopulta akuutiksi leukemiaksi.
 - b. Blastivaiheesta eteenpäinkin kehittyvät solut ovat epänormaaleja/dysplastisia ja kuolevat helpommin kuin normaalit.
 - i. Eroa leukemioiden ja MDS:n välillä voi ajatella näin: molemmissa on klonaalista kasvua, mutta MDS:ssä proliferaatio on rajoittunutta ja suurin ongelma on tehoton kypsyminen ja nopea solujen kuoleminen. Leukemiassa taas on sekä kypsymishäiriö, että esiastesolujen kontrolloimatonta proliferaatiota (joko blastien -> akuutti leukemia tai kypsempien -> krooninen leukemia).
 3. Voivat olla idiopaattisia tai sekundaarisia (aikaisemman syövän solusalpaaja- tai sädehoito lisää riskiä).

KROONINEN LEUKEMIA

I. PERIAATTEET

- A. Kun akuutti leukemia tarkoitti epäkypsien verisolujen neoplastista proliferaatiota, kroonisessa leukemiassa proliferaatio kohdentuu kypsiin kiertäviin verisoluihin.
 - 1. Ilmenee siis myös korkeana valkosolujen määränä.
- B. Oireet ilmenevät hitaasti (joskus ei edes oireita) sekä tyypillisesti ilmenevät vanhemmilla aikuisilla.

II. KROONINEN LYMFATINEN LEUKEMIA (KLL)

- A. KLL tarkoittaa morfologisesti kypsien, mutta immunologisesti puutteellisten naiivien B-lymfosyyttien neoplastista proliferaatiota.
 - 1. Nämä naiivit B-solut ko-ekspressoivat CD5- ja CD20-pintarakenteita, mitkä auttavat diagnoosin varmistamisessa.
- B. Normaalin näköisiä B-lymfosyyttejä kertyy luuytimeen, vereen ja imukudokseen.
- C. Laboratoriolöydöksistä keskeisimmät ovat veren lymfocytoosi ja luuytimen lymfocytti-infiltraatiot.
 - 1. Diagnoosin minimikriteerit ovat persistoiva lymfocytoosi (B-lymfosyyttejä $>5 \times 10^9/l$) ja vähintään 30% luuytimen infiltraatioaste (yli 30% tumallisista soluista B-lymfosyyttejä; ei ole diagnoosivaiheessa välttämätön).
 - a. Pienisoluinen lymfocytaarinen lymfooma (SLL) aiheutuu samoista maligneista B-soluista kuin KLL, mutta B-lymfocytoosi on $<5 \times 10^9/l$.
 - 2. Sivelynäytteessä havaitaan lymfocytoosin lisäksi ”smudge”-soluja, jotka muodostuvat heikkojen lymfocyttien vaurioituessa sivelynäytettä valmistellessa. (Kuva 6.4.)
 - 3. Alkuoireet yleensä vähäisiä, joten diagnosointi tapahtuu yleensä selvitettyä leukosytoosia, joka löydettiin sattumalta.
- D. KLL on yleisin leukemian muoto länsimaissa, ja sen ilmaantuvuus lisääntyy iän myötä (tyypillinen yli 70-vuotiailla, useammin miehillä).
 - 1. Elinikä toteamisen jälkeen n. 10-12 vuotta; suurin ongelma potilaalla ei yleensä ole KLL, vaan joku muu tavallinen sairaus.
 - a. Ei parantavaa hoitoa, eikä ongelmattomassa vaiheessa yleensä aloiteta lääkehoitoa.
- E. Komplikaatiot ovat usein immunologisia, sillä B-solut ovat vasta-aineita tuottavia lymfocyttejä:
 - 1. Hypogammaglobulinemia (IgG, IgA, IgM) johtaa infektioalttiuteen – infektiot ovat yleisin kuolleisuuden syy.
 - 2. Autoimmuuni hemolyttinen anemia – Epänormaalit B-solut voivat tuottaa autoimmuunivasta-aineita; normaalit B-solut voivat myös reagoivat leukemiaan ja tuottavat autovasta-aineita, jotka voivat hyökätä punasoluja vastaan.
 - 3. Richterisaatio (Richterin oireyhtymä) – KLL voi muuttua diffuusiksi suurisoluiseksi B-solulymfoomaksi (n. 5% potilaista).
 - a. Ilmenee yksittäisen imusolmukkeen nopeana kasvuna.

III. KARVASOLULEUKEMIA (HAIRY CELL LEUKEMIA, HCL)

- A. Keski-ikäisillä ja vanhoilla potilailla (useammin miehillä) esiintyvä harvinainen krooninen B-soluleukemia.

1. Neoplastiset solut ovat suuria ja niillä on karvojen kaltaisia haaleita sytoplasmisia ulokkeita. (Kuva 6.5.)
 - a. Solut ovat positiivisia TRAP-entsyymille (tartrate-resistant acid phosphatase).
 - b. Tyypilliset CD-markkerit ovat B-solumarkkerit CD19, CD20 ja CD22 sekä karvasoluleukemialle sensitiivinen markkeri CD103.
- B. Taudille tyypillistä on splenomegalia ja pansytopenia.
 1. Splenomegalia – karvasolut kertyvät punaiseen ytimeen ja suurentavat pernaa
 - a. Valkoinen ydin atrofioiduu tai tuhoutuu.
 - b. Lymfadenopatiaa ei yleensä ilmene.
 2. Pansytopenia – karvasolut infiltroivat luuytimeen ja indusoivat luuytimen fibroosia, joka voi johtaa ”dry tap” -ilmiöön (luuydin ei aspiroidu).
- C. Hitaasti etenevä ja yleensä hyvin hoidettavissa: kladribiini ensimmäisen linjan lääke.

KROONISET MYELOPROLIFERATIIVISET SAIRAUDET (MPD, MPN)

I. PERIAATTEET

- A. Viittaavat myelooisen linjan kypsien solujen neoplastisiin proliferaatioihin.
 1. Johtuvat myelooisessa kantasolussa mutatoituneesta tyrosiinikinaasista, joka välittää kasvutekijäriippumattomuutta.
 - a. PV, ET, PMF JAK2-geenissä tavallisimmat mutaatiot; KML:ssä Philadelphia-kromosomi.
 2. Aiheuttavat korkeita verisolumääriä ja luuytimen hypersellulaarisuutta.
 - a. Koska kaikkien myelooisten solujen määrät lisääntyvät, MPN:t luokitellaan vallitsevat solutyypin mukaan.
 3. Neoplastiset solut täyttävät hematopoieettisia elimiä (perna, maksa ja imusolmukkeet) ja aiheuttavat usein spleno- ja hepatomegaliaa.
- B. Ilmenevät tyypillisesti vanhemmilla aikuisilla (50-60-vuotiailla); suhteellisen harvinaisia.
- C. Yhteiset mahdolliset komplikaatiot kaikilla myeloproliferatiivisilla häiriöillä:
 1. Hyperurikemia ja kihti – lisääntynyt verisolujen tuotto lisää myös niiden degradaation määrää, mikä lisää virtsahapon muodostumista (nukleiinihappoaineenvaihdunta).
 2. Luuytimen fibroosi (”spent phase”) tai transformaatio akuuttiin leukemiaan (blastikriisi).

II. KROONINEN MYELOINEN LEUKEMIA (KML)

- A. Myeloproliferatiivinen sairaus (kypsien myelooisten solujen neoplastinen proliferaatio), jossa tuotetaan liikaa erityisesti granulosyyttejä.
 1. Neutrofiilit hallitsevia, basofiilien määrä lähes aina lisääntynyt ja myös eosinofiilien määrä usein.
- B. Neoplasiaa ajaa kromosomitranslokaatio t(9;22), jonka seurauksena muodostuu BCR-ABL1-fuusiogeneeni (Philadelphia-kromosomi), joka tuottaa tyrosiinikinaasientsyymiä, jolla on voimakas kinaasiaktiiviteetti.
 1. Tyrosiinikinaasiestäjät (TKI:t), kuten imatinibi, ovat yleensä hyvin tehokkaita pitkäaikaisessa hoidossa, eikä elinikä poikkea merkittävästi muusta samanikäisestä väestöstä (KML yleisin 40-70-vuotiailla).
- C. Taudinkulussa voidaan erottaa krooninen vaihe, hoitoresistentti (kiihtynyt) vaihe ja blastikriisi.

1. Kroonisessa vaiheessa potilas on usein oireeton, mutta diagnoosi tehdään useimmiten kuitenkin kroonisessa vaiheessa.
 - a. Sattumalöydöksenä verenkuvassa neutrofilia ja usein basofilia.
 - b. Luuytimessä blasteja on alle 5%.
 2. Kiihtyneessä vaiheessa muutokset taudinkuvassa etenevät lääkehoidon aikana (hoitoresistentti).
 - a. Luuytimen blastit lisääntyvät (alle 20%).
 - b. Nopeasti kasvava perna viittaa kiihtyneeseen vaiheeseen siirtymistä.
 3. Blastikriisi tarkoittaa taudin etenemistä akuuttiin leukemiaan.
 - a. Blastien määrä kasvaa yli 20%:iin.
 - b. KML voi edetä joko AML:ksi (2/3) tai ALL:ksi (1/3).
 - i. Tautia ajava mutaatio on multipotentissa kantasolussa, mikä mahdollistaa muutoksen molempiin hematopoieesin suuntiin.
 - ii. Muuttuminen akuutiksi leukemiaksi on paljon epätodennäköisempää muissa myeloproliferatiivisissa tiloissa.
- D. Erotusdiagnoosi voi olla vaikeaa muista hematopoieettisista taudeista:
1. Leukemoidista reaktiosta (reaktiivinen neutrofilia, left shift) KML voidaan erottaa yleensä seurannalla, mutta laboratoriotutkimuksilla voidaan varmistaa erotusdiagnoosi.
 - a. Basofiliaa ei yleensä esiinny leukemoideissa reaktioissa.
 - b. Ph1-kromosomia ei ole leukemoideissa reaktioissa; BCR-ABL1-fuusiogeenin osoittaminen PCR:llä diagnostiikan perusta, lisäksi täydentävänä tutkimuksena kromosomitutkimus luuytimestä ja verestä.

III. POLYSYTEMIA VERA (PV)

- A. Myeloproliferatiivinen neoplasia, jossa liikatuotetaan erityisesti punasoluja (myös granulosytoosia (neutrofilia) ja trombocytoosia havaitaan).
- B. Lähes kaikilta potilailta löytyy JAK2-geenin aktivoiva mutaatio.
- C. Lisääntynyt punasolumassa lisää verivolyymia sekä veren viskositeettia, mitkä aiheuttavat PV:lle tyypillisiä oireita:
 1. Punakkuus tyypillisin oire, myös punottavat sidekalvot ovat yli puolilla potilaista.
 2. Päänsärky, päänsärky ja näköhäiriöt
 3. Verisuonitukokset (klassisesti Budd-Chiarin oireyhtymä eli maksalaskimon tukos)
 4. Klassinen oire on ”sietämätön” kutitus lämpimän suihkun tai kylvyn jälkeen (akvageeninen pruritus).
- D. Yleisin kuolinsyy on verisuonitukokset, joten hoidon tärkein tavoite on tromboosien esto.
 1. Viskositeettia voidaan vähentää venesektiolla tai myelosuppressiivisilla lääkkeillä.
 2. Pieniannoksinen ASA estää trombositaggregaatiota.
 3. Potilaat kuolevat yleensä n. vuodessa ilman hoitoa, hoidettuna elinaika vain jonkin verran verrokkiväestöä lyhyempi.
- E. Erotusdiagnoosi sekundaarisesta polysytemiasta on tärkeää:
 1. Sekundaarisessa (reaktiivisessa) polysytemiassa EPO on korkea.
 - a. Voi johtua korkeasta elevaatiosta tai keuhkosairaudesta, jolloin myös SaO₂ on matala.
 - b. Jos EPO:a tuottaa ektooppisesti munuaissolu- tai maksasolukarsinoma, SaO₂ on normaali.

2. PV:ssä EPO on vähentynyt ja SaO₂ on normaali.
3. JAK2-mutaatiopositivisuus viittaa hyvin todennäköiseen diagnoosiin.

IV. ESSENTIAALINEN TROMBOSYTEMIA (ET)

- A. Myeloproliferatiivinen tila, jossa liikatuotetaan erityisesti megakaryosyyttejä ja niistä erikoistuvia trombosyyttejä (myös granulosytoosia (neutrofilia) ja punasolujen määrän kasvua havaitaan).
- B. Yli puolella potilaista todetaan JAK2-mutaatio.
- C. Suurin osa potilaista on oireettomia, usein tauti todetaan sattumalöydöksenä; mahdolliset oireet johtuvat trombosytoosista sekä mahdollisesti trombosyyttien toimintahäiriöistä.
 1. Trombosytoosi lisää tukosalttiutta, toimintahäiriöt lisäävät vuototaipumusta.
 2. Jaksoittaiset tukokset sormissa tai varpaissa aiheuttavat erytromelalgiaa eli kohtauksittaista punotusta, kuumotusta ja polttavaa kipua käsissä ja jaloissa.
 - a. Esiintyy myös PV:ssä.
 3. Komplikaatiot (akuutti leukemia, myelofibroosi, hyperurikemia) todella harvinaisia.
 - a. Ennuste hyvä, elinaika ei poikkea merkittävästi verrokiväestöstä.
- D. Diagnoosissa tärkeintä on poissulkea muut mahdolliset erotusdiagnoosit (reaktiivinen trombosytoosi ja muut myeloproliferatiiviset taudit).
 1. Reaktiivista trombosytoosia aiheuttaa esim. raudanpuuteanemia, akuutti verenvuoto tai hemolyysi sekä infektiot ja tulehdus.
 2. JAK2-mutaatiota tai toista klonaalista markkeria ei tarvitse löytyä diagnoosin asettamiseksi, mutta tulee osoittaa, että reaktiivisesta trombosytoosista ei ole viitettä.
 - a. Akuutin vaiheen proteiinit eivät ole koholla ET:ssä.
 - b. Perna on suurentunut ET:ssä; reaktiivisissa tiloissa harvinaista
 - c. Luuytimessä megakaryoottirykelmiä ET:ssä

V. PRIMAARINEN MYELOFIBROOSI (PMF)

- A. Myeloproliferatiivinen tauti, jossa liikatuotetaan erityisesti megakaryosyyttejä.
 1. Sekundaarinen myelofibroosi kehittyy muiden tautien pohjalta (esim. muut myeloproliferatiiviset taudit).
- A. Yli puolella potilaista todetaan JAK2-mutaatio.
- B. Megakaryosyytit tuottavat kasvutekijöitä, kuten PDGF ja TGF-beta, jotka stimuloivat fibroblasteja tuottamaan liikaa kollageenia aiheuttaen luuytimen fibroosia.
- C. On usein pitkään oireeton ja havaitaan sattumalöydöksen kautta; mahdolliset oireet johtuvat yleensä luuytimen hematopoieesin heikentymisestä ja ekstramedullaarisesta hematopoieesista.
 1. Luuytimen fibroosi aiheuttaa heikkoa luuytimen hematopoieesia, mikä ilmenee anemiana.
 2. Muut elimet yrittävät kompensoida luuydintä, mikä johtaa kiihtyneeseen ekstramedullaariseen hematopoieesiin.
 - a. Ilmenee spleno- ja hepatomegaliana.
 3. Veren sivelyvalmisteissa todetaan leukoerytroblastinen verenkuvaa.
 - a. Leukoerytroblastosia tarkoittaa, että havaitaan granulosyyttien prekursoreita ja tumallisia punasoluja; usein myös pisaranmuotoisia punasoluja (dakrosyytti). (Kuva 6.6.)

- i. Fibroosi työntää epäkypsiä soluja ulos luuytimeä vereen. Samoin hematopoieesi ekstramedullaarisissa elimissä on usein häiriintynyt, eikä solut kehity normaalisti.
4. Infektiot, tromboosit, vuototaipumukset ja leukemisoituminen ovat tärkeimmät kuolleisuutta lisäävät tekijät.
 - a. Ennuste huono, toteamisen jälkeen keskimääräinen elinaika vain 5-6 vuotta (PMF on harvinaisin ja aggressiivisin MPD).

HISTIOSYTOOSIT

I. PERIAATTEET

- A. Histiosyytit ovat kudoksissa sijaitsevia makrofageja tai dendriittisiä soluja.
 1. Yksi yleinen dendriittinen solu (nykyään ajatellaan olevan kudismakrofageja) on Langerhansin solu, joita löytyy erityisesti ihon epidermisen ja dermisen raja-alueella.
 2. Dendriittiset solut ovat erikoistuneet antigeenien esittelyyn.
- B. Histiosytoosit ovat harvinaisia neoplastisia proliferaatioita, joissa makrofageja tai dendriittisiä soluja kertyy kudoksiin.
- C. Tärkeimmät histiosytoosit ovat dendriittistä alkuperää olevien solujen aiheuttamat histiosytoosit, joista tärkein luokka on langerhansinsoluhistiosytoosit.
 1. Eri langerhansinsoluhistiosytoosit ilmenevät eri tavoilla, mutta johtuvat samasta perushäiriöstä Langerhansin solujen proliferaatioissa.
 - a. Langerhansin solut voidaan tunnistaa elektronimikroskopiassa Birbeckin granuloistaan ("tennismailan muotoiset") sekä immunohistokemiallisesti CD1a-antigeenipositiivisuudella (spesifiset markerit CD207 ja S100).

II. LANGERHANSINSOLUHISTIOSYTOOSIT

- A. Langerhansinsoluhistiosytoosit voidaan ajatella jatkumolla, jossa vakavin tautimuoto on Letterer-Siwen tauti, heikoin muoto on eosinofiilinen granulooma ja näiden välissä on Hand-Schüller-Christianin tauti.
- B. Letterer-Siwen tauti (multifokaalinen usean elinsysteemin tauti) ilmenee yleensä <2-vuotiailla diffuusina ihottumana, kystisinä luumuutoksina ja multisysteemisenä vajaatoimintana; yleensä nopeasti fataali.
- C. Eosinofiilinen granulooma (unifokaalinen LCH) ilmenee yleensä teini-ikäisillä patologisena luunmurtumana, joka ei johdu yleisemmistä luutuumoreista, kuten osteosarkoomasta.
 1. Luuydinbiopsiassa havaitaan runsaasti langerhansin soluja ja eosinofiilejä; benigni lokalisoitu LSH:n muoto.
 2. Ei iho-ongelmia
- D. Hand-Schüller-Christianin tauti (multifokaalinen yhden elinsysteemin tauti) ilmenee yleensä lapsilla triadina: kallon lyttiset muutokset, diabetes insipidus ja eksoftalmos.
 1. Myös iho-ongelmia, yleensä päänahan ihottuma

LYMFADENOPATIA

I. PERIAATTEET

- A. Lymfadenopatia viittaa imusolmukkeiden turpoamiseen, mikä yleensä johtuu imusolmukkeen hyperplastisista muutoksista.

- B. Hyperplastiset ja tulehdusmuutokset ryhmitellään sen perusteella, mihin imusolmukkeen rakenteeseen ne vaikuttavat pääasiallisesti.
1. Yleensä puhutaan lymfadeniitista eli imusolmukkeen tulehduksesta, kun muutoksen aiheuttaa infektio.
 - a. Lymfadenopatia on yleensä kivuliasta alueilla, jotka dreneeraavat akuuttia infektiota.
 - i. Kivutonta yleensä kroonisessa infektiossa, metastaattisessa karsinoomassa tai lymfoomissa.
- C. Follikulaarinen hyperplasia viittaa B-soluvyöhykkeen hyperplasiaan. (Kuva 6.8.)
1. Lymfaattisten follikkelien itukeskukset suurenevät.
 2. Aiheuttajia ovat esim. nivelreuma, toksoplasmoosi ja HIV-infektion alkuvaiheet.
- D. Parakortikaalinen hyperplasia viittaa T-soluvyöhykkeen hyperplasiaan.
1. Aiheuttajia ovat useimmiten virusinfektiot (esim. EBV).
- E. Sinushyperplasia eli sinushistosytoosi viittaa sinusten makrofagien (histiosyyttien) lisääntymiseen.
1. Esiintyy yleensä imusolmukkeissa, jotka dreneeraavat pahanlaatuisia kasvaimia.

LYMFOOMAT

I. PERIAATTEET

- A. Lymfoomat ovat lymfosyyteistä kehittyviä primaarisia kasvaimia, jotka ilmenevät yleensä imusolmukkeissa, mutta voivat olla myös ”ekstranodaalisia” eli imusolmukkeiden ulkopuolisia (iho, ruuansulatusjärjestelmä).
1. Tavallisimmat imusolmukkeiden pahanlaatuiset kasvaimet ovat kuitenkin metastaaseja (yleensä karsinomia).
- B. Jaetaan kolmeen pääryhmään: B-solujen non-Hodgkin-lymfoomiin, T-solujen ja luonnollisten tappajasolujen non-Hodgkin-lymfoomiin ja Hodgkinin lymfoomiin.
- C. Non-Hodgkin-lymfoomien tarkemmassa jaottelussa auttaa solukoko, immunofenotyyppitys ja sytomolekyyligeneettiset tutkimukset.
1. Pelkästään B-solujen koon perusteella voidaan jakaa NHL:t kolmeen eri ryhmään:
 - a. Pienet B-solut: follikulaarinen lymfooma, manttelisolulymfooma, marginaalivyöhykkeen lymfooma ja pienisoluinen lymfosyttaarinen lymfooma (SLL)
 - b. Keskikokoiset B-solut: Burkittin lymfooma
 - c. Suurikokoiset B-solut: diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma (DLBCL)
- D. Lymfoomilla ei ole tyyppioreita, vaan oireet vaihtelevat sen mukaan, missä elimissä lymfooma ilmenee.
1. Erityisesti laajasti levinneissä lymfoomissa kuitenkin voidaan havaita yleisoireita eli ns. B-oireita (kuumeilu, yöhikoilu, painonlasku).
 - a. Ann Arborin luokitus määrittää levinneisyysasteen (A= ei yleisoireita; B=yleisoireita; levinneisyysaste I-IV).

NON-HODGKININ LYMFOOMAT

I. FOLLIKULAARINEN LYMFOOMA

- A. Suomen toiseksi tavallisin B-solujen (CD20+, CD10+) NHL (250/v), ilmenee yleensä vanhemmalla iällä kivuttomana lymfadenopatiana.

- B. Tyypillisesti havaitaan translokaatio t(14;18), joka aiheuttaa BCL2:n yliekspressiota ja siten apoptoosin inhibitiota.
 - 1. Kromosomin BCL2 siirtyy kromosomin 14 Ig:n raskaan ketjun lokukseen, joka on jatkuvasti aktiivinen.
- C. Lymfooma koostuu itukeskusten neoplastisesta nodulaarisesta proliferaatiosta; solukko koostuu pääasiassa itukeskukselle tyypillisistä sentrosyyteistä, joiden mukana on niukasti sentroblasteja; sentrosyyttien ja blastien suhde vaikuttaa gradukseen (enemmän sentroblasteja -> isompi gradus).
- D. Tärkeää pystyä erottaa reaktiivisesta follikulaarisesta hyperplasiasta:
 - 1. Lymfadeniitissa follikkelien koko ja muoto vaihtelevat; lymfoomassa pääasiallisesti tasakokoisia. (Kuva 6.9.)
 - 2. Normaali imusolmukkeen arkkitehtuuri häiriintyy lymfoomassa (itukeskuksia syvällä imusolmuketta korteksin ulkopuolella; manttelisoluvyöhyke katoaa) (Kuva 6.9.)
 - 3. Lymfoomassa imusolmukkeissa ei havaita fagotsytoivia makrofageja (tingible body macrophages; ovat havaittavissa reaktiivisessa hyperplasiassa). (Kuva 6.10.)
 - 4. Lymfooma on Bcl2-positiivinen (ei ekspressoitu follikulaarisessa hyperplasiassa).
 - 5. Lymfooma on monoklonaalinen (kappa/lambda-suhde).
- E. Hidaskasvuinen, mutta voi edetä aggressiivisemmaksi taudiksi (diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma; n. 1/3 potilaista), joka havaitaan kasvavana imusolmukkeena.
- F. Diagnoosivaiheessa yleensä laajalle levinnyt, jonka takia parantavaa hoitoa ei yleensä ole.
 - 1. Monien potilaiden tautia voidaan kuitenkin hallita lopun eliniän ajan kemoterapialla tai rituksimabilla (anti-CD20-vasta-aine).
 - a. Hoitoa annetaan vain oireisille.

II. MANTTELISOLULYMFOOMA

- A. N. 5-10% NHL-tapauksista, ilmenee keskimäärin n. 60 vuoden iässä kivuttomana lymfadenopatiaa.
- B. Tyypillisesti havaitaan translokaatio t(11;14), joka aiheuttaa sykliini D1:n yliekspressiota ja siten proliferaatiota.
 - 1. Kromosomin 11 sykliini D1 -geeni siirtyy kromosomiin 14 Ig:n raskaan ketjun lokukseen.
 - 2. Sykliini D1 on tärkeä proteiini solusyklin säätelyssä ja edistää G1/S-transitiota.
- C. Neoplastiset pienet B-solut laajentavat manttelivyöhykettä, joka on itukeskusta suoraan ympäröivä alue.
 - 1. Solut ovat CD20- ja CD5-positiivisia.
- D. Huonoennusteinen (3-5v. elossaoloennuste) varsinkin, koska diagnoosin aikaan tauti yleensä laajasti levinnyt.

III. MARGINAALIVYÖHYKKEEN LYMFOOMA

- A. Neoplastiset pienet B-solut (CD20+) laajentavat marginaalivyöhykettä, joka on manttelivyöhykkeen ja T-soluvyöhykkeen välinen alue.
 - 1. Marginaalivyöhyke muodostuu ja kasvaa inflammaatiossa, minkä vuoksi marginaalivyöhykkeen lymfooma ilmenee useimmiten kroonisissa inflammattoorisissa häiriöissä.
 - a. Itukeskuksessa alkaneen kehityksen jälkeen B-solut siirtyvät marginaalivyöhykkeeseen.

B. Marginaalivyöhykkeen lymfoomat ovat usein ekstrapodaalisia ja ilmenevät rauhasepiteeliä sisältävissä elimissä, jolloin niitä kutsutaan MALT-lymfoomiksi (mucosal-associated lymphoid tissue – lymfooma; maltooma).

1. Tyypillisin yhteys kroonisen inflammaation ja MALTooman välillä on H. Pylori -infektio ja mahalaukun MALT-lymfooma.

a. MALTooma voi hävitä helikobakteerin antibioottihäätöhoidolla.

IV. BURKITTIN LYMFOOMA

A. Keskisuurien B-solujen (CD20+) aiheuttama NHL, joka on erityisen aggressiivinen ja lähes aina ekstrapodaalinen.

B. Jaetaan endeemiseen ja sporadiseen muotoon.

1. Endeeminen muoto esiintyy Afrikassa ja on liittynyt EBV-infektioon.

a. Aiheuttaa tietyillä alueilla jopa puolet lapsuusiän syövästä.

b. Kasvain paikallistuu useimmiten leukaluuhun.

2. Sporadinen muoto on harvinaisemmin liittynyt EBV-infektioon ja kasvain yleensä paikallistuu vatsan tai lantion alueelle.

C. Diagnostiikassa auttaa c-myc-translokaatio, joka toimii myös proliferaation ajurina.

1. Translokaatio t(8;14) on yleisin: kromosomin 8 c-myc siirtyy kromosomiin 14 Ig:n raskaan ketjun lokukseen.

2. c-myc on transkriptiotekijä, jonka yliekspressio lisää solukasvua.

3. Usein havaitaan myös Bcl6-positiivisuus.

D. Histologisesti voidaan havaita runsas mitoottinen indeksi ja makrofageista muodostuva tähtitaivaskuvio. (Kuva 6.11.)

V. DIFFUUSI SUURISOLUINEN B-SOLULYMFOOMA

A. Suurien B-solujen lymfooma (CD20+); Yleisin, 30-40% NHL:stä; n. 300/v Suomessa

1. Hoitamattomana nopeasti fataali, mutta solunsalpaaja- ja anti-CD20-hoitojen myötä yli puolet potilaista voidaan parantaa.

2. On erityisen aggressiivinen ja havaitaan vanhemmalla iällä nopeasti kasvavana imusolmukkeena tai ekstrapodaalisena massana.

B. Histologisesti voidaan havaita imusolmukkeessa diffuusi eli mattomainen yleisrakenne, jossa havaitaan atyyppisia ja suuria lymfocytaarisia soluja ilman follikkelirakenteita.

C. Voi olla joko sporadinen tai transformoitunut matalamman asteen lymfoomasta, kuten follikulaarisesta lymfoomasta.

1. Sporadisesti ilmenee esimerkiksi HIV:ssä (AIDS-defining illness)

VI. MYCOSIS FUNGOIDES (IHON T-SOLULYMFOOMA)

A. T- ja NK-solujen lymfoomat ovat B-solulymfoomia harvinaisempia.

B. Mycosis fungoides on tavallisin iholymfooma (tyypillisin aikuisiässä).

C. Kypsien CD4+ T-solujen neoplastinen proliferaatio, joka infiltroituu epidermikseen ja dermoksen pinnallisiin osiin ja myöhemmin myös syvään dermikseen.

1. Infiltraatio aiheuttaa paikallisia ihottumia, plakkeja ja noduksia.

2. Neoplastiset solusaarekkeet epidermiksessä tunnetaan myös Pautrierin mikroabskesseina. (Kuva 6.12.)

3. Hidaskasvuinen ja leviää vasta myöhäisessä vaiheessa imusolmukkeisiin.

D. Solut voivat levitä vereen, mikä aiheuttaa yleistyessään Sézaryn oireyhtymän.

1. Ominaista on yleistynyt erythrodermia sekä lymfadenopatia.

2. Sivelynäytteessä havaitaan Sézaryn soluja (lymfosyyttejä, joilla serebriforminen tuma). (Kuva 6.13.)
3. Ennuste on huono (vrt. mycosis fungoidesin aikaisen vaiheen diagnoosin pitkä elinajanodote).

HODGKININ LYMFooma (HL)

I. PERIAATTEET

- A. Hodgkinin lymfoomat ovat B-solujen maligniteetteja, jotka esiintyvät bimodaalisesti yleensä 20-30 vuotiailla sekä yli 60-vuotiailla pääosin imusolmukkeissa.
- B. Hodgkinin lymfoomat erottuvat B-solu NHL:ista pääosin lymfadenopatiaa aiheuttavien solujen perusteella.
 1. HL:n aiheuttaa Reed-Sternbergin solut (RS-solut), jotka ovat yleensä B-soluperäisiä suuria soluja, jotka ovat CD15+ ja CD30+, mutta vain harvoin tyypilliselle B-solumarkkerille CD20:lle positiivisia.
 - a. Solut ovat monilohkoisia ja niillä on helposti erotettavat eosinofiiliset tumajyväset, mikä tuottaa niille tyypillisen ”pöllönsilmät”-ulkomuodon. (Kuva 6.14.)
 2. RS-solut ovat kuitenkin vain pieni osa suurentuneiden imusolmukkeiden solumassasta.
 - a. RS-solut vapauttavat sytokiinejä, jotka attraktoivat monia reaktiivisia immuunisoluja (esim. lymfosittejä, plasmakkeja, makrofageja, eosinofiilejä).
 - i. Runsaan sytokiini vapautuksen takia B-oireet ovat yleisempiä HL:issa kuin NHL:issa.
 - ii. Sytokiinit voivat myös aiheuttaa fibroosia.
 3. Reaktiiviset solut imusolmukkeissa aiheuttavat lymfadenopatian.
- C. HL voidaan jakaa kahteen päätyyppiin, klassiseen ja ei-klassiseen Hodgkinin lymfoomaan (nodulaarinen lymfositivaltainen Hodgkinin lymfooma, NLPHL).
- D. Klassinen HL (CHL) voidaan jakaa neljään eri alaluokkaan pääasillisten reaktiivisten solujen perusteella.
 1. Sidekudoskyhmyinen – Yleisin (70%); klassisesti ilmenee kasvavana imusolmukkeena kaulalla tai mediastinum alueella kookkaana imusolmukekasvaimena.
 - a. Histologisesti voidaan havaita: (Kuva 6.15.)
 - i. kova ja kyhmyinen imusolmuke, jota fibroottiset septat erottaa solukon saarekkeisiin.
 - ii. RS-soluja, jotka istuvat lakuunoissa (lakunaarisia soluja). (Kuva 6.16.)
 2. Runsaslymfositivaltainen – Paras ennuste; imusolmukkeessa hyvin runsaasti lymfosittejä.
 3. Sekasoluihin – imusolmukkeessa havaitaan sekalaisesti reaktiivisia soluja (erit. eosinofiilejä)
 4. Vähälymfositivaltainen – Huonoin ennuste; imusolmukkeessa vähän RS-soluihin liittyviä lymfosittejä

- E. NLPHL on harvinainen HL:n alaluokka, jossa malignit solut ovat LP-soluja (lymphocyte predominant, ”pop corn” -solut), jotka ovat yleensä CD15- ja CD30- negatiivisia, mutta CD20-positiivisia. (Kuva 6.17)
- F. EBV-infektio lisää riskiä Hodgkinin lymfoomille.

PLASMASOLUTAUDIT

I. PERIAATTEET

- A. Tunnetaan myös monoklonaalisisina gammapatioina, joissa plasmaselujen kloonit tuottavat vereen tai virtsaan immunoglobuliinimolekyyliä tai sen osaa eli monoklonaalista paraproteiinia (M-komponentti elektroforeesissa).
 - 1. Paraproteiini tarkoittaa siis immunoglobuliinia tai immunoglobuliinin kevyttä ketjua (Bence Jones proteiini), joka havaitaan veressä tai virtsassa klonalisesti proliferoituvien kypsien B-selujen tuottamana.
 - 2. SPEP:ssa (serum protein electrophoresis) eli S-Prot-Fr havaitaan M-piikki -> tutkitaan tarkemmin immunofiksaatiossa.
- B. Monoklonaalisisia gammapatioita ovat esimerkiksi plasmaselomyelooma, plasmosytoomat, merkitykseltään epäselvä monoklonaalinen gammapatia (MGUS) ja Waldenströmin makroglobulinemia.

II. PLASMASOLUMYELOOMA (MULTIPPELI MYELOOMA)

- A. Yleisin plasmaselutauti (300/v Suomessa), keskimääräinen sairastumisikä 65-70v.
 - 1. Myös yleisin luun primaarinen kasvain (metastaasi kuitenkin kaiken kaikkiaan yleisin).
- B. Luuytimen plasmaseluklonaalinen syöpä, jossa neoplastiset plasmaselut erittävät vereen ja virtsaan runsaasti monoklonaalista immunoglobuliinia (yleensä IgG tai IgA, joskus muita immunoglobuliineja tai vain kevyttä ketjua).
 - 1. Havaitaan M-piikkinä SPEP:ssa.
 - 2. Klonaalisten plasmaselujen proliferaatio on IL-6:sta riippuvainen, joten usein voidaan havaita korkea seerumin IL-6.
- C. Kliinisiin piirteisiin kuuluu (CRAB):
 - 1. Luustokipu (myelooman yleisin oire, yleensä selkäkipu) ja hyperkalsemia
 - a. Myeloomasolut tuottavat runsaasti sytokiineja, jotka stimuloivat osteoklastivälitteistä luuresorptiota.
 - b. Röntgenkuvauksessa voidaan havaita osteolyttisiä luustomuutoksia (syöpymäpesäkkeitä). (Kuva 6.18)
 - c. Aiheuttaa patologistia murtumia (erit. selkärangan) sekä kohonnutta seerumin kalsiumia.
 - 2. Munuaisten vajaatoiminta
 - a. Kevytketjumyeloomissa kevyt ketju erittyy virtsan kautta Bence Jones -proteiineina, jotka voivat saostua munuaisten tubuluksiin ja estää virtsan kulkua nefronin läpi.
 - i. UPEP tunnistaa Bence Jones -proteiinit.
 - ii. Seerumin vapaa kevytketju -veritutkimus tunnistaa seerumin kappa-/lambda-kevytketjut, ja positiivisena kertoo myös niiden olon virtsassa.

- b. Hyperkalsemia myös edistää munuaisten vajaatoimintaa
 - i. voi aiheuttaa munuaisissa vasokonstriktiota -> GFR:n pieneneminen
 - ii. voi kiteytyä fosfaatin kanssa ja kertyä munuaiskudokseen -> nefrokalsinoosi

3. Anemia

- a. Normosyyttinen ja normokroominen
 - i. Veren sivelynäytteessä havaitaan usein myös punasolujen Rouleaux-formaatiota, joka johtuu runsaasta seerumin proteiinimäärästä, joka vähentää punasolujen välistä hylkivää jännitettä.
- b. Luuytimen täyttyminen plasmasoluista ja munuaisten vajaatoiminnasta johtuva EPO-tasojen vähentyminen johtavat anemiaan.

4. Infektioalttius

- a. Monoklonalisilla vasta-aineilla ei ole diversiteettiä; infektio on yleisin kuolinsyy.

5. Primaarinen AL amyloidoosi

- a. Vapaat kevytketjut seerumissa voivat tallettua kudoksiin -> sydän-, munuais-, maksa- ja keuhkokomplikaatiot.

III. MERKITYKSELTÄÄN EPÄSELVÄ MONOKLONAALINEN GAMMAPATIA (MGUS)

A. MGUS on asymptomattinen plasmasolutauti, jossa havaitaan M-piikki SPEP:ssa ilman muita multippelin myelooman piirteitä.

- 1. MGUS voi kuitenkin edetä multippeliksi myeloomaksi (vain pieni osa).

B. Esiintyvyys kasvaa iän myötä (yli 70-vuotiailla 3%:lla ja yli 85-vuotiailla jopa 10%:lla).

IV. WALDENSTRÖMIN MAKROGLOBULINEMIA (LYMFOPLASMASYTTINEN LYMFooma)

A. B-solulymfooma, jossa tuumorisolut tuottavat runsaasti IgM-vasta-aineita.

- 1. IgM on suuri pentameeri, joka aiheuttaa runsin määrin veressä hyperviskositeettia.
 - a. Ilmenee mm. näkö- ja neuropsykiatrisina häiriöinä, verenvuotoalttiutena, iho-oireina (Raynaud'n oireyhtymä), perifeerisenä neuropatiana ja/tai anemiana.
 - b. Hyperviskositeettioireyhtymä voi olla hätätilanne – hoidetaan plasmafereesillä

B. Eroaa multippelistä myeloomasta siten, että ei aiheuta osteolyyttisiä luumuutoksia, ja SPEP:n M-piikin tyypityksessä havaitaan sen johtuvan IgM:sta eikä IgG:sta, IgA:sta tai kevytketjusta.

C. Pienen ja vakaan IgM-pitoisuuden tilanteessa on vaikea erottaa MGUS ja Waldenström toisistaan, mutta Waldenströmin makroglobulinemiassa havaitaan luuytimessä lymfoplasmasyyttinen infiltraatio.

7 VERISUONIPATOLOGIA

HYPERTENSIO (VERENPAINETAUTI, RR-TAUTI)

I. PERIAATTEET

- A. Verenpaineen määritelmä on sydämen minuuttitilavuuden ja ääreisverenkierron vastuksen tulo.
 - 1. Pysyvästi kohonnut verenpaine johtuu siis jommankumman tai molempien kasvusta.
- B. Kohonneen verenpaineen raja-arvo on 140/90 mmHg.
- C. Hoitamattomana kohonnut verenpaine lisää aterosgeneesia ja degeneratiivisia muutoksia verisuonissa johtaen useisiin elinvarioihin, kuten aivojen, munuaisten, silmien ja sydämen vaurioihin.
- D. Verenpainetauti jaetaan primaariseen (essentielli, idiopaattinen) tai sekundaariseen.
 - 1. Kohonnut verenpaine on essentiellää n. 95% tapauksista.
 - a. Tarkat tekijät ovat epäselviä, mutta esimerkiksi ikä, rotu, ylipaino, geneettiset tekijät, stressi, tupakointi ja korkea suolan saanti lisäävät riskiä verenpainetaudille.

II. SEKUNDAARINEN HYPERTENSIO

- A. Kohonneelle verenpaineelle voidaan paikantaa tietty syy harvoin.
- B. Yhden tai useamman munuaisvaltimon ahtauma on tavallisin syy (renovaskulaarinen hypertensio).
 - 1. Ahtauma vähentää glomeruluksen perfuusiopainetta
 - a. Yleensä stenoosi on unilateraalinen, jolloin toinen munuainen kompensoi vähentynyttä eritystä ja affisioitunut munuainen atrofioiduu.
 - 2. Munuaisen jukstaklomerulaarielin vastaa lisäämällä reniinin eritystä.
 - 3. Reniini konvertoi angiotensinogeenia angiotensiini I:ksi.
 - 4. Angiotensiiniä konvertoiva entsyymi (ACE) konvertoi angiotensiini I:tä angiotensiini II:ksi (ATII).
 - 5. ATII vaikuttaa verenpaineeseen monella keinolla:
 - a. Vasokonstriktori (perifeerinen vastus kasvaa)
 - b. Stimuloi aldosteronin eritystä lisämunuaisista
 - i. Aldosteroni lisää Na⁺ ja veden reabsorbaatiota distaalisesta tubuluksesta eteenpäin (pääasiassa kokoojaputkessa principal-soluissa).
 - ii. Plasmatilavuuden kasvaminen lisää verenpainetta.
 - c. Lisää suoraan Na⁺ reabsorbaatiota proksimaalisessa tubuluksessa.
 - d. Lisää ADH:n vapautumista posteriorisesti aivolisäkkeestä; lisää myös janon tunnetta hypotalamuksen kautta.
- C. Ahtauman aiheuttaa tavallisimmin ateroskleroosi (60-90%; vanhemmat miehet) tai fibromuskulaarinen dysplasia (10-30%; nuoret naiset).
 - 1. FMD:ssä verisuonen (erit. munuaisvaltimon) seinämän soluja korvautuu fibroottisilla soluilla, joka johtaa tiettyjen osien paksuuntumiseen muodostaen ”helminauha”-kuvion angiografiassa. (Kuva 7.1.)
 - a. Klassisesti ilmenee pääkipuna ja korkea verenpaineena nuorella naisella.
- D. Mm. myös endokriiniset häiriöt voivat aiheuttaa sekundaarista hypertensiota.
 - 1. Esim. Connin tai Cushingin oireyhtymät, hypertyreoosi tai feokromosytooma.

III. HYPERTENSIIVINEN KRIISI

- A. Suuren valtaosan ajasta hypertensio on ns. ”benignä” eli lievää tai kohtalaisesti kohonnutta, mikä vaurioittaa elimiä hitaasti.

- a. Hypertensio voi olla myös ”malignia”, josta käytetään nykyään termiä hypertensiivinen kriisi.
- B. Hypertensiivinen kriisi tarkoittaa tilaa, jossa systolinen paine on >200 mmHg tai diastolinen >130 mmHg.
 - a. Yleensä taustalla pitkäaikainen verenpainetauti, mutta voi myös syntyä de novo.
- C. Kriisi jaetaan vaikeusasteen mukaan hypertensiiviseen hätätilanteeseen tai kiiretilanteeseen.
 - a. Hätätilanteessa havaitaan kohde-elinvaurioita, kuten akuuttia munuaisten vajaatoimintaa, verkkokalvon verenvuotoja, pääkipua ja papilledemaa.
 - b. Kiiretilanteessa vaikeat kohde-elinlöydökset puuttuvat ja potilaat ovat yleensä oireettomia.

ARTERIOSKLEEROOSI (VALTIMONKOVETTUMISTAUTI)

- I. PERIAATTEET
 - A. Yleistermi valtimoiden seinämien paksunemiselle ja kimmoisuuden vähenemiselle.
 - B. Tavallisesti syynä ateroskleroosi (rasvakovettumistauti), joskus arterioloskleroosi tai mediaskleroosi (Mönckebergin skleroosi)
- II. ATEROSKLEEROOSI (RASVAKOVETTUMISTAUTI)
 - A. Kliinisesti tärkein intiman tauti, jossa intimaan kehittyä sidekudoksinen ateroskleroottinen plakki (ateroomaplakki), joka häiritsee verenvirtausta.
 - B. Affisioi suuria ja keskikokoisia valtimoita (intima on paksumpi näissä).
 - 1. Sepelvaltimot, vatsa-aorta, alaraajojen suuret valtimot (esim. a. poplitea), sisempi pään valtimo (a. carotis interna) ja kallonpohjan valtimot ovat yleisimmät alueet, joissa ateroskleroosia havaitaan.
 - 2. Erityisesti haaroittumiskohdat ovat riskialttiita.
 - C. Tärkeimmät muokattavat riskitekijät ovat hyperlipidemia, tupakointi, verenpainetauti ja diabetes.
 - 1. Erityisesti korkea seerumin LDL (>3,0 mmol/l)
 - a. Korkea HDL (>1 mmol/l) vähentää riskiä
 - 2. Myös systeeminen krooninen inflammatio lisää riskiä (CRP ennustaa sydän- ja verisuonitapahtumia).
 - D. Riskitekijöitä, joita ei voi muokata ovat ikä, sukupuoli ja geeniperimä.
 - 1. Riski kasvaa vanhentuessa
 - 2. Miehillä ja postmenopausisilla naisilla suurempi riski, sillä estrogeeni on ateroskleroosilta suojaava tekijä.
 - E. Patogeneesi (response-to-injury-hypoteesi)
 - 1. Vaurio endoteeliin (esim. hypertensio) mahdollistaa lipidien ja monosyyttien siirtymisen seinämään.
 - 2. Lipidit oksidoituvat ja makrofagit syövät lipidejä ja muuttuvat vaahtoplasmaisiksi makrofageiksi.
 - a. Nähdään rasvajuosteena jo lapsilla.
 - b. Makrofagit eivät pysty tarpeeksi tehokkaasti poistamaan rasvajuosteiden lipidejä ja kehitys ateroomaplakiksi jatkuu.

3. Makrofagit aiheuttavat tulehdusta ja sen parantumista erittämällä sytokiineja, jotka houkuttelevat sileäihassoluja mediasta ja stimuloivat niiden proliferaatiota sekä ECM:n muodostusta.
 - a. Myös sileäihassolut voivat fagosytoida lipidejä, mutta lopulta kuolevat kuten makrofagitkin.
4. Lopulta muodostuu fibroaterooma, joka koostuu nekroottisesta lipidiytimestä ja fibromuskulaarisesta kuoresta.
 - a. Yleensä havaitaan myös dystrofista kalsifikaatiota
5. Aterooma paksuntaa intimaa ja ahtauttaa suonta. (Kuva 7.2.)

F. Komplikaatiota:

1. Suonten stenoosi voi tapahtua hitaasti, ja n. 75% okkluusiossa havaitaan raskuudessa affisioituneen elimen iskemiaa.
 - a. Angina pectoris tarkoittaa rintakipua, joka johtuu sepelvaltimoiden ahtautumisesta.
 - i. Vakaa angina pectoris havaitaan raskuudessa, epävakaa levossa.
 - b. Ääreisvaltimotauti havaitaan kaudikaationa eli katkokävelynä, joka johtuu kivusta kävelyn tuottaman raskuksen takia.
 - c. Iskeeminen koliitti (suolilievestenosis) havaitaan vatsakipuna ja aiheuttaa n. 20% alemman ruoansulatuskanavan verenvuodoista.
 - d. Iskeeminen enkefalopatia (neurodegeneraatio ja muistisairaudet)
2. Sydän ja suoli-infarktit sekä aivohalvaus ovat useimmiten seuraus epävakaan plakin repeämisestä ja sen aiheuttamasta tromboosista.
3. Plakki voi myös revetessään embolisoitua ja kulkea perifeerisiin kudoksiin aiheuttaen niiden infarkteja.
4. Ateroskleroosi heikentää verisuonen seinämää, mikä altistaa aneurysmalle eli paikalliselle verisuonen tai sydämen seinämän dilataatiolle (vatsa-aortan aneurysmat yleisimpiä)
 - a. Aneurysma voi puhjeta ja aiheuttaa usein fataalia hemorragiaa.

III. ARTERIOLOSKLEROOSI

- A. Arterioskleroosi on verenpainetaudin tyyppimuutos ja tarkoittaa arteriolien kovettumista ja ahtautumista.
- B. Jaetaan hyaliiniseen ja hyperplastiseen arterioskleroosiin.
- C. Hyaliininen arterioskleroosi syntyy proteiinien deponoitumista seinämään, mikä aiheuttaa seinämän paksuuntumista.
 1. Aiheuttajia ovat diabetes ja benigni hypertensio.
 - a. Glukoosi yhdistyy arteriolien tyvikalvon proteiinien kanssa (nonentsymaattinen glykosylaatio, NEG eli glykaatio), mikä lisää tyvikalvon proteiinien tihkumista seinämään.
 - b. Hypertensio työntää plasman proteiineja seinämään.
 2. Mikroskopiassa havaitaan hyaliinista eli rakenteetonta, eosinofiilistä paksuuntumista. (Kuva 7.3.)
 3. Tyyppiesimerkki on munuaisen hypertensiivinen nefroskleroosi, mikä etenee hitaasti krooniseksi munuaisen vajaatoiminnaksi.

D. Hyperplastinen arterioloskleroosi johtuu median sipulinkuorimaisesta sileälihasproliferaatiosta, joka kaventaa verisuonen läpimittaa usein voimakkaasti. (Kuva 7.4.)

1. Johtuu malignista hypertensiosta.
2. Voi johtaa jopa fibrinoidiin nekroosiin ja hemorragioihin.
3. Tyypiesimerkki kohde-elimien iskemiasta on akuutti munuaisten vajaatoiminta, joka havaitaan pieninä petekkioina munuaisen pinnalla ("flea bitten"). (Kuva 7.5.)

IV. MÖNCKEBERGIN SKLEROOSI (KALSIFOIVA MEDIASKLEROOSI)

A. Yleinen vanhemmilla ihmisillä esiintyvä keskisuurten valtimoiden mediakerroksen skleroosi ja kalkkiutuminen. (Kuva 7.6.)

1. Tärkeimmät riskitekijät ovat ikääntyminen, diabetes ja munuaisten vajaatoiminta; muut ateroskleroosin tyypilliset riskitekijät eivät ole roolissa.
2. Ei havaita lipidikertymää eikä tulehdusta.

B. Intima ei ole affisioitunut, joten verisuonen lumenin obstruktiota ei havaita eikä siten tautiin liity yleensä kliinisiä oireita.

C. Häiritsee alaraajojen tukkivassa valtimotaudissa (ASO-tauti) nilkka-olkavarsipainesuhteen mittausta (ABI-mittaus), koska valtimoiden jäykistyessä niiden kompressio nilkassa ei onnistu yhtä helposti -> ABI-mittaus antaa valheellisen korkean arvon

1. Diabeetikoilla, iäkkäillä ja munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ABI mittaus voi olla epäluotettava
 - a. Mediaskleroosi ei yleensä affisioi digitaalivaltimoita, jolloin varvaspainemittaukset antavat luotettavamman kuvan raajan verenkiertotilanteesta näillä potilailla
2. Ajatellaan, että on itsenäinen riskitekijä ASO-taudin kehittymiselle ja pahenemiselle
 - a. Jäykistää valtimoiden seinämiä ja johtaa niiden toimintahäiriöön sekä altistaa trombooseille.

ANEURYSMAT JA AORTAN DISSEKOITUMA

I. PERIAATTEET

A. Aneurysmat ovat synnynnäisiä tai hankittuja valtimoiden tai sydämen seinämän pullistumia ($>1,5\times$ normaali läpimitta).

1. Laskimoissa kutsutaan laskimonlaajentumaksi eli kohjuksi (varix).

B. "Todellinen" aneurysma tarkoittaa pullistumaa, jossa on mukana kaikki suonen seinämän kerrokset.

1. Jaetaan muodon mukaan sakkulaarisiin (berry aneurysm) ja fusiformisiin aneurysmiin.
 - a. Sakkulaariset ovat yksipuolisia pullistumia, jotka sijaitsevat erityisesti aivoverisuonien haarautumiskohdissa (puuttuu tukeva adventitia).

- b. Fusiformiset ovat sukkulamaisia ja suurempia ja niitä havaitaan yleensä aortan aneurysmissa.
- C. Pseudoaneurysmassa vain adventitia ympäröi pullistumaa.
 - 1. Syntyy tyypillisesti veren vuotaessa sisempien kerrosten läpi, mutta adventitia tai ympäröivä perivaskulaarinen kudος sulkee sen sisäänsä.
- D. Aortan dissekoitumassa intima repeää ja veri infiltroituu seinämään erottaen kerroksia toisistaan.

II. VATSA-AORTAN ANEURYSMA (AAA)

- A. Aneurysmien yleisin tyyppi on degeneratiivinen (ateroskleroottinen) aneurysma, joiden tyyppipaikka on vasta-aortta; yleensä munuaisvaltimoiden alapuolella, mutta ennen haarautumaa a. iliaca communiksiksi. (Kuva 7.7.)
 - 1. Aterooma toimii esteenä hapen diffuusiolle mediaan, mikä johtaa seinämän atrofiaan ja heikkouteen.
 - 2. Voi harvoin myös olla ns. mykoottinen aneurysma eli infektion aiheuttama (yleisimmät patogeenit ovat *S. aureus* ja *Salmonella*-alalajit)
- B. Yleisintä yli 60-vuotiailla tupakoivilla miehillä, joilla on korkea verenpaine.
- C. Yleensä oireeton, mutta voi aiheuttaa kompressio-oireita (esim. virtsanjohtimen tai läheisten haarautuvien verisuonten kompressio) ja kipu on yleensä merkki laajenemisesta.
- D. Repeäminen on vaarallinen komplikaatio, jota ennustaa parhaiten aneurysman läpimitta.
 - 1. Korkean repeämisriskin tilanteissa (miehillä yli 55mm ja naisilla yli 50mm) hoidetaan leikkauksella.
 - 2. Puhkeaminen ilmenee rajuna vatsakipuna joka säteilee selkään (voi myös säteillä kylkeen, nivustaipeisiin, kiveksiin tai reiden yläosiin), hypotensiivisenä sokkina ja sykkivänä massana vatsassa; kokonaiskuolleisuus on n. 75%.
 - a. Ruptuura yleensä retroperitoneaalisesti, jolloin vuoto tamponoituu hetkeksi -> parempi kuin intraperitoneaalinen ruptuura (repeämä on aneurysman etuseinässä ja vuoto pääsee vapaaseen vatsaonteloon), jossa potilas usein kuolee ennen kuin hän ehtii sairaalaan.

III. RINTA-AORTAN ANEURYSMA (TAA)

- A. Assosiaatio ateroskleroosiin, hypertensioon, kaksipurjeiseen aorttaläppään ja median kystiseen nekroosiin (esim. Marfanin oireyhtymä) sekä klassisesti kuppaan. (Kuva 7.8.)
- B. Tertiäärinen syfilis aiheuttaa vasa vasorumin endarteriittia, joka vähentää aortan seinämää ruokkivaa verenvirtausta ja johtaa seinämän atrofiaan. (Kuva 7.8.)
 - 1. Nykyään hyvin harvinainen.
- C. Ilmenee usein rintakipuna, ja voi myös AAA:n tapaan aiheuttaa kompressio-oireita, kuten hengitysvaikeuksia (henkitorven kompressio), äänen käheyttä (äänihuulten hermojen kompressio) tai nielemisvaikeuksia (esofaguksen kompressio).
- D. Aorttaläpän dilataatio on vakava komplikaatio, johtaa aorttaläpän regurgitaatioon.

IV. AORTAN DISSEKOITUMA

- A. Intima repeää ja veri pääsee virtaamaan aortan seinämän sisälle tyypillisesti edeten mediakerrosta pitkin.
1. Osa ryhmää diagnooseja, joita kutsutaan akuutiksi aorttaoireyhtymäksi (AAS). Kaksi muuta ovat intramuraalihematooma (IMH) ja penetroiva ateroskleroottinen ulkus (PAU)
 2. IMH: verta pääsee intiman sisälle, mutta trombotisoituu ja intima pysyy ehjänä; johtuu intiman mikrorepeämistä ja/tai vasa vasorumin repeämistä. Voi johtaa dissekoitumaan jos hematooma rupturoituu
 3. PAU: ateroskleroottinen plakki ulseroituu ja penetroi suonen seinämän mediaan jonka seurauksena voi syntyä intramuraalinen hematooma tai dissekoituma tai jopa aortan perforaatio
- B. Useimmiten ilmenee keski-ikäisillä miehillä, joilla taustalla korkea verenpaine.
1. Hypertensio johtaa vasa vasorumin hyaliiniin arterioloskleroosiin ja siten median atrofiaan.
- C. Nuoremmilla voi johtua perinnöllisistä sidekudoksen heikkouksista, kuten Marfanin ja Ehlers-Danlosin oireyhtymistä, joihin liittyy median kystinen nekroosi.
1. Ehlers-Danlosin oireyhtymä (EDS) on iso ryhmä perinnöllisiä tukikudoksen sairauksia (kollageenin muodostuminen häiriintynyt); mutatoitunut geeni määrää tyypin (kaikkia ei ole tunnistettu; esim. hypermobiilille muodolle ei ole tyypillistä mutaatiotaan)
 - a. Yleisin on hypermobiili muoto, jolle on tyypillistä nivelten ylitaipaisuus ja yli liikkuvuus; altistaa mm. nivelluoksaatioille
 - b. Klassinen EDS: Nivelten ylitaipaisuuden lisäksi merkittävä ihon ylivenyvyys ja samettisuus (myös hypermobiilissa muodossa voi olla mukana, mutta vähäisempää); tyypin V kollageenin häiriö
 - c. Vaskulaarinen EDS (vakavin ja harvinainen): Johtuu COL3A1-mutaatiosta, joka häiritsee tyypin III kollageenin synteesiä ja rakennetta -> verisuonien ja onttojen elimien (esim. suoliston) seinämien heikkous -> valtimoiden, sigmasuolen ja kohdun repeämille alttius
 2. Marfanin oireyhtymä johtuu yleensä fibrilliini 1- eli FBN1-geenin mutaatioista
 - a. Fibrilliini on elastiinin ympärille tupen muodostava glykoproteiini; elastiini antaa kudoksille niiden elastisiteetin -> häiriö aiheuttaa aortan lisääntyntä jäykkyyttä -> heikentynyt paineen sieto -> aneurysma-/dissekoituma-alttius (dissekoituma yleisin kuolemaan johtava komplikaatio Marfanissa)
 - i. Myös läppien ongelmat; varsinkin mitraaliläpän prolapsi ja vuoto
 - b. Tyypillisiä ulkoisia piirteitä (Marfanoidi habitus) ovat mm. pitkäraajaisuus, pectus excavatum (suutarinkuoppa), nivelten

ylitaipuvuus ja araknodaktylia (hämähäkkisormisuus, pitkät sormet suhteessa kämmeneen); myös korkea kitalaki ja kapea maxilla tyypillistä -> johtaa hampaiden ahtautumiseen

- c. Aiheuttaa myös silmäongelmia, joista merkittävin on linssiluksaatio (mutatoituneet fibrilliinit -> toimimattomat linssin tukirakenteet ja alttius vaurioille)

D. Potilailla tyypillisesti repivä rintakipu, joka säteilee selkään (voi olla myös hyvin vähäoireinen).

- 1. Erotusdiagnoosi infarktista on tärkeä, koska trombolyyssihoito on dissekoitumassa vasta-aiheinen.
 - a. A-tyyppi hoidetaan leikkauksella, komplisoitumaton B-tyyppi konservatiivisesti (verenpaineen hallinta)

E. Komplikaationa kehittyy mm.

- 1. Sydänpussin tamponaatio – matala verenpaine ja pulssipaine, yleisin kuolinsyy
- 2. Aortan sivuhaarojen verenkierron estyminen – sivuhaaralle tyypillinen infarktin taudinkuva, esim. sydäninfarkti tai akuutti munuaisten vajaatoiminta
- 3. Seinämän ruptuura – massiivinen tappava verenvuoto
- 4. Aorttaläpän akuutti vuoto

F. Dissekoitumat jaetaan Stanfordin ja Debayken luokitteluilla.

- 1. Stanfordin A-tyyppi (yleisin) on nousevan aortan dissekaatio; yleisin repeämispaikka on aortan tyvessä, muutama senttimetri aorttaläpän yläpuolella (korkean stressin alue).
 - b. Tyyppin I ja II DeBakeyn luokat ovat Stanfordin A-tyypin dissekoitumia.
 - i. Tyyppin I – dissekoituma yltää vähintään aortan kaareen
 - ii. Tyyppin II – dissekoituma pysyy nousevan aortan alueella; korkein mortaliteetti
- 2. Stanfordin B-tyyppi on laskevan aortan dissekaatio, joka alkaa vasemman solisvaltimon distaalipuolella.
 - a. DeBakeyn tyyppin III dissekoituma kuvaa samaa, mutta voi affisoida myös aortan kaartaa ja nousevaa osaa. B-tyyppi pysyy vain laskevassa aortassa.
- 3. Uudemmissa eurooppalaisissa guidelineeissa eroteltu myös non-A-non-B-dissektio, joka ei ole nousevan aortan alueella tai pelkästään laskevassa aortassa
 - a. Intimaalinen repeämä sijaitsee joko distaalisesti vasemmasta solisvaltimosta (veri virtaa retrogradisesti aortan kaareen, mutta ei nousevaan aorttaan) tai truncus brachiocephalicuksen ja vasemman solisvaltimon välissä (veri voi edetä kaartaa ja laskevaa aorttaa eteenpäin)

VASKULIITIT

I. PERIAATTEET

- A. Vaskuliitit ovat verisuonia (useimmiten valtimoita) tuhoavia verisuonen seinämän tulehdustauteja.
1. Sekä valtimoiden että laskimoiden seinämä koostuu kolmesta pääkerroksesta: sisimpänä endoteeli ja sen alla ohut sidekudoskerros (tunica intima), keskikerroksena sileää lihasta (tunica media) ja ulkokerroksena löyhää sidekudosta (tunica adventitia). (Kuva 7.9)
 - a. Adventitian läpi kulkee nutrienttisuonia (vasa vasorum), jotka ruokkivat suuria verisuonia.
- B. Patogeneesi on usein epäselvä, mutta taustalla on usein autoimmuuninen reaktio, jossa immuunijärjestelmä hyökkää verisuonten seinämää vastaan.
- C. Kliininen kuva vaihtelee, mutta hoitamattomina vaskuliitit ovat usein tappavia; yhteisiä piirteitä ovat esimerkiksi:
1. Yleisiä epämääräisiä tulehdusoireita, kuten kuume, väsymys, lihaskivut ja painonmenetys
 2. Spesifisiä oireita, jotka määräytyvät tietyn ongelmallisen verisuonen perusteella
 - a. Tietty elin voi infarktoitua, sillä verisuonen lumen kutistuu tai voi tukkiutua tromboosin takia.
 - i. Tulehduksen aiheuttaman endoteelivaurion parantumisreaktiossa endoteeli proliferoituu sekä fibriniä deponoidaan runsaasti seinämään, mikä vie tilaa lumenissa.
 2. Tulehdus voi levitä perifeerisiä hermoja ruokkiviin verisuoniin ja siten aiheuttaa vaskuliittista neuropatiaa, jonka ilmeneminen vaihtelee affisioituneen alueen perusteella.
 - a. Oireet ovat epäsymmetrisiä; mm. parestesiat, turtuminen, kipua ja raajojen lihasten heikkous.
- D. Vaskuliitit voidaan luokitella affisioituneiden verisuonten koon perusteella kolmeen luokkaan:
1. Suurten verisuonien vaskuliitit – aortta ja siitä haarautuvat suurimmat valtimot
 2. Keskikokoisten verisuonten vaskuliitit – lihasvaltimot
 3. Pienten verisuonten vaskuliitit – arteriolit, hiussuonet ja venulit
 - a. Jaetaan vielä ANCA-positiivisiin ja -negatiivisiin vaskuliitteihin.

II. SUURTEN VERISUONTEN VASKULIITIT

- A. Jättisoluarteriitti (temporaaliarteriitti)
1. Klassisesti kaulavaltimoiden haarojen granulomatoottinen vaskuliitti.
 2. Arteriiteista yleisin, Suomessa muutama sata tapausta vuosittain
 - a. Ilmaantuu yleensä yli 50-vuotiailla naisilla
 3. Kliinisesti sairaus alkaa epämääräisesti ilman paikallisoireita, mutta useimmissa tapauksissa esiintyy toispuolista kasvo- ja päänsärkyä, erityisesti ohimovaltimon alueelle.
 - a. Näkökyky laskee usein, sillä a. ophtalmica voi tulehtua; myös diplopiata voi ilmetä.
 - b. Leukaklaudikaatio (kipu pureskellessa) on myös tyypillistä.

4. Tarkka patogeneesi on tuntematon, mutta oletetusti T-soluvälitteisen autoimmuunireaktion välittämä; puolelta potilaista taustalta löytyy polymyalgia rheumatica (lihasreuma).
 - a. Lihasreumassa esiintyy suurten lihasten kipua ja jäykkyyttä niskan, olkapäiden ja lonkkien seudulla.
5. Diagnosoidaan histologisesti ohimovaltimobiopsiasta:
 - a. Granulomatoottinen intiman tulehdus, jossa voidaan havaita intiman fibroosia ja fragmentaatiota sekä jättisoluja. (Kuva 7.10.)
 - b. Inflammaatio on segmentaalista, joten tutkittavaksi vaaditaan pitkä pala eikä negatiivinen löydös ei sulje tautia pois.
 - c. Lasko ja CRP ovat usein merkittävästi suurentuneita.
6. Hoidetaan suurilla annoksilla kortikosteroideja, mikä heikentää aiheuttavaa immuunireaktiota.
 - a. Nopea diagnosointi on tärkeää, sillä alkuvaiheen steroidihoito tehokkaasti hoitaa sairauden ja ehkäisee pysyvän näönmenetyksen.

B. Takayasun arteriitti (pulssiton arteriitti)

1. Pääasiassa aortan ja sen valtimopäähaarojen granulomatoottinen vaskuliitti.
2. Tavataan yleisimmin alle 40-vuotiailla Aasialaisilla naisilla.
3. Klassiset edenneen taudin oireet johtuvat raajojen verisuoni-insuffiensienssistä:
 - a. Sormien kylmyys ja turtuneisuus
 - b. Katkokävely (klaudikaatio)
 - c. Heikko pulssi -> pulssiton arteriitti
 - d. Myös näköhäiriöt ja neurologiset oireet ovat tavallisia.
4. La ja CRP ovat yleensä hyvin kohonneet.
5. Hyvin samanlainen kliininen ja histologinen kuva kuin jättisoluarteriitilla, eroavat toisistaan pääasiassa potilaiden iän ja tavallisimpien affisioituneiden alueiden perusteella.
6. Diagnosoidaan magneetti- tai TT-angiografialla.
7. Hoidetaan kortikosteroideilla.

III. KESKIKOKOISTEN VERISUONTEN VASKULIITIT

A. Polyarteritis nodosa (valtimoiden kyhmytulehdus)

1. Systeeminen keskikokoisten ja pienten valtimoiden nekrotisoiva (fibrinoidia) vaskuliitti, jolle on tyypillistä satunnaisuus – mikä tahansa elin voi affisioitua keuhkoja lukuunottamatta.
2. Esiintyy yleensä keski-iässä.
3. Verisuonten seinämän transmuraalinen nekrotisoiva tulehdus voi aiheuttaa aneurysmia, joka tuottaa taudille tyypillisen ”helminauha”-kuvion magneettiangiografiassa.
4. Nekroosin aiheuttama parantuminen ja tromboosialttius voivat johtaa verisuonen obstruktion ja sitä seuraavan infarktin lähes kaikissa elimissä.
 - a. Munuaisvaltimot ovat yleisimmin affisioituneet – aiheuttaa hypertensiota; munuaisten vajaatoiminta yleisin kuolemansyy
 - b. Sepelvaltimot seuraavaksi yleisimmin – muistuttaa sepelvaltimotautia
 - c. Suoliston valtimot – vatsakipu ja meleena (mustat ulosteet)
5. Assosiaatio hepatiitti B:hen; n. 10-30% potilaista on HBsAG-kantajia.

6. Fataali ilman hoitoa, hoidetaan kortikosteroideilla (vakavat syklofosamidilla).

B. Kawasakiin tauti (mucocutaneous lymph node syndrome)

1. Varhaislapsuuden akuutti kuumetauti, jossa useimmiten esiintyy sepelvaltimoiden vaskuliittia.
 - a. Voi johtaa aneurysmamuodostukseen ja sen mahdolliseen tromboosiin tai repeämiseen, mitkä voivat aiheuttaa sydäninfarktin.
2. Klassisesti ilmenee kliinisesti pitkittynenä kuumeiluna, konjunktiviittina, mansikkakielenä, tuhkarokkomaisena ihottumana vartalolla sekä hilseilevänä ja edeemisenä palmoplantaarieryteemana.
 - a. Myöhemmin ilmenee yleensä myös kaulan imusolmukkeiden lymfadenopatiaa.
3. Oletetaan olevan geneettisesti alttiilla lapsilla mikrobi-infektion laukaisema yliherkkyyssreaktio; tavataan useimmiten Aasialaisilla lapsilla (Suomessa vain n.30 tapausta vuosittain).
4. Tauti on yleensä itsestään rajoittuva, mutta hoidetaan aspiriinilla ja IVIG:llä.
 - a. Poikkeus säännöstä, ettei kuumeiselle lapselle anneta aspiriinia.

C. Obliteroiva tromboangiitti (Bürgerin tauti)

1. Tupakointiin vahvasti assosioitunut vaskuliitti, jonka tyyppipaikkoja ovat tibiaali- ja radiaalivaltimot.
 - a. Varpaisiin ja sormiin johtavien valtimoiden tromboosit johtavat kärkejäsenten kroonisiin haavoihin, kuolioihin ja autoamputaatioon.
 - b. Raynaud'n ilmiö yleensä edeltää tautia.
2. Tärkein hoito on tupakoinnin lopettaminen.

IV. PIENTEN VERISUONTEN VASKULIITIT

A. Granulomatoottinen polyangiitti (GPA, Wegenerin granulomatoosi)

1. Nekrotisoiva ja granulomatoottinen pienten valtimoiden vaskuliitti, jolle on tyypillistä triadi, jossa ylähengitystiet, keuhkot ja munuaiset ovat affisoituneet.
2. Tauti alkaa epätarkoilla oireilla, mutta vähitellen kehittyy märkäinen tai verinen yskä ja hematuria.
3. Voidaan havaita seerumin c-ANCA.
 - a. ANCA-vasta-aineiden määrittäminen on immunofluoresenssitutkimus, jossa voidaan todeta IgG-autovasta-aineita neutrofiilien ja monosyyttien sytoplasmaa vastaan.
 - i. c-ANCA (anti-PR3-vasta-aineita) havaitaan laajasti sytoplasmassa, p-ANCA (anti-MPO-vasta-aineita) perinukleaarisesti.
 - b. ANCA-positiivisuutta voidaan todeta muulloinkin, kuten infektioiden ja systeemitautilien yhteydessä; myöskään negatiivinen ANCA-löydös ei suoraan sulje pois vaskuliitin mahdollisuutta.
3. Biopsialöydökset auttavat diagnoosissa
 - a. Nenän limakalvon tai keuhkon biopsiassa havaitaan vaskuliitti ja granulomatoottinen tulehdus (jättisoluja, epiteloideja histiosyyttejä, nekroosialue)
 - b. Munuaisissa tyypillisesti fokaalinen segmentaalinen nekrotisoiva glomerulonefriitti tai kresenttinen glomerulonefriitti.

4. Hoidetaan immunosuppressiivisilla lääkkeillä, kuten syklofosamidilla ja kortikosteroideilla.
- B. Mikroskooppinen polyangiitti
 1. Systeeminen pienten verisuonien vaskuliitti, jossa kaikki leesiot ovat samanikäisiä (vrt. PAN).
 - a. Erityisesti keuhkot ja munuaiset ovat affisioituneet.
 - i. Ilmenee siis samankaltaisesti kuin GPA, mutta ylähengitystiet säästyvät ja granuloomia ei havaita.
 2. p-ANCA:t yleensä positiivisia.
 3. Hoidetaan immunosuppressiivisilla lääkkeillä, kuten syklofosamidilla ja kortikosteroideilla.
 - a. Usein taustalla on reaktio lääkkeisiin, joten etiologisen tekijän eliminaatio tärkeä.
- C. Eosinofiilinen granulomatoottinen polyangiitti (EGPA, Churg-Straussin oireyhtymä, allerginen granulomatoottinen angiitti)
 1. Systeeminen nekrotisoiva granulomatoottinen vaskuliitti, jonka tulehduksessa havaitaan tyypillisesti runsaasti eosinofiilejä.
 - a. Erityisesti keuhkot ja sydän sekä iho ovat affisioituneet.
 2. Klassisesti yhteys astmaan.
 3. p-ANCA:t usein positiivisia.
- D. IgA-vaskuliitti (Henoch-Schönleinin purppura, HSP, allerginen purppura)
 1. Lasten (erit. esikouluikäisten) yleisin vaskuliitti, joka johtuu IgA-immunokompleksien kertymisestä verisuonten seinämään ja sen aiheuttamasta tulehduksesta.
 2. Oireet:
 - a. Purppuraläiskiä yleensä raajoissa ja pakaroilla
 - b. Nivel- ja vatsakipu sekä GI-verenvuodot
 - c. Hematuria
 3. Yleensä itsestään rajoittuva ja purppuravaihe kestää yleensä muutaman viikon, mutta voi uusiutua.
 - a. Hoidetaan kortikosteroideilla tarvittaessa.

VERISUONTEN TUUMORIT

I. HEMANGIOOMA

- A. Pieniä punertavia, yleensä iholla (myös maksassa – viskeraalinen hemangiooma) tavattavia hyvänlaatuisia verisuonista koostuvia kasvaimia. (Kuva 7.11.)
 1. Esimerkkinä pyogeeninen granulooma, joka on pienistä verisuonista, proliferoivista fibroblasteista ja sidekudoksesta koostuva tarkasti rajautuva tulehtunutta ihopullistumaa muistuttava kasvain.
- B. Imeväisiän tavallisin hyvänlaatuinen kasvain (n. 5-10% lapsista); yleensä ei vaadi hoitoa ja kutistuu itsestään.

II. ANGIOSARKOOMA

- A. Endoteelin pahanlaatuisia ja vahvasti aggressiivisia kasvaimia.
- B. Tavallisin iholla (erit. pään ja kaulan alueella), mutta myös maksassa ja rinnassa. (Kuva 7.12.)
- C. Riskitekijöitä:

1. Aikaisemman syövän säteilyhoito
 2. Altistus useille kemikaaleille, kuten vinyylidikloridille (PVC:n valmistus) tai arsenikille
- III. KAPO SIN SARKOOMA
- A. Verisuonten endoteelin pahanlaatuinen ja yleensä matala-asteinen kasvain, jonka aiheuttaa HHV-8 liittynään immuunivajavuustilaan (ikäntyminen, HIV/AIDS, elinsiirtopotilaat).
 - B. Ilmenee vanhojen ihmisten raajojen iholla liiloina läikkinä, plakkeina ja nystyinä. (Kuva 7.13.)
 1. Ekstrakutaanisesti yleensä GI-kanavassa; voidaan havaita liiloina nystyinä kitalaessa.
 - C. Nykyään harvinainen antiretroviraalilääkityksen antiosta.

8 SYDÄNPATOLOGIA

ISKEEMINEN SYDÄNSAIRAUS

- I. PERIAATTEET
- A. Tauteja, joissa tavataan sydänlihaksen iskemiaa; yleisin aiheuttaja sepelvaltimotauti.
 - B. Sepelvaltimotauti on yleisin yksittäinen kuolleisuuden aiheuttaja Suomessa (8600 kuolemaa 2020; miehillä 1/5 kuolemista).
 1. Pääsyyinä siis ateroskleroosi.
- II. ANGINA PECTORIS
- A. Rintakipukohtaus, jonka aiheuttaa sepelvaltimoiden vähentynyt hapenkuljetuskyky.
 - B. Stabiili angina pectoris ilmenee rasituksen tai tunnepohjaisessa stressin aiheuttamana.
 1. Sepelvaltimoiden luumenin yli 75-prosenttinen ateroskleroottinen stenoosi aiheuttaa oireita.
 2. Rintakipukohtaus kestää alle 20 minuuttia ja voi säteillä vasempaan käteen tai leukaan. Usein mukana myös diaforeesia ja hengitysvaikeuksia.
 - a. Myosyyttien vaurio on kuitenkin palautuvaa eli nekroosia ei havaita.
 - b. Kipu häviää levolla (nitroglyseriinillä voidaan auttaa myös).
 3. EKG:ssä havaitaan ST-segmentin laskua, sillä subendokardiumi on iskeeminen.
 - C. Epästabiili angina pectoris ilmenee rintakipuoireistona, joka ei liity rasitukseen ja voi tapahtua levossakin.
 1. Tyypillisesti johtuu sepelvaltimon aterooman rupturoitumista seuraavasta osittaisesta tukoksesta.
 - a. Vaurioaluetta ympäröivä verisuonen seinämä supistuu pahentaen oireistoa.
 2. Kipukohtaus voi kestää yli 20 minuuttia tai toistua nopeasti.
 - a. Myosyyttien vaurio on kuitenkin palautuvaa eli nekroosia ei havaita.
 - b. Hoidetaan nitroglyseriinillä.
 3. EKG:ssä havaitaan ST-laskua, sillä subendokardiumi on iskeeminen.
 4. Korkea riski etenemiselle myokardiumin infarktiin.
 - D. Prinzmetal-angiina ilmenee yleensä yöllä vaihtehtaisena rintakipuna, joka ei liity rasitukseen.
 1. Johtuu sepelvaltimoiden vasospasmista.
 2. Yleensä kestää n. 5-15 minuuttia.

- a. Myosyyttien vaurio palautuvaa eli nekroosia ei havaita.
 - b. Nitroglyseriini tai kalsiumkanavan estäjät helpottavat.
3. EKG:ssa havaitaan ST-nousua (lasku myös mahdollinen), sillä iskemia on transmuraalista.

III. AKUUTTI SYDÄNINFARKTI

- A. Tyypillisesti johtuu sepelvaltimon aterooman rupturoitumista seuraavasta täydellisestä suonen tukoksesta.
1. Myös sepelvaltimoiden vasospasmi (esim. kokaiinin käyttö), embolukset tai vaskuliitit (esim. Kawasakin tauti) voivat olla aiheuttajia.
- B. Tärkein oire on yli 20min kestävä rintakipu, joka säteilee vasempaan käteen tai leukaan; myös diaforeesia ja dyspneaa havaitaan. Ei helpotu nitrolla.
1. Iskemia kestää niin kauan, että myosyyttien vaurio ei enää ole palautuvaa ja nekroosia havaitaan.
- C. Yleisimmät sijainnit tukokselle ovat:
1. Vasemman sepelvaltimon laskeva haara (LAD, 40-50%); johtaa vasemman kammion etuseinämän ja septumin alueen infarktiin
 2. Oikea sepelvaltimo (RCA, 30-40%); johtaa vasemman kammion takaseinämän infarktiin
 3. Vasemman sepelvaltimon kiertävä haara (LCX, 15-20%); johtaa vasemman kammion lateraaliseinämän alueen infarktiin
- D. Oikean kammion ja eteisten infarktit ovat harvinaisia.
- E. Infarkti alkaa subendokardiaalisena eli kattaa alle puolet sydänlihaksen paksuudesta, koska subendokardium on muuta sydänlihasta alttiimpi iskemialle.
1. EKG:ssa havaitaan ST-laskua (NSTEMI); eroaa UAP:sta (epästabiili angina pectoris) troponiinipositiivisuuden kautta.
- F. Jatkuva iskemia mahdollistaa kehittymisen transmuraaliseksi infarktiksi ensimmäisten tuntien aikana.
1. EKG:ssa havaitaan ST-nousua (STEMI).
- G. Herkin tapa osoittaa sydänlihaskvaurio on verinäytteillä.
1. Troponiini I (P-TnI) on herkin ja tarkin sydänlihaskvaurion osoittaja. Tasot nousevat viitealueen yläpuolelle n. 2-4h kivun alusta, huippu 18-24h ja voi pysyä suurentuneena 5-10vrk.
 - a. Käytetään myös TnT, pysyy koholla hieman pidempään, jopa 14vrk.
 2. CK-MB (kreatiiniikinaasi-MB, P-CK-MBm) voidaan hyödyntää uusiutuneen sydäninfarktin tutkimisessa tai sydäntoimenpiteen jälkeisissä mittauksissa. Tasot nousevat 3-8h tukoksen tapahtumisesta, huippu 20-24h ja paluu normaaliksi 50-70h.
 - a. Voi nousta myös luurankolihasvauriossa.
- H. Sydäninfarkti (STEMI) vaatii välitöntä hoitoa:
1. Aspiriini – ehkäisee tromboosia (antitromboottinen)
 2. Nitraattisuihke – vasodilataatio
 3. Lisähappi – vähentää iskemiaa
 4. Pallolaajennus (ensisijainen) tai liuotushoito – avaavat suonen tukoksen
 - a. Pallolaajennuksessa (PCI) ranne- tai nivusvaltimon kautta pallokatetri viedään röntgenlaitteella seuraten ahtauman kohdalle ja laajennetaan paineen avulla. Työntää tukkeuman seinämää vasten ja avaa suonen.

- i. Yleensä samalla asennetaan stentti.
 - ii. Tulisi pystyä tehdä alle 120min kuluessa ensimmäisestä hoitokontaktista.
- b. Jos pallolaajennusta ei pystytä toteuttamaan nopeasti, tulee harkita liuotushoitoa, jota voidaan antaa 12 tuntiin asti oireiden alusta.
 - i. Tenekteplaasi tai reteplaasi (tPA:n rekombinantteja lääkemuotoja)
- c. Reperfuusio palautumattomasti vaurioituneisiin soluihin johtaa kalsiumin sisäänvirtaukseen ja myofibrillien hyperkontraktioon (sydänlihaksen poikkijuovien nekroosi, contraction-band necrosis). (Kuva 8.1.)
 - i. Reperfuusio myös tuo kudokseen takaisin happea ja tulehdussoluja, mikä lisää vapaiden radikaalien tuotantoa ja vaurioittaa myosyyttejä yhä enemmän (reperfuusiovaurio)
- I. Komplikaatiot ovat vahvasti yhteydessä sydänlihaksen makro- ja mikroskooppisiin muutoksiin.

Taulukko 8.1.

Infarktin ikä	Makroskopia	Mikroskopia	Komplikaatiot
0-12h	Ei muutoksia	Mahdollisesti vähäisiä alkavia nekroottisia muutoksia	Kardiogeeninen sokki, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, arrytmia
12-24h	Tummaa läiskäisyyttä tai kalpeutta	Alkava koagulaatiivinen nekroosi ja neutrofiili-infiltraatio (Kuva 8.2.)	Arrytmia
1-3vrk	Kellertävä infarktialue	Koagulaationekroosi ja interstitiaalinen neutrofiili-infiltraatio (Kuva 8.3.)	Fibrinoidi perikardiitti, ilmenee rintakipuna ja sydänpussin hankausääninä (Kuva 8.4.)
3-10vrk	Kellertävä infarktialue, jota ympäröi hypereeminen punainen reunus (Kuva 8.5.)	Makrofagit	Sydänlihaksen rupturoituminen: papillaarilihasruptuura (mitraaliläpän vajaatoiminta), seinämäruptuura (perikardiumtamponaatio), septumruptuura (suntti) (Kuva 8.6.)
10-14vrk	Infarktialue reunoiltaan harmahtava	Granulaatiokudos, jossa paljon fibroblasteja, kollageenia ja runsas verisuonitus	

Yli 2kk	Vaalea arpi (Kuva 8.7.)	Tiivis sidekudos (Kuva 8.8.)	Aneurysma, muraalinen tromboosi, Dresslerin oireyhtymä (Kuva 8.9.)
---------	----------------------------	---------------------------------	---

IV. SYDÄNPERÄINEN ÄKKIKUOLEMA

- A. Odottamaton sydänperäinen kuolema 24h kuluessa oireiden alkamisesta tai ilman oireita.
 - 1. Yleensä fataalin kammioarrytmian aiheuttama.
- B. Etiologia vaihtelee ikäryhmissä.
 - 1. Nuorilla sydänlihassairaus, läppäsairaus ja kokaiinin käyttö.
 - 2. Vanhemmilla sepelvaltimotauti; akuutti sydänlihaksen hapenpuute, joka laukaisee kammiovärinän.

V. KROONINEN ISKEEMINEN SYDÄNSAIRAUS

- A. Iskeemisen sydänlihassaurion takia kehittyvä etenevä sydämen vajaatoiminta
 - 1. Vähitellen kehittyvä sepelvaltimotauti johtaa etenevään iskeemiseen vaurioon, johon liittyy myofibroosi ja kompensatorinen hypertrofia (iskeeminen kardiomyopatia).
 - 2. Taustalla on usein myös sairastettu sydäninfarkti.

SYDÄMEN VAJAATOIMINTA

I. PERIAATTEET

- A. Monien sydänsairauksien seuraus, jossa sydämen pumppaustoiminta on heikentynyt, minkä seurauksena verta ei saavu tarpeeksi perifeerisiin kudoksiin.
- B. Voidaan jakaa vasemman ja oikean sydänpuoliskon vajaatoimintaan, mutta yleensä vajaatoiminta on kombinoitunutta.
- C. Yleisin yli 65-vuotiaiden sairaalaan ottamisen syy; ennuste huono (alle 50% 5vuotiselossaoloennuste)
- D. Voi olla pitkään piilevä, koska sopeutumismekanismit peittävät oireita.
 - 1. Sympaattinen toiminta, RAA-järjestelmä ja sydänlihassolujen hypertrofia (uudelleenmuovautuminen).
 - a. Hapen tarve kasvaa, joka lisää iskemia-alttiutta ja nostaa riskiä sydänkuolemalle.

II. VASEMMAN PUOLEN VAJAATOIMINTA

- A. Yleisimmät syyt ovat sepelvaltimotauti (yli 50%), verenpainetauti, läppäviat, dilatoiva ja restriktiivinen kardiomyopatia ja myokardiaalinen infarkti.
- B. Pumppaustoiminnan heikkeneminen voi johtua joko systolisesta tai diastolisesta vajaatoiminnasta.
- C. Kohonnut LVEDV ja LVEDP johtaa veren pakkautumiseen keuhkoverenkiertoon.
 - 1. Pulmonaarinen kongestio johtaa keuhkoödeemaan.
 - a. Hengenahdistus on tärkein ensioire, ilmenee erityisesti paroksysmaalisena nokturnaalisena dyspneana ja ortopneana (lisääntynyt systeeminen laskimopaluu maataessa).
 - b. Yleensä havaitaan myös takykardiaa ja keuhkojen rahinaa auskultaatiossa.
 - c. Akuutissa kongestiossa voidaan mikroskopiassa nähdä täyteen pakkautuneita verisuonia ja alveoliloissa ödeemanestettä.

- i. Tilan kroonistuessa pakkautuneet kapillaarit voivat puhjeta ja aiheuttaa inta-alveolaarista hemorragiaa. Makrofagit fagosytoivat verisoluja, joka näkyy mikroskopiassa hemosideriiniä sisältävinä makrofageina (sydänvikasolu). (Kuva 8.10.)
 - ii. Pitkäaikainen kongestio aiheuttaa myös interstitiumin fibroosia.
2. Vähentynyt eteenpäin pumppaus johtaa heikkoon verenvirtaukseen munuaisiin ja RAA-systeemin aktivoitumiseen.
 - a. RAA-systeemi lisää nesteen kertymistä, mikä pahentaa sydämen vajaatoimintaa.

D. Hoidetaan pääasiassa lääkkeillä; ensimmäisen linjan lääkityksenä ACE-estäjät.

III. OIKEAN PUOLEN VAJAATOIMINTA

- A. Tavallisimmat syyt ovat edeltävät vasemman puolen vajaatoiminta (yleisin), keuhkosairaudet sekä synnynnäiset sydänviat (vasemmalta-oikealle-suntti).
 1. Keuhkosairaudet, jotka nostavat pulmonaalipainetta (COPD, fibrotisoivat keuhkosairaudet) aiheuttavat cor pulmonalea (keuhkosydänsairaus) eli oikean kammion hypertrofiasta johtuvaa vajaatoimintaa.
- B. Veri pakkaantuu systeemiseen laskimostoon, mikä johtaa tyypillisiin klinisiin löydöksiin.
 1. Vena jugularisten pullotus (Kuva 8.11.)
 2. Perifeerinen kuoppautuva ödeema – ihoa painaessa siihen jää kuoppa (pitting edema) (Kuva 8.11.)
 3. Staasi maksassa ja pernassa – kivulias hepatosplenomegalia ja tyypillinen ”muskottimaksa” (Kuva 8.12.)
 - a. Pitkittyneenä voi johtaa maksakirroosiin.

SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT

I. PERIAATTEET

- A. Vastasyntyneiden yleisimmät rakenteelliset viat (n. 1% vastasyntyneistä).
 1. Sivuääni kuuluu kuitenkin n. 50%:lla lapsista ainakin joskus (ja jopa 80%:lla päivystyspotilaista) – useimmiten siis sivuäänien aiheuttaja on täysin hyvänlaatuinen virtausääni.
- B. Muodostuvat organogeneesin aikana (raskausviikot 3-8) yleensä idiopaattisesti.
 1. Osa saattaa olla ympäristötekijöiden (esim. vihurirokko, alkoholin käyttö raskauden aikana) tai geneettisten tekijöiden aiheuttamia.
- C. Tyyppioire on syanoosi, sillä veren vähähappisuus sävyttää ihon tai limakalvon sinipunertavaksi.
- D. Karkeasti kahdenlaisia syitä:
 1. Yleisimmät viat ovat oikovirtauksia (suntti) systeemisen (vasen) ja pulmonaarisen (oikea) verenkierron välillä.
 2. Verisuoniobstruktio
- E. Suntti vasemmalta oikealle (yleisin) on syntyessä usein suhteellisen oireeton, mutta ajan kuluessa suntti voi kääntyä.
 1. Keuhkovaltimokierron lisääntyminen johtaa pulmonaarisen hypertensioon.
 2. Lisääntynyt keuhkovaltimoiden vastus aiheuttaa oikean kammion hypertrofiaa, polysytemiaa ja kellonlasikynsiä. Suntti voi kääntyä oikealta vasemmalle suntiksi ja aiheuttaa myöhäistä syanoosia (Eisenmengerin oireyhtymä). (Kuva 8.13)

- F. Oikealta vasemmalle suntit ilmenevät syanoosina nopeasti syntymän jälkeen (sinisten lasten sydänviat).

II. KAMMIOVÄLISEINÄUKKO (VSD)

- A. Selvästi yleisin synnynnäinen sydänvika.
- B. Häiriö kammioita erottavan septumin muodostumisessa.
 - 1. Yhteydessä sikiön alkoholioireyhtymään (FAS).
- C. Johtaa sunttiin vasemalta oikealle eikä aiheuta syntymän jälkeen yleensä oireita.
 - 1. Reiän koko määrittää oikovirtauksen vakavuuden ja oireiden alkamisen iän; suuri aukko voi johtaa Eisenmengerin oireyhtymän muodostumiseen.
- D. Keuhkoverenkierron vastus on vielä ensimmäisten viikkojen aikana korkea, mutta sen laskiessa voidaan jo muutaman viikon iässä kuulla oikovirtauksen aiheuttama sivuääni (holosystolinen).
 - 1. Sivuuänen perusteella ohjataan kaukotutkimukseen, jossa reiän koko selvitetään.
 - a. Yleensä hoitoa ei tarvita heti (isot aukot n. 1v iässä, pienemmät myöhemmin) ja pienet aukot voivat sulkeutua spontaanisti.

III. ETEISVÄLISEINÄUKKO (ASD)

- A. Häiriö eteisiä erottavan septumin muodostumisessa.
 - 1. Eroaa avoimesta foramen ovalesta (PFO), joka on häiriö soikean aukon fuusioitumisessa kokonaan kiinni (n. 20% aikuisista).
- B. Jaetaan kahteen tyyppiin: ostium secundum (n. 80%) ja ostium primum.
 - 1. Ostium primum sijaitsee eteisväliseinän alaosassa ja vaikuttaa jopa hiippaläppään; assosiaatio Downin oireyhtymään.
- C. Johtaa sunttiin vasemmalta oikealle.
 - 1. Yleensä hyvin pitkään oireeton ja ilmenee vasta aikuisiässä pulmonaalihypertensiona (ASD on yleisin aikuisiällä havaittava sydänvika).
 - 2. Auskultaatiossa kuullaan jakautunut S2, sillä lisääntynyt veri oikeassa puoliskossa hidastaan pulmonaaliläpän sulkeutumista.
- D. Laskimoista lähtöisin oleva embolismi voi mahdollisesti kulkea aukon läpi ja päästä systeemiseen valtimoverenkiertoon (paradoksaalinen embolia).

IV. AVOIN VALTIMOTIEHYT (PDA)

- A. Valtimotiehyen (ductus arteriosus) sulkeutumisen epäonnistuminen.
 - 1. Kehityksen aikana valtimotiehyt sunntaa vertaa keuhkovaltimosta aorttaan.
 - a. Sulkeutuu normaalisti ensimmäisinä päivinä syntymän jälkeen.
- B. Johtaa sunttiin vasemmalta oikealle.
 - 1. Yhteys keuhkovaltimon ja laskevan aortan välillä nostaa verenpainetta keuhkovaltimoissa.
- C. Yleensä oireeton syntyessä, mutta voidaan havaita auskultaatiossa tunnusomaisena jatkuvana ”konemaisena” sivuäänenä.
 - 1. Voi johtaa Eisenmengerin oireyhtymään, joka ilmenee alaraajojen syanoosina.
- D. Yleisempää keskosilla ja assosiaatio synnynnäiseen vihurirokoon (rubella).
- E. Vastasyntyneillä hoidetaan COX-inhibiittorilla (indometasiini tai ibuprofeeni).
 - 1. Vastasyntyneisyyskauden jälkeen kirurgisesti.

V. FALLOT’N TETRALOGIA (TOF)

- A. Sydänvika, johon kuuluu neljä poikkeavuutta:

1. Keuhkovaltimon tyven stenoosi (oikean kammion ulosvirtauskanavan obstruktio, RVOTO)
 2. Oikean kammion hypertrofia
 3. VSD
 4. ”Ratsastava” aortta (lähtee kammioden välistä)
- B. Suntti oikealta vasemmalle johtaa aikaiseen syanoosiin.
1. Pulmonaalistenoosi rajoittaa verenvirtausta keuhkoihin ja määrittää sunttauksen määrän ja siten myös oireiden vaikeusasteen.
- C. Yleensä havaitaan heti syntyessä tai jo ennen syntymää.
1. Lievänä voi säilyä havaitsemattomana myöhäisempäänkin ikään asti.
 - a. Potilaat usein kyykkäävät syanoosin pahentuessa (esim. urheilu), sillä se lisää perifeeristä valtimovastusta ja vähentää sunttautumista.

VI. SUURTEN SUONTEN TRANSPOSITIO (D-TGA)

- A. Aortta ja keuhkovaltimo vaihtaneet paikkoja; Aortta lähtee oikeasta kammioista ja keuhkovaltimo vasemmasta kammioista.
1. Keuhkoista palaava happisaturoitunut veri palaa takaisin keuhkoihin, aortta pumppaa desaturoitunutta verta systeemiverenkiertoon.
 2. Johtaa oikean kammion hypertrofiaan ja vasemman kammion atrofiaan.
- B. Ilmenee aikaisena syanoosina.
- C. Koska keuhko- ja systeemiverenkierto eivät pääse sekoittumaan, tulee ennen korjausleikkausta säilyttää avoin valtimotiehyt alprostadiililla.
- D. Assosiaatio äidin diabetekseen.

VII. YHTEINEN VALTIMORUNKO (TRUNCUS ARTERIOSUS COMMUNIS, TAC)

- A. Sydämessä on vain yksi ulosvirtausaukko.
1. Normaalin kehityksen aikana truncus arteriosus jakautuu keuhkovaltimoksi ja aortaksi.
 2. Lähes aina mukana VSD.
- B. Ilmenee aikaisena syanoosina.
1. Saturoitunut ja desaturoitunut veri pääsevät sekoittumaan ennen keuhko- ja systeemiverenkierron jakautumista.

VIII. EBSTEININ ANOMALIA

- A. Harvinainen oikean kammion ja trikuspidaaliläpän kehityshäiriö, jossa trikuspidaaliläpän liuskat ovat kiinnittyneet oikean kammion seinämään eteis-kammoliitosta alemmaksi – ”kammion atrialisatio”.
1. Voi vaikeuttaa veren pääsyä oikean kammion läpi keuhkovaltimoon eteis-kammioaläpän vuodon ja oikean kammion toimintahäiriön takia -> oikean eteisen paine nousee, ja veri ohjautuu mahdollisen eteisväliseinän (usein läsnä) aukon läpi oikealta vasemmalle, jolloin potilas tulee syanoottiseksi.
 2. Vaikeissa tapauksissa potilaat ovat oireisia jo vastasyntyneinä, lievissä oireet voivat olla vähäisiä pitkälle aikuisikään
 3. Usein trikuspidaaliläppä vuotaa
- B. Kannattaa leikata, jos raskautensa- ja elämänsä heikentynyt, ilmenee syanoosia tai tromboembolisia komplikaatioita, läpän vuoto on vähäistä suurempi (tällöin ennakoivasti jo ennen aikuisikää / sen kynnyksellä).

IX. YKSIKAMMIOISET SYDÄMET (UVH)

- A. Yksikammioisten sydänten (univentricular heart, UVH) ryhmä koostuu useasta viasta, joille on yhteistä, että sydämen toinen puoli on alikehittynyt.
1. Vajaakehittyneen vasemman sydänpuoliskon oireyhtymässä (HLHS) kyseessä voi olla mitraali- tai aorttaläpän tai kummankin atresia (puutos), pieni vasen kammio ja kapea nouseva aortta.
 - a. HLHS on yleisin ja tunnetuin UVH.
 2. Oikean puolen vioissa kyseessä voi olla trikuspidaali- tai keuhkovaltimoläpän umpeuma eli atresia tai kahden sisäänvirtausaukon vasen kammio (DILV).
 - a. Trikuspidaaliatresia on toiseksi tunnetuin UVH -> yhteyttä oikeasta eteisestä oikeaan kammioon ei ole. Vasemmasta kammioista lähtee aortta, ja sieltä on myös VSD-yhteys pieneen oikean kammion tyypiseen ulosvirtauslokeroon, josta lähtee keuhkovaltimo
- B. Viat ovat yleensä valtimotiehytriippuvaisia.
1. Aikainen syanoosi (viimeistään syntymän jälkeisen adaptaation aikana), hengitysvaikeudet ja sydämen vajaatoiminta
- C. Lähes 90 % yksikammiovioista todetaan jo sikiöaikana
- D. Hoito kirurginen; usein tarvitaan kolmivaiheinen leikkaus (ensimmäinen usein ensimmäisten 2 elinviikon aikana), mutta riippuu tyypistä.

X. TÄYDELLISESTI POIKKEAVA KEUHKOLASKIMOPALUU (TAPVD, TAPVR)

- A. Harvinainen (2-3 tapausta Suomessa vuodessa) sydänvika, jossa keuhkolaskimot dreneeraavat oikeanpuoleiseen verenkiertoon (systeemilaskimoverenkiertoon) sen sijaan, että kulkisivat normaalisti vasempaan eteiseen.
1. Jaetaan eri tyyppeihin anatomisen poikkeavuuden mukaan; yleisin on suprakardiaalinen TAPVD, jossa keuhkolaskimot yhtyvät sydämen takana ja ohjautuvat vena verticalis -suonen kautta siltalaskimoon, oikeaan eteiseen ja eteisaukon kautta systeemikiertoon
 2. Yhteydessä siis eteisväliseinän aukkoon ja joskus PDA:han, jotta oikealta-vasemmalle shunttautumista tapahtuisi
- B. Koska vasemmanpuoleiset rakenteet ovat sikiökauden aikana saaneet tavallista vähemmän verenkiertoa, ovat vasemman puolen ahtautumat, kuten hiippaläpän ahtauma tai aortan koarktaatio, kohtalaisen yleisiä
- C. Kaikki korjaamattomat lapset ovat desaturoivia, koska vasemman eteisen ja kammion täyttö on peräisin foramen ovalen tai muun eteisvian kautta onttolaskimokierrosta.
1. Korjaus on kirurginen; kiireellisyys riippuu vaikeusasteesta

XI. AORTAN KOARKTAATIO

- A. Paikallinen aortan kaventuma, joka tyypillisesti sijaitsee laskevassa aortassa juuri vasemman solisvaltimon lähtökohdan jälkeen
1. Voidaan jakaa tarkemman sijainnin mukaan preduktaaliseen (infantiiliin), duktaaliseen ja postduktaaliseen (aikuistyyppiseen).
 2. Koarktaation anatomia, fysiologia ja kliininen kuva vaihtelevat paljon. Ahtauma voi olla lyhyt tai pitkä, hyllymäinen tai kalvomainen kaventuma.
 - a. Voi myös sijaita muuallakin rinta- tai vatsa-aortassa tyypipaikan sijasta.
- B. Liitännäisviat ovat yleisiä.
1. Noin puolella on kaksiliuskainen aorttaläppä (BAV).

2. Muita yleisiä liitännäispoikkeavuuksia ovat mm. avoin valtimotiehyt, kammioväliseinän aukko, aorttaläpän ahtauma tai vuoto sekä mitraaliläpän ahtauma
 3. Yksi yleisimmistä sydänvivoista Turnerin oireyhtymässä
- C. Oireet riippuvat ahtauman vaikeusasteesta, sijainnista ja ilmenemiseistä sekä mahdollisista liitännäisvivoista.
- D. Preduktaaliossa muodossa ahtauma sijaitsee distaalisesti aortan kaaresta, mutta ennen valtimotiehyeen junktiokohtaa. Sikiöaikana veri kulkee ductuksen kautta ja laskevakin aortta saa verta hyvin.
1. Syntymän jälkeen kuitenkin ductuksen kautta tulee vähähappista verta laskevaan aorttaan -> vastasyntyneellä alaraajojen syanoosi (ilmenee siis nopeasti -> joskus nimitetään infantiliksi).
 2. Samalla jos ductus alkaa sulkeutumaan, niin alaraajojen perfuusio laskee nopeasti.
- E. Postduktaaliossa muodossa ahtauma sijaitsee ductuksesta distaalisesti, minkä takia sikiöajanakaan ei päästä ohittamaan ahtaumaa ductuksen kautta. Tämän takia jo sikiöajalla kehittyä kollateraaliveirtausta (esim. a. thoracica internan ja kylkiluuvälien arterioiden kautta).
1. Vaikka ductus sulkeutuisi, niin kollateraaliveirtaus mahdollistaa ahtaumasta distaalisten elimien ja raajojen perfuusion -> voi olla suhteellisen oireeton aikuisikäänkin saakka (tämän takia nimitetään ns. aikuistyyppiseksi joskus; ei siis tarkoita sitä että ahtauma kehittyisi aikuisiällä; älä anna nimen hämätä, aikuistyyppisen koarktaation voi ihan hyvin diagnosoida lapsella tai teinilläkin).
 - a. Kollateraalisuonisto voidaan joskus sattumalta havaita röntgenissä, kun pullistuneet suonet tuottavat kuvaan kylkiluiden loveutumista. (Kuva 8.14.)
 - b. Osalla lapsista ilmenee päänsärkyä ja/tai poikkeavaa jalkojen väsymistä rasituksessa (klaudikaatio)
- F. Suurin osa koarktaatioista jää kiinni rutiinitutkimuksissa
1. Syntymän jälkeen n. 2h iässä otetaan ns. (kaksois)saturaatioseulonta eli mitataan happisaturaatio oikeasta kädestä ja jommastakummasta alaraajasta.
 - a. Lapsilla ala- ja yläraajojen saturaatio- ja verenpaine-erot yleensä mitataan, niin, että yläraajojen suhteen hyödynnetään oikeaa yläraajaa – tämä sen takia, että a. brachiocephalica, josta oikea yläraaja saa verenkiertonsa erkaantuu aortan kaaresta lähes aina ennen koarktaatiota. Ahtauma voi kuitenkin toisinaan ulottua vasemman solisvaltimon lähtökohtaan tai sijaita sen yläpuolella -> affisioisi vasenta yläraajaa.
 - b. Ne vastasyntyneen koarktaatiot, joissa on oikealta vasemmalle suuntautuva oikoveirtaus ductuksessa (valtimotiehyessä) ja siten pienemmät postduktaaliset saturaatiot, paljastuvat saturaatioseulassa. Suurelta osalta niistä lapsista, joilla on koarktaatio, tämä saturaatioero kuitenkin puuttuu. Näiden potilaiden diagnostiikka on vielä pitkälti kliinisen tutkimuksen varassa.
 2. Neurolasassa yms. vastaanotoilla tulee aina lasten tutkimisessä muistaa se, että sydänäänien auskultaatio kannattaa suorittaa myös selän puolelta (lapaluiden välistä / vasemman lapaluun alta), koska sieltä koarktaation aiheuttama sivuääni kuuluu yleensä parhaiten (myös rintalastan yläosista vasemmalta puolelta).

- a. Tyypillinen löydös on soinniton systolinen ejektioääni. Voi joskus vaikuttaa jatkuvalta, jos kollateraaliveirtaus on huomattavaa.
 - b. Sivuäänien puuttuminen ei sulje pois koarktaatiota.
- 3. Reisivaltimopulssit voivat puuttua tai olla heikentyneet. Isommilla lapsilla kun varttinä- ja reisivaltimopulsseja tunnustellaan samanaikaisesti, on usein havaittavissa viive.
- 4. Nelirajaverenpaineiden (kaksirajapaineiden) mittaaminen on yleensä käytännössä diagnostinen aortan koarktaatiolle.
 - a. Koarktaatio aiheuttaa suhteellisesti suuremman paineen yläraajoihin kuin alaraajoihin -> Yli 10 mmHg:n ero oikean käden ja alaraajojen paineiden välisissä verenpainearvoissa pitäisi johtaa jatkotutkimuksiin (UÄ, joka on myös usein riittävä hoidon määrittämiseksi).
 - b. Normaalisti alaraajoista mitattuna systolinen verenpaine on samaa tasoa tai hieman korkeampi, kuin käsissä.
- G. Vastasyntyneen valtimotiehyestä riippuvaisen eli ns. kriittisen koarktaation ensisijainen hoito on leikkaushoito.
 - 1. Valtimotiehyt pidetään toimenpiteeseen saakka auki prostaglandiini-infuusiolla. Korjaus suoritetaan voinnin stabiloinnin jälkeen, yleensä lähipäivien aikana.
- H. Muissa kuin valtimotiehyestä riippuvaisissa koarktaatioissa toimenpideindikaationa on yli 20 mmHg:n paine-ero ylä- ja alaraajojen välillä tai oireet.
 - 1. Leikkaushoidon vaihtoehtona isolla lapsella on perkutaaninen hoito (pallolaajennus +/- stenttaus) katetritekniikalla. Rekoarktaatiassa perkutaaniset toimenpiteet ovat yleensä ensisijainen hoitomenetelmä. Kirurgista hoitoa tarvitsevat lapset, joiden koarktaatio ei anatomiansa vuoksi sovellu perkutaaniseen hoitoon.
 - 2. Verenpainetauti on yleinen myöhäisongelma, joka kehittyy hoidosta huolimatta jopa 3/4:lle potilaista. Kallonsisäisiä vuotoja esiintyy normaaliväestöä useammin ja erityisesti niillä, joilla koarktaatio on hoidettu imeväiskauden jälkeen.

XII. SYNNYNNÄISET LÄPPÄVIAT

- A. Tavallisimmat synnynnäiset läppien toimintaviat ovat keuhkovaltimoläpän ja aorttaläpän ahtaumat.
 - 1. Yleisin yksittäinen rakenteellinen poikkeavuus on kaksipurjeinen aorttaläppä (BAV; n. 1-2%:lla väestöstä), mutta se ei useimmiten aiheuta merkittäviä oireita lapsuudessa
 - 2. Ahtautuneeseen aorttaläppään usein (n. 20%) liittyy jokin liitännäisvika, tavallisimmin aortan koarktaatio, kaksiliuskainen aorttaläppä, avoin valtimotiehyt tai kammioväliseinän aukko
 - a. Synnynnäinen aorttaläpän vuoto on harvinainen ja liittyy useimmiten kaksiliuskaiseen aorttaläppään; vuodon esiintyvyys lisääntyy iän myötä BAV:ssa.
 - 3. Ahtauma voi myös joskus olla läppätason ylä- tai alapuolella.
- B. Kriittinen keuhkovaltimo- tai aorttaläppäahtauma on ductuksesta riippuvainen sydänvika
- C. Toimenpide useimmiten pallolaajennus perkutaanisesti, mutta myös kirurgia on mahdollinen tarvittaessa.

LÄPPÄSAIRAUDET

I. PERIAATTEET

- A. Lämpien toimintahäiriöt ovat sydämen vajaatoiminnan syynä n. 10% tapauksista.
- B. Ilmenevät yleensä läpän ahtaumana (stenoosi), läppävuotona (insufisienssi) tai vegetaatioina.
 - 1. Stenoosi aiheuttaa hypertrofiaa lihaksessa, joka pumpppaa läpän läpi (prestenoottinen).
 - 2. Läppävuoto aiheuttaa takaisinvirtausta (regurgitaatio), mikä johtaa pre- ja postinsuffisientin sydänlihaksen (eksentriseen) hypertrofiaan ja dilataatioon.
- C. Vasemman puolen viat yleisempiä suuremman työmäärän takia.

II. AKUUTTI REUMAATTINEN KUUME

- A. Reumakuume on autoimmuunisairaus, joka syntyy A-streptokokin aiheuttaman nielutulehduksen harvinaisena komplikaationa.
 - 1. Ilmenee tyypillisesti 5-15-vuotiailla lapsilla 2-3 viikkoa streptokokkifaryngiitin jälkeen.
- B. StrA:n pinnan M-proteiini muistuttaa sydänlihaksen myosiinia, ja infektion aikana antigeenit M-proteiinia vastaan voivat epätarkoituksenmukaisesti reagoida kehon omia rakenteita vastaan (molekyylijäljittely, molecular mimicry).
- C. Diagnoosi perustuu oireisiin, usein hyödynnetään Jonesin kriteereitä: (Kuva 8.15.)
 - 1. Näyttö edeltävästä Streptococcus pyogenes -infektiosta.
 - a. Antistreptolysiini O (ASO)- tai anti-DNAse B-tiitterit koholla
 - 2. Kaksi pääasiallista tai yksi pääasiallinen ja kaksi vähemmän merkittävää diagnostista kriteeriä.
 - 3. Vähemmän merkittävät kriteerit
 - a. Kuume
 - b. Kohonnut La tai CRP
 - c. Nivelkipu
 - d. I asteen eteis-kammiokatkos (pidentynyt PR-aika)
 - 4. Pääasialliset kriteerit
 - a. Nivel tulehdus (migratorinen polyartriitti) – suurien nivelten turvotusta ja kipua, joka siirtyy muutaman päivän jälkeen toiseen suureen niveleen (esim. ranteet, polvet, nilkat)
 - b. Sydäntulehdus, joka voi olla pankardiitti eli kaikkien sydämen seinämän osien tulehdusta.
 - i. Endokardiitti (sisäkalvon tulehdus) – Oikean puolen läppäsairaudet ovat harvinaisia ja yleensä reumaattisen läppäsairauden aiheuttamia. Mitraaliläppä affisioitunut aorttaläppää useammin. Regurgitaatiota aiheuttaa pienet vegetaatiot purjeiden sulkevilla reunoilla. (Kuva 8.16.)
 - ii. Myokardiitti (sydänlihastulehdus) – Vakavin tulehdusalue, yleisin kuolinsyy akuutin vaiheen aikana. Mikroskopiassa voidaan havaita Aschoffin kappaleita, jotka ovat kroonisen inflammaation keskittymiä (granulomatoottisia rakenteita, jotka koostuvat fibrinoidista materiaalista, lymfosyyteistä, jättisoluista ja reaktiivisista histiosyyteistä, joilla on ohuet ja aaltoilevat tumat (Anitschkowin solu)). (Kuva 8.17)
 - iii. Perikardiitti (sydänpuositulehdus) – rintakipu ja neste kertyminen sydämen ympärille, havaitaan hankausääninä
 - c. Ihonalaiset kyhmyt nivelten koukistajapainnoilla

- d. Erythema marginatum (rengasmaisen reumapunoitus) – punaisia renkaanmuotoisia kivuttomia ihottumaläiskä
- e. Sydenhamin korea – liikehäiriö, jossa nopeita, nytkähteleviä ja epäsäännöllisiä pakkoliikkeitä kasvoissa ja raajoissa (Pyhän Vituksen tanssi)
- D. Suomessa nykyään harvinainen, sillä nielutulehdukset hoidetaan penisilliinillä, eikä komplikaatiota ehdi muodostumaan.
 - 1. Maailmanlaajuisesti kuitenkin tavallin syy lasten hankittuun sydänvikaan.
- E. Ennuste hyvä ja oireet yleensä häviävät täysin, mutta läppävauriot voivat pahentua ajan kuluessa varsinkin, jos altistuu uudelleen A-streptokokille ja reumakuume uusiutuu.
 - 1. Voi johtaa krooniseen reumaattiseen sydänsairauteen.

III. KROONINEN REUMAATTINEN SYDÄNSAIRAUS

- A. Uusiutuneiden akuuttien reumaattisten kuumekohtausten aiheuttamaa sydänlähän arpeutumista.
- B. Arpeutuminen johtaa läpän stenoosiin, ja oireet määriytyvät affisioituneen läpän/läppien perusteella.
 - 1. Mitraaliläppä lähes aina affisioitunut. (Kuva 8.18.)
 - a. Ripustinsäikeet (chordae tendineae) ja purjeet paksuuntuvat muodostaen tyypillisen kalansuudeformiteetin.
 - b. Esim. Afib, tromboemboleet ja keuhkokongestio yleisiä komplikaatioita.
 - 2. Aorttaläppä on joskus affisioitunut; muut vielä harvemmin. (Kuva 8.19.)
 - a. Aorttalähän kommissuurat kasvavat yhteen (fuusio) tyvestä alkaen.
- C. Arpeutuneet ja epämuotoiset läpät ovat alttiimpia infektiiviselle endokardiitille.

IV. AORTTALÄPÄN AHTAUMA (AORTTASTENOOSI)

- A. Yleisin etiologia on degeneratiivinen eli normaalin kulutuksen aiheuttaman fibroosin ja kalsifikaation tuottamaa.
 - 1. Ilmenee tyypillisesti vasta 70-80-vuotiailla; kaksipurjeisilla aikaisemmin.
 - a. Bikuspisessa aorttalähässä yksittäiseen purjeeseen kohdistuu normaalia suurempi kulutus, joten oireita voidaan tyypillisesti nähdä jo 40-50-vuotiailla.
- B. Nykyään reumaattinen sydänsairaus aiheuttaa vain pienen osan aorttalähän ahtaumista.
 - 1. Reumaattisen sydänsairauksen aiheuttama aorttastenoosi eroaa normaalista kulutuksen aiheuttamasta läppäsairaudesta siten, että voidaan havaita kommissuurien fuusiota sekä samalla usein mitraalilähän stenoosiakin.
- C. Oireeton vaihe kestää pitkään, vähitellen kehittyä komplikaatioita.
 - 1. Systolinen työ määrä lisääntyy, mikä aiheuttaa vasemman kammion hypertrofiaa.
 - a. Voidaan havaita sydämen vajaatoimintaan liittyviä oireita.
 - 2. Rintakipua ja synkopeetä rasituksessa
 - 3. Kalsifikoituneen läpän läpi kulkiessaan punasolut voivat vaurioitua, mikä voi aiheuttaa makroangiopaattista hemolyyttistä anemias (kypäräsoluja verenkierrassa).
- D. Auskultaatiossa kuullaan systolinen sivuääni (keskisystolinen crescendo-decrescendo-sivuääni).
- E. Hoidetaan toimenpiteellä vasta, kun kehittynyt vaikea-asteiseksi.
 - 1. Aorttaläppäleikkaus – vaihto tekoläppään

2. TAVI – aorttaläpän vaihto katetritekniikalla eli reisivaltimon kautta tuodaan ahtautuneen läpän päälle biologinen läppä ja stentti

V. AORTTALÄPPÄVUOTO

- A. Aorttaläppä ei sulkeutu täydellisesti diastolen aikana, mikä mahdollistaa veren takaisinvirtauksen aortasta vasempaan kammioon.
- B. Aorttaläpän tai sen tukirakenteiden vika
 1. Esim. infektiivinen endokardiitti voi vaurioittaa läppää ja ehkäistä sen normaalin sulkeutumisen.
 2. Läppärenkaan dilataatio aiheuttaa myös vuotoa ja voi johtua perinnöllisistä sidekudossairauksista (Ehlers-Danlosin ja Marfanin oireyhtymät) tai akuuttina esim. aortan dissekoitumisesta.
- C. Oireeton vaihe kestää pitkään, vähitellen kehittyä oireita (hengenhädistys ja rintakivut; ei synkopeetaipumusta).
- D. Voi vaikeana aiheuttaa hyperdynaamisen verenkierron tilan, joka johtuu kasvaneesta pulssipaineesta (systolisen ja diastolisen verenpaineen erotus).
 1. Diastolinen verenpaine laskee läppävuodon seurauksena ja systolinen kasvaa lisääntyneen iskutilavuuden takia.
 - a. Voidaan havaita ”water-hammer” -pulssina (sykkivä ja voimakas verenvirtauksen nousu ja lasku valtimoissa, Corriganin pulssi), sykkimisenä kynsissä (Quincken pulssi) sekä pään heilumisena (De Mussetin merkki).
- E. Auskultaatiossa kuuluu diastolinen sivuääni (alkudiastolinen, voimakkuudeltaan laskeva (decrescendo)).
- F. Hoidetaan läppäleikkauksella; vasta oireiden alettua tai oireettomillakin, jos vasen kammio on huomattavasti laajentunut.

VI. MITRAALISTENOOSI

- A. Yleisin aiheuttaja on krooninen reumaattinen sydänsairaus.
- B. Veri ei pääse virtaamaan vapaasti eteenpäin ja kertyy keuhkoihin (keuhkoödeema).
 1. Pulmonaalihypertensio ja kehittyvä oikean puolen vajaatoiminta
 2. Vasen eteinen kuormittuu ja laajenee lisäten taipumusta eteisvärinä ja muraalisille verihiyytymille.
- C. Auskultaatiossa kuullaan alkunapsahdus ja sitä seuraava loppudiastolinen muriseva sivuääni.

VII. MITRAALILÄPPÄVUOTO (MITRAALILÄPPÄ-INSUFFISIENSSI)

- A. Veri pääsee palaamaan vasemmasta kammiosta vasempaan eteiseen systolen aikana.
- B. Voi johtua purjeiden, papillaarilihasten tai vasemman kammion muutoksista.
 1. Yleinen aiheuttaja on iskeeminen sydänsairaus, joka aiheuttaa vasemman kammion dilataatiota ja papillaarilihasten dysfunktia.
 2. Mitraaliläppäprolapsi on myös yleinen aiheuttaja.
 3. Myös mm. infektiivinen endokardiitti, akuutti reumaattinen kuume tai papillaarilihasten ruptuura infaktin seurauksena voivat olla taustalla.
- C. Johtaa vasemman puolen vajaatoimintaan.
- D. Auskultaatiossa kuullaan holosystolinen sivuääni, joka vahvistuu kyykätessä (systeemisen vastuksen nousu vähentää vasemman kammion tyhjenemistä) ja uloshengityksessä (paluu vasempaan eteiseen lisääntyy).

VIII. MITRAALILÄPPÄPROLAPSI (BARLOWIN OIREYHTYMÄ)

- A. Systolen aikana mitraaliläpän purjeet työntyvät vasemman eteisen puolelle.
 - 1. n. 5-10% väestöstä, erityisesti nuoret naiset
- B. Mitraaliläpän myksoidinen degeneraatio aiheuttaa mitraaliläpän pehmentymistä ja paksuuntumista.
 - 1. Etiologia ei selvä, mutta joskus geneettinen (Marfanin tai Ehlers-Danlosin oireyhtymät)
- C. Yleensä oireeton, komplikaatioita ilmenee vain n. 3% potilaista.
 - 1. Yleisimpiä ovat mitraaliläppävuoto, infektiivinen endokardiitti, rytmihäiriöt ja emboliat.
- D. Auskultaatiossa kuullaan keskisystolinen klikki ja keski-myöhäissyystolinen sivuääni, jotka heikentyvät kyykätessä (systeemisen vastuksen nousu vähentää vasemman kammion tyhjenemistä).

SYDÄMEN TULEHDUKSET

I. ENDOKARDIITTI

- A. Endokardiumin eli sydämen sisäkalvon tulehdus, joka yleensä affisioi läppiä.
- B. Jaetaan infektiiviseen (IE) ja ei-infektiiviseen muotoon.
 - 1. Yleisin aiheuttaja on bakteeri-infektio.
- C. Bakterielli endokardiitti jaetaan akuuttiin ja subakuuttiin muotoon.
 - 1. Akuutin tyypillinen aiheuttaja on *Staphylococcus aureus* (hyvin virulentti), joka infektoi jopa aikaisemmin terveitä läppiä (useimmiten trikuspidaali- tai mitraaliläppää).
 - a. Läppävegetaatiot ja tulehdus tuhoavat läppää ja voivat johtaa läppäperforaatioon.
 - b. Tärkein riskiryhmä on suonensisäisten huumausaineiden käyttäjät (erit. trikuspidaaliläppä vaarassa).
 - c. Korkea mortaliteetti
 - 2. Subakuutin tyypillinen aiheuttaja on *Streptococcus viridans* (vähemmän virulentti), joka infektoi tyypillisesti vain aikaisemmin vahingoittuneita läppiä (esim. reumakuume tai mitraaliläpän prolapsi).
 - a. Aikaisempi vaurio aiheuttaa steriilien fibriinitrombien muodostumisen läppään, jotka sitten kolonisoituvat bakteereilla.
 - i. Bakteerit voivat päästä pienten haavojen kautta verenkiertoon, joten riskiryhmille annetaan ehkäiseviä antibiootteja esim. ennen hampaisiin ja ikeniin kohdistuvia toimenpiteitä.
 - b. Muodostuu pieniä vegetaatioita, jotka eivät johda läppäperforaatioon.
 - c. Hyvä ennuste
 - 3. Muita aiheuttajia:
 - a. *Staphylococcus epidermidis* aiheuttaa tyypillisesti tekoläppäinfektioita.
 - b. Enterokokit (yleensä *Enterococcus faecalis*) tyypillisesti vanhemmilla miehillä virtsatieinfektion leviämisen seurauksena; yleensä subakuutti.
 - c. HACEK-ryhmän (*Haemophilus*, *Actinobacillus*, *Cardiobacterium*, *Eikenella*, *Kingella*) gramnegatiiviset normaalin suun flooran bakteerien aiheuttamat endokardiitit ovat harvinaisia ja ovat yhteydessä negatiivisiin veriviljelyihin.
- D. Bakteriellin endokardiitin kliininen kuva:

1. Kuume – bakteremian seuraus
 - a. Yleisin merkki infektiivisestä endokardiitista, voi kuitenkin olla havaitsemattomissa subakuuteissa tilanteissa.
 - i. Subakuutti tilanne voikin mahdollisesti ilmetä vain kroonisen taudin anemiana (mm. väsymys, painonmenetys)
2. Sivuäännet – läppien vegetaatiot aiheuttavat
3. Emboliperäiset oireet – septiset vegetaatiot voivat embolisoitua ja aiheuttaa vasemmanpuoleisessa endokardiitissa systeemiverenkierron kautta erilaisia oireita.
 - a. Petekiat ja kynnenalaiset sylinteriverenvuodot (Kuva 8.20.)
 - b. Aivoinfarkti
 - c. Janewayn muutokset (erytematoottisia kivuttomia muutoksia kämmenissä ja jalkapohjissa) (Kuva 8.21.)
 - d. Oslerin kyhmyt (kivuliaita kyhmyjä pääasiassa sormissa ja varpaissa)
 - e. Rothin infiltraatit (silmänpohjien hemorragioita, joissa vaalea keskus). (Kuva 8.22.)

E. Diagnostiikka:

1. Mikrobiologinen diagnosointi perustuu veriviljelyihin (80-90% endokardiiteista positiivisia).
2. Transtorakaalinen kaikukardiografia (TTE) tai tarvittaessa esofagiaalinen kaikukardiografia (TEE) – nähdään läppien muutokset; tulee tehdä viipymättä endokardiittiepäilyn yhteydessä

F. Ei-infektiivinen endokardiitti ei johdu bakteeri-infektiosta:

1. Nonbakteriellissa tromboottisessa endokardiitissa (NBTE) läpän vegetaatiot ovat steriilejä (eikä mikroskooppista inflammaatiota) ja muodostuvat läpän sulkureunoille.
 - a. Vegetaatiot johtuvat hyperkoagulatiivisesta tilasta.
 - b. Yleensä vaikutus hyvin pieni, mutta voivat aiheuttaa esim. mitraalivuotoa; lisäävät kuitenkin riskiä infektiiviselle endokardiitille.
2. Libman-Sacks-endokardiitti johtuu steriileistä (kuitenkin mikroskooppista inflammaatiota) vegetaatioista, jotka muodostuvat SLE:n immuunikompleksien kertymisen seurauksena.
 - a. Vegetaatiot muodostuvat mitraaliläpän molemmille puolille ja aiheuttavat mitraalivuotoa.

II. MYOKARDIITTI

- A. Sydämen lihaskerroksen tulehdus.
- B. Virukset yleisin aiheuttaja, erityisesti enterovirukset (coxsackie A ja B, echovirus).
 1. Flunssaisena ei tästä syystä suositella kuntoliikunnan harrastamista.
- C. Myös muut mikrobit (esim. *Borrelia burgdorferi*) ja immuunivälitteiset taudit (esim. reumakuume, SLE) voivat aiheuttaa myokardiittia.
- D. Aiheuttaa usein kaikkien kammioiden ja eteisten dilataatiota ja sydämen laajenemista.
- E. Oireet vaihtelevat suuresti: oireettomasta jopa äkkikuolemaan.
 1. Kuume yleinen infektioiden
 2. Osalla on rintakipua ja rytmihäiriötuntemuksia.
 - a. Pysyvä takykardia, joka ei ole tasapainossa kuumeen kanssa on tyypillinen löydös.

3. Muistuttaa usein kliinisesti sydäninfarktia

F. Diagnostiikka:

1. Tärkeimmät tutkimukset ovat EKG ja sydänlihassaurion merkkikokeet (troponiini I, CK-MB)
 - a. Myokardiitissa CRP suhteellisen korkea ja troponiini suhteellisen matala, akuutissa infarktissa päinvastoin.

III. PERIKARDIIITTI

- A. Sydänpussin tulehdus.
- B. Suurin osa tapauksista idiopaattisia, voi myös olla mm. myokardiittiakin aiheuttavien infektioiden tai autoimmuunitautien aiheuttamia.
 1. Myokardiitti ilmeneekin usein perikardiitin kanssa (perimyokardiitti).
- C. Oireet:
 1. Sydänpussiin voi kertyä nestettä, joka aiheuttaa sydämen vajaatoiminnan oireita (mm. hengenahdistus, takykardia, turvotus).
 2. Yleensä akuuttia ja ilmenee hankausääninä ja rintakipuna, joka pahenee sisään hengittäessä ja helpottaa istuessa etukumarassa.
 - a. Useimmiten paranee itsestään, mutta tulehduksen kroonistuessa voi aiheuttaa restriktiivista perikardiittia, joka johtuu perikardiumin paksuuntumisesta ja kalsifikaatiosta.
 - i. Johtaa sekä oikean- että vasemmanpuoleiseen vajaatoimintaan.

KARDIOMYOPATIA

I. PERIAATTEET

- A. Sydänlihassairauksien joukko, joihin liittyy sydänlihaksen toiminnan ja rakenteen poikkeavuuksia, jotka eivät johdu hemodynaamisen rasituksen muutoksista (esim. iskemia, kohonnut verenpaine, läppäviat).
- B. Jaetaan pääasiassa viiteen ryhmään: dilatoivaan (DCM), hypertrofiseen (HCM), restriktiiviseen (RCM), oikean kammion arytmoogeeniseen (ARVC) ja luokittelemattomaan kardiomyopatiaan.

II. DILATOIVA (LAAJENTAVA) KARDIOMYOPATIA

- A. Kardiomegaliaa, jossa sydämen lokerot ovat dilatoituneet; tyypillisesti alkaa vasemmasta kammioista.
 1. Yleisin kardiomyopatia, esiintyy yleensä 20-60-vuotiailla.
- B. Kammioden pumppaustoiminta heikkenee (ejektiofraktio laskee), mikä johtaa lopulta molemmanpuoleisen sydämen vajaatoiminnan oireisiin (esim. hengenahdistus, väsymys, rintakivut, nilkkaturvotus).
 1. Laajentuminen voi johtaa komplikaatioina myös mitraali- ja trikuspidaaliläppien vuotoon ja rytmihäiriöihin.
- C. Taustalla voi olla useita eri tekijöitä:
 1. Idiopaattinen (yleisin)
 2. Geneettinen (20-50%) – Virhe yleensä sydänlihassolujen rakenneproteiineissa ja sarkomeereissa; periytyy yleensä autosomissa vallitsevasti
 3. Sairastettu virusmyokardiitti – myöhäinen komplikaatio
 4. Raskaus (peripartaalinen kardiomyopatia) –myöhäisraskaudessa tai n. 6kk sisällä synnytyksestä

5. Alkoholin suurkulutus
6. Sydänlihastoksiset lääkkeet, kuten doksorubisiini
7. Hemokromatoosi

D. Hoito on sydämen vajaatoiminnan hoitoa, äärimmäisessä tilanteessa sydämensiirto (yleisin syy sydämensiirrolle).

III. HYPERTROFINEN KARDIOMYOPATIA

- A. Kammiot ovat massiivisesti hypertrofiset, erityisesti septumissa.
1. Hypertrofia häiritsee kammiodien täyttymistä sekä voi mahdollisesti estää vasemman kammion uloskulkureittiä aorttaan.
 - a. Ilmenee rintakipuna tai synkopeenä rasituksessa (funktionaalisesti sama kuin aorttaläpän stenoosi).
- B. N. puolet tapauksista ovat geneettisiä (sarkomeeriproteiinien mutaatioita); yleensä autosomaalisesti dominantti.
1. Sairaus alkaa jo nuorena, mutta yleensä oireita havaitaan vasta keski-iässä.
 - a. Nuorilla (varsinkin urheilijoilla) yleisin sydänperäisen äkkikuoleman syy.
 2. Histologialle tyypillistä lihassäikeiden poikkeava järjestyminen (myocardial disarray). (Kuva 8.23.)

IV. RESTRIKTIIVINEN KARDIOMYOPATIA

- A. Seinämärakenteiden jäykistyminen johtaa diastoliseen vajaatoimintaan (täyttymisdefekti).
- B. Aiheuttaja voi olla idiopaattinen tai sekundaarinen.
1. Kertymäsairaudet (amyloidoosi, hemokromatoosi)
 2. Sarkoidoosi
 3. Endokardiaalinen fibroelastoosi – lapsilla harvinainen endokardiumin fibrotisoituminen häiritsee diastolista täyttymistä
 4. Löfflerin tauti – infiltroivien eosinofiilien tuottamat toksiset aineet aiheuttavat vaurioita ja fibroosia
- C. Ilmenee yleensä sydämen vajaatoimintana ja arytmioina.

V. OIKEAN KAMMION ARYTMOGEEENINEN KARDIOMYOPATIA

- A. Pääasiassa oikean kammion dilatoitumista (2/3 vasen kammio normaali; 1/3 paksuuntunut), mikä johtuu yleisimmin desmosomiproteiineja koodaavien geenien mutaatioista.
1. N. puolella tapauksista todetaan suvuttaista esiintymistä.
 2. Desmosomit sitovat sydänlihassoluja toisiinsa, mikä luo voimaa myokardiumille ja on tärkeässä roolissa naapurisolujen signaloinnissa toisilleen.
- B. Häiriöt desmosomeissa johtaa solujen irtoamiseen toisistaan ja mahdollisesti niiden kuolemaan, varsinkin stressitiloissa (esim. urheilu).
1. Vaurioitunut myokardium korvataan rasvalla ja arpikudoksella, mikä johtaa lopulta oikean kammion dilatoitumiseen ja sen seinämän ohenemiseen.
 - a. Häiritsee systolista toimintaa ja voi häiritä signaalireittejä -> arrytmia.

SYDÄMEN KASVAIMET

I. PERIAATTEET

- A. Sydämen primaariset kasvaimet ovat hyvin harvinaisia; metastaasit ovat paljon yleisempiä.
1. Yleisimpiä metastaaseja ovat keuhko- ja rintasyövät, malignit lymfoomat sekä melanoomat.

2. Yleensä affisioivat perikardiumia ja aiheuttavat perikardiaalista effuusiota ja sydämen tamponaatiota sekä mahdollista konstriktiivista perikardiittia.
 - B. Primaarisista sydämen kasvaimista 90% hyvänlaatuisia.
 1. Oireet vaihtelevat koon ja lokalisaation mukaan.
- II. MYKSOOMA
- A. Aikuisten yleisin primaarinen sydämen tuumori.
 - B. Hyvänlaatuinen pehmytkudostuumori, joka yleensä lokalisoituu vasemman eteisen seinämään.
 1. Voi aiheuttaa mitraalistennoosin kaltaisia oireita.
 - C. Histologisesti voidaan todeta runsaasti löyhää väliainetta, jonka joukossa on pienitumaisia ja sukkulamaisia kasvainsoluja.
- III. PAPILLARINEN FIBROELASTOOMA
- A. Aikuisten hyvänlaatuinen kasvain.
 - B. Yleensä paikantuu läppiin (yleisin läppien tuumori), erityisesti aorttaläppään.
 1. Eivät yleensä kuitenkaan aiheuta oireita.
 - a. Voivat mahdollisesti itse embolisoitua tai aiheuttaa tromboottisia emboleita.
- IV. RABDOMYOOMA
- A. Lasten yleisin sydäntuumori, valtaosalla myös tuberoosiskleroosi.
 - B. Kyseessä on hamartooma eli oikealla paikallaan epätavallisen runsaina esiintyvistä soluista koostuva muodostuma.
 1. Koristooma on taas normaaleista soluista koostuva muodostuma epätavallisessa paikassa (esim. Meckelin divertikkelissä mahalaukun ektooppista kasvua)
 - C. Yleensä paikantuu vasempaan ventrikkiin.

9 HENGITYSTIEPATOLOGIA

NENÄN JA NENÄNIELUN SAIRAUDET

- I. RINIITTI JA SINUIITTI
- A. Nenän limakalvon tulehdus, joka ilmenee aivasteluna, tukkoisuutena ja vuotavana nenänä (nuha).
 - B. Rinovirus yleisin infektiivinen aiheuttaja, yleisin syy ylipäättään on allergia.
 - C. Allerginen riniitti on tyypin I yliherkkyyssreaktio esimerkiksi siitepölylle (n. 20% väestöstä).
 1. Diagnoosi helppo oireiden kulun perusteella, joskus voidaan hyödyntää veri- ja ihopistokokeita (prick-testi)
 2. Tulehdus on eosinofiilistä.
 3. Potilailla esiintyy usein myös muita allergisia oireita, kuten astmaa tai atooppista ekseemaa.
 - D. Sinuiitti tarkoittaa tulehdusta nenän sivuonteloissa.
 1. Riniitti ja sinuiitti esiintyvät yleensä samanaikaisesti, jolloin käytetään termiä rinosinuiitti.
 - a. Aiheuttajat pääosin samoja kuin riniitissä.
- II. NENÄN POLYYPPIAUTI
- A. Polyypit ovat nenän limakalvon hyvälaituisia tulehtuneita pullistumia. (Kuva 9.1.)

1. Pieninä voivat olla oireettomia, mutta suurina voivat tukkia koko sieraimen.
- B. Varmaa syytä ei tiedetä, mutta astmaatikoilla, allergikoilla ja kroonista rinosinuiittia sairastavilla on suurempi alttius polyypeille.
 1. Aspirin-exacerbated respiratory disease (AERD, Samterin triadi) – ASA-yliherkkyys, astma ja nenäpolyyptit; liittyy lisäksi vielä krooninen rinosinuiitti
 - a. Polypoosi normaalia vakavampaa; triadi ilmenee jopa 10%:lla astmapotilaista.
 2. Lapsilla nenäpolypoosi liittyy kystiseen fibroosiin.

III. NENÄNIELUN JUVENIILI ANGIOFIBROOMA

- A. Harvinainen hyvänlaatuinen side- ja suonikudoksesta koostuva kasvain nenäontelossa.
 1. Esiintyy lähes pelkästään nuorilla miehillä (10-20v.).
- B. Tuumorin kasvaessa ilmenee tyypilliset oireet, eli runsaat verenvuodot nenästä (epistaksis) ja hengitysvaikeudet.

IV. NENÄNIELUN KARSINOOMA (NPC)

- A. Nenänielun pintaepiteelistä lähtöisin oleva pahanlaatuinen kasvain.
- B. Harvinainen länsimaissa, mutta hyvin tavallinen Afrikassa ja erityisesti Etelä-Kiinassa.
 1. Geneettinen alttius siis todennäköinen; assosiaatio EBV-infektioon on vahva.
 - a. Voidaan havaita EBER in situ -hybridisaatiolla.
 2. Länsimaissa tavataan paljon myös HPV-positiivisia nenänielukarsinomia.
- C. Histologisesti havaitaan runsaasti lymfosyyttistä reaktiivista tulehdussolukkoa ja tuumorit voidaan jakaa keratinisoivaan, ei-keratinisoivaan ja erilaistumattomaan muotoon. (Kuva 9.2.)
- D. Metastasoivat usein kaulan imusolmukkeisiin.
- E. N. 60% kolmen vuoden selviytyminen

KURKUNPÄÄ (LARYNX)

I. LARYNGIITTI

- A. Kurkunpään infektiot ovat useimmiten virusinfektioita; yleisiä lapsilla.
- B. Akuutti epiglottiitti:
 1. Äkillinen, mahdollisesti hengenvaarallinen, kurkunkannen tulehdus, joka näkyy mansikanpunaisena ja voimakkaana turvotuksena. (Kuva 9.3.)
 2. Tyypillisesti ilmenee korkeana kuumeena, nielemiskipuna, kuolan valumisena ja sisäänhengitysvaikeutena (inspiratorinen stridor).
 - a. Stridor tarkoittaa vinkuvaa ja voimakasta lisä-ääntä sisäänhengittäessä.
 3. Yleisin aiheuttaja on Haemophilus influenzae b; nykyään harvinainen rokotusten takia.
- C. Laryngotrakeobronkiitti (kruppi, valekuristustauti)
 1. Hitaasti (päivien kuluessa) kehittyvä; akuuttia epiglottiittia vähemmän vaarallinen ylähengitystieinfektio
 2. Tyypillisesti ilmenee matalana kuumeena, äänen käheytenä, hengitysvaikeutena (inspiratorinen stridor) ja haukkuvana yskänä.
 3. Yleisin aiheuttaja on parainfluenssavirus.

II. ÄÄNIHUULIKYHMYT

- A. Useimmiten johtuvat äänihuulitraumasta (esim. liiaallinen äänenkäyttö).
- B. Yleensä muutaman millimetrin kokoisia ja bilateraalisia. (Kuva 9.4.)

1. Hyvänlaatuisia; histologisesti koostuvat degeneratiivisesta (myksoidista) sidekudoksesta.

C. Ilmenevät äänen käheytenä ja paranevat äänenkäytön vähentämisellä.

III. KURKUNPÄÄN PAPILLOOMAT

- A. Kurkunpään hyvänlaatuisia eksofyyttisiä levyepiteelikasvaimia äänihuulilla, joiden aiheuttajia ovat papilloomavirukset HPV 6 ja 11. (Kuva 9.5.)
- B. Papilloomat ovat yleensä yksittäisiä aikuisilla, kun taas lapsilla esiintyvä juveniili papillomatoosi on tyypillisesti useista tuumoreista koostuvaa ja helposti uusiutuvaa.
- C. Ilmenee äänen käheytenä ja saattaa vaikeuttaa hengitystä.
- D. Etenee vain harvoin karsinoomaksi.

IV. KURKUNPÄÄN KARSINOOMA

- A. Lähes kaikki kurkunpään pahanlaatuiset kasvaimet ovat levyepiteelikarsinomia.
- B. Vahva assosiaatio tupakoimiseen, myös alkoholi riskitekijä
- C. Ilmenevät yleensä äänen käheytenä ja siihen usein liittyneenä kaulan lymfadenopatiana.
- D. Tuumorin sijainti vaikuttaa ennusteeseen (supraglottisessa huonompi kuin glottisessa); ennuste hyvä aikaisessa vaiheessa.

KEUHKOINFEKTIOT

I. KEUHKOKUUME (PNEUMONIA)

- A. Pneumonia tarkoittaa keuhkoparenkyymin infektiota ja on yksi tärkeimmistä kuolemaan johtavista taudeista.
- B. Taustalla useimmiten bakteeri tai virus (harvoin sienä tai alkueläin) sekä jokin altistava tekijä (bakteeripneumoniassa aikaisempi virusinfektio, heikentynyt yskänrefleksi, vähentynyt mukosilaarinen kuljetus, immuunipuutostilat, krooniset keuhkosairaudet, tupakointi, jne.)
 1. Yleisimmät syyt infektiolle ovat suunielun sisällön mikroaspiraatio unen aikana ja aerosolipisaroiden hengittäminen ilmasta.
- C. Yleisimmät oireet ovat kuume, yskä, yskökset (märästä johtuen keltavihreää tai verestä johtuen ruosteenväristä) ja infektion pleuraan edettyään hankausääni ja rintakipu.
- D. Mahdolliset komplikaatiot liittyvät yleensä bakteeritauteihin.
 1. Pleuran infektio voi johtaa pleuraeffuusioon (eksudatiivinen vaihe), jolloin pleuraan kehittyy märkäpesäke eli empyeema.
 - a. Voi hoitamattomana jatkaa fibropurulenttiin ja lopulta organisoituvan vaiheeseen, jossa pleuratila fibrinotisoituu ja arpeutuu häiriten keuhkon laajenemista ja toimintaa.
 2. Kudostuho ja nekroosi voi johtaa keuhkoabskessin muodostumiseen.
 3. Bakteereeminen disseminaatio muihin elimiin (sepsis, endokardiitti, meningiitti, jne.)
- E. Diagnosoidaan yleensä kliinisesti, radiologisesti ja laboratoriokokein (yskös- ja veriviljely).
 1. Keuhkoauskultaatiossa usein rahinaa, perkussiossa kumea ääni.
- F. Voidaan jakaa mm. alkupaikan ja kasvutavan mukaan.
 1. Avohoitokeuhkokuumeessa tartunta on saatu muualta kuin sairaalaympäristöstä, sairaalakeuhkokuume alkaa sairaalassa saadusta infektiosta.
 - a. Sairaalakeuhkokuumeitten aiheuttajia useimmiten gramnegatiiviset sauvat (Enterobacteriaceae spp. ja Pseudomonas spp.) sekä S. aureus.

2. Anatomisen kasvutavan mukaan tyypillisesti jaetaan lobaari-, bronko- ja interstitiaalipneumoniaan.

II. LOBAARIPNEUMONIA (LOHKOKEUHKOKUUME)

- A. Keuhkokudos on raskasta ja tiivistä (konsolidoitunutta) kokonaan tai lähes kokonaan yhden lohkon alueella.
- B. Tyypillisesti bakteeriperäinen infektio (yleisin *Streptococcus pneumoniae*, muita mm. Klebsiella).
- C. Kehityksen vaiheet:
 1. Kongestio (1-2 päivää) – Punaviolettia parenkyymin osittaista konsolidaatiota, joka johtuu verisuonten kongestiosta ja eksudaattisesta ödeemasta. (Kuva 9.6.)
 2. Punainen hepatisaatio (3-4 päivää) – Punaruskeaa konsolidaatiota, joka johtuu fibriinirikkaasta eksudaatista, neutrofiileistä ja punasoluista, jotka täyttävät alveolit. (Kuva 9.7.)
 3. Harmaa hepatisaatio (5-7 päivää) – Kudos näyttää harmaalta, joka johtuu eksudaatin punasolujen degradaatiosta ja leukosyytti-infiltraatiosta.
 4. Resoluutio (8+ päivää) – T2 makrofagit korjaavat kudoksen ja T2 pneumosyytit toimivat alveolien kantasoluina.

III. BRONKOPNEUMONIA

- A. Keuhkokudoksen läiskittäistä konsolidoitumista, joka keskittyy bronkusten ja bronkiolien sisälle ja ympärille. (Kuva 9.8.)
 1. Usein multilobaarista ja bilateraalista.
- B. Aiheuttajia runsas määrä, mm. *Strep. pneumoniae*, Hib, *Staph. Aureus*
- C. Voi edetä lobaaripneumoniaksi.

IV. INTERSTITIAALINEN (ATYYPPIINEN) PNEUMONIA

- A. Niukat paikallislöydökset ja interstitiumin diffuusi, pääosin mononukleaarinen infiltraatio. (Kuva 9.9.)
 1. Alveolitiloissa ei siis yleensä eksudaattia.
- B. Oireet yleensä lievempiä kuin tyypisessä pneumoniassa (walking pneumonia).
- C. Aiheuttajana useimmiten *Mycoplasma pneumoniae*, varsinkin talvisin armeijassa.
 1. Voi komplikaationa johtaa iho-oireisiin ja lievään autoimmuuniin hemolyyttiseen anemiaan.

V. ASPIRAATIOPNEUMONIA

- A. Aspiraatio eli mahan sisällön tai nieltävän aineen pääsy keuhkoihin altistaa pneumonialle.
- B. Nähdään usein tajuttomilla potilailla ja alkoholisteilla.
- C. Keuhkoihin päässyt happama materiaali on hyvin ärsyttävää, mikä aiheuttaa yleensä suunielun anaerobisten bakteerien kanssa nekrotisoivan pneumonian.
- D. Taudin kulku on usein nopea ja vakava; yleinen komplikaatio on oikean puolen alemman lohkon abskessi.
 1. Aspiraation aiheuttamat abskessit ovat yleisempiä oikealla puolella, koska oikea pääkeuhkoputki haarautuu vertikaalisemmassa kulmassa.

VI. VIRUSPNEUMONIAT

- A. Tyypillisesti interstitiaalinen pneumonia, mutta voi myös yltää alveoleihin ja tuottaa bakteeripneumonian kaltaista konsolidaatiota kuvauksissa, joten vain radiologisilla tutkimuksilla ei voida erottaa bakteeri- ja virusperäistä pneumoniam.

- B. Vaurioittavat respiratorista epiteeliä ja mukosiliaarista kuljetusta altistaen sekundaariselle bakteeripneumonialle.
- C. Aiheuttajia mm.
 1. RSV – Yleisin atyyppisen pneumonian syy pienillä lapsilla
 2. Influenssavirus – Tärkein bakteeriperäistä keuhkokuumetta edeltävä virusinfektio

VII. KEUHKOTUBERKULOOSI

- A. Yleisin kroonisen pneumonian syy; aiheuttaja *Mycobacterium tuberculosis*.
 1. Maailmanlaajuisesti tärkein infektiivinen kuolemanaiheuttaja, Suomessa vain n. 200 tapausta vuodessa.
- B. Primaarituberkuloosivaihe seuraa aikaisemmin altistumattoman potilaan infektiota.
 1. Bakteerit leviävät ylälohkon alaosiin/alalohkon yläosiin ja muodostavat granulomatoottisen tulehduksen primaaripesäkkeitä (Ghon focus, 1-1.5cm läpimitaltaan tyypillisesti), joiden keskus kaseaatinekrotisoituu. (Kuva 9.10.)
 2. Bakteereita mahdollisesti pääsee läheisiin imusolmukkeisiin; usein hiluksessa.
 - a. Lymfadenopatia ja Ghonin fokus muodostavat yhdessä Ghonin kompleksin.
 3. Soluvälitteisen immunitetin kehittyminen yleensä mahdollistaa infektion kontrolloimisen, ja Ghonin kompleksi fibrotisoituu ja kalsifikoituu Ranken kompleksiksi.
 4. Kompleksit eivät kuitenkaan ole steriilejä (latentti infektio) ja voivat reaktivoitua potilaan immuunipuolustuksen heikentyessä.
 5. Primaarituberkuloosi on yleensä oireeton; latentti infektio voidaan havaita IGRA testillä.
 - a. Mantoux-ihotesti (tuberkuliinikoe) on positiivinen myös BCG-rokotuksen (tuberkuloosirokote) saaneilla, mutta voidaan käyttää määrittämään voiko BCG-rokotusta antaa (jos pos. ei saa antaa).
 - b. Ei voida erottaa käynnissä olevaa infektiota latentista.
- C. Sekundaarituberkuloosi (postprimaarinen) ilmenee usein latentin infektion reaktivoituessa vuosikymmenien jälkeen alkufektioista.
 1. Yleisin aiheuttaja on immuunipuolustuksen heikentyminen AIDS:n seurauksena.
 2. Voimakas immunologinen reaktio johtaa suureen kudostuhoon ja kaseaatinekroosisten kaviteettien muodostumiseen.
 - a. Havaitaan keuhkojen ylimmissä osissa (vrt. primaarivaihe) suurina n. 3-10cm kavitaatioina.
 3. Keuhkotuberkuloosin oireita ovat mm. jatkuva kuumeilu, pitkittynyt verinen yskä, yöhikoilu ja painonmenetys.
 4. Diagnosoidaan yskösten värjäyksellä, geenimonistuksella ja viljelyllä.
 - a. Ziehl-Neelsenin värjäyksessä havaitaan haponkestäviä punaisia sauvoja, mutta herkkyys on huono. (Kuva 9.11.)
 - b. Geenimonistustesti (PCR) on nopea ja merkitsevä, mutta ei negatiivisena sulje pois tuberkuloosia (esim. vähäbakteerinen näyte).
 - c. Viljelytutkimus on diagnostiikan kulmakivi, mutta tulos on todella hidas (4-6vk)
 5. Voi komplisoitua verenkiertoon levitessään miliaariseksi tuberkuloosiksi, joka johtaa minkä tahansa elimen infektoitumiseen (mm. kaulan lymfadeniitti, meningiitti, munuaiset ja selkäranka (Pottin tauti)).

KEUHKOJEN OBSTRUKTIIVISET SAIRAUDET

I. PERIAATTEET

- A. Ryhmä sairauksia, jotka johtuvat ilmäteiden obstruktiosta, mikä estää ilman kulkua keuhkoista ulos.
 - 1. Keuhkoahtaumatauti (COPD), astma ja bronkiektasiat
- B. Diagnoosi perustuu keuhkofunktio tutkimuksiin; spirometriassa tärkeimmät arvot ovat FVC, FEV1 ja näiden suhde. (Kuva 9.12.)
 - 1. Uloshengitys heikkenee, joten $\downarrow$ FVC ja $\downarrow\downarrow$ FEV1 ja $\downarrow$ FEV1/FVC (FEV%).
 - a. Normaali FEV1/FVC on $4L/5L=80\%$
 - b. Tutkimukseen liitetään aina bronkodilataatiokoe; varsinkin kun halutaan astmaa diagnosoida.
 - 2. TLC yleensä kasvaa ilman jäädessä jumiin keuhkoihin.

II. KEUHKOAHATAUMATAUTI (COPD)

- A. Keuhkojen krooninen obstruktiivinen sairaus, jonka lähes ainoa syy on tupakointi.
- B. Kaksi tyypillistä osatekijää: krooninen bronkiitti ja emfyseema.
 - 1. Yleensä ilmenevät yhdessä eikä oireisto ole yleensä selvästi kummankaan yksin aiheuttamaa.
- C. Krooninen bronkiitti tarkoittaa limaa tuottavaa yskää, joka kestää vähintään 3kk ajan kahtena peräkkäisenä vuotena.
 - 1. Tupakansavu (tai ilmansaasteet ja pölyt tietyissä töissä) ärsyttävät bronkusten epiteeliä ja aiheuttavat tulehdusta sekä seinämien limarauhasen hypertrofiaa ja hypersekreetiota.
 - a. Histologisesti havaitaan limarauhasalueen paksuuden kasvamisena suhteessa bronkusten seinämän kokonaispaksuuteen (epiteelin ja ruston välinen paksuus); normaali Reidin indeksi $<40\%$, kroonisessa bronkiitissa $>50\%$. (Kuva 9.13.)
 - b. Kertyvä lima sekä limakalvojen ja keuhkoputkien sileän lihaksen paksuuntuminen vähitellen ahtaavat keuhkoputket.
 - 2. Keuhkoputkien ahtautuminen estää hiilidioksidin poistumisen ja hapen saannin ja siten voi aiheuttaa syanoosia – ”blue bloaters”. (Kuva 9.14.)
 - 3. Ahtautuminen lisää myös riskiä infektioille ja cor pulmonalelle.
 - a. Infektiot ovat tärkeä tekijä toistuville pahenemisvaiheille.
- D. Emfyseema eli keuhkolaajentuma tarkoittaa terminaalista bronkiolista distaalisten osien eli asinuksen palautumattoman tuhoutumisen aiheuttamaa laajentumista. (Kuva 9.15.)
 - 1. Alveolipinta-ala vähenee ja elastinen palautuvuus heikkenee, mikä johtaa pienten ilmäteiden kollapsiin ja heikkoon kaasujen vaihtoon. (Kuva 9.16.)
 - 2. Johtuu proteaasien liiaallisesta suhteesta verrattuna antiproteaaseihin.
 - a. Tupakointi (tai ilmansaasteet ja pölyt tietyissä töissä) lisäävät tulehdusta keuhkoissa, jolloin neutrofiilit ja makrofagit vapauttavat proteaaseja.
 - b. Pääosin maksan tuottama α_1 -antitrypsiini (A1AT) neutralisoi proteaaseja.
 - 3. Kaksi tärkeintä anatomisen jakautumisen luokitusta ovat sentriasinaarinen (n. 95%) ja panasinaarinen emfyseema. (Kuva 9.17.)
 - a. Sentriasinaarinen emfyseema on yleensä keuhkojen ylälohkoissa ja liittyy tupakointiin.

- i. Muutokset keuhkoasínusten keskellä eli respiratorisissa bronkióleissa.
- b. Panasinaarinen emfyseema on yleensä keuhkojen alaosissa ja liittyy A1AT:n puutukseen, jonka aste määrää taudin vakavuuden.
 - i. Maksan tuottama A1AT ei laskostu normaalisti ja kertyy hepatosyyttien endoplasmiseen retikkeliin, mikä aiheuttaa myös maksavauriota. Maksakirroosia voidaan havaita ja biopsiassa pinkkejä, PAS-positiivisia kertymiä hepatosyyteissä. (Kuva 9.18.)
 - ii. PiM on normaali alleeli (PiMM-genotyyppi), PiZ-alleeli aiheuttaa vähentynyttä kiertävää A1AT:tä.
 - iii. PiMZ-heterotsygootit yleensä oireettomia, mutta tupakointi nostaa riskiä emfyseemalle normaalia enemmän.
 - iv. PiZZ-homotsygooteille kehittyy usein lapsuudessa kirroosia ja panasinaarisen emfyseeman riski on suuri.
- 4. Emfyseeman oireita ovat mm.
 - a. Hengenahdistus ja vähälimainen yskä
 - b. Pitkittetty uloshengitys mutristetuilla huulilla – ”pink-puffer”. Kuluttaa runsaasti energiaa ja johtaakin usein painon menetykseen.
 - c. Tynnyririnta (kasvanut AP-halkaisija) (Kuva 9.19.)

III. ASTMA

- A. Astmassa on COPD:n tapaan uloshengitysvajausta, mutta se yleensä johtuu lääkityksellä palautuvasta hyperreaktiivisesta kohtauksittaisesta bronkokonstriktiosta.
 - 1. Astman ilmentyminen usein nopea ja kulku vaihteleva, kun taas COPD kehittyy hitaammin ja etenevästi.
- B. Yleisin tyyppi on allerginen (atooppinen) astma, joka alkaa lapsuudessa ja liittyy muihin allergisiin tauteihin (mm. atooppinen ihottuma, riniitti, ruoka- ja lääkeaineallergiat).
- C. Atooppinen astma on tyypin I yliherkkyyssreaktio.
 - 1. Allergeeni indusoi Th2-solujen fenotyyppiksi erilaistumista CD4+ T-soluissa.
 - 2. Th2-solut erittävät runsaasti erilaisia sytokiineja, kuten IL-4 (stimuloi IgE:n tuotantoa), IL-5 (eosinofiilien kemoattraktantti) ja IL-10 (stimuloi Th2-soluja ja inhiboi Th1-soluja).
 - a. IgE sitoutuu syöttösolujen pinnalle.
 - 3. Allergeenille uudelleen altistuessa allergeeni sitoutuu IgE:hen syöttösolujen pinnalla ja aiheuttaa syöttösolujen degranulaatiota sekä leukotrieenien tuotantoa.
 - a. Tuotetut leukotrieenit C4, D4 ja E4 sekä granuloista vapautuva histamiini aiheuttavat bronkokonstriktiota ja lisäävät vaskulaarista permeabiliteettia.
 - b. Inflammaatio kehittyy hitaammin ja on yleensä eosinofiilien tuottaman MBP:n aiheuttamaa (major basic protein).
- D. Diagnosoidaan kliinisesti oireiden ja keuhkojen toimintakokeiden perusteella:
 - 1. Kohtauksittainen hengenahdistus ja hengityksen vinkuna
 - 2. Yöllinen tai aamuun painottuva limainen yskä
 - a. Ysköksissä eosinofiliaa, ohuita ja vieterimäisiä limasäikeitä (Curschmannin spiraaleja) (Kuva 9.20.) ja eosinofiiliperäisiä Charcot-Leydenin kristalleja. (Kuva 9.21.)
 - 3. PEF-mittaus (uloshengityksen huippuvirtaus) ja spirometria varmistavat diagnoosin.

- a. PEF-arvon (15%) tai FEV1:n (12%) parantuminen bronkodilataation jälkeen tai pieneneminen yli 15% juoksurasituskokeessa.
 - i. COPD:ssa ei klassisesti havaita normaaliin toimintaan palauttavaa bronkodilataatiovastetta, mutta jonkin asteen vaste on kuitenkin yleistä.
- E. Astma voi myös olla ei-allergista, joka on tavallisemmin aikuisten tautimuoto.
 - 1. Aiheuttajia mm. lääkeaineet (aspiriinin aiheuttama AERD), työperäiset hengitettävät aineet ja virusinfektiot (usein rinovirus).
- F. Henkeä uhkaavaa ja heikosti lääkitykseen vastaavaa pahenemisvaihetta kutsutaan status asthmaticukseksi, joka ilmenee akuuttina ja vaikeana hengenahdistuksena, vinkumisena, hypoksemiana sekä hyperkapniana.

IV. BRONKIEKTASIA

- A. Bronkusten ja bronkiolien epänormaalia ja pysyvää laajentumista, joka on emfyseemaa proksimaalisempaa.
- B. Johtuu bronkusten seinämää vaurioittavasta kroonisesta tulehduksesta, mikä aiheuttaa ilmesteiden järetyden menetystä ja ilman loukkuun jäämistä.
- C. Yleisin aiheuttaja on nekrotisoiva bakteeripneumonia, mutta antibioottihoitojen kehittyessä ilmeneminen on vähentynyt. Muita syitä ovat mm.
 - 1. Virus- ja sieni-infektiot – sieni-infektioista *Aspergillus fumigatus* voi aiheuttaa astmaatikoille ja kystisestä fibroosista kärsiville allergisen bronkopulmonaarisen aspergilloosin (ABPA)
 - 2. Mekaaninen este (kasvain, vierasesine, limatulppa) – esteestä distaalisesti oleva kudostulehdus ja aiheuttaa paikallista bronkiektasiaa.
 - a. Kystinen fibroosi – ionitransportteri CFTR-geenissä mutaatio, joka aiheuttaa liman viskositeetin lisääntymistä ja poistumisen hidastumista. Johtaa laaja-alaiseen bronkiektasiaan.
 - 3. Liikkumattomien värekarvojen oireyhtymä – moottoriproteiinien, kuten dyneiinin, toiminta on heikkoa ja aiheuttaa liman kertymistä bronkukseen ja hengitystieinfektioalttiutta.
 - a. Assosiaatio myös hedelmättömyyteen (etenkin miehillä; siittiöiden heikko liikehdintä) ja n. puolella potilaista on täydellinen situs inversus eli tila, jossa sisäelimen ovat asettuneet normaalin peilikuvaksi.
 - i. Kartagenerin oireyhtymä: Liikkumattomien värekarvojen aiheuttama triadi: bronkiektasioita+krooninen sinusiitti+situs inversus (Kuva 9.22.)
- D. Ilmenee yleisimmin pitkittyneenä yskänä, huonohajuisina ja mahdollisesti verisinä (vrt. krooninen bronkiitti) ysköksinä ja hengenahdistuksena.
 - 1. Komplikaatioita ovat hypoksemia ja cor pulmonale sekä sekundaarinen (AA) amyloidoosi.
- E. Todetaan ohutleiketietokonekerroskuvauksella; verikokeet ja yskösnäytteet auttavat syyn selvittelyssä.

KEUHKOJEN RESTRIKTIIVISET SAIRAUDET

I. PERIAATTEET

- A. Ryhmä sairauksia, jotka johtuvat keuhkojen normaalin täyttymisen heikkenemisestä.

1. Ovat yleensä kroonisia interstitiaalisia keuhkosairauksia (keuhkoparenkyymin tauteja, ILD), mutta restriktio voi myös johtua ekstraparenkyymisistä syistä, kuten sairaalloisesta lihavuudesta.

- a. Interstitiaaliset keuhkosairaudet ovat sairauksien ryhmä, jossa havaitaan inflammatorisia ja fibroottisia muutoksia alveolien interstitiumissa ja mahdollisesti ympäröivässä bronkiaalisessa kudoksessa.

- i. Mm. idiopaattiset interstitiaaliset pneumoniat (IIP), sarkoidoosi ja pneumokonioosit

2. Paljon obstruktiivisia harvinaisempia.

B. Spirometria: $\downarrow$ FVC, $\downarrow$ FEV1, $\uparrow$ FEV1/FVC (FEV%) (ja $\downarrow$ TLC)

1. FVC:n z-arvo JA VC:n z-arvo on alle -1.65.

C. Keuhkojen HRTT on tärkein ja ensisijainen diagnostinen keino, mutta joskus tarvitaan keuhkobiopsia tarkkaan diagnoosiin.

II. IDIOPAATTINEN KEUHKOFIBROOSI (IPF)

A. Tavallisin idiopaattinen interstitiaalinen pneumonia ja siten myös tavallisin interstitiaalinen keuhkosairaus (Suomessa n. 600-800 potilasta, yleensä yli 60v.).

B. Vaikea ja etenevä keuhkojen interstitiumia fibrotisoiva sairaus.

1. Histologinen muutos on UIP (usual interstitial pneumonia, Kuva 9.23.), jota saattaa esiintyä myös monissa muissakin taudeissa, kuten nivelreumassa, SLE:ssä ja asbestoosissa.

2. Keuhkojen HRTT:ssä nähdään ”hunajakennokeuhko”. (Kuva 9.24.)

C. Etiologia tuntematon, mutta liittyynee toistuvaan keuhkovaurioon.

1. Vaurioituneet pneumosyytit vapauttavat TGF-betaa, mikä indusoi fibroosia.

D. Tyypillisesti ilmenee hengenahdistuksena ja kuivana yskänä.

E. Tällä hetkellä lääkehoito vain hidastavaa, ainoa lopullinen hoitokeino on keuhkon siirto.

III. SARKOIDOOSI

A. Useita elimiä vaurioittava ei-kaseoivasti granulomatoottinen sairaus; yleensä nuorilla aikuisilla (Suomessa n. 500/v)

B. Etiologia tuntematon; dendriittisolun tunnistaa tuntemattoman antigeeni, jonka se esittelee CD4+-auttaja-T-solulle, joka aktivoituu ja alkaa erittää sytokiinejä ja kemoattraktantteja johtaen granuloomien muodostukseen.

C. Granuloomien tavallisimmat elinilmentymät:

1. Tavallisimmat löydökset ovat keuhkoportin imusolmukkeissa ja keuhkokudoksessa, mitkä johtavat restriktiiviseen keuhkosairauteen.
 - a. Oireina hengenahdistus ja kuiva yskä.
 - b. Kuvantamisessa keuhkoportin adenopatiaa ja parenkyymin noduksia.
 - c. Granulooman jättisolut sisältävät usein asteroidikappaleita. (Kuva 9.25.)
2. Ihomuutokset – yleisin muutos on kyhmyruusu (erythema nodosum) (Kuva 9.26.)
3. Silmämuutokset – yleisin muutos on suonikalvoston tulehdus (uveiitti)
4. Limakalvomutokset – kuivasilmäisyys, suuhaavaumat, vähentynyt syljeneritys ja sylkirauhasten turvotus (Sjögrenin oireyhtymän kaltainen tila)
5. Sydänmuutokset – ilmenee eteis-kammiokatkoksenä; sarkoidoosin pelätyin komplikaatio on äkkikuolemaan johtava äkillinen rytmihäiriö

6. Munuaismuutokset – Munuaiskivet ovat yleinen löydös; epiteloidisolujen 1-alfahydroksylaasiaktiiviteetti konvertoi D-vitamiinia aktiiviseen muotoon ja aiheuttaa hyperkalsemiam, mikä johtaa kalsiumoksalaattikivien muodostumiseen.

- a. Verenkuvassa voidaan siis usein nähdä hyperkalsemiam, mutta myös ACE-pitoisuuden ja maksaentsyymiarvojen kohonneisuutta.

- D. Yleensä itsestään paraneva lievä tauti, mutta tarvittaessa hoidetaan immunosuppressiivisesti.

IV. PNEUMOKONIOOSIT (PÖLYKEUHKOSAIRAUKSET)

- A. Keuhkojen restriktiivisiä ammattisairauksia, jotka johtavat interstitiaaliseen fibroosiin.

1. Työssä altistutaan pienille partikkeleille, jotka pääsevät hengityksen kautta alveoleihin, jossa alveolaarimakrofagit fagosytoivat ne, vapauttavat välittäjäaineita ja indusoivat fibroosia.

- B. Tärkeimpiä pneumokoniooseja ovat asbestoosi, silikoosi, hiilityöläisen pneumokonioosi ja beryllioosi.

- C. Asbestin käyttö kiellettiin vuonna 1993, joten nykyään sille altistutaan pääosin purkutöissä. Sairauksia todetaan edelleen n. 30-40 tapausta vuodessa pitkän latenssiajan takia (10-50 vuotta).

1. Pitkäaikainen altistuminen voi johtaa keuhkokudoksen ja pleuran fibroosiin (pleuraplakit). (Kuva 9.27.)
 2. Lisää riskiä keuhkosyövälle sekä mesoteliomalle, joka on lähes yksinomaan asbestialtistumiselle spesifinen syöpä.
 3. Histologisesti voidaan nähdä pitkiä, kultaruskeita kuitumaisia asbestikappaleita. (Kuva 9.28.)

- D. Silikoosi eli kivi- tai hiekkapölykeuhko johtuu pitkäaikaisesta altistumisesta kivi- tai hiekkapölylle (tavallisimmin kvartsipölylle), mitä tapahtuu mm. kaivos-, maansiirto- ja tunnelinrakennustyössä.

1. Tavallisin muoto on klassinen krooninen kivi- tai hiekkapölykeuhko, jossa voidaan havaita ylälohkopainotteista nodulaarista fibroosia ja keuhkoportin imusolmukkeiden kalkkiutumista. (Kuva 9.29.)
 2. Kvartsipöly on karsinogeeni sekä silikoosi lisää riskiä tuberkuloosille.
 - a. Kvartsipöly häiritsee fagolysosomiformaatiota makrofageissa, mikä altistaa tuberkuloosille.

- E. Hiilityöläisen pneumokonioosi (CWP, BLD) johtuu pitkäaikaisesta altistumisesta hiilipölylle, mitä tapahtuu mm. hiilikaivostyöläisillä.

1. Kehittyy antrakoosin kautta vakavampaan tautimuotoon.
 - a. Antrakoosi tarkoittaa yleensä oireetonta keuhkojen mustaa värjäytymistä, joka johtuu hiilipigmentin kertymisestä makrofageihin, välikudokseen ja imusolmukkeisiin. (Kuva 9.30.)
 - i. Havaitaan jossain määrin kaikilla kaupungeissa asuvilla.
 - b. Jatkuva vakava altistuminen voi johtaa diffuusiin keuhkojen fibroosiin, mikä näyttää hyvin samanlaiselta kuin silikoosi.
 - i. Makroskooppisesti keuhkot ovat hyvin tummat (Black lung disease). (Kuva 9.31.)

- F. Beryllioosi johtuu pitkäaikaisesta altistumisesta berylliumille, mitä tapahtuu mm. elektroniikka- ja lentokoneteollisuudessa.

1. Johtaa ei-kaseoivaan granulomatoottiseen tulehdukseen keuhkoissa, keuhkoportin imusolmukkeissa ja myös muissa elimissä (muistuttaa siis sarkoidoosia).
2. Beryllium on karsinogeeni, joten lisää myös keuhkosityövän riskiä.

V. ALLERGINEN ALVEOLIITTI (HYPERSENSITIVITY PNEUMONITIS)

- A. Inhaloitujen orgaanisten antigeenien aiheuttama interstitiaalinen pneumonia, joka voi kroonisessa altistumisessa johtaa fibroosiin.
 1. Tulehduksessa havaitaan useimmiten ei-nekrotisoituvia granuloomia.
- B. Tavallisimpia aiheuttajia ovat bakteerit ja homeet; tavataan useimmiten maanviljelijöillä (farmer's lung eli homepölykeuhko) ja lintujen kanssa työskentelevillä (linnunpölykeuhko).
- C. Ilmenee muutama tuntia altistumisen jälkeen kuumeena, yskänä ja hengenahdistuksena.

PULMONAALINEN HYPERTENSIO

I. PERIAATTEET

- A. Keuhkoverenpainetaudissa keuhkovaltimon keskipaine on levossa yli 25mmHg (normaalisti 14mmHg).
- B. Johtaa muutoksiin verisuonten endoteelissä, sileälihassoluissa ja soluvälitilassa.
 1. Sisäkerroksen fibrotisoituminen, keskikerroksen hypertrofia ja ulkokerroksen paksuuntuminen.
 - a. Sydänsairauksista johtuva laskimohypertensio aiheuttaa myös näitä muutoksia ja johtaa ns. arterialisaatioon; myöhemmässä vaiheessa verenpaine kohoaa myös keuhkovaltimoissa.
 2. Vaikeassa ja pitkäaikaisessa taudissa voidaan tavata pleksiformisia lesioita, jotka ovat uudismuodostuneita pieniä verisuonia, joiden tarkoitus on mahdollistaa verenkulku ahtauneista keuhkovaltimoista huolimatta; havaitaan histologisesti pienten verisuonten kerääntymistä. (Kuva 9.32.)
 3. Kohonnut verenpaine on ateroskleroosin riskitekijä, joten usein havaitaan myös keuhkovaltimorungon ahtautumista ateroskleroosin takia.
- C. Johtaa hoitamattomana sydämen oikean puolen vajaatoimintaan ja lopulta cor pulmonaleen eli keuhkosydänsairauteen.
 1. Cor pulmonale tarkoittaa oikean kammion paksuuntumista ja lopullista vajaatoimintaa keuhkojen tai keuhkoverenkierron häiriöiden seurauksena.
- D. Tyypillisiä oireita ovat varsinkin rasituksen aiheuttama hengenahdistus, pyörtyileminen ja rintakipu sekä sydämen oikean puolen vajaatoiminnan oireet (mm. perifeerinen ödeema).
- E. Monia eri mahdollisia etiologioita; pääasiallisesti voidaan jakaa primaarisiin ja sekundaarisiin tapauksiin.

II. PRIMAARINEN KEUHKOVERENPAINETAUTI

- A. Sporadisissa tapauksissa kutsutaan idiopaattiseksi keuhkovaltimoiden hypertensioksi (IPAH), lähisukulaisilla myös todettuna periytyväksi.
- B. Suurella osalla esiintyy BMPR2-geenin inaktivoiva mutaatio, mikä lisää verisuonten sileän lihaksen proliferaatiota.
- C. Tyypillisesti tavataan nuorilla aikuisilla naisilla.

III. SEKUNDAARINEN KEUHKOVERENPAINETAUTI

- A. Muihin tauteihin liittyvä keuhkovaltimotauti (APAH) on IPAH:ta yleisempi.

- B. Tavallisimmat taustalla olevat taudit ovat muut keuhkosairaudet ja happeutumisvajausta, sydäntoiminnan häiriöt (esim. synnynnäinen vasemmalta oikealle oikovirtaus) ja toistuvat organisoituvat tromboemboliat.
1. Keuhkosairaudesta tai happeutumisvajaudesta johtuva - Mm. Keuhkoastma (COPD) ja krooninen altistuminen korkealle ilmanalalle johtavat hypoksemiaan keuhkoissa, mikä johtaa laajaan keuhkoverenkierron vasokonstriktioon ja siten hypertensioon.
 2. Sydäntoiminnan häiriöstä johtuva - Vasemmalta oikealle suuntautuva oikovirtaus lisää verivolyymiä keuhkoverenkierrossa ja siten aiheuttaa hypertensiota.
 - a. Tietysti myös vasemman puolen vajaatoiminta aiheuttaa PAH (oikeastaan yleisin syy)
 3. Krooninen tromboembolinen keuhkoverenpainetauti (KTEPH) - Akuutti keuhkoembolia ei aina liukene täysin vaan voi organisoitua ja ahtauttaa keuhkovaltimon pysyvästi, jolloin keuhkoverisuonten virtauspinta-ala pienenee – varsinkin embolioiden ollessa toistuvia.

HENGITYSVAJAUS

I. PERIAATTEET

- A. Hengitysvajauksessa kaasujenvaihto alveoleissa tai keuhkotuuletus eli hapen saanti ja hiilidioksidin poistuminen on heikentynyt.
- B. Syynä on kaasujenvaihdon rajapinnan ongelma tai ilmatien tai aktiivisen hengityselimen puutteellinen toiminta.
1. Kaasujenvaihtohäiriö johtaa hypoksemiaan ja ventilaatiohäiriö hyperkapniaan.
 2. Useimmilla potilailla on sekä kaasujenvaihtohäiriö että keuhkotuuletuksen vaje, sillä kaasujenvaihdon heikentyessä vaadittavan hengitystyön kasvu saattaa ylittää kompensointireservit.
- C. Voidaan jakaa akuuttiin ja krooniseen hengitysvajauteen.
1. Akuutti voi johtua mm. keuhkokuumeesta ja -pöhostä, keuhkoveritulpasta ja ARDS:tä
 2. Kroonisen yleisin syy on keuhkoastma, muita ovat mm. hermo-lihassairaudet (esim. myasthenia gravis) ja lihavuus.

II. AKUUTTI/AIKUISEN ÄKILLINEN HENGITYSVAJAUSOIREYHTYMÄ (ARDS)

- A. Keuhkokapillaarien diffuusi tulehdusreaktion aiheuttama endoteelivaurio (DAD, diffuse alveolar damage) häiritsee alveoli-kapillaari -rajapintaa ja siten kaasujenvaihtoa.
1. Proteiinirunsasta nestettä tihkuu alveolien soluvälitilaan ja sisälle ja muodostaa nekroottisten solujen kanssa kaasujenvaihtopintaa häiritsevän hyaliinimembraanin. (Kuva 9.33.)
 - a. Myös normaali surfaktantin toiminta häiriintyy ja alveolit kollapsoituvat helpommin (alveolaarinen atelektasi).
 2. Tulehdusreaktio aiheuttaa myös keuhkokapillaarien trombotisoitumista (V/Q - jakauman häiriö) sekä aktivoi fibroblasteja aiheuttaen keuhkokudoksen arpeutumista.
 - a. Myös tyypin I ja II pneumosyytit vaurioituvat, joten regeneraation sijasta tapahtuu enemmän reparaatiota arpikudoksella.

- B. Ei ole oma tautinsa, vaan tapahtuu sekundaarisena yhteydessä muuhun vakavaan ei-sydänperäiseen sairauteen, kuten sepsiksen, sokkitilan, myrkytyksen, DIC:n, keuhkotulehduksen tai pankreatiitin seurauksena.
- C. Oireet:
 - 1. Hengenahdistus, suurentunut hengitystaajuus ja apuhengityslihasten käyttö
 - 2. Hypoksemiasta johtuvaa syanoosia
 - 3. Hyperkapniasta johtuvaa päänsärkyä, sekavuutta ja uneliaisuutta
- D. Thoraxkuvauksessa nähdään molemminpuoliset samentumat ilman sydänperäistä keuhkokongestiota.
- E. Hoidetaan taustasairauden hoidolla sekä säästävällä hengityslaittehoidolla, jossa keuhkojen venyttymistä ja jatkuvaa avautumista ja sulkeutumista pyritään minimoimaan.
 - 1. Hengityslaittehdossa matala kertahengitystilavuus sekä loppu-uloshengityksen aikainen positiivinen paine (PEEP), joka estää keuhkorakkuloiden kasaan painumista.

III. VASTASYNTYNEEN HENGITYSVAIKEUSOIREYHTYMÄ (NRDS, RDS-TAUTI)

- A. Surfactantin puutteesta johtuva vastasyntyneen hengitysvajaus
 - 1. Surfactantti on T II pneumosyyttien tuottama pintajännitystä heikentävä tekijä, joka muodostaa alveoleihin ohuen kerroksen ja estää niiden kasaan painumista uloshengityksessä.
 - a. Tärkein rakennusosa on fosfatidyylikoliini (lesitiini).
 - 2. Kapillaari-alveolaarikalvon lisääntynyt läpäisevyys mahdollistaa plasmaproteiinien valumisen alveoleihin ja hyaliinimembraanien muodostumisen.
- B. RDS-taudin ilmaantuvuus on kääntäen verrannollinen syntymäikään.
 - 1. Ennen aikaisella vastasyntyneellä surfactanttia ei ole ehtinyt vielä muodostua tarpeeksi; tuotanto alkaa n. vk 28 ja riittävät tasot saavutetaan n. vk 35.
 - a. Ennen lapsen syntymää keuhkojen kehittymistä voidaan seurata lapsiveden lesitiini/sfingomyeliini-suhteella (L/S-suhde), joka on riittävä, jos se on yli 2.
 - i. Nykyään tutkitaan lapsiveden lamellaarikappaleita tutkimalla (kun Am-Lamel >25x10⁹/l (labrasta riippuen), niin L/S on >2)
- C. Myös keisarileikkaus ja äidin diabetes lisäävät riskiä RDS-taudille.
 - 1. Normaalissa vaginaalisessa synnytyksessä stressireaktio lisää steroidisynteesiä vauvalla, mikä lisää surfactantin tuotantoa.
 - 2. Äidin diabeteksessa äidin korkea verensokeri kulkee sikiöön ja lisää sikiön insuliinintuotantoa (insuliini vähentää surfactantin tuotantoa).
- D. Vastasyntyneellä havaitaan korkea hengitystaajuus, ähkimistä ja syanoosia.
- E. Ehkäistään äidille annetulla kortikosteroidihoidolla ja hoidetaan vastasyntyneellä ylipainehengityshoidolla sekä korvaavalla surfactantilla.

KEUHKOKASVAIMET

I. PERIAATTEET

- A. Lähes kaikki (99%) keuhkojen kasvaimista ovat maligneja.
- B. Suomessa todetaan n. 2700 uutta keuhkosyöpätapausta vuosittain; tyypillisesti havaitaan yli 60-vuotiailla ja hieman useammin miehillä.
 - 1. Keuhkosyövät aiheuttavat eniten syöpäkuolemia maailmassa (5v elossaolo-osuus n. 10-15%).

- C. Tärkein etiologia on tupakointi (85-90% keuhkosyövistä), mutta myös radonsäteily ja asbesti ovat riskitekijöitä.
1. Tupakansavun yksi tärkeimmistä karsinogeenisista aineista ovat polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet), joita syntyy orgaanisen aineen palaessa epätäydellisesti.
 - a. PAH-yhdisteitä syntyy siis myös savustaessa ja grillatessa ruokaa, liikenteessä, energiantuotannossa, alumiinitehtaissa yms. paikoissa ja tilanteissa.
 - b. Keuhkosyövän riski nousee askivuosien mukaan (askivuodet=päivittäisten askien lkm * tupakoinnin kesto).
 2. Radon on radioaktiivinen jalokaasu, jota syntyy uraanin hajoamisreaktiossa.
 - a. Tärkein radonin lähde tyypilliselle suomalaiselle on sisäilma, johon radonkaasua on päässyt talon alla olevasta maaperästä.
 - b. Suomessa sisäilman radon aiheuttaa n. 300 keuhkosyöpätapausta vuosittain.
- D. Keuhkosyövät ovat usein pitkään oireettomia ja havaitaan vasta levinneessä vaiheessa.
1. Oireet ovat epäspesifisiä ja riippuvat pääosin primaarituumorin koosta, sijainnista ja levinneisyydestä.
 - a. Vena vaca superior -syndrooma (yläonttolaskimo-oireyhtymä) syntyy kasvaimen painaessa yläonttolaskimon tukkoon.
 - i. Mm. kasvojen ja käsien ödeema, kaulan verisuonet alkavat pullottaa sekä voidaan havaita positiivinen Pembertonin merkki (kasvojen punotusta ja pöhötystä pitäessä käsiä ylhäällä pään vieressä). (Kuva 9.34.)
 - b. N. phrenicuksen kompressio aiheuttaa pallean paralyysiä ja olkapääkipua; n. laryngeus recurrensin kompressio taas äänen käheyttä.
 - c. Keuhkon yläkärjen kasvain (Pancoastin tuumori, superior pulmonary sulcus tumor) voi painaa useita olkahermopunoksen hermojuuria (olkakipu ja käden heikkous) ja sympaattista hermorunkoa (Hornerin oireyhtymä eli yleensä unilateraalinen ptoosi, mioosi ja kasvojen anhidroosi). (Kuva 9.35)
 - d. Keuhkosyövät usein myös aiheuttavat pleuraeffuusiota, joka ilmenee rintakipuna.
 2. Epäily herää oireista ja poikkeavasta thoraxkuvasta, jossa voidaan havaita pyörövarjo.
 - a. Myös mm. benignit kasvaimet (useimmiten hamartooma) ja infektiot (esim. tuberkulooma, aspergillooma) voivat aiheuttaa pyörövarjon.
- E. Levinneisyysastetta ja sen myötä ennustetta kuvataan TNM-luokituksella, joiden perusteella syövät voidaan jakaa myös asteisiin (I-IV):
1. T- Tumor; primaarikasvaimen koko ja paikallinen tunkeutuminen
 2. N- Nodes; paikallisten imusolmukkeiden etäpesäkkeet
 3. M- Metastasis; Etäpesäkkeet muualla
 - a. Yleisimmät paikat ovat maksa, luusto, aivot ja lisämunuaiset.
- F. Diagnoosi perustuu histologiseen tai sytologiseen näytteeseen.

1. Keskeisin tutkimus on transtorakaalinen neulanäyte tuumorista paksuneulabiopsiana (voidaan täydentää sytologisilla tutkimuksilla, kuten ohutneulabiopsialla, BAL-näytteellä tai harjaamalla bronkusten seinämiä)
- G. Näytteiden perusteella keuhkosyövät jaetaan kahteen pääluokkaan: pienisolainen keuhkokarsinoma ja ei-pienisoluiset keuhkokarsinomat.
 1. Ei-pienisoluiset keuhkokarsinomat voidaan tavallisesti hoitaa kirurgisesti, kun taas pienisolainen karsinoma hoidetaan pääasiassa kemoterapialla ja säteilyllä.
 2. Immunohistokemialliset tutkimukset auttavat alatyypityksessä ja tarkemman hoidon valinnassa.
 - a. Adenokarsinoomassa voidaan havaita EGFR-mutaatioita tai kromosomin 2 inversio (EML4-ALK -fuusioproteiini), jotka ohjaavat systeemistä terapiaa.
 - b. PD-L1 voi olla ekspressoitu missä tahansa ei-pienisoluisessa karsinoomassa ja ohjaa immunologista hoitoa.

II. PIENISOLUINEN KEUHKOSYÖPÄ

- A. N. 15% kaikista keuhkosyövästä ovat pienisoluisia karsinomia.
- B. Erittäin vahva yhteys tupakointiin; tavataankin yleensä vanhoilla tupakoivilla miehillä.
- C. Histologisesti havaitaan heikosti erikoistuneita pieniä soluja, jotka ovat peräisin neuroendokriinisistä Kulchitskyn soluista. (Kuva 9.36.)
- D. Primaarituumorin sijainti on yleensä keuhkojen keskiosassa (sentraalinen), josta se metastasoi aikaisin.
- E. Usein havaitaan myös paraneoplastisia oireyhtymiä, mm.
 1. Antidiureettisen hormonin epäasianmukainen erityys (SIADH) – ADH:n liikaeritys aiheuttaa hyponatremiaa
 2. Ektooppinen Cushingin oireyhtymä – ACTH:n liikatuotanto aiheuttaa Cushingin oireyhtymän kaltaisia oireita (painonnousu, kuukasvoisuus, akne, proksimaalinen lihasheikkous, hypertensio yms.)
 3. Lambert-Eatonin myasteeninen syndrooma (LEMS) – Syöpäsolut tuottavat vasta-aineita hermo-lihasliitoksen presynaptisia kalsiumkanavia vastaan; oireistoon kuuluu proksimaalisten lihasten heikkous ja vaimentuneet heijasteet

III. EI-PIENISOLUINEN KEUHKOSYÖPÄ

- A. Adenokarsinoma
 1. Yleisimpiä primaarisia keuhkosyöpiä (n. 50%); yleisin naisten ja ei-tupakoitsijoiden tyyppi (tupakointi silti tärkein riskitekijä)
 2. Histologisesti havaitaan usein rauhasmaista tai lepidistä kasvua ja usein musiinia. (Kuva 9.37.)
 3. Primaarituumorin sijainti yleensä keuhkojen perifeerisissä osissa (perifeerinen).
 4. Voi olla:
 - a. preinvasiivinen (adenokarsinoma in situ), jossa lieriömäisiä soluja kasvaa pitkin bronkiolien ja alveolien seinämää (Kuva 9.38.)
 - b. minimaalisesti invasiivinen: halkaisijaltaan korkeintaan 3 cm, sen hallitseva kasvutapa on lepidinen, ja invasiivinen alue on kooltaan korkeintaan 5 mm.
 - c. tai invasiivinen, joilla useita erilaisia kasvutapoja; jaetaan vielä non-musinoottiseen ja invasiiviseen musinoottiseen
- B. Levyepiteelikarsinoma
 1. Toiseksi yleisin keuhkokarsinoma; yleisin tupakoivilla miehillä

2. Histologisesti havaitaan keratinisaatiota, keratiinihelmiä ja soluvälisiltamuodostusta. (Kuva 9.39)
 3. Primaarituumorin sijainti yleensä sentraalinen.
 4. Voi tuottaa PTHrP ja aiheuttaa paraneoplastisen oireyhtymän, johon liittyy mm. hyperkalsemia.
- C. Suurisoluinen karsinooma (LCNEC)
1. Vain n. 5-10% keuhkokarsinoomista; yleisin tupakoivilla miehillä
 2. Histologisesti havaitaan huonosti erilaistuneita suuria neuroendokriinisia soluja ja usein nekroosia, mutta ei muita adenokarsinooman tai levyepiteelikarsinooman tyypillisiä piirteitä. (Kuva 9.40.)
 - a. Diagnoosi on poissulkudiagnoosi immunohistokemiaa hyödyntäen.
 3. Primaarituumorin sijainti vaihtelee, mutta yleensä perifeerinen.
- D. Karsinoidituumori
1. Alle 5% keuhkosyövistä; voi esiintyä myös alle 20v (kuitenkin yleensä n. 45-55v.), ei liity selkeästi tupakointiin
 2. Histologisesti havaitaan hyvin erilaistuneita neuroendokriinisia soluja, jotka ovat kromograniniiniposiitivisia. (Kuva 9.41.)
 3. Primaarituumorin sijainti vaihtelee, mutta yleensä sentraalinen ja sijaitsevat keutkoputken sisällä.
 4. Tyypillisesti matalan maligniasteen tuumori, jonka ennuste on hyvä.
 - a. Voi harvoin aiheuttaa karsinoidisyndrooman (muiden elinten karsinoidituumoreissa yleisempi).
 - i. Tuumori erittää runsaasti serotoniinia, joka aiheuttaa mm. ripulia, kasvojen punoitusta ja takykardiaa.
- E. Metastaasit keuhkoihin
1. Yleisempää kuin primaariset tuumorit.
 2. Yleisin veriteitse leviävien kasvainten metastasointipaikka; tavallisemmat lähtöpaikat ovat rinta-, maha-suolikanava-, munuais- ja kilpirauhassyövät ja melanooma sekä pään ja kaulan alueen syövät.
 3. Kuvauksessa havaitaan multippeleita pyörötuumoreita; immunohistokemia auttaa erottamisessa.

PLEURAN TAUDIT

I. PLEURANESTEKERTYMÄ

- A. Pleuranesteen ylittäessä fysiologisen määrän (10-20ml), ilmenee pleuranestekertymälle tyypillisiä oireita, kuten pistävää kylkikipua ja hengenahdistusta.
- B. Neste voi olla koostumukseltaan joko transudaattia (vähäproteiininen) tai eksudaattia (runsasproteiininen).
 1. Transudaatti syntyy hydrostaattisen paineen kohotessa (esim. sydämen vajaatoiminta) tai onkoottisen paineen laskiessa (esim. nefroottinen oireyhtymä).
 2. Eksudaatti syntyy hiussuonten läpäisevyyden lisääntymisen seurauksena (esim. pleuriitti tai maligniteetti)

II. PNEUMOTHORAX (ILMARINTA)

- A. Keuhkopussiin kertyy ilmaa, mikä hävittää pleuratilän negatiivisen paineen, painaa keuhkon toista puolta kasaan ja aiheuttaa hengenahdistusta ja kipua.

- B. Voi syntyä spontaanisti tai trauman aiheuttamana.
- C. Spontaani ilmarinta syntyy ”sisäkautta” keuhkoputkista, kun laajentunut bronkiolin tai alveolin kupla repeää ja vuotaa ilmaa keuhkopussiin.
 - 1. Voi olla primaarinen (terveissä keuhkoissa tapahtuva) tai sekundaarinen (sairaissa keuhkoissa, esim. tuberkuloosi, maligniteetti, COPD)
- D. Trauma rintakehän läpi päästää ilmaa suoraan ulkoilmasta pleuraan; voi aiheuttaa jänniteilmarinnan (tension pneumothorax), jossa ilmaa pääsee pleuraan mutta ei ulos sieltä (yksisuuntainen läppä).
 - 1. Kasvava ylipaine on nopeasti henkeä uhkaava ja johtaa nopeasti hoitamattomana kuolemaan.

III. MESOTELIOOMA

- A. Pleuramesoteliooma on keuhkopussin maligni kasvain; lähes aina taustalla työperäinen asbestialtistus.
 - 1. Viive altistuksen ja sairastumisen välillä jopa useita vuosikymmeniä.
- B. Aiheuttaa hengenahdistusta, rintakehän kipuja ja toistuvia pleuraeffusioita.

10 RUOANSULATUSKANAVAN PATOLOGIA

SUUONTELON SAIRAUDET

I. HUULI-SUULAKIHALKIOT

- A. Yleisimpiä synnynnäisiä rakennepoikkeamia (n. 120 Suomessa vuosittain); suulakihalkio ja huulihalkio voivat ilmentyä erillään toisistaan, mutta tapahtuvat usein yhdessä.
- B. Ensimmäisen kolmanneksen aikana kehittyvät huulet, leuka ja suulaki eivät kasva yhteen normaalisti, jolloin sikiöllä puuttuu osa huulesta ja/tai suulaesta. (Kuva 10.1.)
- C. Geeniperimä sekä ympäristötekijät (mm. alkoholi, tupakointi ja tietyt lääkkeet) vaikuttavat syntymiseen.

II. SUUHAAVAUMAT

- A. Yleensä pinnalliset limakalvohaavat ovat suoran trauman aiheuttamia, mutta toistuvat pienet, kivuliaat haavaumat ovat aftoja, joiden etiologia ei ole aina selvä.
 - 1. Aftan tunnistaa soikeana tai pyöreänä, yleensä alle 1cm haavaumana, joka on keskeältä vaaleampi ja reunoilta punertava (Kuva 10.2.)
- B. Aftojen ilmenemisen voi laukaista mm. stressi, tupakoinnin lopettaminen ja natriumlauryylisulfaattia sisältävät hammastahnat.
 - 1. Parantuvat itsestään 1-6 viikossa, mutta usein uusiutuvat vaihtelevin väliajoin.
- C. Behçetin tauti on harvinainen autoimmuunisairaus, jossa etiologialtaan tuntematon vaskuliitti aiheuttaa toistuvia aftoja, sukupuolielinten haavaumia ja uveiittia. (Kuva 10.3.)
 - 1. Puhkeaa yleensä nuorilla aikuisilla (erityisesti entisen Silkkien varrella)

III. RAKKULATAUDIT

- A. Voidaan jakaa virusperäisiin tai autoimmuuniperäisiin tauteihin (kts. myöhemmin pemfigoidi ja pemfigus)
- B. Rakkuloita aiheuttavista virustaudeista yleisin on huuliherpes.

1. Herpes simplex -virus 1 (HSV1) on suun herpestulehduksen yleisin aiheuttaja, mutta myös HSV-2 pystyy tarttua suuhun.
2. Arviolta yli puolet aikuisväestöstä on HSV-1:n kantajia, mutta vain osalla ilmenee taudin oireita.
 - a. Ensitartunta saadaan yleensä lapsena ja primaarisen infektion jälkeen virus säilyy piilevänä trigeminaalihermon hermotumakkeessa, josta se voi aktivoitua ajoittain ja aiheuttaa lieviä oireita.
 - i. Erityisesti stressi ja runsas auringonvalo voivat aiheuttaa reaktivaatiota.
3. Primaari-infektion oireina havaitaan vesikkeleitä yleensä suun limakalvon, ikenien ja kielen alueella (gingivostomatiitti). (Kuva 10.4.)
 - a. Vesikkelit voivat revetä ja aiheuttaa punaisia, pinnallisia ja kivuliaita haavaumia.
4. Sekundaari-infektiossa vesikkeleitä havaitaan ryhmissä yleensä huulessa (huuliherpes eli yskänrokko), mutta niitä voidaan tavata myös muualla suuontelossa. (Kuva 10.5.)

IV. SUUN LEVYEPITEELIKARSINOOMA

- A. Yleinen suuontelon limakalvon levyepiteelin maligni neoplasia.
 1. Yleensä yli 50-vuotiailla, suuontelon syövässä n. 50-75% 5 vuoden elossaolo-osuus.
 - a. Suurella osalla todetaan diagnoosin jälkeen myöhemmin uusi primaarituumori (kenttäkarsinogeneesi).
- B. Yleisin sijainti on suun pohjassa, mutta voi ilmetä myös kielessä ja huulessa.
 1. Ilmenee yleensä alussa kyhmyinä ja punoittavana tai valkoisena muutoksena ja kehittyessään muodostaa kovareunaisen haavauman. (Kuva 10.6.)
- C. Taustalla on yleensä tupakan ja alkoholin suurkulutus, mutta myös korkean riskin HPV-variantit (lähinnä HPV16) ovat riskitekijä (kts. kohdunkaulan HPV-infektio tarkemman selityksen toivossa)
- D. Leukoplakia ja erytroplakia ovat suun limakalvon muutoksia, joihin liittyy suurentunut suusyövän riski (prekanseroottisia muutoksia), jonka vuoksi niistä tulee aina ottaa koepala.
 1. Leukoplakia tarkoittaa suun limakalvon vaaleaa muutosta, jota ei saada raaputtamalla irottettua eikä johdu selkeästi muusta taudista. (Kuva 10.7.)
 - a. Ei ole sama asia kuin suun kandidiaasi (hiivasieni-infektio, sammas), joka on raaputettavissa pois. (Kuva 10.8.)
 - b. Karvainen leukoplakia ilmenee kielen sivussa koholla olevana ”karvaisena” leesion ja eroaa tyypillisestä leukoplakiasta, sillä sen aiheuttaa EBV:n indusoima levyepiteelin hyperplasia immunokompromisoiduilla potilailla (esim. AIDS) eikä se ole premaligni. (Kuva 10.9.)
 2. Erytroplakia on kirkkaanpunainen suun limakalvon muutos, joka on leukoplakiaa harvinaisempi, mutta sen malignisoitumisriski on paljon suurempi (yli 50%). (Kuva 10.10.)

V. HAMPAIDEN SAIRAUDET

- A. Itse hampaan tärkeimpiä sairauksia ovat karies ja eroosio; tukikudossairauksista gingiviitti ja parodontiitti.
- B. Karies ja hammaseroosio ovat molemmat hampaan kovakudosta kuluttavia tauteja.

1. Karies johtuu plakin mikrobeista (yleensä Strep. mutans), jotka tuottavat sokeria sisältävää ainetta metaboloidessaan hampaiden kiillettä liuottavia happoja.
 - a. Invasoidessaan hampaaseen bakteerit aiheuttavat hampaan reikiintymistä.
 2. Hammaseroosio johtuu hapoista, jotka eivät ole peräisin suun mikrobeista, kuten happamat juomat tai oksennus. (Kuva 10.11.)
 - a. Heikentynyt hammaskiille altistaa hampaiden reikiintymiselle.
- C. Huonon suuhygienian seurauksena kertyvä plakki voi johtaa gingiviittiin eli ientulehdukseen ja vielä edetessään parodontiittiin eli hampaan kiinnityskudossairauteen (kiinnityskatotauti). (Kuva 10.12.)
1. Yleensä ientulehduksen ainoa oire on verenvuoto hampaiden harjauksen yhteydessä.
 2. Parodontiitissa hammasta ympäröivä osa leukaluuta ja tukikudos tuhoutuu, joka johtaa hampaiden lisääntyneeseen liikkuvuuteen ja mahdolliseen hampaiden menetykseen.
 - a. Periapikaalinen parodontiitti on juurenkärjen alueen tulehdus, joka johtuu lähes aina kariesperäisestä juurikanavainfektiosta. (Kuva 10.13.)
 - i. Voi johtaa juurikystaan, joka on leukojen yleisin kysta.

SYLKIRAUHASTEN SAIRAUDET

I. PERIAATTEET

- A. Sylkirauhaset ovat eksokriinisia sylkeä erittäviä rauhasia, jotka voidaan jakaa suuriin ja pieniin sylkirauhasiin.
1. Suuria on kolme paria: korva- (parotisrauhaset), leuanalus- (submandibulaarirauhaset) ja kielenalussylkirauhaset (sublinguaalirauhaset).
 - a. Parotisrauhaset ovat lähes täysin serööseja rauhasia.
 - b. Submandibulaarirauhaset pääasiassa serööseja.
 - c. Sublinguaalirauhaset erittävät pääasiassa mukoosia sylkeä.
 2. Pieniä on satoja ja niitä on kaikkialla suuontelossa.

II. SIALADENIITTI (SYLKIRAUHASEN INFLAMMAATIO)

- A. Tärkeimmät syyt ovat infektiiviset ja obstruktiiviset (akuutteja yleensä) sekä autoimmuunitulehdukset (usein kroonisia).
- B. Obstruktiivinen syy johtuu sylkikivestä (sialolitiaasi), joka tukkii syljen kulkeutumisen sylkirauhasista suuhun -> ylimääräinen sylki rauhasessa johtaa rauhasen turpoamiseen ja kivuliaaseen tulehdukseen, joka on usein bakteriellää.
1. Tavallisin bakteeriperäinen infektio on polymikrobiaalinen (tärkein Staph. aureus).
 - a. Heikko syljen virtaus rauhasesta suuhun altistaa bakteerien kasvulle -> obstruktiiviset sialolitiaasit ja dehydraatio tärkeitä altistavia tekijöitä
- C. Virusperäisistä taudeista yleisin maailmassa on sikotauti (epideeminen parotiitti), jonka aiheuttaa paramyxovirus.
1. Ilmenee bilateraalisisena parotiittina, mutta myös orkiitti, pankreatiitti ja aseptinen meningiitti voivat olla läsnä. (Kuva 10.14.)
 - a. Seerumista voidaan havaita kohonnut amylaasi pankreatiitin ja parotiitin seurauksena.
 - b. Orkiitti lisää riskiä lapsettomuudelle.
 - c. Käytännössä hävinnyt Suomesta (MPR-rokote).

D. Autoimmuunisairauksista tärkein on Sjögrenin oireyhtymä, jolle on tyypillistä sylki- ja kyynelrauhasten krooninen tulehdus ja tuhoutuminen.

1. Sarkoidoosi on myös toinen tärkeä immuuniperäinen sialadeniitin syy, mutta ei ole klassisesti autoimmuunitaudiksi laskettu.

III. PLEOMORFINEN ADENOOMA (SEKATUUMORI)

- A. Sylkirauhasen hyvänlaatuinen ja selvästi yleisin kasvain; esiintyy useimmiten parotisrauhasissa.
- B. Histologisesti rauhasrakenteissa havaitaan epiteelikerros, jota ympäröi myoepiteliaalinen kerros ja näiden ulkopuolella kondromyksoidinen strooma. (Kuva 10.15.)
- C. Hoidetaan täydellisellä kirurgisella poistolla.
 1. Uusiutuu kuitenkin usein, sillä usein epätäydellisen kapselin läpi normaalikudokseen työntyneet ulokkeet on vaikea poistaa. Leikkauksen aikana tuumori voi myös rupturoitua ja tuumorisoluja pääsee ympäröivään kudokseen.
 2. Voi harvoin pitkäkestoisena malignisoitua.

IV. WARTHININ TUUMORI

- A. Sylkirauhasen hyvänlaatuinen ja toiseksi yleisin kasvain; esiintyy lähes aina parotisrauhasessa.
- B. Histologisesti havaitaan papillaarisesti rakentunut kystinen tuumori, jossa tiivis lymfosyyttinen strooma.
 1. Papillaarisia ulokkeita muodostaa kaksirivinen onkosyyttinen epiteeli ja kystatiloissa havaitaan usein proteiinipitoista debristä. (Kuva 10.16.)

V. ADENOKYSTINEN KARSINOOMA

- A. Sylkirauhasen yleisin pahanlaatuinen kasvain; esiintyy vaihtelevasti eri rauhasissa.
- B. Histologisesti havaitaan klassisesti kribriforminen kasvutapa, jossa pienet epiteelisolut muodostavat solusaarekkeitä ja niiden sisällä mikrokystisiä rakenteita. (Kuva 10.17.)
 1. Myös tubulaarinen tai solidi kasvutapa ovat mahdollisia.
- C. Aggressiivisimpia sylkirauhastumoreita; perineuraalinen invaasio yleistä jo aikaisessa vaiheessa, mikä ilmenee mm. kasvojen kipuna, turtumisena ja lopulta paralyysinä. (Kuva 10.18)

VI. MUKOEPIDERMOIDIKARSINOOMA

- A. Sylkirauhasen toiseksi yleisin (Suomessa, maailmanlaajuisesti yleisin ja adenokystinen on 2. yleisin) pahanlaatuinen kasvain, esiintyy useimmiten parotiksessa.
- B. Histologisesti havaitaan musinoottisia soluja, välimuotoisia soluja ja levyepiteelisoluja, jotka muodostavat kystarakenteita. (Kuva 10.19.)
 1. Pahanlaatuisuusasteen kasvaessa saarekkeet kiinteytyvät ja limasolujen osuus vähenee.

RUOKATORVEN SAIRAUDET

I. ESOFAGUSATRESIA JA TRAKEOESOFAGIAALINEN FISTELI

- A. Ruoka- ja henkitorven separaatiovaiheen häiriöt johtavat fistelin eli kahden tuubin epänormaaliin yhteyteen ruoka- ja henkitorven välillä.
- B. Yleisimmässä trakeoesofageaalisen fistelin muodossa fisteli yhdistää henkitorven ja ruokatorven alaosan samalla, kun ruokatorven yläosa on umpipussi (esofagusatresia). (Kuva 10.20.)

1. Harvinaisemmin fisteliyhteys voi olla yläosaan tai fisteli voi olla muodostunut ilman esofagusatresiaa.

C. Atresia aiheuttaa välitöntä syömis jälkeistä regurgitaatiota, fisteli johtaa vatsan pullotukseen, korkeaan aspiraatoriskii (keuhkokuume) ja hengitysvaikeuksiin.

1. Havaitaan myös polyhydramnion, sillä sikiö ei pysty juomaan lapsivettä.

II. ZENKERIN DIVERTIKKELI

A. Kaularuokatorven pullistuma (Kuva 10.21.), joka muodostuu luontaisesti heikkoon kohtaan ruokatorvessa (Killianin kolmio). (Kuva 10.22.)

1. Syntymekanismi epäselvä, mutta oletetaan johtuvan vauriosta alueen lihasseinämään, mikä johtaa mukoosan ja submukoosan pullistumiseen lihasseinämän läpi (pseudodivertikkeli).

B. Ilmenee nielemisvaikeuksina, regurgitaationa ja aspiraatoriskinä ja pahanhajuisena hengityksenä (halitoosi); ilmaantuvat yleensä keski- iän jälkeen.

III. RUOKATORVEN HAAVA JA RUPTUURA

A. Raju tai pitkään kestänyt oksentelu voi vaurioittaa ruokatorven limakalvoa ja johtaa kivuliaaseen veriseen oksenteluun (Mallory-Weissin oireyhtymä = repeämä gastroesofagiaalisessa junktiassa). (Kuva 10.23.)

1. Johtuu yleensä alkoholismista tai bulimiasta.

B. Harvinaisesti voi edetä Boerhaaven oireyhtymään, jossa raju oksentelu aiheuttaa ruokatorven spontaanin ruptuuran.

1. Ilmenee voimakkaana rinta- tai ylävatsakipuna ja subkutaanisena emfyseemana, koska ilmaa pääsee ruptuuran kautta ihon alle ja mediastinumiin (pneumomediastinum ja mediastiniitti).

IV. RUOKATORVEN LASKIMOLAAJENTUMAT (ESOFAGUSVARIKSIT)

A. Dilatoituneita laskimoita submukoosassa, jotka nousevat ruokatorven seinämää pitkin distaalisessa ruokatorvessa. (Kuva 10.24.)

B. Johtuvat kohonneesta porttilaskimopaineesta, joka liittyy mm. maksakirroosiin tai porttilaskimotromboosiin.

1. Distaalisen ruokatorven laskimot yleensä tyhjenevät v. gastrica sinistran kautta porttilaskimoon, mutta porttilaskimon paineen ollessa koholla laskimoveri pakkautuu ruokatorven laskimoihin.

C. Ei itsessään aiheuta oireita, mutta laskimolaaientumien repeämisestä seuraava kivuton verenvuoto on vaarallinen ja yleisin kuolemaan johtava komplikaatio maksakirroosissa.

V. AKALASIA

A. Krooninen ruokatorven motiliteettihäiriö, johon liittyy erityisesti epätäydellinen ruokatorven alasulkijan (LES) relaksaatio, mutta myös puuttuva runko-osan peristaltiikka.

B. Seurausta myenteerisen pleksuksen gangliosolujen degeneraatiosta.

1. Ruokatorven seinämässä myenteerinen hermopunos (Auerbachin pleksus) kulkee sisemmän poikittaisen ja ulomman pitkittäisen lihaskerroksen välissä. Submukoosassa taas kulkee Meissnerin pleksus.
2. Vaurio inhibitorisiin neuroneihin johtaa alasulkijan puutteelliseen relaksaatioon sekä rungon peristaltiikan häiriintymiseen.

C. Yleensä primaarista idiopaattista akalasiaa, mutta esim. Chagasin tauti (loistauti Etelä-Amerikassa; Trypanozoma cruzi-infektio) voi aiheuttaa sekundaarista akalasiaa.

- D. Tyyppioire on kiinteiden sekä nesteiden nielemisvaikeus, myös regurgitaatiota sekä pahanhajuista hengitystä esiintyy.
- E. Diagnostiikassa voidaan käyttää röntgenkuvausta, endoskopiaa ja manometriaa.
 - 1. Röntgenkuvausta ennen juodaan barium-varjoainetta, jonka kulkua ruokatorven läpi tutkitaan; havaitaan laajentunut ruokatorvi, joka kaventuu kuin linnun nokka ("linnunnokkailmiö"). (Kuva 10.25.)
 - 2. Manometriassa sieraimen kautta ruokatorveen viedään mittauskatetri, jonka kautta havaitaan nieltäessä havaitaan kohonnut ruokatorven alasulkijan lepopaine sekä puutteellinen runko-osan peristaltiikka.
- F. Lisää riskiä ruokatorven levyepiteelisyövälle.

VI. REFLUKSITAUTI (GERD)

- A. Gastroesofagiaalinen refluksi tarkoittaa mahalaukun sisällön takaisinvirtausta ruokatorveen, mikä aiheuttaa kudosisäurioita ruokatorvessa.
- B. Esofagogastrisen jnkktion rakenteet (LES, pallean lihas ja frenoesofageaalinen ligamentti) normaalisti estävät refluksin.
 - 1. LES:n nielemiseen liittymätön relaksaatio ja LES:n vähentynyt jänitys on tärkein syy refluksille.
 - 2. Hiatusherniassa mahalaukun osa luisuu pallean ruokatorvihiatuksen läpi; yleisin muoto on liukutyri, jossa GE-junktio sekä mahalaukun yläosa luisuu thoraxonteloon. (Kuva 10.26.)
 - a. Terävä Hisin kulma ei enää toimi refluksia estävänä läppäsysteminä, mikä altistaa refluksitautille.
- C. Pääoire on närästys ja myös regurgitaatiota (käänteisvirtaus) ilmenee usein.
 - 1. Regurgitaatio voi aiheuttaa ylempien (äänien käheys, kurkkukipu, hampaiden kiilleauriot) ja alempien hengitysteiden (yskä, astman paheneminen) oireita.
- D. Komplikaatioita ovat mm. ruokatorven haavaumat (ulseraatiot) tai striktuura sekä Barretin ruokatorvi.
 - 1. Haavaumat johtavat odynofagiaan (kipu niellessä).
 - 2. Pitkäaikainen refluksi voi myös johtaa Schatzkin renkaan muodostumiseen, joka pahentaa dysfagiaa.
 - a. Schatzkin rengas on mukoosasta ja submukoosasta koostuva rengasmaainen kalvo distaalisessa esofaguksessa. (Kuva 10.27)
- E. Histologisia löydöksiä esofagitiitille ovat basaalisolujen hyperplasia, stromaalistien papillien pidentyminen ja intraepiteliaalinen neutrofiilien ja eosinofiilien infiltraatio. (Kuva 10.28.)
 - 1. Keski vaikeassa voidaan nähdä limakalvoeroosiota ja vaikeassa limakalvoulseraatioita. (Kuva 10.29.)
- F. Hoidetaan yleensä konservatiivisesti elämäntapamuutoksilla (ruokavalio, painon pudottaminen) sekä lääkityksellä (mm. PPI:t, antasidit, H₂-salpaajat, alginaatti), mutta näiden pettäessä ja oireiden ollessa vakavia voidaan myös hoitaa kirurgisesti (Nissenin fundoplikaatio).

VII. BARRETIN ESOFAGUS (BE)

- A. Ruokatorven alaosiin kerrostunut levyepiteeli muuttuu metaplastisesti nonsiliaariseksi lieriöepiteeliksi, jossa on pikarisoluja.

1. Intestinaalinen metaplasia; suolityypiset pikarisolut värjäytyvät AB-PAS-värjäyksessä sinisiksi epiteeli purppuranväriseksi. (Kuva 10.30.)
 2. Makroskooppisesti näyttää GE-junktiosta nousevalta punaiselta muutokselta. (Kuva 10.31.)
- B. Syntyy lähes aina GERD:n seurauksena, n. 10% GERD-potilaista on Barretin esofagus.
1. Epiteeli muuttuu paremmin refluksin tuomaa happamuutta kestäväksi.
- C. Voi edetä dysplasiaksi ja lopulta adenokarsinoomaksi (n. 3-5% etenee syöväksi eliniän aikana)
1. Jos todetaan vaikea dysplasia, on riski adenokarsinoomalle n. 10%/vuosi (lievässä dysplasiassa <0.5%/v).

VIII. EOSINOFIILINEN ESOFAGIITTI (EOE)

- A. Ruokatorven eosinofiilivaltaista tulehdusta; johtuu tyypillisesti allergisesta Th2-vasteesta allergeenille (tyypillisesti ruoka-aine, mahdollisesti aeroallergeeni)
1. N. 75%:lla potilaista on myös muita allergisia tauteja (esim. allerginen riniitti tai astma)
 2. Välillä kutsutaan ”ruokatorven astmaksi”
- B. Kyseessä ei ole tyypillinen IgE-välitteinen ruoka-allergia, jossa allergeenin nauttiminen johtaisi välittömästi turvotukseen, vaan taudinkuvaa hallitsee aikuisilla tyypillisesti nielemisvaikeudet, mahdollinen närästyksen tunne (pidettävä mielessä, jos reflukstitaudin hoitovaste happosalpaajille on epätyypillinen) ja jopa ruuan jääminen kiinni ruokatorveen
1. Jatkuva eosinofiilinen tulehdus aiheuttaa subepiteliaalista fibroosia ja johtaa ruokatorven dysmotiliteettiin
 - a. Lopulta voi muodostua striktuuroita, jotka aiheuttavat ruokaboluksen tarttumisen kiinni ruokatorveen
 2. Pienillä lapsilla oksentelua, vatsakipua ja syömishäiriöitä
- C. Diagnoosi perustuu kliiniseen kuvaan ja tähystys- sekä histologiseen löydökseen
1. Ruokatorven limakalvossa todettava eosinofilia (15 eosinofiilia suuren suurennuksen näkökentässä (x 40)) on diagnoosin edellytys
 - a. Taritsee myös olla ruokatorven toimintahäiriöön viittavia oireita ja muut eosinofilian syyt (esim. infektio) tulee poissulkea
- D. Hoitona voidaan käyttää mm. eliminaatiodieettiä joko ensisijaisena hoitona sekä lapsilla että aikuisilla tai lääkehoitojen (PPI ensilinjana, mahdollisesti paikallisteroidi) lisänä
1. Soija, kanamuna, maito, vehnä, pähkinät sekä kalat ja äyriäiset ovat parhaiten tunnetut eosinofiiliseen esofagiittiin liittyvät ruoka-aineet (6 ruuan eliminaatiodieetti)
 2. Endoskooppista dilataatiohoitoa käytetään ruokatorven striktuuroiden hoitoon, jos lääke- ja ruokavaliohoito osoittautuu riittämättömäksi

IX. RUOKATORVEN KASVAIMET

- A. Hyvänlaatuiset ovat hyvin harvinaisia (5%), yleensä ruokatorven kasvaimet ovat levyepiteeli- tai adenokarsinoomaa.
1. Suomessa n. 300/v, levyepiteelikarsinooma harvinaistunut ja adenokarsinooma yleistynyt.
- B. Adenokarsinooma on yleisempi länsimaissa ja syntyy lähes aina Barretin esofaguksen pohjalta (95%); kehittyvät siis ns. metaplasia-dysplasia-karsinoomasekvenssin kautta.
1. Adenokarsinoomat sijaitsevat tästä johtuen lähes aina ruokatorven distaaliosassa
 2. Yleisimmin tubulaarinen kasvutapa. (Kuva 10.32.)

- C. Levyepiteelikarsinooma on yleisempi muoto maailmanlaajuisesti ja se sijaitsee yleensä ruokatorven ylemmässä tai keskimmäisessä kolmanneksessa.
1. Tärkeimmät riskitekijät länsimaissa ovat tupakka ja alkoholi.
 2. Muualla, kuten Kiinassa, tärkeimpiä riskitekijöitä ovat ruoan nitrosamiinit ja runsas todella kuuman teen juonti.
 3. Myös akalasia ja rengasmuodostumat (rings&webs; esim. Plummer-Vinsonin oireyhtymä) lisäävät riskiä. (Kuva 10.33.)
 - a. Plummer-Vinsonin oireyhtymän triadi = raudanpuute, ruokatorven verkkomaiset muutokset ja nielemisvaikeudet; etiologia tuntematon
- D. Tyypillisiä oireet ovat mm. etenevä nielemisvaikeus, laihtuminen, rinta- ja ylävatsakivut, verinen oksennus ja yskä.
1. Ilmenevät myöhään ja metastasoivat aikaisin (runsas imutieverkosto), minkä takia ennuste on huono molemmissa tyypeissä (5-vuotiselossaolo-osuus 10-20%).
 - a. Imusolmukemetastaasien sijainti antaa vihjeen alkuperäissyövän tyypistä ja lokalisaatiosta.
 - ii. Levyepiteelisyöpä on yleensä proksimaalisessa ruokatorvessa sekä torven keskiosissa, joten imusolmukemetastaasit sijaitsevat yleensä kaulalla ja rintaontelossa.
 - iii. Adenokarsinooma on yleensä distaalisessa ruokatorvessa, joten imusolmukemetastaasit sijaitsevat yleensä ylävatsan imusolmukkeissa sekä pitkälle edetessään kaulalla ja mediastinumissa.
 - iv. Ylin 1/3 -> kaulan imusolmukkeet
 - v. Keskimmäinen 1/3 -> mediastinumin imusolmukkeet ja paratrakeaaliset sekä trakeobronkiaaliset imusolmukkeet
 - vi. Alin 1/3 -> sisusvaltimorungon alueen imusolmukkeet (celiac nodes) ja mahan imusolmukkeet

MAHALAUKUN SAIRAUDET

I. KEHITYSHÄIRIÖT

- A. Gastroskiisi eli vatsahalkio on anteriorisen vatsan seinämän sulkeutumishäiriö, missä sikiön sisäelimet työntyvät ulos vatsaontelosta ilman suojaavaa kalvopussia.
1. Ennuste yleensä erinomainen.
- B. Omfaloseele eli napanuoratyrä on vatsaontelon sulkeutumishäiriö, missä suolistoa työntyy napanuoran kautta vatsaontelon ulkopuolelle kalvopussin ympäröimänä eikä palaa sieltä takaisin.
1. Ennuste isoituna hyvä, mutta tilaan liittyy yleensä muitakin epämuodostumia.
- C. Synnynnäinen pylorusstenoosi eli mahanportin ahtaus on hypertrofisen pyloruslihaksen aiheuttama suhteellisen yleinen kehityshäiriö (n. 2-6/1000; 4x yleisempää pojilla (esikoisilla vielä erityisesti)).
1. Makrolidit ovat yhteydessä kehittymiseen
 2. Ilmenee suihkumaisina, sapettomina oksennuksina muutaman viikon ikäisenä.
 - a. Johtaa pitkittyneenä painon laskuun, kuivumiseen ja hypokloreemisen hypokaleemisen metabolisen alkaloosin kehittymiseen.

3. Havaitaan ylävatsan palpaatiossa oliivimaisena pylorustuumorina, joka varmennetaan kaikututkimuksessa.
 - a. Silmin voidaan myös nähdä peristaltiikkaa.
4. Hoidetaan kirurgisesti (pyloromyotomia; osa pyloruslihaksesta leikataan).
 - a. Leikkauksella ei ole kiire, ja se suoritetaan vasta, kun kuivuma ja elektrolyyttihäiriöt ovat korjattu.

II. AKUUTTI GASTRIITTI

- A. Gastriitti tarkoittaa tulehdusta mahan limakalvossa ja se voidaan jakaa akuuttiin ja krooniseen.
- B. Akuutilla gastriitilla yleensä viitataan nopeasti (yleensä muutamassa vuorokaudessa) syntyvään hapon aiheuttamaan limakalvovaurioon, joka johtaa pinnalliseen inflammatioon, eroosioon ja vaikeissa tapauksissa haavojen eli ulkusten muodostumiseen.
 1. Eroosio tarkoittaa mukoosan pintaosien menetystä, ulkus (haava) viittaa koko mukoosan läpi ylettyvään vaurioon (yltää siis vähintään submukoosaan).
 2. Kun puhutaan gastriitista, puhutaan yleisesti eroosiosta.
 - a. Limakalvovaurio voi edetä eroosiosta haavaksi, jolloin puhutaan akuutista/kroonisesta peptisestä haavasta.
- C. Patofysiologiassa keskeistä on häiriö tasapainossa limakalvon suojausmekanismien ja limakalvoa vaurioittavan hapon välillä.
 1. Limakalvoa suojaa ehjä epiteeli (erittää limaa, prostanoideja ja HCO_3^- ; tiiviit liitokset blokkavat hapon pääsyä solujen läpi) ja mukoosan riittävä verenkierto.
 - a. Prostanoidit (erityisesti PGE_2 ja myös PGI_2) vähentävät hapon eritystä ja lisäävät liman sekä bikarbonaatin eritystä sekä lisäävät verenkiertoa mukoosaan.
 - i. Sivusolut tuottavat limaa.
 - b. Verenkierto tuo soluille ravintoa ja happea sekä kerää happoa pois.
 2. Epiteelin parietaalisolut (katesolut) tuottavat happoa (HCl) (ja sisäistä tekijää).
 - a. Hapon tuotantoa stimuloivat asetyylikoliini, gastriini ja histamiini.
- D. Akuutin gastriitin taustalla voi olla mm.
 1. Tulehduskipulääkkeet (NSAIDit) – Estävät limakalvon COX-entsyymejä (erityisesti COX1) ja estävät siten prostaglandiinien tuotantoa.
 2. Runsas alkoholin kulutus – Alkoholi vaurioittaa epiteeliä suoraan sekä lisää hapon tuotantoa.
 3. Mekaaninen vamma tai palovamma (Curlingin ulkus) – Hypovolemia johtaa mukoosan verenkierron vähenemiseen.
 4. Kallonsisäisen paineen nousu – Lisääntynyt vagaalinen stimulaatio lisää asetyylikoliinivälitteistä hapontuotantoa ja aiheuttaa yleensä yksittäisen, syvän ns. Cushingin ulkuksen.
 - a. Korkea riski puhkeamiselle.
 5. Sokki – Limakalvon verenkierron väheneminen altistaa ns. stressiulkuksille, joita nähdään usein tehohoitopotilailla
- E. Potilaat ovat usein kivuttomia, mutta mm. dyspepsiaa (ylävatsavaivoja) ja veristä ulostetta (meleena) tai oksennusta (hematemeesi) voidaan nähdä.

III. KROONINEN GASTRIITTI

- A. Krooninen mahalaukun limakalvon inflammaatio; voidaan jakaa etiologian perusteella pääasiassa autoimmuunigastritiiksi ja helikobakteerigastritiiksi (ja reaktiiviseksi gastritiiksi; samoja aiheuttajia kuin akuutissa (mm. NSAIDit, runsas alkoholin kulutus), nyt tulehdus on vain pidempiaikaisempaa).
1. Erityistyyppejä on mm. eosinofiilinen gastritti, lymfosyyttigastritti ja fokaalinen aktiivinen gastritti, joiden etiologiat jäävät usein epäselviksi.
- B. Autoimmuunigastritiin aiheuttaa tyypin IV yliherkkyyssreaktio (T-soluvälitteinen), mikä johtaa korpuksen (runko-osa) ja funduksen (mahanpohjukka) limakalvon rauhasen atrofiaan.
1. Havaitaan yleensä vasta-aineita parietaalisoluja ja/tai sisäistä tekijää vastaan, mutta soluvälitteinen yliherkkyyssreaktio on itse vaurioiden taustalla.
 2. Korpuserauhasen parietaalisolujen tuhoutuminen johtaa aklorhydriaan (mahan hapottomuus) ja sisäisen tekijän puutteeseen.
 - a. Aklorhydria (tai hypoklorhydria) aiheuttaa ruoansulatusvaivoja ja raudanpuuteanemiaa; atrofian etenemisen myötä B12-vitamiinin puute ja pernisiöosi anemia.
 - i. Sisäistä tekijää tarvitaan B12-vitamiinin absorptioon.
 3. Atrofian yhteydessä havaitaan suolimetaplasiaa, joka lisää riskiä adenokarsinooman kehittymiselle.
 4. Hapenerityksen vähenemisen takia gastritiin erityis lisääntyy ja G-soluissa on hyperplasiaa.
 5. Ei ole hoitoa, mutta B12- ja rautalisät auttavat oireellisilla.
- C. Helikobakteerigastritti on kroonisen gastritiin yleisin tyyppi ja yksi maailman yleisimmistä tartuntataudeista (H. pylori -infektio; n. 1-3% H. heilmannii).
1. Helikobakteeri istuu limakerroksessa, jossa se tuottaa ureaaseja, jotka vähentävät mahan hapokkuutta (tuottaa ammoniakkia) ja tekevät ympäristöstä bakteerille suotuisamman. (Kuva 10.34.)
 - a. Bakteeri myös tuottaa muita toksiineja (mm. CagA) sekä käynnistää tulehdusreaktion, mitkä heikentävät limakalvon puolustusmekanismeja erityisesti antrum-alueella.
 - b. Aikaisemmin ajateltiin täysin non-invasiiviseksi bakteeriksi; nyt on havaittu sen invasiokykyä mukoosisoluihin.
 - i. Vieläkin käsitellään non-invasiivisena kuitenkin.
 2. Bakteerit voidaan nähdä endoskopian yhteydessä otetun biopsian (modifoidussa, Helico giemsa) Giemsa-värijäykässä epiteeliin kiinnittyneinä; lamina propriassa myös runsaasti lymfosyyttejä ja plasmakalvoja. (Kuva 10.35.)
 - a. Myös ureaasitesti voidaan tehdä endoskopian yhteydessä.
 - b. Aikaisemmin hoitamattomille endoskopiaa ennen tehdään yleensä ulosteen antigeenimääritys; muita mahdollisia on 13C-ureahengitystesti tai IgG-vasta-aineiden määritys verestä (IgG vain aikaisemmin hoitamattomille)
 - c. Alkuvaiheessa infektio on ei-atrofinen, mutta n. puolella potilaista etenee vuosien kuluessa atrofioivaksi ja suurella osalla intestinaaliseen metaplasiaan.
 3. Yleensä infektio on oireeton, mutta voi aiheuttaa ylävatsavaivoja sekä lisää riskiä peptiselle ulkustaudille, adenokarsinoomalle sekä MALT-lymfomalle.

4. Hoidetaan viikon kestävällä häätohoidolla, johon kuuluu kolme lääkettä (kolmoishoito): PPI+klaritromysiini+amoksisilliini/metronidatsoli
 - a. Hoito voi johtaa suolimetaplasian palautumiseen.

IV. PEPTINEN ULKUSTAUTI

- A. Peptinen haava tarkoittaa mahalaukun tai pohjukaisuolen ulkusta, joka on mahahapon ja pepsiniin aiheuttama.
 1. Ulkus sijaitsee useimmiten proksimaalisessa duodenumissa, ventrikelissä se on tyypillisesti pienessä kaaroksessa distaalisessa mahalaukussa.
- B. Lähes kaikilla duodenaaliulkuspotilailla on todettavissa H. pylori -infektio (antrumpainotteinen).
 1. Suora toksinivaikutus, limakalvon tulehdusreaktio ja ammonian tuotanto lisäävät gastriinin tuotantoa, mikä lisää HCl-eritystä.
 2. Lisääntynyt happokuorma kulkee proksimaaliseen duodenumiin aiheuttaa ulkuksen.
 - a. Zollinger-Ellisonin oireyhtymässä (ZE-syndrooma) samankaltainen toimintaperiaate: haimassa tai duodenumissa sijaitseva neoplastisista G-soluista koostuvan gastrinooman (neuroendokriinituumori) aiheuttama runsas gastriinin erityys johtaa HCl-erityksen stimulaation kautta duodenumin ulkuksiin.
 - i. Voidaan diagnosoida seerumin paastogastriinista ($>10\times$ normaalista ja mahalaukun pH <2) ja tarvittaessa sekretiinistimulaatiotestillä.
 3. Ilmenee epigastrisena kipuna, joka paranee ruokaillessa –Kun ruokaa pääsee mahalaukkuun, mahaportin sfinkteri sulkeutuu, jotta ruoan hajotus ja sekoitus mahalaukussa onnistuu. Tällöin mahalaukun hapot eivät pääse ärsyttämään ohutsuolen haavaa.
 4. Komplikaatioita:
 - a. Yleisin komplikaatio on verenvuoto, joka ilmenee yleensä hematemeesinä ja/tai meleenana.
 - b. Toiseksi yleisin komplikaatio on perforaatio, joka voi olla anteriorinen (yleensä peritoniitti) tai posteriorinen (ulkuspenetraatio lähielimiin, esim. pankreatiitti).
- C. Mahahaavapotilailla n. 60% on todettavissa H.pylori -infektio; myös muut gastriitin syyt (esim. NSAIDit) voivat olla taustalla.
 1. Ilmenee epigastrisena kipuna, joka pahenee ruokaillessa.
 2. Yleisin lokaatio on curvatura minor; curvatura majorin haava viijaa vahvasti maligniin taustaan.
 3. Komplikaatiot samanlaisia kuin duodenaaliulkuksilla: verenvuoto ja perforaatio.
- D. Diagnosoidaan gastroskopialla, jossa ulkusta voidaan tarkastella makroskooppisesti sekä ottaa limakalvon koepaloja.
 1. Mahahaavoihin liittyy n. 4% tapauksista syöpä, eikä niitä ole mahdollista varmuudella erottaa gastroskooppisesti, joten on tärkeää ottaa runsaasti biopsioita.
 - a. Duodenumin ulkukset eivät ole lähes koskaan maligneja, mutta mahalaukun ulkuksissa on paljon suurempi riski sille, että se on syövän aiheuttama.
 - b. Benigni haava on yleensä pienempi ja sen reunamat ovat siistimmät kuin malignin haavan.

V. MAHALAUKUN KASVAIMET

- A. Polyyppi on limakalvolla näkyvä kohouma, joka on limakalvolähtöinen ja hyvänlaatuinen muutos. (Kuva 10.36.)
1. Endoskopiassa polyyppejä löytyy n. 5%:lta; yleistyvät iän yötä.
- B. Mahasyövästä yli 90% ovat adenokarsinomia; jaetaan Laurénin luokituksen mukaan diffuusiin ja intestinaaliseen (hieman yleisempi) karsinoomaan.
- C. Intestinaalinen karsinooma tyypillisesti muodostaa pieneen kaarrokseen tuumorimaisen kraaterin, jonka reunat ovat koholla.
1. Histologisesti havaitaan epäsäännöllisiä rauhasrakenteita. (Kuva 10.37.)
 2. Assosioituu helicobakteerigastriittiin, intestinaaliseen metaplasiaan ja rauhasatrofiaan, tynkämahaan (ulkustaudin takia tehty ventrikkeli resektio) sekä tupakointiin, ruoan nitrosamiineihin (savustettu ruoka) ja runsaaseen suolaan.
 - a. Veriryhmä A on yhteydessä korkeampaan riskiin myös (useimmissa lähteissä altistaa enemmänkin diffuusille karsinoomalle).
- D. Diffuusi karsinooma ei muodosta selvää tuumoria, vaan ventrikkelin seinämä paksuuntuu ja jäykistyy laajalta alueelta (linitis plastica).
1. Rauhasrakenteita ei muodostu, vaan histologisesti havaitaan kasvainsolukon diffuusia leviämistä solujonoina sekä näitä ympäröivä tiivis sidekudosreaktio (desmoplasia). (Kuva 10.38.)
 - a. Kasvainsolut sisältävät usein runsaasti limaa, joka työntää tuman solun reunalle (sinettisormussolu). (Kuva 10.39.)
 2. Heikko yhteys helicobakteerigastriittiin; yleensä syntyy de novo eikä ole yhteydessä intestinaaliseen metaplasiaan tai rauhasatrofiaan.
 - a. Patogeneesi epäselvä, perinnöllinen muoto johtuu E-kadheriinin geenin (CDH1) inaktivoivasta mutaatiosta.
 - b. Ilmenee täten myös myös nuorilla, kun taas intestinaalinen on enemmän vanhuksia affisioiva (noudattaa Correen sekvenssiä, joka vie aikaa).
- E. Oireet ovat yleensä vähäisiä ja epäspesifisiä: mm. ylävatsakipuja, laihtumista, ruokahaluttomuutta, nopea täyttymisen tunne (erityisesti diffuusi tyyppi) ja anemioita.
1. Havaitaan myöhään, 5-vuotiselossaoloennuste n. 30%.
 2. Levinneen taudin merkkejä ovat mm. Virchowin imusolmuke eli metastaasi vasemmassa soliskuopassa, acanthosis nigricans eli ihon tummumista ja paksuuntumista taivealueilla sekä useiden seborrooisten keratoosien (rasvaluomi) ilmeneminen iholla (Leser-Trélat sign). (Kuvat 10.40. / 10.41. / 10.42.)
 - a. Yleisin kaukainen metastasointipaikka on maksa, muita distaalisia tyyppipaikkoja ovat:
 - ii. Periumbilikaalinen alue (sisar Mary Josephin kyhmy) – Intestinaalinen tyyppi (Kuva 10.43.)
 - iii. Munasarjat (Krukenbergin tuumori) – Diffuusi tyyppi
- F. Pahanlaatuisista kasvaimista n. 5% on lymfoomia, joista suurin osa on H. pylori -infektioon liittyviä MALT-lymfoomia.
1. Ennuste hyvä ja paranevat varhaisvaiheessa yleensä häättöhoitolla.
- G. Mahalukun mesenkymaalinen kasvaimet ovat harvinaisia ja niistä yleisin on gastrointestinaalinen stroomatuumori (GIST).

1. Muodostaa kiinteän ja vaalean pullistuvan kyhmyn, joka on lähtöisin maha-suolikanavan muskularis proprian interstitiaalisista sukkulamaisista tahdistinsoluista (Cajalin soluista). (Kuva 10.44.)
2. Yleensä c-KIT proto-onkogeenin aktivoivan mutaation aiheuttama (CD117 eli KIT-proteiini toimii diagnostisena markkerina).
 - a. Tyrosiinikinaasi-inhibiittori imatinibi auttaa levinneessä taudissa.
3. Pahanlaatuisuus vaihtelee ja ennuste perustuu kokoon ja levinneisyyteen.

OHUTSUOLEN SAIRAUDET

I. KEHITYSHÄIRIÖT

A. Duodenumin atresia

1. Duodenumin lumen puuttuu; esiintyy erityisesti Downin oireyhtymässä.
2. Ilmenee polyhydramnionina ja suolen tukosoireina (vatsan pömpötys, sapen värjäämä oksennus).

B. Malrotaatio ja volvulus

1. Suoliston kehittyessä suoli kiertyy palaessaan napanuorasta vatsaonteloon; virhekiertymää eli malrotaatio on suhteellisen yleinen, mutta ei aiheuta suurimmalle osalle oireita.
2. Malrotaatio altistaa volvulukselle eli suolenkiertymälle, jossa suoli kiertyy suoliliepeen ympärille, mikä aiheuttaa suolitukoksen ja suolen infarktin (strangulaatio). (Kuva 10.45.)
 - a. Tapahtuu lapsilla yleensä ohutsuolessa, nuorilla aikuisilla umpisuolessa (cecum) ja vanhuksilla sigmasuolessa.

C. Meckelin divertikkeli

1. Ileumin loppuosan pussimainen lisäke, joka on jäännös epätäydellisesti involoituneesta sikiöaikaisesta ductus vitellinuksesta.
 - a. Kaikki kolme suolen seinämän kerrosta muodostaa pullistuman (todellinen divertikkeli). (Kuva 10.46.)
2. Suhteellisen yleinen (2% väestöstä, yleisin GI-kanavan synnynnäinen poikkeavuus), mutta oireilee vain n.2%:lla ja yleensä ilmenee kahtena ensimmäisenä ikävuotena.
 - a. Yleisin oire on verenvuoto, joka johtuu ektooppisen mahalaukun limakalvon hapon erityksestä ja sen aiheuttamasta ulseraatiosta.
 - i. Yleisin pienen lapsen maha-suolikanavan anemisoivan verenvuodon syy aina kouluikänsä asti.
 - b. Voi johtaa myös volvulukseseen tai intussuseptioon (tuppeuma), jotka aiheuttavat suolitukoksen, tai divertikuliittiin (mimikoi appendisiittia).
 - ii. Suolitukos (okluusio, ileus) johtuu yleensä kiinnikkeistä navan ja divertikkelin välillä.
2. **Kakkosten** sääntö: **2x** yleisempää miehillä, **2** tuumaa (5cm) pitkä, **2** jalkaa (60cm) ohutsuolen ja paksusuolen yhtymiskohdasta (valva ileocaecalis), **2%** väestöstä, oireilee **2** ensimmäisen ikävuoden aikana, oireilee **2%** potilaista, **2** epiteelityyppiä: mahalaukun (yleisempi) ja/tai haiman.

II. INTUSSUSSEPTIO (SUOLENTUPPEUMA, INVAGINAATIO)

A. Suolen segmentti työntyy teleskooppimaisesti distaalisemman segmentin sisälle, jossa peristaltiikka kuljettaa vetää sitä eteenpäin. (Kuva 10.47.)

1. Johtaa suolitukokseen ja mahdolliseen infarktiin yleensä ileumin loppuosassa.

- a. Ilmenee aaltomaisena vatsakipuna ja ("currant jelly, viinimarjahillomainen") verisenä ulosteena. (Kuva 10.48.)
- B. Useimmiten tapahtuu nuorilla lapsilla (tyypillisesti <2v.), joilla yleensä lymfaattinen hyperplasia toimii tarttumiskohtana intussusception alkamiselle.
 - 1. Rotavirusrokote on ensimmäinen annettava rokote kansallisessa rokoteohjelmassa, sillä rotavirusinfektiot ovat tärkeä suoliston lymfaattisen hyperplasian syy.
 - a. Itse rokotteellakin pieni riski intussusception aiheuttamiselle.
 - 2. >2-vuotiailla lapsilla Meckelin divertikkeli ja aikuisilla kasvain ovat tyypillisimmät aiheuttajat.
- C. Diagnoosi useimmiten kaikukuvauksella ("napakymppi", targetoidi kuva); paksusuolen tuppeumassa varjoainokuvaus tarvittaessa (maljamainen varjoainepuutos). (Kuva 10.49)
 - 1. Valtaosa tuppeumista hoidetaan peräaukon kautta annettavalla ilmalla.

III. MESENTERIAALI-ISKEMIA

- A. Suolistosuonet saavat suuren osan sydämen minuuttitilavuudesta, sillä ne vaativat paljon energiaa ravinnon metabolian toteuttamiseen.
 - 1. Suolisto on siis hyvin altis iskeemisille vaurioille ja suolen iskemia on vanhuksilla merkittävä kuolemaan johtava komplikaatio.
- B. Ohutsuolen iskemia voidaan jakaa akuuttiin ja krooniseen mesenteriaali-iskemiaan.
- C. Akuutti mesenteriaali-iskemia voidaan jakaa laskimoperäiseen ja valtimoperäiseen iskemiaan ja jälkimmäinen vielä tukosalkuiseen (okklussiivinen) ja ei-tukosalkuiseen (non-okklussiivinen).
 - 1. Valtimoperäiset syyt ovat yleisempiä kuin laskimoperäiset.
 - a. Yleisin aiheuttaja on a. mesenterica superiorin embolia (esim. eteisvärinä) tai ateroskleroottinen tromboosi.
 - i. Myös vaskuliitit, kuten polyarteritis nodosa voivat johtaa valtimon tromboosiin ja siten iskemiaan.
 - b. Ei-tukosalkuinen voi johtua esim. äkillisestä systeemisen verenkierron vajauksesta (sokki).
 - 2. Laskimoperäinen
 - a. Hyperkoagulaatiiviset tilat, kuten polysytemia vera, antifosfolipidisyndrooma, faktori V Leiden ja proteiinien C/S puutokset voivat johtaa suolilievaskimoiden tukokseen.
- D. Verenkierron vajauksen aste määrittää infarktin vakavuuden.
 - 1. Täydellinen nopeasti kehittynyt verisuonitukos aiheuttaa transmuraalisen suoli-infarktin, joka johtaa hoitamattomana perforaatioon ja septiseen sokkiin, joka on usein fataali.
 - 2. Systeemisen verenkierron vajuus tai epätäydellinen tukos voi aiheuttaa mukoosaan rajoittuvan infarktin tai submukoosaan yltävän eli muraalisen infarktin, mitkä aiheuttavat verenvuodon ja perforaation riskin sekä voivat korjautuessaan arpikudoksella aiheuttaa striktuurin.
- E. Akuutti iskemia ilmenee vaihtelevan äkillisesti ilmenevänä vatsakipuna, jonka yhteydessä voidaan tavata veristä ripulia ja oksentelua.
 - 1. Suoliäänet ovat heikentyneet ja D-dimeeri saattaa olla koholla (verisuonitukos); tietokonekerroskuvaus ensisijainen diagnostinen keino.

- a. Tukosalkuisen AMI:n hoidossa pyritään revaskularisaatioon ennen pysyvää suolivauriota; toteutetaan kirurgisesti tai endovaskulaarisesti.
 - b. Verenkierro pyritään palauttamaan, vaikka suoli olisikin jo kuoliassa (rajoittaa suolinekroosin laajuutta ja auttaa paranemista)
- F. Krooninen mesenteriaali-iskemia johtuu yleensä sisusvaltimorungon (truncus coeliacus) tai suolilievevaltimoiden ateroskleroottisesta ahtautumisesta, joka havaitaan erityisesti ruokailun jälkeen epigastrisena kipuna, kun verenvirtauksen tarve suolistoon kasvaa.
 - 1. Mesenteriaali-iskemian riski katsotaan olevan olemassa, mikäli SMA ja vähintään toinen kahdesta muusta mesenteriaalivaltimosta (truncus coeliacus/IMA) ovat ahtautuneet yli 70 %:sti

IV. LAKTOOSI-INTOLERANSSI

- A. Laktaasi on ohutsuolen harjareunuksessa tuotettava entsyymi, joka hajottaa ravinnosta saatua laktoosia glukoosiksi ja galaktoosiksi.
- B. Laktoosi-intoleranssi tarkoittaa laktaasin vajauksesta johtuvaa malabsorptiota, josta aiheutuu mm. osmoottista ripulia ja vatsan pömpötystä maitotuotteiden nauttimisen jälkeen.
- C. Laktaasinpuutoksen tyypit voidaan jakaa synnynnäiseen, aikuisiän hankittuun (primaarinen hypolaktasia) ja sekundaariseen.
 - 1. Synnynnäinen puute on johtuu harvinaisesta autosomaalisesti resessiivisesti periytyvästä mutaatiosta laktaasigeenissä ja ilmenee imeväisiässä vetisenä ripulina.
 - 2. Aikuistyyppin hankittu laktaasin vaje ei ilmene imeväisiässä, mutta kehittyy hitaasti aikuisikään mennessä; n. 18% suomalaisista aikuisista.
 - a. C/C-genotyyppi yhteydessä laktoosi-intoleranssiin; C/T ja T/T merkitsevät normaalia laktoosin sietoa (tosin sekundaarinen syy voi johtaa laktoosi-intoleranssiin).
 - b. Geenitutkimus voidaan tehdä, jos diagnoosi on epäselvä (laktoositon ruokavalio ei vaikuta oireisiin).
 - 3. Sekundaarinen vaje voi johtua mistä tahansa enterosyyttejä vaurioittavasta tilasta (esim. infektio, keliakia, Crohnin tauti).

V. KELIAKIA

- A. Autoimmuunitauti, jossa gluteeni indusoi ohutsuolen limakalvovaurion.
 - 1. Gluteeni on pääasiassa proteiinikompleksi, jota muodostuu vehnän, ohran ja rukiin vesiliuoksissa.
 - a. Esim. vehnägluteeni koostuu pääasiassa gluteeniineista ja gliadiineista.
- B. Vehnän prolamiini eli gliadiini on parhaiten tunnettu gluteenin patogeeninen tekijä.
 - 1. Gluteenin absorboitua gliadiinin deamidoi limakalvossa esiintyvä kudostransglutaminaasi (tTG).
 - 2. Keliakialle geneettisesti alttiit potilaat (HLA DQ2- tai DQ8-haplotyyppit) esittelevät deamidoitua gliadiinia antigeenia esittelevien solujen MHC II-molekyylien kautta CD4+-T-lymfosyyteille.
 - 3. Auttaja-T-solut aiheuttavat pääasiassa Th1-välitteisen kudosaaurion.
 - 4. Kudosaurio johtaa ohutsuolen villusatrofiaan, mikä vähentää imeytymispinta-alaa ja johtaa imeytymishäiriöön.
 - a. Vaurio on vakavinta duodenumissa, kun taas jejunum ja ileum ovat yleensä vähemmän affisioituneita.

- i. Tyyppipaikka siis proksimaalinen ohutsuoli (vrt. tropical sprue, joka muistuttaa keliakiaa, mutta voi affisioida mitä tahansa osaa ohutsuolta (useimmiten jejunumia ja ileumia) ja muodostuu infektiivisen ripulin jälkeen; johtuu siis tunnistamattomasta organismista)

C. Kliininen kuva

1. Voi ilmetä iästä riippumatta, mutta nykyään suurin osa todetaan aikuisiässä (n. 2% aikuisväestöstä).
2. Ilmenee kroonisena ripulina (mahdollisesti steatorreaa), vatsan turvotuksena ja ilmavaivoina sekä hoitamattomana lapsilla kasvun hidastumisena.
3. N. 10% potilaista havaitaan ihokeliakiaa, jossa iholla esiintyy kutiavaa, rakkulaista ihottumaa (dermatitis herpetiformis). (Kuva 10.50.)
 - a. Ihon koepalan immunofluoresenssitutkimuksessa nähdään IgA-kertymistä dermoksen papilloiden kärjissä.
 - b. Johtuu anti-gliadiini-IgA-vasta-aineiden ja epidermaalisen transglutaminaasin ristireaktiosta.
4. Keliakikoilla todetaan usein kiillelauriota ja hoitamattomana jopa osteoporoosia, mitkä johtuvat pääosin kalsiumin ja D-vitamiinin malabsorptiosta.

D. Diagnostiikka

1. Diagnostiikka tulee tehdä normaalin ruokavalion aikana.
 - a. Jos potilas aloittanut keliakiaruokavalion, gluteenipitoiseen ruokavalioon tulisi palata väh. 3kk ajaksi ennen näytteiden ottoa.
2. Diagnoosi perustuu ohutsuolen limakalvon histologiaan, missä voidaan havaita suolinukan madaltumista (villusatrofia), kuopakkeiden pidentymistä (kryptahyperplasia) sekä intraepiteelisten lymfosyyttien määrän kasvua. (Kuva 10.51.)
 - a. Villusatrofia ei ole spesifinen keliakialle, joten diagnoosi tulee varmistaa joko kliinisellä tai histologisella vasteella gluteenittomaan dieettiin.
3. Verestä mitattavat IgA-vasta-aineet endomysiumia, tTg:tä tai gliadiniinia vastaan tukee diagnoosia vahvasti, mutta negatiivinen ei sulje diagnoosia pois.
 - a. Jos tTG-vasta-ainepitoisuudet >10x viitealueen ylärajan yli ja endomysiumvasta-aineet positiiviset, diagnoosi voidaan tehdä ilman biopsiaa
 - b. IgG-vasta-aineet voidaan mitata IgA-puutteilla; IgA-puutos on yleisempää keliakikoilla
4. Myös genetiikka auttaa erotusdiagnostiikassa: jos HLA DQ2 tai DQ8 puuttuvat, on keliakia käytännössä suljettu pois.
 - a. Yleisiä siis myös tavallisessa väestössä -> ei tuo positiivisena lisäarvoa, eikä tehdä rutiininomaisesti perusterveydenhuollossa.

E. Riski ohutsuolen adenokarsinoomalle tai ohutsuolilymfoomalle (T-solulymfooma, EATL) ovat moninkertaiset muuhun väestöön verrattuna; gluteeniton ruokavaliohoito laskee riskiä.

1. Jos ruokavaliohoitoa noudattanut potilas saa uudelleen oireita (refraktaarikeliakia), on syytä epäillä syöpää.

F. Keliakiaa ei tule sekoittaa gluteeniherkkyyteen, jossa suolinukka on rakenteellisesti normaali, eikä ole merkkejä keliakiaan liittyvästä autoimmunitetistä.

1. Ei ole diagnostisia testejä ja hoito toteutetaan yksilöllisesti.

VI. ABETALIPOPROTEINEMIA

A. Autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä harvinainen malabsorptiosairaus, jossa mutaatio MTTP-geenissä (microsomal triglyceride transfer protein) häiritsee ApoB-100:n ja ApoB-48:n tuotantoa.

B. Kliininen kuva:

1. Havaitaan yleensä ennen ikävuotta 1

2. Steatorrea - ApoB-48 tarvitaan kylomikronien formaatioon ohutsuolessa

a. Kasvun hidastuminen johtuu essentiaalisten rasvahappojen ja rasvaliukoisten vitamiinien malabsorptiosta.

3. Plasman kolesteroli-, VLDL- ja LDL-tasot ovat hyvin matalat tai olemattomat – VLDL ja LDL tarvitsevat ApoB-100.

VII. SUOLISTOINFEKTIOT

A. Ohutsuolen infektiota kutsutaan enteriitiksi, paksusuolen koliitiksi ja molempien infektiota enterokoliitiksi (mahalaukku+ohutsuoli taas olisi gastroenteriitti ja kaikki yhdessä gastroenterokoliitti).

B. Suolistoinfektioita voivat aiheuttaa niin virukset, bakteerit kuin parasiitit.

1. Virukset – mm. norovirus, rotavirus,

a. Suomessa saadun taudin syy on yleensä virusinfektio (norovirus).

2. Bakteerit – mm. E. coli, C. jejuni, C. difficile, S. enteritica, Trophyma whipplei

a. Yleisin bakteeriperäinen ripulitauti Suomessa on kamylobakteerin aiheuttama; valtaosa saatu ulkomailta.

b. C. difficile -liikakasvusta johtuva infektio on peräisin useimmiten laajakirjoisesta antibiootihoidosta; johtaa toksiseen limakalvovaurioon, jossa limakalvolla nähdään fibriinistä, soludebriksestä ja tulehdussolukosta koostuvia kellertäviä katteita (pseudomembranoottinen koliitti). (Kuva 10.52.)

c. Trophyma whipplei (Actinomyces-sukua) aiheuttaa harvinaisen Whiplen taudin, jossa makrofagit täyttyvät PAS-positiivisilla bakteereilla, pullistuvat ja tukkivat ohutsuolessa kylomikroneita kerääviä imusuoneja (lacteal). Johtaa rasvan malabsorptioon ja steatorreaan. (Kuva 10.53.)

3. Parasiitit (alkueläimet) – Giardia lamblia, Dientamoeba fragilis, Cryptosporidium spp., Entamoeba histolytica

VIII. OHUTSUOLEN KASVAIMET

A. Ohutsuolen kasvaimet ovat hyvin harvinaisia sekä yleensä hyvänlaatuisia ja näistä tavallisimpia ovat adenoomat.

1. Adenooma-karsinoomasekvenssi tapahtuu myös ohutsuolessa, joten adenoomat tulisi poistaa mahdollisuuksien mukaan.

B. Primaarisista pahanlaatuisista kasvaimista tavallisimpia ovat adenokarsinoomat, toiseksi tavallisimpia ovat matalan asteen neuroendokriiniset kasvaimet (karsinoidituumori); metastaasit ovat primaarikasvaimia tavallisempia (melanooma tavallisin).

1. Karsinoidituumorit voivat ilmetä missä tahansa suoliston osassa, mutta ohutsuoli (n. 40-50%) ja erityisesti ileum ovat yleisin paikka.

- a. Kasvaa submukosaalisena polyyppimaisena kyhmynä, joka sisältää kromograniinille positiivisia neuroendokriinisia soluja. (Kuva 10.54.)
2. Kasvainsolukko erittää usein serotoniinia, joka kulkee portaaliverenkierron kautta metaboloitavaksi maksaan.
 - a. Maksan MAO-entsyymi (monoamiinioksidaasi; tarkalleen ottaen MAO-B) hajottaa serotoniini (5HT) 5-HIAA:ksi, joka eritetään virtsan kautta ulos kehosta.
3. Karsinoidituumorin metastaasi maksaan mahdollistaa maksassa tapahtuvan metabolian välttämisen.
 - a. Serotoniini vapautuu suoraan maksalaskimoon, jolloin se kulkee laskimoverenkierron kautta sydämeen ja systeemiseen verenkiertoon (keuhkojen MAO ei pysty metaboloimaan kaikkea serotoniinia); voidaan havaita karsinoidioireyhtymänä ja karsinoidisydämenä.
 - b. Karsinoidioireyhtymän klassiseen oirekuvaan kuuluu mm. punastuminen, ripuli ja hengenahdistus (bronkospasmi).
 - ii. Erityisesti syöminen, alkoholi ja stressi voivat laukaista oireita, sillä ne stimuloivat serotoniinin eritystä kasvaimesta.
 - iii. Voi myös aiheuttaa B3-vitamiinin (niasiini) puutetta -> pellagra. Johtuu siitä, että tuumori käyttää suuria määriä tryptofaania tuottaakseen serotoniinia -> vähemmän tryptofaania niasiinin tuottamiseen.
 - c. Karsinoidisydämelle tyypillistä on sydämen oikean puolen vajaatoiminta, joka johtuu oikean puolen läppien fibrotisoitumisesta (trikuspidaalinen regurgitaatio ja pulmonaaliläpän stenoosi).
 - ii. Vasemman puolen toiminta on normaalia, sillä suurin osa serotoniinista metaboloidaan keuhkojen MAO:n avulla.

UMPILISÄKKEEN SAIRAUDET

- I. ÄKILLINEN UMPILISÄKETULEHDUS (AKUUTTI APPENDISIITTI)
 - A. Appendisiitti tarkoittaa umpisuolen pohjassa sijaitsevan umpilisäkkeen akuuttia tulehdusta; yleisin ”akuutin vatsan” syy lapsuusiässä ja nuorilla aikuisilla.
 - B. Alkaa useimmiten luumenin ahtautumisen seurauksena.
 1. Lapsilla ja nuorilla limakalvon lymfoidi hyperplasia yleisin aiheuttaja (esim. virusinfektion laukaisema); aikuisilla fekoliitti (paksuuntunut ulostekivi)
 - C. Kliininen kuva ja hoito:
 1. Epämääräinen vatsakipu (paikallistuu muutamien tuntien aikana oikealle alavatsalle McBurneyn pisteeseen), kivun jälkeen alkava pahoinvointi ja oksentelu, joskus ripulia ja kuumetta
 - a. Tulehduksen alussa afferentit kipusäikeet umpilisäkkeestä / proksimaalisesta koolonista / umpilisäkkeen päällisestä viskeraalisesta peritoneumista kulkevat plexus mesenterica superiorin kautta selkäyttimeen T10-tasolle (T10-dermatomin alueen heijastekipu).
 - i. Appendiksin tulehtuessa ja suurentuessa enemmän se lopulta ärsyttää parietaalista peritoneumia ja vatsaontelon seinämää -> parietaalisessa peritoneumissa on somaattinen hermotus -> kipu lokalisoituu tarkasti ärsyyntyneeseen pisteeseen (McBurneyn piste)

- b. McBurneyn piste on navan ja oikean suoliluun etukärjen yhdysjanan ala- ja keskikolmanneksen rajalla. (Kuva 10.55.)
 - c. Oireilu vaihtelee hieman umpilisäkkeen lokaation perusteella.
2. Tulehdus voi ärsyttää vatsakalvoa, jonka ärtyneisyys pystytään osoittamaan provokaatiokokeilla.
- a. Lihaspuolustus eli *défence* tarkoittaa vatsanpeitteiden lihasten jännittyneisyyttä, jota ei pystytä poistamaan harhauttamalla.
 - i. *Défence* voi puuttua varsinkin silloin, jos umpilisäke sijaitsee umpisuolen posterioripuolella (*retrocecal*) eikä anatomisen sijaintinsa vuoksi aiheuta vatsakalvon paikallista tulehdusta. (Kuva 10.56.)
 - b. Päästöaristus eli *rebound* todetaan vatsan syväpalpaatiolla ja nopealla päästöllä (*Rovsingin koe*; vasemman alavatsan syväpalpaation nopea irti päästäminen aiheuttaa heijastuskivun oikealle alavatsaan). (Kuva 10.57.)
 - c. Ärsytys voi affisoida myös obturator- tai psoaslihaksia, mitkä voidaan todeta positiivisilla obturator- ja psoaskokeilla. (Kuva 10.58.)
3. Umpilisäkkeen puhkeaminen ja sen aiheuttama peritoniitti on tärkein komplikaatio; riski suurentuu erityisesti 36h jälkeen.
- a. Kuume nousee korkeaksi, vatsanpeitteet voimakkaasti jännittyneet (laudankovat) ja aristus on vahvaa.
 - b. Ympäröivään kudokseen rajoittuvan perforaation seurauksena kehittyy usein periappendikulaariabsessi (Kuva 10.59.)
 - i. Tyypillisellä potilaalla ollut useita päiviä kestänyt vatsakipu, ripuli ja kuumeilu sekä vatsan palpaatiossa tunnetaan usein aristava resistenssi.
 - ii. Yleisin akuutin appendisiitin komplikaatio.
 - iii. Yli 40-vuotiailla absessiin liittyy suurentunut tuumorin ja syövän riski, jonka takia yli 40-vuotiaille tehdään herkästi paksusuolen täyhystys ennen umpilisäkkeen poistoa.
4. Klassisten kliinisten löydösten ja laboratoriokokeiden (leukosytoosi ja neutrofilia sekä 24h sisällä oireiden alusta kohonnut CRP) perusteella voidaan mahdollisesti suoraan edetä leikkaushoitoon, mutta nykyään tila tyypillisesti kuvannetaan ennen leikkausta, koska TT- (nykyään useimmiten ensisijainen), magneetti tai ultraäänikuvaus (epäluotettavampi ja ei voida poissulkea komplisoitunutta tautia) parantaa diagnostista tarkkuutta ja vähentää viattomien umpilisäkkeiden poistoja.
- a. Appendisiitin todennäköisyyttä voidaan arvioida mm. Adult Appendicitis Score -pisteytyksen avulla. (Kuva 10.60.)
 - i. Jos pistelukema on pieni, potilas voi todennäköisesti kotiutua turvallisesti ilman jatkotutkimuksia ja mikrobilääkehoitoa.
 - ii. Jos appendisiitti on mahdollinen (pisteet 11–15), suositellaan kuvantamistutkimuksella diagnoosin varmistamista.
5. Ensisijainen komplisoituneen taudin hoito on leikkaushoito, jossa umpilisäke poistetaan laparoskooppisesti (ensisijainen) tai avoimesti alavatsan oikealle puolelle tehdystä haavasta (ns. vaihtoviilto); leikkausta ennen annetaan ehkäisevää antibioottilääkitystä, jota jatketaan vain, jos perforaatio tai paise todetaan.

- a. Jos tulehdus on lievä ja komplisoitumaton, potilas voidaan mahdollisesti hoitaa pelkästään antibiooteilla ja tulehduksen mahdollisesti rauhoituttua leikkaustarve arvioidaan uudestaan.

II. UMPILISÄKKEEN KASVAIMET

- A. Yleensä hyvänlaatuisia polyyppeja.
- B. Pahanlaatuisista yleisimpiä ovat neuroendokriiniset tuumorit ja limaa tuottavat musinoottiset kasvaimet.
 1. Peritoneumiin levinneisiin musinoottisiin muutoksiin liittyy peritoneaalinen pseudomyksooma (Pseudomyxoma peritonei), jossa peritoneum täyttyy limalla ja usein naisilla havaitaan sekundaarinen munasarjan musinoosi kasvain. (Kuva 10.61.)

KROONISET TULEHDUKSELLISET SUOLISTOSAIRAUDET (IBD)

I. PERIAATTEET

- A. Tulehduksellisia suolistosairauksia, jotka ovat luonnoltaan kroonisia, uusiutuvia ja syntymekanismiltaan tuntemattomia.
 1. Taustalla ajatellaan olevan geneettisesti alttiin henkilön epänormaalin voimakas immuunivaste normaaliakin mikrobiflooraa kohtaan.
- B. Tavallisin sairastumisikä on 20-35; Suomessa n. 44 000 potilasta
 1. Ilmaantuvuus yleistyy elintason noustessa eli kehitysmaissa harvinaisempaa.
- C. Luokitellaan pääasiassa haavaiseen paksusuolitulehdukseen (Colitis ulcerosa, ulseratiivinen koliitti) ja Crohnin tautiin.
 1. IBD-diagnooseja ovat myös näiden välimuoto ja vielä mikroskooppinen koliitti
- D. Diagnoosi perustuu kliiniseen kuvaan sekä endoskopia- (ileokolonoskopia), histologia- ja kuvantamislöydöksiin
 1. Ohutsuoli voidaan tutkia ohutsuolen kapselikuvauksella (ei sovellettu tukosoireisille) tai kuvantamistutkimuksin, ensisijaisesti magneettikuvauksella.
 2. Hyvä seulontatesti varsinkin koliitille on F-Calpro eli ulosteiden kalprotektiini, joka on pääosin neutrofiileistä peräisin oleva proteiini, jonka pitoisuus ulosteessa kohoaa suoliston inflammaation seurauksena

Taulukko 10.1.

	Colitis ulcerosa (UC)	Crohnin tauti (CD)
Sijainti	Alkaa rektumista ja voi edetä proksimaalisesti cecumiin asti yhtenäisesti ja kehämäisesti. Koliitti voidaan jakaa proktiittiin, vasemman puolen koliittiin ja laaja-alaiseen koliittiin.	Mikä tahansa osio GI-kanavaa (yleensä ainakin diagnoosihetkellä terminaalinen ileum ja paksusuolen alkuosa) ja usein segmentaalinen (skip-leesiot; ei-yhtenäinen)
Makroskopia	Herkästi haavautuva limakalvo, haavojen paranemisesta aiheutuvat pseudopolypit (Kuva 10.62.) Haustroituksen häviäminen ja suolen muuttuminen jäykäksi, putkeksi (lead pipe)	Tulehduksen edetessä aftamaisia haavoja ja niiden fuusioitumista (fissuuramaisia haavoja) Pitkälle kehittyessä mukulakivimäinen limakalvo, striktuurat (ahtauttava CD) ja runsas ympäröivä rasvakerros ("creeping fat") (Kuva 10.63.)
Mikroskopia	Mukoosan ja submukoosan inflammaatio ja neutrofiilitäytteiset krypta-absessit ilman granuloomia. (Kuva 10.64.)	Ei rajoitu limakalvoon (transmuraalinen) ja voidaan havaita teräväreunaisia fissuuramaisia haavaumia. Tulehdussolukko muodostaa lymfosititkeräytyksiä joko granuloomien kanssa tai ilman. (Kuva 10.65.)
Intestinaaliset oireet	Vatsakivut (yleensä vasemmalla alaneljänneksessä) ja verinen ripuli; tenesmus (tunne, että tarvitsee ulostaa, vaikka suoli on tyhjä) Relapsoiva taudinkulku tyypillistä	Vatsakivut (yleensä oikealla alaneljänneksessä) ja yleensä veretön ripuli (voi kuitenkin olla veristä distalisessa CD:ssä) Relapsoiva taudinkulku tyypillistä
Ekstraintestinaaliset oireet	Samat kuin Crohnin taudissa, mutta vain hieman epätavallisempia (primaarinen sklerosoiva kolangiitti kuitenkin selvästi yleisempää). Tulehdus aiheuttaa hyperkoagulatiivisen tilan -> tromboemboliariski koholla Yhteydessä p-ANCA-vasta-aineiden kohonaisuuteen.	Pienten nivelten tulehdus, spondyloartropatiat, osteoporoosi, suun aftat, kyhmyruusu (erythema nodosum), pyoderma gangrenosum, (Kuva 10.66.) episkleriitti/uveiitti, primaarinen sklerosoiva kolangiitti Tulehdus aiheuttaa hyperkoagulatiivisen tilan -> tromboemboliariski koholla Yhteydessä ASCA-vasta-aineiden kohonaisuuteen.
Komplikaatiot	Malabsorptio ja mahdollinen aliravitsemus, kolorektaalisyöpäyhteys vahvempi kuin CD:llä (riski lisääntyy n. 10v. jälkeen) Toksinen megakoolon (Kuva 10.67)	Malabsorptio ja aliravitsemus (useammin kuin CU:ssa), kolorektaalisyöpä, toksinen megakoolon Fistelit yleisimmät (n.1/3) ovat perianaalifistelit, muita on mm. suoli-rakko, suoli-emätin, suoli-iho) Munuaiskivet (yleensä kalsiumoksalaatti)
Tupakointi	Suojaava	Lisää riskiä

Hoito	1- 5-ASA-valmisteet (mesalatsiini, sulfasalatsiini) 2- Tiopuriinit (atsatiopriini/6-merkaptopuriini) 3- Biologiset lääkkeet (esim. TNF-alfasalpaajat) 4- Kolektomia (parantava) – tehdään J-pussi tai pysyvä ohutsuoliavanne Glukokortikoidihoitoa voi käyttää pahenemisvaiheissa tai hoidon alussa oireiden nopeaan rauhoittamiseen (remission induktioon)	1- Tiopuriinit (atsatiopriini/6-merkaptopuriini), metotreksaatti 2- Biologiset lääkkeet (esim. TNF-alfasalpaajat) 3- Leikkaushoidossa poistetaan pahimmin oireita aiheuttava suolen osuus; ei ole parantava hoito Glukokortikoidihoitoa voi käyttää pahenemisvaiheissa tai hoidon alussa oireiden nopeaan rauhoittamiseen
-------	---	--

II. MIKROSKOOPPINEN KOLIITTI

- A. Yhteisnimitys kollageenikoliitille ja lymfosyyttiselle koliitille, joiden taudinkuva on samanlainen, mutta histologia eroaa.
 1. Molemmille on tyypillistä normaali endoskopia ja normaali radiologia (ja normaalit labrakokeet, kuten verenkuva ja CRP; osalla calpro lievästi koholla) – diagnoosi perustuu histologiaan -> ”mikroskooppinen” koliitti
 2. Tyypillinen kliininen kuva on krooninen vesiripuli, johon ei liity veriulosteita
 - a. Yleistyy iän myötä ja yleensä esiintyy 50. ikävuodesta lähtien, mutta voi esiintyä myös lapsilla; yleisempää naisilla
 - b. Taudin kulku on yleensä krooninen ja relapsoiva; tyypillistä tulehduksellisille suolistosairauksille
- B. Histologiset muutokset ovat läiskäisiä, jonka takia biopsioita tulee ottaa monta eri puolilta paksusuolta
 1. Kummassakin (lymfosyyttisessä koliitissa ja kollageenikoliitissa) nähdään lamina propriassa erityisesti mononukleaarista soluista koostuva tulehduksellisen infiltraatio, joka on dominoivampi piirre lymfosyyttisessä koliitissa; usein voidaan todeta myös epiteelin degeneraatiota (litistymistä ja irtoamista) (Kuva 10.68)
 - a. Kollageenikoliitille tyypillinen löydös on subepiteliaalisen kollageenikerroksen paksuntuminen yli kymmenen mikrometriä
 - b. Lymfosyyttisessä koliitissa todetaan normaalipaksuinen kollageenikerros, mutta intraepiteliaaliset lymfosyytit ovat selkeästi lisääntyneet eli yli 20 lymfosyyttiä 100 epiteelisolua kohti
- C. Mikroskooppinen koliitti ei tietävästi lisää paksusuolisyövän riskiä -> ei tarvetta kolonoskopiaseurannalle
- D. Usein säännöllistä lääkitystä ei tarvita ja hoito on oireenmukaista
 1. Remission induktioon käytetään usein glukokortikoidihoitoa (budesonidi)

PAKSU- JA PERÄSUOLEN SAIRAUDET

I. HIRSCHSPRUNGIN TAUTI

- A. Synnynnäinen rektumin ja distaalisen sigmasuolen sairaus, jossa gangliosolut puuttuvat Meissnerin (submukosaalinen) ja Auerbachin (myenteerinen) plexuksista.
 1. Hermostopienasta peräisin olevien neuroblastien vaellus kaudaaliseen suoleen estyy tuntemattomasta syystä.

2. Yhteydessä inaktivoiviin RET-mutaatioihin (osallistuu ENS-kehitykseen)
- B. Peräsuoli ja sisempi sulkijalihas eivät kykene normaaliin relaksaatioon, jonka seurauksena ne ovat jatkuvassa supistustilassa.
- C. Kliininen kuva ja diagnosointi
1. Ulostamisvaikeuksia jo vastasyntyneenä – Useimmiten lapsi ei ulosta mekoniumia ensimmäisen elinvuorokautensa aikana.
 2. Paksusuolen varjoainekuvaus suoritetaan tyhjentämättä suolta – Nähdään suolen laajentumista (megakoolon) proksimaalisesti obstruktiokohdasta
 - a. Tuseeraamista vältettävä ennen tutkimista, mutta tuseeratessa havaittaisiin tyhjä peräsuoli.
 3. Lopullinen diagnostiikka perustuu histologiaan – gangliosolujen puuttuminen submukoosisesta ja myenteerisistä hermopleksuksesta
 - a. Näyte otetaan tavallisesti imubiopsialaitteella.
- D. Hoidetaan kirurgisesti poistamalla aganglionaarinen osa suolesta ja terve paksusuoli anastomoidaan anaalikanavaan.

II. DIVERTIKULOOSI (SUOLEN UMPIPUSSITAUTI)

- A. Paksusuolen divertikkelit ovat mukoosan ja submukoosan pullistumia (pseudodivertikkeli) muscularis propria läpi ulos suolen lumenista. (Kuva 10.69)
1. Umpipussin seinämästä puuttuu lihaskerros, mikä altistaa sen puhkeamiselle.
- B. Kohonnut suolensisäinen paine ja lihasseinämän heikkous johtavat pullistuman muodostumiseen.
1. Tyypillisesti syntyvät teenioiden väliin haustrojen alueelle, missä limakalvolle tulevat verisuonet (vasa recta) läpäisevät suolen poikittaisen lihaskerroksen; sigmasuoli on länsimaissa yleisin sijainti.
 2. Ravinnon vähäkuitusuus ja ummetus pidentää läpikulkuaikaa paksusuolella ja lisää suolensisäistä painetta.
- C. Suurin osa on oireettomia komplisoitumattomia (umpipussien lisäksi ei ole muita löydöksiä), mutta komplisoituneena voi ilmetä sekundaarisia ongelmia mm.
1. Akuutti divertikuliitti (tavallisin komplikaatio, jopa n. ¼ potilaista) – Ulostetta jää jumiin umpipussiin ja aiheuttaa tulehduksen, joka voi johtaa divertikkelin perforaatioon; paikallinen kipu (ja paikallinen defence) vasemmalla alavatsalla (sigmasuolen divertikuliitti; mielenkiintoisesti Aasiassa oikeanpuoleisen koolonin divertikuliitti yleisempää)
 - a. Divertikuliitti voi olla komplisoitumaton (Luokka 1, suolen seinämä ehjä; >90% tapauksista) tai komplisoitunut (seinämän perforaatio ja sen seuraukset)
 - i. Perforaatio voi johtaa peritoniittiin -> laaja-alainen vatsan arkuus tai defence
 - ii. Jos puhkeaman seurauksena syntyvä ulostekontaminaatio rajautuu, muodostuu paise (absessi)
 - iii. Puhkeama voi johtaa fistelin syntyyn, kun perforaation kautta tulehduspesäke kanavoituu viereiseen elimeen; tyypillisin on kolovesikaalinen fisteli, joka oireilee virtsatieinfektiona, johon liittyy ilman (pneumaturia) tai ulosteen virtsaamista.

- b. Suolitukos – Ohutsuolen lenkki voi liimautua kiinni inflammatoriseen divertikkeliin (adheesio) aiheuttaen ohutsuolitukoksen. Tulehdusten jälkeinen arpeutuminen (striktuura) voi myös ahtauttaa paksusuolta aiheuttaen paksusuolitukoksen. Akuutti tulehdus ja turvotus voi myös ahtauttaa suolta.
- 2. Ensimmäisen divertikuliitin diagnosointiin suositellaan tietokonetomografiaa (TT); aiemmin diagnosoidun potilaan tyypillisellä taudinkuvalla uusiutuneet lieväoireiset divertikuliitit voidaan diagnosoida ja hoitaa (kipu- ja kuumelääkitys; ei tarvita paastoa) pelkän kliinisen kuvan perusteella.
 - a. Lievä tyypillinen taudinkuva tarkoittaa vasemmanpuoleista alavatsakipua, mahdollista paikallista palpaatioarkuutta, kuumetta ja tulehdusarvojen nousua (valkosolut koholla; CRP kymmeniä, jopa > 100)
 - b. Mikäli oireet eivät helpota parissa päivässä tai vointi heikkenee, tulee diagnoosia tarkentaa TT:lla ja tarvittaessa aloittaa antibiootti (aloitetaan ensilinjassa kipu- ja kuumelääkityksen kanssa raskaana oleville tai immuunisupprimoiduille varovaisuusperiaatteen mukaan)
 - c. Uusiutuminen yleistä; voidaan harkita tarvittaessa elektiivistä sigmasuolen resektiota (>3krt kahdessa vuodessa tai kroonisesti oireileva >3kk)
 - d. Komplisoitunut tauti vaatii hoidoksi aina i.v. antibiootin ja joskus myös leikkauksen (esim. peritoniitti)
 - i. Jos komplisoitunut divertikuliitti on hoidettu konservatiivisesti eli ilman leikkausta, tulee varmistaa, ettei kyseessä ole paksusuolisyöpä; tehdään siis kolonoskopia n. 1kk kuluttua hoidosta (Kuva 10.70)
- 2. Tärkeä divertikuloosin komplikaatio on verenvuoto (tavallisin GI-kanavan alaosan verenvuodon syy) – Ilmenee hematoketsiana eli kirkkaan veren ja hyytymien ulostamisena
 - a. Ei suoraan liity divertikuliittiin
 - b. Useimmiten verenvuoto on vasa recta-suonista
- B. Myös komplisoitumaton divertikuloosi voi olla oireellinen, jolloin sitä kutsutaan SUDD:ksi eli symptomatic uncomplicated diverticular disease; divertikkeliin esiintyminen vatsaoireiden kanssa ilman makroskooppisia muutoksia tähytystutkimuksissa ja muut vatsaoireiden aiheuttajat poissuljettu

III. VERISUONTEN POIKKEAVUUDET

- A. Angiodysplasia
 - 1. Hankittu mukoosan ja submukoosan pienten verisuonten poikkeavuus, jossa suolenseinämän laskimotoiminta on heikentynyt ja kapillaarit ovat dilatoituneet; GI-kanavan yleisin verisuonimuutos. (Kuva 10.71)
 - 2. Ilmenee yleensä cecumissa ja oikeassa koolonissa kohonneen suolensisäisen paineen ja muscularis proprian kontraktiiviteetin seurauksena, mikä obstruktioi submukoosan laskimoita.
 - 3. Verisuonet voivat revetä, mikä ilmenee hematoketsiana; klassisesti yli 60-vuotiailla (esiintyvyys lisääntyy iän myötä)
- B. Oslerin tauti (hereditaarinen hemorraginen telangiektasia, HHT, Osler-Weber-Rendun oireyhtymä)

1. Harvinainen, periytyvä angiogeneesin häiriö, josta seuraa pienten verisuonten pysyvä dilataatio erityisesti suussa ja GI-kanavassa. (Kuva 10.72)
2. Laskimoiden ja valtimoiden välille muodostuu laajentuneita suoniyhteyksiä (suntteja) ilman kapillaariverkostoa, jotka näkyvät telangiektasioina eli laajentuneina verisuonina limakalvoilla tai iholla (tai maksan, keuhkojen tai aivojen alueella).
 - a. Ruptuura ilmenee verenvuotona.

IV. ISKEEMINEN KOLIITTI

- A. Paksusuolen hapenpuute riittämättömän verenkierron seurauksena; jetaan okklusiiviseen ja non-okklusiiviseen muotoon kuten mesenteriaali-iskemiakin.
 1. Mesenteriaali-iskemiakin voi aiheuttaa paksusuolen iskemiaa, koska SMA ruokkii paksusuolta pernamutkaan asti
- B. Yleisimmin johtuu non-okklusiivisesta hypoperfuusiotilasta (esim. septinen sokki, hypovolemia, sydämen vajaatoiminta), mikä näkyy iskeemisena vauriona yleensä vedenjakaja-alueella flexura coli sinistran (SMA + IMA) tai rektosigmoidin junktion (IMA + a. rectalis superior) alueilla.
- C. Ilmenee akuutisti vatsakipuna ja verisenä ripulina; kroonisena voi aiheuttaa ruokailun välttämistä (kipu pahenee ruokailun jälkeen hapen tarpeen lisääntyessä)

V. ÄRTYVÄ SUOLI -OIREYHTYMÄ (IBS)

- A. Yleinen (n. 10% väestöstä) toiminnallinen suolistovaiva, joka ilmenee toistuvana vatsakipuna tai -vaivoina, johon liittyy oireiden lievittyminen ulostamisen jälkeen ja muutos ulostamisfrekvenssissä tai ulosteen konsistenssissa.
 1. Diagnostiset kriteerit siis vatsakipua vähintään 1x/viikossa viimeisten 3 kk:n ajan ja lisäksi 2 seuraavista oireista
 - a. Vatsakipu liittyy ulostamiseen (helpottuu tai pahentuu)
 - b. Vatsakipuun liittyy ulostamistiheyden muutos (tihentynyt tai harventunut ulostaminen)
 - i. Ulostamistiheys on poikkeava, kun suoli toimii yli 3 kertaa päivässä tai alle 3 kertaa viikossa
 - c. Vatsakipuun liittyy ulosteen koostumuksen muutos (löysä ja ripulimainen uloste tai poikkeavan kova uloste; ulosteen konsistenssia määriteltäessä voidaan käyttää Bristolin luokitusta)
 - i. Jaetaan neljään alaryhmään: ummetuspainotteinen (IBS-C), ripulipainotteinen (IBS-D), sekamuotoinen (IBS-M), määrittämätön (IBS-U)
- B. Etiologia on tuntematon eikä suolesta löydy selkeää vikaa, mutta ruokavalion on todettu vaikuttavan oireisiin.
 1. Hoidoksi suositellaan itselle sopivan ruokavalion etsimistä; yleensä säännölliset pienet ateriat ja riittävä kuidun ja nesteen saanti auttaa.
 - a. FODMAP-ruokavalion on todettu auttavan oireisiin; FODMAP viittaa huonosti imeytyviin fermentoituviin hiilihydraatteihin (valtava lista raaka-aineita: mm. ruis, ohra, vehnä, sipuli, maitotuotteet, herneet, pavut, omena...), joita kannattaa välttää

VI. KOOLONIN POLYYPIT

- A. Polyyppi on limakalvolta kohoava hyvänlaatuinen muutos; yleisin polyyppien sijainti on paksusuolella.

- B. Yleisimmät polyypit ovat adenoomat ja hyperplastiset polyypit (lähteestä riippuen vaihtelee kumpi on yleisin).
- Hyperplastiset polyypit ovat tyypillisesti sahalaitaisia polyyppejä, jotka johtuvat rauhasen hyperplasiasta, mikä havaitaan histologisesti epiteelin sahalaitaisena reheävänä poimuiluna.
 - Ovat yleensä pieniä (alle 5mm) ja esiintyvät useimmiten (n. 90%) rektumissa ja sigmoidissa
 - Lähes täysin benignejä, mutta hyvin pieni malignisoitumispotentiaali (ennen nähtiin reaktiivisina, ei-neoplastisina muutoksina), sillä voivat kehittyä traditionaalisiksi sahalaita-adenoomiksi
 - Oikean puolen polyypit muistuttavat lähemmin sessiiliä sahalaitaleesiota, jolla on potentiaalinen riski kehittyä kohti paksusuolisyöpää
 - Adenoomat eli adenomatoottiset polyypit johtuvat rauhasen neoplastisesta proliferaatiosta.
 - Jaetaan rakenteen perusteella tubulaarisiin (yleisin), tubulovillooseihin ja villooseihin (harvinaisin) adenoomiin
 - Tubulaarisella pieni malignisoitumisriski verrattuna tubulovilloottisiin tai villooseihin.
 - Benignejä, mutta premaligneja eli voivat edetä adenokarsinoomaksi adenooma-karsinooma-sekvenssin kautta.
- C. Normaaliin koolonin mukoosaan voi kehittyä adenomaattisen polyypin kautta koolonkarsinooma; kehityskulkua kutsutaan adenooma-karsinooma-sekvenssiksi.
- APC-tuumorisuppressorigeenin mutatoituminen nostaa riskiä polyypin muodostumiselle.
 - Tämän jälkeen K-ras-proto-onkogeenin mutatoituminen aiheuttaa polyypin muodostumisen.
 - P53-mutaatiot mahdollistavat etenemisen karsinoomaksi.
 - Lisääntyneen COX2-ekspression on havaittu olevan tärkeä karsinoomaksi etenemiselle, joten aspiriini saattaa hidastaa progressiota ja ehkäistä paksusuolisyöpää.
 - Moniin tuumoreihin liittyy myös mutaatiot kromosomin 18q tuumorisuppressorigeeneihin; DCC (Deleted in Colorectal Cancer) ja SMAD2/SMAD4
- D. Muita polyypityyppejä ovat mm. hamartomatoottiset polyypit, inflammatoriset polyypit, sessiilit sahalaitaleesiot ja traditionaaliset sahalaita-adenoomat
- Hamartomatoottinen polyyppi = normaalia koolonkudosta, mutta epänormaali arkkitehtuuri; voivat olla sporadisia tai assosioitua polypoosioireyhtymiin, kuten juveniiliin polypoosiin ja Peutz–Jeghersin polypoosiin
 - Ei merkittävää ryöpäriskiä, jos sporadisia; polypoosioireyhtymien yhteydessä syöpäriski merkittävä
 - Inflammatoriset polyypit voivat johtua koliitista tai jostain muusta limakalvoa vaurioittavasta tekijästä, kuten iskemiasta

- a. Limakalvovauriota seuraa granulaatiokudosmuodostus, ja alkuvaiheessaan tulehduspolyypit koostuvatkin granulaatiokudoksesta; myöhemmin granulaatiokudos väistyy ja (pseudo)polyypin strooma on fibroottinen
- 3. Sessiilit sahalaitaleesiöt (SSL, aik. sessiili sahalaita-adenooma) ovat toiseksi yleisimpiä (n. 15-20%) sahalaitamuutoksia (hyperplastiset polyypit nro 1); käytännössä yleisimpiä prekanseroottisia sahalaitamuutoksia, sillä hyperplastisilla todella pieni malignisoitumisriski
 - a. Sessiili kasvutapa -> laakea limakalvon myötäinen kohoama
 - b. Muistuttaa hyperplastista polyypia, mutta erityisesti kryptien rakennehäiriö eroaa (mm. kryptojen lateraalinen kasvu tyypillistä)
- 4. Traditionaaliselle sahalaita-adenoomalle (TSA, n. 2-4% sahalaitapolyypeistä) on ominaista runsas eosinofiilinen sytoplasma ja tumiltaan pinoutuva (pseudostratifioitunut) epiteeli
 - a. Nykyään tunnistetaan, että hyperplastinen polyyppi voi kehittyä traditionaaliseksi sahalaita-adenoomaksi, jolla on malignisoitumisriski -> myös hyperplastisten polyyppien poistamista pidetään tärkeänä
- 5. Sahalaitamuutoksia ovat siis hyperplastiset polyypit (yleisin), sessiilit sahalaitaleesiöt ja traditionaaliset sahalaita-adenoomat (ja luokittelemattomat sahalaita-adenoomat)
- E. Polyypit ovat yleensä oireettomia, mutta voivat aiheuttaa verenvuotoa ulosteisiin, mikä on kuitenkin usein silminnähden havaitsemattomissa.
 - 1. Ulosteen piilevä veri voidaan osoittaa tutkimalla ulosteesta hemoglobiini (F-hHb eli FIT-testi).
- B. Polyyppeja ei voi varmuudella erottaa toisistaan ulkomuodon perusteella, joten kaikki polyypit tulee poistaa kolonoskopian yhteydessä.
 - 1. Mikroskooppisen tutkimuksen jälkeen saadaan selville, oliko polyyppi suuressa malignisoitumisriskissä ja oliko polypektomia riittävä hoito.
 - a. Suurin riski etenemiselle adenoomasta karsinoomaksi: yli 1cm halkaisijaltaan, sessiili kasvutapa (laakea limakalvon myötäinen kohoama), villoittinen histologia
 - b. Lisähoitoa ei tarvita, jos adenooma poistettiin kokonaan ja kannassa nähdään terve marginaali histologisesti tai invasiivinen karsinooma ei ole anaplastinen eikä ulotu submukoosaan asti (riski imusolmuke-etäpesäkkeille ja paikalliselle jäännöskasvaimelle).

VII. FAMILIAALINEN ADENOMATOOTTINEN POLYPOOSI (FAP)

- A. Johtuu autosomaalisesti vallitsevasti periytyvästä APC-mutaatiosta, mikä lisää riskiä muodostaa runsaasti koolonin adenoomia; yleisin polypoosisyndroomista
- B. Ilmenee jopa tuhansina adenoomina, jotka alkavat ilmestyä 12-15 vuoden iässä ja voivat aiheuttaa ripulia, veriulosteita ja vatsakipua.
- C. Johtaa lähes varmasti koolonkarsinoomaan keski-ikään mennessä, joten koolon ja rektum (proktokolektomia) poistetaan profylaktisesti ja ileum yhdistetään anukseen; leikkaus tehdään mieluiten viimeistään 20–25 vuoden iässä.
 - 1. Kolektomian seurauksena on alettu huomaamaan, että adenoomia esiintyy oikeastaan koko suoliston alueella, eniten pohjukaissuolessa (kehittyy lähes

kaikille); duodenumin syöpävaaran suuruudeksi on arvioitu jopa 20 % 60–70 vuoden ikään mennessä

D. Gardnerin oireyhtymä on FAP:n tyyppi, jossa ilmenee polyyppien lisäksi ekstrakoloonisia manifestaatioita, mm. osteoomia, epidermaalikystia, pehmytkudoskasvaimia ja ylimääräisiä hampaita.

1. Osteooma tarkoittaa luun hyvänlaatuista tuumoria, joka ilmenee yleensä kallossa.

E. Turcotin oireyhtymässä ekstrakoloonisena manifestaationa tavataan CNS:n tuumori, erityisesti medulloblastooma.

1. Turcotin oireyhtymä = FAP + aivotuumori

VIII. JUVENIILIPOLYPOOSI

A. Autosomaalisesti vallitsevasti periytyvä harvinainen polypoositauti, joka muistuttaa FAP:a, mutta polyyppit eivät ole adenoomia vaan kystisiä hamartoomia, joita on yleensä määrällisesti vähemmän (muutamasta noin 300:aan) kuin FAP:ssa.

B. Tauti ilmenee usein lapsuudessa, mutta n. 1/3 todetaan vasta aikuisiässä.

C. Vaikka hamartoomat ovat benignejä, runsaina ne lisäävät paksusuolisyövän vaaraa; hoidetaan polyyppien poistamisella ja runsaspolyyppisiltä poistetaan paksusuoli profylaktisesti.

IX. PEUTZ-JEGHERSIN POLYPOOSI/OIREYHTYMÄ

A. Autosomaalisesti vallitsevasti periytyvä harvinainen polypoositauti, jossa koko suolistossa (erityisesti ohutsuolessa) ilmenee runsaasti hamartomatoottisia polyyppejä.

1. Polyyppien aiheuttamia oireita ennen todetaan pigmenttiläiskiä erityisesti suun limakalvolla ja huulien ympäristössä, joskus raajojen iholla ja sukuelinten ympäristössä (vrt. juveniilipolypoosi, jossa ei hyperpigmentaatiota).

B. Lisää riskiä suolistosyövän lisäksi myös monien muiden syöpien todennäköisyyttä (mm. munasarjojen, kohdunkaulan, rintarauhasen, kivesten ja haiman syöpään).

X. PAKSU- JA PERÄSUOLISYÖPÄ (KOLOREKTAALISYÖPÄ)

A. Suomessa sekä naisilla että miehillä toiseksi yleisin syöpä ja esiintyvyys on kasvussa (yleisimpänä rinta- ja eturauhassyövät).

B. Valtaosa kehittyy sporadisesti adenooma-karsinooma-sekvenssin kautta tavalliseksi adenokarsinoomaksi, mutta osa (n. 15%) kehittyy mikrosatelliitti-instabiliteetti-reitin kautta.

1. Mikrosatelliitit ovat ei-koodaavan DNA:n toistojaksoja, joiden pituuden muuttumista solujakautumisen yhteydessä kutsutaan instabiliteetiksi.

2. Instabiliteetti viittaa replikaatiossa tapahtuneeseen emäspariumarvirheeseen, jota ei ole korjattu eli mismatch-repair entsyymit eivät toimi normaalisti.

3. MSI-reitin kautta muodostuneet tuumorit ilmenevät useammin oikeanpuoleisina kuin adenooma-karsinoomareitin kautta syntyneet; ennuste on myös parempi kuin mikrosatelliittistabiileilla (MSS) syöville.

C. N. 5% kolorektaalisyöivistä ovat perinnöllisiä, yleisin periytyvä oireyhtymä on Lynchin oireyhtymä (LS).

1. Lynchin oireyhtymälle on tyypillistä mikrosatelliitti-instabiliteetti, jonka aiheuttaa MMR-geenien (MLH1, MSH2, MSH6) yhden alleelin ituratamutaatio.

a. MMR-mutaation kantajalla on nykyään noin 50-80 %:n elinaikainen riski sairastua paksusuolisyöpään

- b. Lisää kolorektaalisyövän lisäksi riskiä nuorena muillekin syöville, kuten munasarjojen, mahalaukun ja endometriumien syöville.
 - c. Tilaan ei liity polypoosia.
 - d. Mismatch-korjausgeenien (MMR) mutaatioihin liittyy vastaavan proteiinin katoaminen tautiin assosioituvissa syövässä, mikä voidaan osoittaa immunohistokemiallisesti; tutkitaan kaikista uusista syöpätapauksista (MSI-status vaikuttaa ennusteeseen, hoitoon ja seurantaan)
- 2. Termiä perinnöllinen ei-polypoottinen kolorektaalisyöpä (HNPCC) eli polyypittautiin liittymätön koolonkarsinoma käytetään usein Lynchin oireyhtymän synonyyminä, mutta tarkalleen ottaen se tarkoittaa kliiniseltä kuvaltaan Lynchin oireyhtymän kaltaisia familiaalisia suolistosyöpiä, joissa ei todeta Lynchin oireyhtymälle tyypillisiä mismatch-korjausgeenin ituramutaatioita.
- D. Kolorektaalisyöpä voi olla pitkään täysin oireeton ja ilmeneminen riippuu karsinoman sijainnista; klassinen potilas on 60-80-vuotias ja valittaa vatsavaivoista, ulostamisvaikeuksista tai anemiasta (raudanpuuteanemiasella vanhuksella tulee olettaa kolorektaalikarsinoma siihen saakka, että se todistetaan vääräksi).
 - 1. Oikean puoliskon kasvaimet aiheuttavat huomaamatonta verenvuotoa ja raudanpuuteanemiaa ja tukosoireet ilmenevät myöhään (umpisuoli ja nouseva koolon ovat luonnostaan laajoja, tuumori on useammin eksofyttinen eikä ympäröivä).
 - 2. Vasemman puoliskon kasvaimet (yleisempiä) aiheuttavat useammin tukosoireita (vasemman puoleinen koolon on luonnostaan kapeampi ja tuumorit ovat usein annulaarisia ympäröiviä) ja ulosteen verisyys näkyy selvemmin.
- E. Kolorektaalisyövän tunnettuja riskitekijöitä ovat mm. tupakointi ja alkoholi, obesiteetti ja tyypin 2 diabetes, runsas lihan syöminen ja matalakuituinen ruokavalio.
- F. Suomessa aloitettiin uusi suolistosyöpäseulonta vuonna 2022. Seulonta koskee tällä hetkellä 60–70-vuotiaita, ja se laajenee ikäryhmittäin siten, että ohjelma ulottuu kaikkiin 56–74-vuotiaisiin vuodesta 2031 alkaen.
 - 1. Seulontaan kutsutaan 2 v:n välein niinä vuosina, jolloin kutsuttava täyttää parillisia vuosia
 - 2. Seulontatestissä tutkitaan piilevä veri ulosteesta FIT-testillä; tarvitaan vain yksi ulostenäyte, joka otetaan itse kotona ja lähetetään postitse laboratorioon tutkittavaksi. Veritestin ollessa positiivinen tehdään kolonoskopia.
- G. Diagnoosi perustuu kolonoskopiaan ja koepaloihin
 - 1. Ennuste perustuu TNM-luokitukseen.
 - a. Mukoosaan rajoittunut kasvain ei yleensä leviä (ei imusuonia mukoosassa).
 - b. Yleisimmät metastaasipaikat ovat järjestyksessä maksa, keuhkot ja peritoneum
 - c. Karsinoosi = syövän, yleensä karsinooman, leviämistä vatsaonteloon vatsakalvon pinnoille
 - 2. Kasvainmerkkiaineista ei ole seulonnassa tai alkudiagnostiikassa hyötyä; CEA auttaa hoidon seurannassa ja sen suurentuminen on merkki uusiutumisesta.

11 MAKSAN, SAPPITEIDEN JA HAIMAN PATOLOGIA

MAKSAN SAIRAUDET

I. PERIAATTEET

- A. Maksatautien tärkeimmät löydökset perustuvat maksan toiminnan heikentymiseen.
- B. Maksan tärkeimpiä tehtäviä on erilaisten aineiden detoksikaatio, metabolia ja synteesi sekä joidenkin näiden aineiden varastointi.
- C. Tärkein löydös on ikterus (silmien kovakalvon ja ihon kellertävyys, jaundice), joka johtuu bilirubiinin metabolian häiriöstä. (Kuva 11.1.)
 - 1. Seerumin bilirubiinin noustessa yli 40 $\mu\text{mol/l}$ (2,5mg/dL) keltaisuutta aletaan havaita silmissä; ihon keltaisuuden havaitseminen riippuu valaistuksesta ja potilaan ihonväristä.
 - a. Bilirubiinin kertyessä ihokin alkaa kellertää.
 - b. P-Bil mittaa konjugoitumattoman ja konjugoituneen bilirubiinin yhteenlasketun pitoisuuden; P-Bil-Kj mittaa vain konjugoituneen bilirubiinin pitoisuuden.
- D. Normaali bilirubiinin metabolia (kuva 11.2):
 - 1. RES-makrofagit (pääasiassa pernassa) hajottavat punasolut
 - a. Hemin protoporfyrinistä irrotetaan rauta ja protoporfyriniirengas avataan biliverdiiniksi
 - b. Biliverdiini hajotetaan konjugoimattomaksi bilirubiiniksi (biliverdiinireduktaasi)
 - 2. Albumiini kuljettaa bilirubiinin maksaan; vapaa bilirubiini on toksista.
 - a. Konjugoimaton bilirubiini on sitoutunut albumiiniin ja ei muuten ole vesiliukoista -> ei erity virtsaan
 - 3. Maksasolujen ER:ssä bilirubiini konjugoidaan; tärkein entsyymi on UDP-glukuronyylitransferaasi
 - 4. Konjugoitunut bilirubiini (bilirubiiniglukuronidi) erittyy sappitiehyisiin ja osallistuu sapen muodostukseen; varastoidaan sappirakossa
 - a. Sappi sisältää veden lisäksi mm. sappihappoja, kolesterolia, fosfolipidejä ja bilirubiinia.
 - 5. Sappea vapautetaan duodenumiin ruokaillessa; auttaa ruoansulatuksessa ja rasvan absorboinnissa.
 - 6. Suoliston mikrobisto muuttaa bilirubiiniglukuronidin urobilinogeeniksi, joka oksidoidaan sterkobiliiniksi (tekee ulosteesta ruskean).
 - a. Noin 10-20% urobilinogeenista reabsorboidaan, kuljetetaan porttilaskimon kautta maksaan, jota kautta osa urobilinogeenistä pääsee verenkiertoon ja eritetään munuaisten kautta pois virtsaan (osa oksidoituu urobiliiniksi tekee virtsasta keltaisen).
- E. Ikteruksen etiologia voidaan jakaa pre-hepaattiseen, intrahepaattiseen ja post-hepaattiseen tyyppiin.
 - 1. Pre-hepaattinen johtuu liiallisesta bilirubiinin tuotannosta.
 - a. Pääasiassa konjugoitumatonta hyperbilirubinemiaa.

2. Intrahepaattinen johtuu konjugoinnin häiriöstä tai konjugoituneen bilirubiinin erityksen estymisestä.
 - a. Koholla olevan bilirubiinin suhde vaihtelee etiologian mukaan.
3. Post-hepaattinen johtuu sapen virtauksen obstruktiosta maksan ja ohutsuolen välillä.
 - a. Pääasiassa konjugoitunutta hyperbilirubinemiaa.

Taulukko 2 Ikteruksen syyt

Tyyppi	Mekanismi	Kliininen esimerkki	Etiologia	Laboratoriolöydökset	Kliininen kuva
Pre-hepaattinen	Lisääntynyt bilirubiinin tuotanto	Hemolyyttiset anemiat (mm. sirppisolanemia, TTP, autoimmuuni hemolyyttinen anemia, ineffectiivinen erytropoiesi (mm. pernisiöosi anemia, talassemia)), hematooman resorptio	Pernan makrofagit hajottavat runsaasti punasoluja ja tuottavat enemmän konjugoimatonta bilirubiinia (S-Bil) kuin maksa pystyy konjugoimaan (S-Bil-Kj).	↑ P-Bil	Virtsan tummaa virtsan kohonneen urobilinogeenin (UBG) takia. Lisää riskiä bilirubiinipigmentille (pigmenttikivet).
Intrahepaattinen	Häiriintynyt maksan metabolia	Vastasyntyneen keltaisuus	Vastasyntyneen maksan UGT-aktiiviteetti on matala ja veren runsas punasolujen hajoaminen ylittää konjugaatiokapasiteetin.	↑ P-Bil	Bilirubiini on rasvaliukoista ja voi kertyä tyvitumakkeisiin aiheuttaen neurologisia ongelmia ja jopa kuoleman (kernikterus). Hoidetaan valoterapialla (tekee bilirubiinista vesiliukoista)
		Gilbertin oireyhtymä	Perinnöllinen vähäinen UGT-aktiiviteetti	↑ P-Bil	Ei kliinisesti kovin merkittävä; keltaisuus ilmenee stressin (esim. paasto ja runsas alkoholin käyttö) yhteydessä.
		Crigler-Najjarin oireyhtymä	Perinnöllinen UGT:n puutos (CNS1 täysi puutos, CNS2 osittainen puutos)	↑ P-Bil	CNS1 johtaa kernikterukseen ja on usein fataali ilman maksansiirtoa. CNS2 ennuste hyvä sopivalla hoidolla (fenobarbitaali-induktihoito).
	Häiriintynyt maksansisäinen erityys	Dubin-Johnsonin oireyhtymä (musta maksa)	Perinnöllinen MPR2-solukalvotransportterin mutaatio, mikä estää bilirubiiniglukuronidin siirtymistä sappeen.	↑ P-Bil-Kj	Ei kliinisesti merkitsevä, mutta maksa on tumman värinen
	Häiriintynyt maksansisäinen varastointi (takaisinotto)	Rotorin oireyhtymä	Perinnöllinen OATP1B1-solukalvotransportterin mutaatio, mikä estää bilirubiiniglukuronidin takaisinottoa verestä hepatosyyttiin.	↑ P-Bil-Kj	Ei kliinisesti merkitsevä, eikä maksa ole tumman värinen.
	Häiriintynyt maksansisäinen metabolia, varastointi ja erityys (maksan solujen vaurioituminen)	Virushepatiitti, alkoholihepatiitti; kroonisesti myös kirroosi tietysti aiheuttaa	Hepatosyyttien ja pienten sappitiehiden inflammaatio johtaa maksan konjugaatiotoiminnan häiriintymiseen sekä hepatosyyttien ja pienten tiehyiden sisällön vapautumiseen verenkiertoon.	↑ P-Bil sekä ↑ P-Bil-Kj (akuuteissa ongelmissa P-ALAT ja ASAT myös koholla vaurion merkiksi)	Virtsan tummaa virtsan konjugoituneen bilirubiinin takia. Virtsan urobilinogeeni on normaali tai koholla.
Post-hepaattinen (Obstruktiivinen)	Sappiteiden obstruktio	Mm. sappikivet, haimasyöpä, kolangiokarsinoma, parasiitit (esim. suolinkainen eli askariaasi)	Sappiteiden obstruktio johtaa sappiteiden sisällön kertymiseen ja vuotamisen verenkiertoon.	↑ P-Bil ja erityisesti P-Bil-Kj, ↑ P-AFOS, ↓ U-UBG, ↑ S-Sappih, hyperkolesterolemia, lievästi koholla P-ALAT ja ASAT	Virtsan tummaa bilirubinurian takia. Plasmaan vuotaneet sappihapot aiheuttavat pruritusta. Hyperkolesterolemia voi aiheuttaa ksantoomien muodostusta. Sappea ei pääse duodenumiin, mikä aiheuttaa haaleita ulosteita, steatorreaa ja rasvaliukoisten

					vitamiinien vajetta.
--	--	--	--	--	----------------------

II. MAKSAN HISTOLOGIA

- A. Maksan parenkyyymi koostuu mikroskooppisesti tuhansista lobuluksista, jotka ovat noin 1 mm:n läpimittaisia ja mikroskopiassa viisi- tai kuusikulmioita.
 1. Kulmissa ovat portaali alueet ja keskellä keskuskaskimo.
- B. Portaalialueiden sidekudoksessa sijaitsevat maksavaltimon ja porttilaskimon haarat sekä sappitiehyet (portal triad)
- C. Maksasolut jaetaan kolmeen vyöhykkeeseen sen mukaan, millä etäisyydellä ne sijaitsevat portaali alueesta ja keskuskaskimosta; oksygenaatio heikkenee siirtyessä kauemmas portaali vyöhykkeen maksavaltimoista.
 1. Periportaali vyöhykkeellä (vyöhyke 1) sijaitsevat maksasolut saavat maksaan tulevasta verestä eniten happea, hormoneja ja ravintoaineita -> Hapenpuutetiloissa periportaaliset hepatosyytit ovat kestävämpiä kuin muiden vyöhykkeiden hepatosyytit.
 - a. On ensimmäinen alue, joka affisioituu virushepatiiteissa ja suoraan maksatoksisten aineiden nauttimisen jälkeen (esim. kokaiini, valkoinen fosfori) (ensimmäinen alue johon pääsevät)
 2. Lobuluksen keskialueen maksasolut kuuluvat vyöhykkeeseen 2
 3. Lähinnä keskuskaskimoa olevat perisentraaliset maksasolut kuuluvat vyöhykkeeseen 3 (sentrilubulaarinen vyöhyke); ovat heikoimmin hapetettuja -> hapenpuutetiloissa vyöhyke 3 kuolee ensimmäisenä
 - a. Sisältävät myös eniten CYP-450-entsyymejä ja ovat siten alttiita toksisten metaboliittien kertymiselle -> metaboloituvat toksinit vaurioittavat ensimmäisenä vyöhykettä 3

III. KOHONNEIDEN MAKSA-ARVOJEN KUVIOT

- A. Tärkeimpiä maksan ja sappiteiden tilanteesta (toiminnasta/vauriosta) kertovia laboratoriotutkimuksia ovat ASAT (aspartaattiaminotransferaasi), ALAT (alaniiniaminotransferaasi), AFOS (alkalinen fosfataasi), GT (gammaglutamyyli transferaasi), Bil (bilirubiini; kokonais- ja konjugoitu), ALB (albumiini) ja INR
 1. Suoraa vauriota kuvaavat ASAT, ALAT, AFOS JA GT; eivät kerro maksan toiminnasta
 - a. ASAT ja ALAT ovat maksasoluissa toimivia entsyymejä, jotka vapautuvat vereen hepatosellulaarisen vaurion yhteydessä
 - i. ALAT on varsin maksasoluspesifinen, mutta ASAT esiintyy myös luurankoli haksissa ja sydänlihaksessa (myös mm. munuaisissa, keuhkoissa, aivoissa, sappirakossa, haimassa ja punasoluissa)
 - ii. Voidaan laskea ns. ASAT/ALAT-suhde, joka antaa vihjeitä maksasoluvaurion etiologiasta (korkea ASAT/ALAT (>1) suhde yleensä viittaa ekstrahepaattiseen vaurioon tai alkoholi hepatiittiin (erityisesti yli >2 on vihje))
 - c. AFOS ja GT ovat entsyymejä, joita on erityisesti sappiteiden epiteliallisissa soluissa (myös hepatosyyteissä), jonka takia niiden määrät seerumissa

suurenevat erityisesti kolestaattisissa tiloissa (nousevat myös suorassa hepatosellulaarisessa vauriossa).

- i. AFOS löytyy myös luustosta ja istukasta (raskauden aikana), joten arvot voivat nousta mm. luustoperäisissä sairauksissa. GT ei kohoa luustoperäisissä sairauksissa -> voidaan päätellä, että suurentunut AFOS-arvo on maksaperäistä, jos gammaglutamyyli transferaasitaso on samanaikaisesti kohonnut.
- ii. GT myös indusoituu herkästi kroonisen alkoholin käytön yhteydessä

2. Maksan funktiota kuvaavat bilirubiini, albumiini ja INR

- a. P-Bil nousee kiihtyneen tuotannon (esim. hemolyysi) tai häiriytyneen eliminaation (esim. maksasoluvaurio tai sappitietukos) tai puutteellisen konjugoitumisen (esim. Gilbert) vuoksi
- b. Albumiini on seerumin tärkein proteiini, sitä on noin 60 % kaikista seerumin proteiineista; albumiinipitoisuuden pieneneminen korreloi hyvin maksan synteessifunktion heikkenemiseen.
 - ii. Albumiinin esiaste eli prealbumiini sopii myös laboratoriotutkimukseksi; sen puoliintumisaika on albumiinia lyhyempi (2-4pv vs 20-22pv) ja laskee sen takia nopeammin akuutissa maksavauriossa ja aliravitsemuksessa
- b. INR (lasketaan TT:stä) on luotettava maksan synteessitoiminnan mittari, jos potilaalla ei ole K-vitamiinin puutetta; hyytymistekijällä VII on lyhyt puoliintumisaika -> maksatoiminnan heikentyminen näkyy ensimmäisenä TT eikä APTT:ssä.

B. Kohonneet maksa-arvot voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: hepatosellulaariseen vaurioon ja kolestaasiin (ongelma sapen kuljettamisessa hepatosyyteistä duodenumiin; voi olla hepatosellulaarinen tai obstruktiivinen kolestaasi).

1. Hepatosellulaarisessa vauriossa maksa-arvot ovat koholla ALAT- (ja ASAT-) voittoisesti (transaminaasipainotteinen kuvio)
 - a. AFOS ja GT sekä bilirubiini voivat olla normaaleja-koholla
 - b. Albumiini voi olla normaali-matala
 - c. INR voi olla normaali-koholla
 - d. Nyrkkisääntönä ALAT on raja-arvoinen, jos se on $<2\times$ viitearvon ylärajan, lievästi suurentunut jos $<3\times$, selvästi suurentunut jos $>3\times$ ja vaikeassa maksavauriossa $>10\times$
2. Sappitiehyen sairauksissa/kolestaasissa maksa-arvot ovat koholla AFOS ja GT-voittoisesti (AFOS-painotteinen kuvio)
 - a. Bilirubiini on koholla
 - b. ALAT ja ASAT voivat olla normaaleja-koholla
 - c. Albumiini ja INR ovat yleensä normaaleja, ellei kyseessä ole krooninen ja vaikea tilanne
3. Myös näiden sekamuotoja sekä pelkästään GT- ja bilirubiiniarvojen suurenemisia voi esiintyä
 - a. Pelkkä bilirubiinin nousu ja muuten normaalit labrat -> johtuu useimmiten Gilbertin syndroomasta (konjugoimaton koholla)

- b. Sekamuotoisia (sekä ALAT, ASAT että AFOS samanasteisesti koholla) voi aiheuttaa mm. monet lääkeaineet, maksan syöpäkasvaimet, sarkoidoosi, amyloidoosi, tuberkuloosi, vaikea sydämen oikean kammion vajaatoiminta sekä maksavaltimon, porttilaskimon tai maksalaskimoiden tukos.
- 4. Kirroosissa vauriomarkkerit (ALAT, ASAT, AFOS, GT) ovat usein normaalit ja vain toiminnalliset markkerit (bil, alb, INR) ovat häiriöityneet.
 - a. Ei ole enää toiminnallisia soluja niin paljoa, josta entsyymejä voisi vapautua.

IV. AKUUTTI MAKSAVAURIO

- A. Akuutti maksavaurio tarkoittaa alle 6kk kestänyttä heptosellulaarisen vaurion labrakuviota.
 - 1. Vaurion aste voidaan karkeasti jakaa akuuttiin hepatiittiin (ilman virallista vajaatoimintaa) ja akuuttiin maksan vajaatoimintaa (ALF)
- B. Akuutti maksan vajaatoiminta (ALF) tarkoittaa nopeasti kehittyvää maksan toiminnan pettämistä, jossa enkefalopatia kehittyy nopeasti keltaisuuden ilmaantumisesta laskien.
 - 1. Virallinen määritelmä: koagulopatia ($\text{INR} \geq 1,5$) + enkefalopatia kehittyy < 6kk:ssa terveelle (ei tiedossa oleva maksasairautta/kirroosia)
 - 2. Hyperakuutti (alle 1vk), akuutti (1-3vk), subakuutti (3-26vk); joskus akuuttia tai hyperakuuttia saatetaan kutsua fulminantiksi (klassisesti määriteltä alle 8vk).
 - 3. Voi myös muodostua tavallisemmin aikaisemman kroonisen vajaatoiminnan päälle (acute-on-chronic); esim. akuutti alkoholihepatiitti ei ole akuuttia maksan vajaatoimintaa, koska taustalla on aina pidempiaikaisempi maksasairaus kroonisen alkoholinkäytön takia.
- B. Ilmenee samoina epämääräisinä oireina ja maksan vajaatoiminnan oireina kuin kroonisessa vajaatoiminnassakin.
 - 1. Väsymys, ruokahaluttomuus, pahoinvointi, RUQ-alueen (oikean ylävatsan) kipu, kutina (vereen kertyvistä sappisuoloista johtuen)
 - 2. Hepaattinen enkefalopatia (HE) syvenee yleensä maksan vajaatoiminnan edetessä: Maksa metaboloii suolistobakteerien tuottamaa ammoniakkia ureaksi, mutta maksan vajaatoiminnassa ammoniakkitasot nousevat ja sitä päätyy aivoihin; havaitaan asteittain muutoksia tajunnan tasossa ja neurologisissa toiminnoissa (jäykkyys, hyperrefleksia, asterixis).
 - a. HE voi johtua joko akuutista tai kroonisesta maksan vajaatoiminnasta tai sitten veren virtauksesta maksan ohi ilman kirroosia (synnynnäinen tai iatrogeeninen suntti)
 - b. HE voidaan luokitella neljään asteeseen (gradus) oireiden ja persoonallisuuden muutosten perusteella; vaikeimmassa asteessa potilas on koomassa.
 - c. Erona kroonisen maksan vajaatoiminnan aiheuttamaan HE:aan, ALF:ssa voi ilmentyä myös kohonnutta kallonsisäistä painetta (ICP), joka lisää riskiä herniaatiolle, joka johtaa usein kuolemaan.
 - i. Toksiinien nopea kertyminen neuroneihin aiheuttaa ödeemaa -> kohonnut ICP
 - 3. Ikterus – Bilirubiinimetabolia häiriintynyt
 - 4. Koagulopatia – Heikko sekä hyytymistekijöiden että anti-hyytymistekijöiden synteesi ja aktivoituneiden hyytymistekijöiden poistamisen kyvyn heikentyminen johtaa

samanaikaiseen verenvuoto- ja tromboosivaaraan; TT laskee ja INR nousee (APTT nousee myös TT:n jälkeen)

5. Vaikka vaikea hepatosellulaarinen vaurio häiritsee maksan syntetisointikykyä, seerumin albumiini ei ole erityisen matala, ellei vaurio ole jo subakuutin kestoinen (>3vk).
 - a. Albumiinin puoliintumisaika on n. 20-22pv, joten maksan vajaatoiminta ei heti ilmene sen määrän muutoksina; prealbumiini taas pystyy osoittamaan vaurion jo aikaisemmin (puoliintumisaika 2-4pv).
 - b. Albumiinin vähäisyyden aiheuttama turvotus on yleisempää kroonisessa maksan vajaatoiminnassa
6. Munuaisten vajaatoiminta
7. Infektioalttius: Komplementin ja muiden akuutin faasin proteiinien tuotanto vähentynyt
8. Portahypertensio esiintyy useammin ja kompleksisemmin kroonisessa.
 - a. Kroonisessa maksan kirroosi aiheuttaa portahypertensiota, akuutissa vajaatoiminnassa syynä ei yleensä ole maksan rakenteellinen muutos, joka nostaisi portapainetta
9. Hypoglykemia: Glukoneogeneesin ja glykogenolyysin väheneminen altistaa hypoglykemialle; on suurempi riski akuutissa kuin kroonisessa

C. Suomessa etiologia usein tuntematon (seronegatiivinen), mutta useissa teollisuusmaissa lääkkeet (parasetamolimyrkytys) ja kehitysmaissa virushepatiitit tärkeimmät aiheuttajat.

1. Pääasiassa erotusdiagnostiikka akuutissa maksavauriossa on: lääkkeiden aiheuttama maksavaurio (DILI) sisältäen luontaistuotteet ja ravintolisät, hepatiittivirukset, muut virukset (esim. HSV1 ja 2 EBV, CMV), maksatoksiset aineet (esim. valkoinen kärpässieni, kavalakärpässieni), metabolinen (Wilsonin tauti), iskeeminen hepatopatia (hypotensio, sepsis, Budd-Chiarin oireyhtymä), autoimmunihepatiitti tai raskauden aikainen akuutti rasvamaksa (HELLP)
 - a. Budd-Chiarin oireyhtymä tarkoittaa maksalaskimoiden ulosvirtauksen obstruktiota (yleensä tromboosin aiheuttama eli primaarinen); voi ilmentyä muskottimaksana sydämen vajaatoiminnan tapaan kongestion takia.
 - b. Riskitekijöitä on mm. hyperkoagulatiiviset tilat ja maksakarsinooma (tuumori kompressoii laskimoa)
 - c. Voidaan todeta sentrilobulaarista nekroosia (zone 3)
2. Lapsilla voidaan harvinaisesti tavata Reyen oireyhtymää, jossa virustautia potevalle lapselle kehittyy akuutti maksan vajaatoiminta aspiriinin käytön aiheuttamana.
 - a. Todennäköisesti johtuu hepatosyyttien mitokondriovauriosta, joka johtaa beetaoksidaation ja siten rasvahappometabolian estymiseen -> mikroversikulaarinen steatoosi.
 - b. Ilmenee hypoglykemiana, kohonneina maksa-arvoina, pahoinvointina ja oksenteluna; voi johtaa koomaan ja jopa kuolemaan.

V. KIRROOSI

- A. Minkä tahansa kroonisen maksasairauden (CLD eli >6kk kestänyt maksasairaus) loppuvaihe voi olla kirroosi eli pitkälle edennyt fibroosi ja maksan normaalin rakenteen häviäminen.

1. Fibroosi on nauhamaista ja erottaa regeneratiivisia noduluksia, joista normaali lobulaarinen rakenne puuttuu (keskellä ei keskuskaskimoa).
 2. Voidaan jakaa ulkonäön perusteella makro- ja mikronodulaariseen muotoon (nodulukset yli vai alle 3mm)
 - a. Nodulusten koko on suuntaa antava etiologiaa päätellessä: alkoholikirroosi (yleisin aiheuttaja) on tyypillisesti alkuvaiheessa mikronodulaarinen, krooninen virushepatiitti taas johtaa yleensä makronodulaariseen.
 - b. Maksabiopsiaa pidetään maksan fibroosiasteen ja kirroosin arvioinnin luotettavimpana menetelmänä, mutta biopsian ollessa kajoava testi, siihen tietysti liittyy komplikaatoriski -> kehitetty epäsuoria mittareita (FIB-4, NFS, APRI, kuvantamistutkimukset (elastografia))
- B. Fibroosin patofysiologiassa keskisiä ovat maksan tähtisolut (stellate cells), jotka sijaitsevat sinusoideja verhoavan endoteelin ja hepatosyyttien välissä (Dissen tila).
1. Maksavaurion yhteydessä endoteelisolut, Kupfferin solut ja hepatosyytit tuottavat sytokiineja, kuten TGF- β 2, joka saa tähtisolut muuttumaan kollageenia tuottaviksi myofibroblasteiksi.
- C. Aikaisemmin ajateltu täysin palautumattomaksi, mutta nykyään voidaan tietyissä tilanteissa alkuvaiheessa pienentää fibroosin määrää.
- D. Kliininen kuva johtuu maksan kroonisesta vajaatoiminnasta sekä portahypertensiosta.
1. Alkuvaiheessa (kompensoitu) yleensä oireeton tai oireet voivat olla epämääräisiä (väsymys, ruokahaluttomuus, painon tunne ylävatsalla, RUQ-alueen kipu, kutina).
 2. Oireet tulevat selvästi esille ns. dekompensoidussa kirroosissa (potilaalle kehittyy joko ikterusta, askitesta, varixvuotoa tai hepaattinen enkefalopatia).
 - a. Synteesitoiminnan väheneminen
 - ii. Koagulopatia – Heikko sekä hyytymistekijöiden että anti-hyytymistekijöiden synteesi ja aktivoituneiden hyytymistekijöiden poistamisen kyvyn heikentyminen johtaa samanaikaiseen verenvuoto- ja tromboosivaaraan; TT laskee ja INR nousee (APTT nousee myös TT:n jälkeen)
 - iii. Perifeerinen turvotus – Hypoalbuminemia aiheuttamaa
 - iv. Hypoglykemia – Glukoneogeneesin ja glykogenolyysin väheneminen altistaa hypoglykemialle.
 - v. Infektioriski – Komplementin ja muiden akuutin faasin proteiinien tuotanto vähentynyt.
 - b. Detoksifikaatiotoiminnan väheneminen
 - i. Ikterus – Bilirubiinimetabolia häiriintynyt
 - ii. Hepaattinen enkefalopatia – Maksa metaboloii suolistobakteerien tuottamaa ammoniakkia ureaksi, mutta maksan vajaatoiminnassa ammoniakkitasot nousevat ja sitä päätyy aivoihin; havaitaan asteittain muutoksia tajunnan tasossa ja neurologisissa toiminnoissa (jäykkyys, hyperrefleksia, asterixis).
 - iii. Hyperestrogenemia – Miehillä vähentynyt estrogeenin metabolia johtaa mm. gynekomastiaan, hämähäkkiluomiin (spider nevus) ja palmaarieryteemaan.

- c. Portahypertensio – Sinusoidien verenvirtauksen resistenssin kasvu johtaa porttilaskimon verenpaineen nousuun.
 - i. Askites – Hypoalbuminemia ja kohonnut porttilaskimon paine mahdollistaa nesteen valumisen sisäelinten laskimoista ja nesteen kertymisen vatsaonteloon.
 - ii. Kongestiivinen splenomegalia – Voi laskea verihiutaleiden määrää.
 - iii. Kollateraalisuonet – Pienet laskimot muodostavat uusia yhteyksiä ja pyrkivät ohjaamaan laskimovirtausta pois päin maksasta.
 - iv. Ruokatorvivariksit – Akuutti variksvuoto on henkeä uhkaava tila
 - v. Caput medusae – Periumbilikaalisella iholla havaittavia kollateraleja
 - vi. Anorektaalivariksit (ei sama asia kuin peräpukamat)
 - vii. Hepatorenaalinen oireyhtymä – nopeasti etenevä munuaisten vajaatoiminta sekundaarisena kirroosille
 - iii. Lisääntynyt NO:n erityys portahypertensiassa johtaa suoliston (splanknikusalueen) valtimokierron vasodilataatioon.
 - iv. Systeemisen verenpaineen laskeminen saa sydämen lisäämään minuuttitilavuutta.
 - v. Lisääntynyt verenvirtaus suolistoon ja mahdollinen hypoalbuminemian aiheuttama ödeema vähentävät munuaisten perfuusiota sekä aktivoivat sympaattista hermostoa.
 - vi. Munuaiset aktivoivat RAA-systeemin, mikä johtaa laajaan vasokonstriktioon ja natriumin sekä veden retentioon (askites) nostamalla perifeeristä vastusta ja vähentäen munuaisten perfuusiota vielä enemmän.

E. Kirroosi on tärkein hepatosellulaarisen karsinooman riskitekijä.

V. STEATOOTTINEN MAKSAUTAUTUMINEN (SLD, RASVAMAKSAUTUMINEN): ALKOHOLIMAKSASAIRAUS JA MASLD

- A. Alkoholi on yleisin maksasairauden aiheuttaja Suomessa; jopa 90% maksakirrooseista on alkoholin aiheuttamia.
- B. Alkoholi aiheuttaa jatkuvassa liikkäytössä alkoholimaksasairauden (ALD) kirjon, joka ilmenee samalla tavalla myös ei-alkoholiperäisessä sairaudessa.
 - 1. Rasvamaksa (steatoosi) – Suurentuneen maksan hepatosyyteissä nähdään rasvan kertymistä; lähes kaikilla alkoholin suurkuluttajilla
 - a. Mekanismit:
 - i. AFLD (alkoholinen rasvamaksatauti): Etanolin metabolia tuottaa runsaasti NADH:ta (NADH/NAD-suhde kasvaa), mikä häiritsee glukoneogeneesiä ja lisää rasvahapposynteesiä.
 - ii. MASLD (metabolinen rasvamaksatauti eli metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease; aikaisemmalta nimeltään NAFLD eli non-alcoholic fatty liver disease): Mekanismi epäselvä, mutta metabolinen oireyhtymä (mm. ylipaino ja insuliiniresistenssi) tärkein vaikuttaja; vapaiden rasvahappojen mobilisaatio rasvakudoksesta lisääntyy ja johtaa lipidikertymiin maksasoluissa.
 - iii. MASLD-diagnoosi edellyttää, että rasvamaksan muut syyt, erityisesti alkoholin käyttö on poissuljettu

- b. Histologia - Rasvamaksassa yli 5% hepatosyyteistä ovat suurten rasvapisaroiden valtaamia (makrovesikulaarinen). Tavallisesti vasta yli 30% havaitaan kaikukuvauksella ja yli 2/3 rasvoittuminen on vaikeaa (gradus 3).
 - i. Rasvoittuminen alkaa sentrilobulaarisista hepatosyyteistä.
 - c. Yleensä oireeton kohonneilla maksa-arvoilla (ALAT, ASAT, GT); täydellinen korjaantuminen mahdollista.
 - 2. Steatohepatiitti (rasvamaksatulehdus) – Rasvamaksassa havaitaan inflammatorista aktiviteettia ja hepatosyyttien vaurioita.
 - a. Mekanismi:
 - i. Alkoholihepatiitti – Etanoli itsessään sekä sen metabolian sivutuotteet, kuten asetaldehydi vaurioittaa maksasoluja; ilmenee yleensä erityisen vakavan ryyppypäivän jälkeen
 - ii. MASH (metabolinen rasvamaksatulehdus eli metabolic dysfunction associated steatohepatitis; aikaisemmalta nimeltään NASH) – Mekanismi epäselvä, mutta lipidikertymät ilmeisesti altistavat sytokiinien toksiselle vaikutukselle.
 - iii. Alkoholiin liittyvä rasvamaksasairaus (alcohol-related liver disease, ALD) ja steatohepatiitti (alcohol-related steatohepatitis, ASH) voivat esiintyä yhdessä MASLD:n kanssa, jolloin kyseessä on metabolinen rasvamaksatauti ja alkoholimaksasairaus (MetALD)
 - b. Histologia – steatoosi, hepatosyyttien turpoaminen ja Malloryn kappaleet (vaurioituneita eosinofiilisiä keratiinisäikeitä), nekroosit, neutrofiilivaltainen lobulaarinen tulehdus
 - c. Ilmenee kivuliaana hepatomegaliana, kuumeena, pahoinvointina ja kohonneina maksa-arvoina; johtaa vaikeana usein kuolemaan.
 - i. Klassisesti ASAT/ALAT>2 ASH:ssa ja <1 MASH:ssa.
 - 3. Kirroosi – Kehittyy n. 20%:lle alkoholirasvamaksa- tai MASLD-potilaista
 - 4. Maksasolusyöpä – Kehittyy muutamalle prosentille kirroosipotilaista; voi myös kehittyä ilman fibroosia
- C. Alkoholin liikakäyttöön on vahvasti yhteydessä myös runsaasti ekstrahepaattisia ongelmia; esim. Wernicke-Korsakoffin oireyhtymä.
 - 1. Johtuu B1-vitamiinin eli tiamiinin puutoksesta, jonka taustalla mm. yksipuolinen ravinto, oksentelu, häiriöitynyt imeytyminen ja heikentynyt varastoituminen vaurioituneeseen maksaan; alkoholi myös häiritsee tiamiinin konvertoitumista aktiiviseen muotoon
 - a. B1-vitamiinia tarvitaan moniin eri metaboliareitteihin, erityisesti glukoosin metaboliaan mm. Krebsin syklin kautta -> tiamiinin puutteessa solujen energiantuotanto vähenee; erityisesti aivot ovat herkkiä heikentyneelle glukoosimetabolialle, sillä ne vaativat niin paljon energiaa
 - i. Glukoosin anto potilaalle lisää tiamiinin tarvetta, sillä tiamiinia tarvitaan sen metaboloimisessa
 - 2. Oireyhtymällä on kaksi vaihetta: Wernicken enkefalopatia ja Korsakoffin psykoosi/oireyhtymä

- a. Wernicken enkefalopatialle on tyypillistä mm. silmäoireet kuten nystagmus ja oftalmoplegia (silmälihashalvaus), kävelyoireet (ataksia), psyykkiset oireet kuten sekavuus ja keskittymiskyvyn puute...
 - i. Lieviä tapauksia jää paljon tunnistamatta -> taudin epäily on tärkeä
 - ii. Hoidettavissa eli palautuva muutos
- b. Wernicken enkefalopatia voi edetä Korsakoffin psykoosiin, joka pääasiassa targetoi limbistä järjestelmää -> desorientaatio ja persoonallisuuden muutokset, amnesia (retro- ja anterogradinen ja satuilu (confabulation)
 - i. Muistihäiriöt eivät enää ole palautuvia
- 3. Voi johtaa kuolemaan, joten hoito aloitetaan jo epäilyn pohjalta
 - a. Annetaan tiamiinia; glukoosi-infuusiota tai ravintoa ei saa antaa ennen tiamiinin antoa (pahentaa tilannetta)!
 - i. Jos nälkäiset solut saavat glukoosia käytettäväkseen, ne alkavat käyttämään sitä nopeasti, mutta metaboliareitit eivät pysty etenemään jos ei ole tiamiinia -> välimetaboliitteja, kuten pyruvaattia kertyy ja tämä muutetaan maitohapoksi -> asidoosi ja soluvaurio

VI. HEMOKROMATOOSI

- A. Raudan liiallinen kertyminen elinten soluihin (hemosideroosi) voi johtaa vaurioihin näissä elimissä (hemokromatoosi).
 - 1. Rauta voi muodostaa Fentonin reaktion kautta vapaita radikaaleja ja siten aiheuttaa vaurioita.
- B. Hemokromatoosi voi olla perinnöllistä (primaarinen) tai sekundaarista (toistuvat verensiirrot, liiallinen rautalääkitys, tietyt krooniset anemiat (esim. sideroblastinen anemia)).
 - 1. Yleisin perinnöllinen muoto johtuu HFE-mutaatiosta (tyypin 1 eli klassinen hemokromatoosi) kromosomissa 6, mikä häiritsee raudan absorboinnin säätelyä suolistosta.
 - a. HFE-mutaatio johtaa rautatasojen vialliseen aistimiseen, mikä saa enterosyyttien DMT1-ekspression lisääntymään ja hepsidiinisynteesin vähenemään.
 - 2. On myös tyypin 2 (juveniili), tyypin 3 (TfR2-hemokromatoosi) ja tyypin 4 (ferroportiinitauti)
- C. Kliininen kuva ja diagnosointi
 - 1. Perinnöllinen hemokromatoosi ilmenee tyypillisesti myöhään aikuisuudessa (klassisesti yli 40v.) ja on usein epä määräinen.
 - a. Klassinen pitkälle edennyt potilas on keski-ikäinen mies, jolla nivelkipuja (erit. MCP-nivelissä), ihopigmentaatiota (pronssin värinen iho), hepatomegaliaa ja kirroosia sekä diabetes.
 - i. Myöhäisvaiheessa tavallisia ovat myös sydämen rytmihäiriöt (restriktiivinen/dilatoiva kardiomyopatia altistaa) ja vajaatoiminta sekä seksuaalitoimintoihin liittyvät ongelmat (kivesten atrofia).
 - ii. Lisää riskiä maksasyövälle.
 - 2. Tutkimukset:
 - a. ↑ fS-TfFeSat, (↑P-Ferrit, ↑ S-Fe)
 - b. HFE-genotyypitys

- c. Maksabiopsiassa havaitaan ruskeaa pigmenttiä hepatosyyteissä; berliininsinivärjäys erottaa raudan (sininen) lipofuskiinista.
 - i. Lipofuskiini on usein hepatosyyteissä tavattavaa ruskeaa pigmenttiä, jota muodostuu kalvolipidien hapettumisreaktioissa (ikäpigmentti).

D. Hoidetaan venesektioilla.

VII. WILSONIN TAUTI

- A. Autosomaalisesti resessiivinen mutaatio ATP7B-geenissä (kuparin transporttiporteini hepatosyyttien pinnalla) johtaa vähentyneeseen kuparin erittymiseen sappeen ja kuparin liittämiseen keruloplasmiiniin.
- B. Kupari alkaa kertyä ensin maksaan ja aiheuttaa maksavaurioita Fentonin reaktiossa tuotettujen vapaiden radikaalien kautta.
 - 1. Kuparia vapautuu verenkiertoon ja kertyy muihinkin elimiin (mm. tyvitumakkeet, sarveiskalvot).
- C. Kliininen kuva ja diagnosointi
 - 1. Ilmenemiskä vaihtelee lapsuudesta keski-ikään (tyypillisesti 5-35v)
 - a. Maksaoireet vaihtelevat akuutista/kroonisesta hepatiitista kirroosiin
 - b. Neuropsykiatriset oireet (mm. käyttäytymisen muutoksia, Parkinsonin taudin oireisto)
 - c. Sarveiskalvolla Kayser-Fleischerin rengas
 - d. Lisää riskiä maksasyövälle.
 - 2. Tutkimukset:
 - a. $\uparrow$ dU-Cu, $\downarrow$ S-Kerulo
 - b. Maksabiopsiassa näkyy rodaniinivärjäyksessä granulaista sytoplasmista värjäytymistä periportaalisissa hepatosyyteissä.
- D. Hoidetaan sinkkisulfaatilla (estää suolistosta imeytymistä) ja kuparia kelatoivilla lääkkeillä (penisillamiini, trientiini)

VIII. AUTOIMMUUNIHEPATIITTI (AIH)

- A. T-soluvälitteinen autoimmuunisairaus, jonka laukaisevana tekijänä oletetaan useimmiten olevan jokin virusinfektio (esim. hepatiittivirukset, CMB, EBV) tai lääke
- B. AIH jaetaan kliinisin ja serologisin perustein kahteen päätyyppiin
 - 1. Tyyppi 1 (tavallisin, >80%) – ANA ja/tai sileälihasvasta-aineita (SMA)
 - a. Tyypillisesti nuorten naisten sairaus (70-80% on naisia); sairastumisikähuiput ovat 15-30v ja 40-60v
 - 2. Tyyppi 2 - laukaiseva autoantigeeni on identifioitu (sytokromissa P450 IID6 on lineaarinen 33:n aminohapon ketju (254–271)) ja LKM-1-vasta-aineet reagoivat sitä vastaan
 - a. Etenee kirroosiin useammin (on vaikeampi) ja ilmenee aikaisemmin (tyypillisesti 2-14-vuotiailla eli on pääasiassa pediatriinen sairaus)
- C. Tyyppi 1 todetaan tyypillisesti sattumalta suurentuneiden maksa-arvojen (hepatosellulaarinen kuvio) perusteella, mutta jopa 20–40 % tapauksista alkaa akuutilla taudinkuvalla, joka muistuttaa akuuttia virushepatiittia tai toksista maksavauriota
 - 1. Usein todetaan jatkoselvittelyissä kohonnut IgG (hypergammaglobulinemia) ja ANA/SMA-vasta-aineita (ei kaikilla)

2. Diagnoosi voidaan varmistaa maksabiopsialla, jossa todetaan mononukleaarista infiltraatiota portaaliaalueilla, joka voi levitä rajavyöhykkeen läpi interfaasitulehdukseksi

- a. Rajavyöhykenekroosi ja silloittava nekroosi merkki voimakkaasta ja vaikeasta maksavauriosta; fibroosia ja kirroosia pitkälle edenneessä taudissa

D. Tärkein hoito on immunosuppressio; alkuhoitona steroidihoito, rinnalle liitetään usein atsatiopriini tai merkaptopuriini

1. Hoidetuista potilaista 80–90 % on elossa 10 v:n kuluttua, kun ilman hoitoa 5-vuotiselossaolo-osuus on alle 50 %
2. Maksansiirto voi tulla tarpeeseen kirroosiin edenneillä potilailla; taudin uusiutuminen kuitenkin yleistä

IX. INTRAHEPAATTISTEN SAPPITEIDEN SAIRAUDET (KROONISET KOLESTAATTISET MAKSASAIRAUDET)

A. Primaarinen biliaarinen kolangiitti (PBC) ja primaarinen sklerosoiva kolangiitti (PSC) ovat molemmat kolestaattisia maksasairauksia eli sapen erityys sappiteiden kautta on estynyt (kolestaasi).

1. Sappea kertyy hepatosyytteihin ja aiheuttaa kroonista inflammaatiota, fibroosia ja lopulta kirroosia.

B. PBC on etiologialtaan tuntematon autoimmuunisairaus, jossa todetaan intrahepaattisten sappiteiden tuhoutumista ja usein ympäröivää granulomatoottista tulehdusta.

1. Ilmenee obstruktiivisena ikteruksena (pääasiassa konjugoitu hyperbilirubinemia).
 - a. Myös kolesteroli on tyypillisesti koholla, sillä sitä ei saada eritettyä sappeen; johtuu tosin pääosin Lp-X:stä, joka on antiaterogeeninen -> hyperkolesterolemiaa hoidetaan vain jos CV-riskitekijöitä
2. Tyypipotilas on n. 40-vuotias nainen (90% naisia).
3. Yhteydessä muihin autoimmuunisairauksiin; spesifisenä havaintona M2-mitokondriovasta-aineet.

C. PSC on etiologialtaan tuntematon intra- ja ekstrahepaattisten sappiteiden segmentaalisesti fibrosoiva ja strikturoiva tulehdustauti (uskotaan olevan autoimmuuniperäinen).

1. Ilmenee obstruktiivisena ikteruksena (pääasiassa konjugoitu hyperbilirubinemia).
2. Tyypipotilas on n. 40-vuotias mies.
3. Biopsiassa havaitaan sipulinkuorimaista periduktaalista fibroosia.
4. Magneettikolangiografiassa havaitaan helminauhamaisuutta (segmentaalinen fibroosi).
5. Yhteydessä tulehduksellisiin suolistosairauksiin, erityisesti ulseratiiviseen koliittiin; p-ANCA on usein positiivinen.
 - a. PSC on yleisin syy paksusuolitulehduksen yhteydessä suurentuneeseen AFOS-pitoisuuteen.
6. Lisää riskiä kolangiokarsinoomalle (kehittyy 10–20 %:lle potilaista).

X. VIRUSHEPATIITIT

B. Maksatulehdusviruksia on viisi päätyyppiä eli A-, B-, C-, D- ja E-virukset, mutta myös mm. CMV, EBV ja HHV-6 voivat aiheuttaa hepatiitteja.

C. Virushepatiitti voi ilmetä akuuttina tai kroonisena.

1. Akuutti hepatiitti tarkoittaa maksan parenkymin inflammaatiota ja hepatosyyttien vauriota, mikä kestää alle 6kk.
 - a. Ilmenee ikteruksena, virtsan tummuutena, kuumeena, pahoinvointina ja kohonneina maksa-arvoina tyypillisellä suhteella (ASAT/ALAT<1).
 - b. Voi myös olla oireeton (maksa-arvojen kohoaminen kuitenkin havaitaan).
 - c. Histologisesti voidaan havaita tulehdussoluja hepatosyyttien välissä lobuluksissa sekä portaali alueella.
 - d. Akuutille itsestään rajoittuvalle virushepatiitille (HAV, HEV) ei ole lääkettä; huom. myös HBV, HCV ja HDV voivat aiheuttaa vaikean akuutin hepatiitin.
2. Hepatiitti arvioidaan krooniseksi, jos se on kestänyt yli kuusi kuukautta.
 - a. Paksuneulabiopsiasta nähdään histologisesti inflammaatiota, joka affisioi pääasiassa portaali alueita; portaali aluetulehdus ei tuhoa maksasoluja eikä johda yksinään fibroosin muodostumiseen.
 - b. Jos tulehdussoluja havaitaan interfaasi alueilla (portaali alueiden reunoilla) ja/tai lobuluksissa, tulehdus on aktiivinen (gradus).
 - iii. Aktiivinen krooninen hepatiitti etenee kirroosiksi.
 - d. Kroonista virushepatiittia aiheuttaville viruksille (HBV, HCV, HDV) on lääkettä, joka vaihtelee aiheuttavan viruksen mukaan.
 - e. Lisää riskiä maksasyövälle.

Taulukko 3 Hepatiittivirukset

Virus	Tartunta	Kroonistuminen	Info
HAV&HEV	Uloste-suu-reitti (saastunut vesi/ruoka; erityisesti matkailijoilla)	Ei (HEV3 mahdollisesti immuunipuutteisilla)	IgM-vasta-aineet osoittavat akuutin hepatiitin, IgG voidaan määrittää immuniteetin muodostumisen tutkimiseksi HEV on raskaana oleville naisille hengenvaarallinen (fulminantti hepatiitti eli maksan vajaatoiminta ja massiivinen maksanekroosi)
HBV	Parenteraalinen (synnytys, suojaamaton yhdyntä, suonensisäiset huumeet)	Mahdollinen (5% aikuisilla, 90% vastasyntyneistä)	Tärkein maksasyövän aiheuttaja maailmanlaajuisesti. N. 1% saa akuutin fulminantin hepatiitin. Serologia auttaa taudin vaiheen

			tutkimisessa (Taulukko __)
HCV	Parenteraalinen (pääasiassa suonensisäiset huumeet, myös suojaamaton yhdyntä)	Mahdollinen (80%)	Infektio on yleensä oireeton ja kroonistuva. Seulotaan HCV- vasta- ainetutkimuksella ja voidaan varmentaa HCV-RNA- määrityksellä (hoidon tavoite on HCV-RNA- negatiivisuus 12. hoitoviikolla).
HDV	Parenteraalinen	Mahdollinen (80% superinfektiossa, vain 2% ko-infektiossa)	Puutteellinen virus, infektio edellyttää HBV:n apua. Superinfektio (HbsAG kantaja saa HDV-tartunnan) on koinfektiota (samanaikaista tartuntaa) vakavampaa ja siihen liittyy akuutti vaikea, mahdollisesti fulminantti hepatiitti.

Taulukko 4 HBV:n serologia

Vaihe	HBsAg	HBeAg ja HBVnH	HBcAb	HBsAb
Akuutti	+	+	IgM	-
Ikkuna	-	-	IgM	-
Parantunut	-	-	IgG	IgG (protektiivinen); huom. voi joskus olla negatiivinen
Krooninen	+ (>6kk -> krooninen)	+/- HBeAg voi olla negatiivinen, mutta HBVnH on ainakin jollain asteella positiivinen. Korkea HBeAg tai HBVnH kuvastaa korkeaa tartuttavuutta	IgG	-

Immunisaatio rokotuksesta	-	-	-	IgG (protektiivinen)
------------------------------	---	---	---	-------------------------

D. Periaatteet HBV:n serologiasta: HBV:lla on kolme merkittävää antigeeniä eli pinta-antigeeni (HBsAg, surface antigen), e-antigeeni (HBeAg) ja ydinantigeeni (HBcAg, core antigen)

1. Näitä vastaan voi muodostua vasta-aineita (HBsAb, HBeAb, HBcAb), jotka voivat tietysti olla taudin vaiheesta riippuen IgM tai IgG (IgM korkealla akuutissa vaiheessa/kroonisen hepatiitin pahenemisvaiheessa, IgG eli kokonaisvasta-aineet koholla kroonisessa vaiheessa)

a. Tavoite on tuottaa vasta-aineita s-antigeeniä vastaan, sillä kun keho on tuottanut IgG-HBsAg, on immuniteetti HBV vastaan; tässä kestää aikaa, ja voi ajatella, että sillä välillä keho tuottaa vasta-aineita ydintä ja e-antigeeniä vastaan

E. Ensimmäinen serologinen markkeri on HBsAg, joka ilmestyy vereen n. 1-3kk tartunnasta (s-antigeeni on pinnalla -> ilmestyy ensimmäisenä). Kertoo, että potilas on sairas.

1. HBeAg ilmestyy seuraavaksi (lähes samaan aikaan) ja kuvastaa viruksen replikaatiota; e-antigeeni sijaitsee pintakuoren ja ytimen välissä ja vapautuu vereen viruksen replikoituessa. Kertoo että potilaalla on aktiivinen infektio ja viremia -> potilas on helposti tartuttava.

a. Viremian määrittämiseksi paras testi on HBV-DNA:n kvantitatiivinen määrittäminen verestä (S-HBV-Nh)

b. Kroonisen HBV-infektion hoitoon vaikuttaa viremia, joka pääasiassa määritellään erikoissairaanhoidossa HBV-Nh-tasolla (aikaisemmin enemmän e-antigeenipositiivisuus/-negatiivisuus)

2. Sitten ilmenee HBcAb (c-antigeeniä ei voi nähdä verestä, sillä se on viruksen sisällä piilossa; infektoituneet hepatosyytit esittelevät c-antigeeniä pinnallaan ja sitä vastaan tuotetaan siten vasta-aineita). Korkea IgM HBcAb kuvastaa akuuttia/vuoden sisällä ollutta infektiota/kroonisen infektion pahenemisvaihetta. Jos HBc-vasta-aineita on, potilaalla on ollut infektio joskus.

3. Sitten ilmenee HBeAb. HBeAb kuvastaa matalaa tartuttavuutta (voi vieläkin olla tartuttava jos HBsAg ei ole negatiivinen).

4. Viimeiseksi ilmenee HBsAb ja kuvastaa immuniteetin muodostumista. Jos pelkästään HBsAb on positiivinen ja muu serologia on blanco niin potilaalla on immuniteetti rokotuksesta.

a. s-antigeeni katoaa s-vasta-aineiden ilmentyessä serologiaan; on kuitenkin ns. ”immunologinen ikkuna”, jossa sekä s-antigeeni että s-vasta-aineet ovat negatiiviset, sillä viruksia on tuhottu tarpeeksi, että niitä ei enää näy serologiassa, mutta s-vasta-aineita ei ole tarpeeksi nähtäväksi. Tällöin vain HBcAb on positiivinen, vaikka virusta ei ole täysin tuhottu kehosta.

XI. MAKSAN PESÄKKEET

A. Suurin osa maksan pesäkemuutoksista ovat hyvänlaatuisia.

B. Yleisimpiä benignejä pesäkemuutoksia ovat kystat, hemangioma, fokaalinen nodulaarinen hyperplasia; adenoomat ovat näihin verrattuna harvinaisia.

1. Kystat liittyvät sappiteiden poikkeavaan kehitykseen; kystia esiintyy kaikissa ikäryhmissä, ovat yleensä oireettomia ja löytyvät sattumalta kaikukuvauksessa.
 - a. Ovat yleisiä ja eivät vaadi hoitoa eikä seurantaa
2. FNH on reaktiivinen proliferatiivinen muutos, jonka taustalla on todennäköisesti maksan valtimoiden malformaatio (havaitaan keskusarpi).
 - a. Ei tarvitse hoitoa eikä seurantaa
3. Hemangioomat (yleisimpiä solideja tuumoreita maksassa) ja adenoomat ovat yhteydessä ehkäisy pillereiden ja anabolisten steroidien käyttöön ja usein regressoivat potilaan lopettaessa käytön.
 - a. Riski ruptuuraan erityisesti raskauden aikana.
 - i. Adenoomat voidaan hoitaa tietyin indikaatioin syöpä- ja ruptuurariskin takia (mm. iso >5cm tai miehellä).
 - ii. Hemangioomia ei yleensä tarvitse hoitaa eikä tyypillisesti vaadi seurantaa raskaudenkaan aikana.
- C. Pahanlaatuiset maksatuumorit ovat yleensä metastaaseja; yleisimmät primaariset maligniteetit ovat maksasolusyövät (hepatosellulaarinen karsinooma, HCC) ja sappitieperäiset kolangiokarsinoomat (CCA).
- D. HCC saa alkunsa hepatosyyteistä ja on yhteydessä kroonisiin maksasairauksiin.
 1. Kirroosi (alkoholikirroosi, MASLD/MASH, hemokromatoosi, Wilsonin tauti, A1AT-puute, krooninen virushepatiitti)
 - a. Myös pelkkä HBV-kantajuus (HBsAg+) ilman kirroosia lisää riskiä syöpäriskille.
 2. Homesienten (mm. Aspergillus) erittämät aflatoksiinit (esim. pähkinöissä) indusoivat p53-mutaatioita ja lisäävät syöpäriskiä.
- D. Havaitaan usein myöhään, sillä maksassa ei ole kipuhermoratoja (vasta maksakapselin venyttyminen aiheuttaa kipuja); huono ennuste (alle 10% viisivuotiselossaoloennuste).
 1. Ensioireet usein laihtuminen, maksan vajaatoiminta tai kasvaimen aiheuttama maksalaskimoiden tukos (sekundaarinen Budd-Chiarin oireyhtymä).
 - a. Budd-Chiarin oireyhtymä tarkoittaa yhden tai useamman suuren maksalaskimon tukkeutumista (yleensä tromboosin aiheuttama eli primaarinen).
 - b. Ilmenee klassisesti vatsakipuna, askiteksena ja maksan suurentumisena.
 2. Käytetyin seerumin tuumomerkkiaine on alfa-fetoproteiini (AFP).
- E. CCA saa alkunsa intra- tai ekstrahepaattisista sappitiehystä ja on yhteydessä krooniseen sappiteiden inflammaatioon ja kolestaasiin.
 1. Tärkeitä riskitekijöitä ovat siis PSC (kehittyy 10-20% potilaista) ja sappitiehytkivet, mutta myös maksakirroosi ja virushepatiitti ovat altistavia.
 2. Yleisiä Kaakkois-Aasiassa parasiittien (Kiinanmaksamato eli Clonorchis sinensis) vuoksi.
- F. Yleisimmät maksaan metastasoivat tuumorit ovat paksusuolen, haiman, keuhkojen ja rinnan karsinoomat.
 1. Havaitaan yleensä myöhään multippeleina noduluksina.

SAPPIRAKKO JA ULKOISET SAPPITIED

I. SAPPIKIVITAUTI (KOLELITIAASI)

- A. Sappirakkoon tai sappiteihin voi kertyä konkrementteja, jotka koostuvat sapen eri ainesosista.
- B. Sappikivet voidaan jakaa koostumuksensa perusteella pääasiassa kolesterolikiviin (80%) ja pigmenttikiviin.
 - 1. Syntyvät kolesterolin tai bilirubiinin (pigmenttikivet) supersaturoidessa sapen, jolloin ne eivät pysty enää liukenemaan sappeen ja saostuvat.
 - a. Sappirakon tyhjenemishäiriö edistää kivien muodostumista antaen nukleaatiolle tarpeeksi aikaa; erityisesti paastossa ja raskailla naisilla.
 - b. Vähentynyt sappihappojen määrä (mm. resiinit) heikentää kolesterolien emulsifikaatiota ja siten lisää kivien muodostumisen riskiä.
 - c. Myös nukleatioajan eli kiteytymiseen vaadittavan ajan kiihtyminen mm. sappiteiden infektioiden yhteydessä lisää kivien muodostumista.
- C. Kolesterolikivet ovat tyypillisesti keltaisia ja radiolusentteja (röntgennegatiivisia).
 - 1. Koostumus on vähintään puolet kolesterolia, suuremmat määrät kalsiumia tekevät niistä radio-opaakkeja (röntgenpositiivisia).
 - a. Ensisijainen tutkimus kolesterolikiviä tutkiessa on ultraääni yleisen röntgennegatiivisuuden takia.
 - 2. Muodostuvat sappirakossa.
 - 3. Riskitekijöitä ovat mm. kaukaasialainen etnisyys, ikä, estrogeeni (naissukupuoli, ehkäisytabletit, useat raskaudet, ylipaino), Crohnin tauti ja kirroosi.
 - a. Tyypipotilas viiden F:n potilas (Fat, Female, Forty, Fertile, Fair).
 - i. Vielä lisää F-riskitekijöitä: Family history, Fasting, Fibrates, Flaming (IBD, erityisesti Crohnin tauti)
- D. Pigmenttikivet ovat tyypillisesti mustia tai ruskeita.
 - 1. Koostuvat bilirubiinista ja kalsiumista.
 - 2. Mustat kivet muodostuvat yleensä steriiliin sappirakkoon ja ovat radio-opaakkeja, kun taas ruskeat kivet muodostuvat sappiteihin ja ovat radiolusentteja.
 - 3. Riskitekijöitä ovat ekstravaskulaarinen hemolyysi (lisää bilirubiinin määrää sapessa) ja sappiteiden infektio (erit. ruskeat pigmenttikivet).
 - a. Bakteerien tai loisten (esim. ascaris lumbricoides eli suolinkainen) beetaglukuronidaasi hydrolysoi bilirubiiniglukuronidit vapaaksi bilirubiiniksi, joka ei ole vesiliukoista ja muodostaa kalsiumin kanssa liukenemattomia suoloja.
- E. Sappikivet ovat yleensä oireettomia, mutta oireillessa aiheuttaa kovan, 1-2 tuntia kestävästä oikean kylkikaaren kipukohtauksen; johtuu tyypillisesti sappirakkoa obstruktiivasta kivistä (sappikoliikki).
 - 1. Voi komplisoitua aiheuttaen akuuttia tai kroonista kolekystiittia, kolangiittia, obstruktiivista ikterusta, sappikivi-ileusta, sappipankreatiittia tai jopa sappirakon karsinoomaa.
 - 2. Oireettomat sappikivet eivät yleensä vaadi hoitoa, komplisoituneet hoidetaan pääsääntöisesti operatiivisesti (kolekystektomia ja tarvittaessa sappiteiden kivien poisto ERCP-teitse).

II. AKUUTTI KOLEKYSTIITTI

- A. Sappirakon seinämän akuutti tulehdus lähes aina johtuu sappikiven aiheuttamasta obstruktiosta (yleensä ductus cysticus), jonka yhteydessä on usein sappirakon bakteerien liikakasvua ja invaasiota (*E. coli* yleisin).
 - 1. Kivetön kolekystiitti (n. 10% tapauksista) ilmenee tyypillisesti vaikeasti sairailta potilailla; mm. suuret leikkaustoimenpiteet, palovammat, vaikea sepsis.
- B. Ilmenee oikeaan olkapäähän säteilevänä oikean kylkikaaren alaisena kipuna, kuumeena, pahoinvointina ja oksenteluna.
 - 1. Labroissa havaitaan kohonnut CRP, valkosolujen määrä (ja AFOS-arvo).
 - 2. Kaikututkimuksessa nähdään sappirakon seinämän paksuuntumista.
 - 3. Murphyn testi positiivinen eli potilas lopettaa sisäähengittämisen käden koskettaessa tulehtunutta sappirakkoa
- C. Hoitamattomana seinämään voi kehittyä gangreeni ja edelleen perforaatio (sappiperitoniitti, sisäinen sappifisteli).

III. KROONINEN KOLEKYSTIITTI

- A. Krooninen sappirakon seinämän tulehdus johtuu lähes aina sappikivien aiheuttamista toistuvista obstruktiosta ja niistä aiheutuvista matala-asteisista tulehduskohtauksista.
- B. Ilmenee tyypillisesti tylppämaisena kipuna oikealla ylkäneljänneksellä ja liittyy usein rasvaisen ruoan nauttimiseen.
 - 1. Verenkuvassa ei välttämättä havaita muutoksia.
 - 2. Histologisesti havaitaan paksuuntunut, lymfosyyttitäyteinen seinämä ja mukoosan työntymistä ympäröivään lihasseinämään (Rokitansky-Aschoffin sinukset).
- C. Myöhäisenä komplikaationa voidaan tavata sappirakon dystrofista kalkkeutumista (kutistunut ja kova ”posliinisappirakko”), mikä lisää riskiä sappirakon karsinomialle.

IV. KOLANGIITTI

- A. Sappiteiden bakteeritulehdus; yleisin aiheuttaja on sappitiekivet erityisesti sapenjohtimessa (coledokolitiaasi)
 - 1. Tyypillisesti muodostuu nousevasti – Enteeriset gramnegatiiviset bakteerit kulkevat ylös sappitietä pitkin ja aiheuttavat infektion.
- B. Ilmenee klassisesti Charcot’n triadina – keski- ja ylävatsan kipu, ikterus ja kuumeilu.
 - 1. Voi johtaa nopeasti henkeä uhkaavaan sepsikseen.
 - a. Sekavuus ja hypotensio + Charcot’n triadi = Reynoldin pentadi
- C. Mirizzin oireyhtymä voi ilmetä samalla tavalla keltaisuutena
 - 1. Kivi sappirakon kaulalla tai ductus cysticuksessa ahtauttaa pääsappitietä ulkopuolisen kompression vuoksi ja aiheuttaa näin obstruktiivisen ikteruksen taudinkuvan
 - a. Tilaan usein liittyy sappirakon ja sappiteiden välinen fisteli

V. SAPPIKIVI-ILEUS

- A. Sappikiven aiheuttama suolitukos; infektoitunut sappirakko kiinnittyy ja puhkeaa pohjukaissuoleen, jolloin sappikivi voi siirtyä suoleen.
 - 1. Suuri sappikivi juuttuu tavallisesti terminaaliseen ileumiin.
- B. Ilmenee sappioireiden helpottamisena ja myöhemmin ilmenevinä suolen okkluusio-oireina.

VI. SAPPIPANKREATIITTI

- A. Akuutti sappipankreatiitti syntyy, kun sappitiekivi kiilautuu Oddin sulkiyalihakseen.
 - 1. Haiman entsyymejä kertyy haimaan ja voi johtaa pankreatiittiin

B. Esiintyy noin 5 %:lla oireisista sappikivipotilaista

VII. SAPPIONGELMIEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO

A. Ylävatsan UÄ tärkein tutkimus sappikivitaudin diagnostiikassa (kolesterolikivet eivät näy TT:ssä)

1. Labroista mm. PVK, CRP, ALAT, AFOS, GT, Bil, amyl

- Sappikoliikissa yleensä viitealueella
- Akuutissa kolekystiitissä tulehdusarvot yleensä selvästi suurentuneet, joskus myös bilirubiini- ja maksa-arvot suurenevat lievästi
- Sappitiekiviin (kolekolistiaasi) viittaavat selvemmin koholla olevat bilirubiini- ja maksa-arvot
- Jos sekä tulehdus-, bilirubiini- että maksa-arvot ovat selvästi suurentuneet, kyse on todennäköisimmin sappitiekivistä ja kehittyneestä kolangiitista

B. Oireetonta sappirakkokivitautia ei yleensä hoideta eikä leikata.

- Leikkausta kannattaa harkita potilailla, joilla on T1DM tai immunosuppressiivinen lääkitys, tai jos posliinisappirakko todetaan nuorehkolla ja muuten leikkaukelpoisella potilaalla. Myös PSC-potilaiden oireettomat sappirakkokivet ovat merkittävän syöpäriskin vuoksi indikaatio sappirakon poistoon

C. Oireisen komplisoitumattoman sappikivitaudin hoito on kolekystektomia eli sappirakon poisto.

- Jo ensimmäisen sappikoliikin jälkeen potilaasta kannattaa tehdä elektiivinen lähete kolekystektomian harkintaan. Toistuvasti oireilevat tulisi leikata muutaman kuukauden kuluessa, vaikeaoireiset vielä nopeammin.

D. Komplisoitunut sappikivitauti hoidetaan aina kiireellisesti operatiivisesti

- Akuutti kolekystiitti tulisi leikata mahdollisimman pian diagnoosista, mieluummin päivystyksenä. Ensiapuna i.v.-nestehoito, kipulääkitys ja i.v. kefuroksiimi.
 - Yleensä leikataan laparoskooppisesti, mutta joskus konvertoitava avoleikkaukseksi
- Kolangiitissa sappitiekivet pyritään aina poistamaan.
 - Sappiteiden magneettikuvaus (magneettikolangiografia, MRCP) on paras kajoamaton diagnostinen tutkimusmenetelmä, jos epäillään sappitiekiviä.
 - Sappitiekivien havaitseminen UÄ:llä voi olla vaikeaa mm. suolikaasujen tai obesiteetin takia, mutta ilman kivien näkemistäkin sappitiet ovat dilatoituneet
 - MRCP otetaan preoperatiivisesti, jos epäillään sappitiekiviä (sappiarvot koholla tai UÄ:ssä sappitiet dilatoituneet).
 - Sappitiekivet poistetaan ensisijaisesti endoskooppisen retrogradisen kolangiografian (ERC-teitse) avulla; toissijaisesti voidaan mennä perkutaanisesti (PTC-teitse)
 - Jos taas sappirakkoa ei ole poistettu ennen ja sappikiviä on sappirakon lisäksi sappiteissä, sappitiekivet tyypillisesti poistetaan ennen sappirakon poistoa ERC-teitse (kaksivaiheinen toimenpide).
 - Jos taustalla on kasvaimen aiheuttama ahtauma -> hoidetaan ERC-teitse endoproteesilla eli stentillä
- Sappikivi-ileuksen hoito on laparaskopia- tai laparotomiateitse tehty enterotomia ja suolitukoksen aiheuttaneen kiven poisto

- a. Taustalla oleva kolekystoduodenaalinen fisteli on itsessään oireeton eikä yleensä vaadi leikkausta. Fisteliin ei kannatakaan koskea kirurgisesti, sillä fistelileikkaus saattaa olla teknisesti hankala ja siihen liittyy suurentunut komplikaatoriski.
4. Akuutti sappipankreatiitti hoidetaan ERCP:n yhteydessä sfinkterotomialla ja kiven poistolla samoin kuten muutenkin sappitiekivien kanssa.
5. Krooninen kolekystiitti hoidetaan laparoskooppisesti kolekystektomialla (samoin kuten akuuttikin)

E. Sappirakkosyöpä löytyy usein sattumalta sappileikkauksen yhteydessä.

VIII. SAPPIRAKON KASVAIMET

- A. Noin 5 %:lla ihmisistä löytyy ylävatsan ultraäänitutkimuksessa sappirakon polyyppi
 1. Valtaosa näistä on niin sanottuja pseudopolyyppeja, jotka ovat täysin hyvänlaatuisia muutoksia. Ne eivät muutu pahanlaatuisiksi, eivätkä ne tarvitse seurantaa tai hoitoa.
 2. Noin joka kymmenes polyyppi on varsinainen hyvänlaatuinen kasvain eli adenooma, jolla on pieni, mutta kliinisesti merkittävä riski (< 1 %) muuttua ajan saatossa pahanlaatuiseksi
 - a. Yli 10 mm:n polyyppit poistetaan kolekystektomialla, sillä ne ovat useimmiten adenoomia
- B. Sappiteiden (kolangiokarsinooma) ja sappirakon syövät (Carcinoma vesicae felleae) yleensä adenokarsinoomia; tärkein altistava tekijä on sappikivitauti (pelkät sappirakkokivet eivät kuitenkaan yleensä ole kolekystektomian indikaatio), erityisesti kun sitä komplisoi krooninen kolekystiitti (varsinkin posliinirakko); muita riskitekijöitä ovat adenoomapolyyppit, primaari sklerosoiva kolangiitti (PSC), ylipaino ja koledokuskystat.
 1. Ilmenee tyypillisesti kolekystiittinä tai ikteruksena vasta levinneessä vaiheessa (huono ennuste; yli puolet kuolee 1. vuoden aikana ja 5v-ennuste n. 20%); yleisempää naisilla.
 - a. Leikkaus ainoa parantava hoito ja tulee kyseeseen vain paikallisessa taudissa
 - b. Etäpesäkkeistä tautia hoidetaan onkologisilla lääkehoidoilla, ja tavoite on silloin pikemminkin tautia jarruttava kuin parantamiseen tähtäävä
 - i. Aika usen hoito on vain palliatiivinen

EKSOKRIININEN HAIMA

I. PERIAATTEET

- A. Haima on sekä eksokriininen elin että endokriininen rauhanen (kts. endokriininen patologia).
- B. Eksokriininen osa koostuu asinuksista ja niiden välitiloista; käsittää n. 85% koko haimasta.
- C. Asinussolut tuottavat ja erittävät ruoansulatusentsyymejä, vettä ja bikarbonaattia, jotka kulkevat haimatiehyiden kautta duodenumiin

II. KEHITYSHÄIRIÖT

- A. Normaalisssa kehityksessä ventraalinen ja dorsaalinen haiman laskutiehyt fuusioituvat yhdeksi haimatiehyeksi; fuusioitumisen epäonnistuessa haima jää kahdeksi erilliseksi rauhaseksi, jolla on erilliset laskutiehyt duodenumiin (pancreas divisum).
 1. Pancreas divisum on n. 10% ihmisillä eikä aiheuta suurimmalle osalle oireita, mutta lisää riskiä pankreatiitille.

- B. Pancreas annulare tarkoittaa tilaa, jossa haimakudos kiertyy poikkeavasti duodenumin ympäri, mikä lisää riskiä vastasyntyneen duodenaaliselle obstruktiolle; assosiaatio Downin oireyhtymään.

III. AKUUTTI PANKREATIITTI

- A. Äkillinen haiman parenkyymin inflammaatio; johtuu ennenaikaisesta haiman ruuansulatusentsyymien aktivoitumisesta ja sitä seuraavasta haiman autodigestiosta.
1. Asinaarisoluissa tuotetut ruuansulatusentsyymit, kuten trypsinogeeni, vuotavat solujen ulkoiseen tilaan asinussoluvaurion seurauksena.
 - a. Aktivoitunut trypsiini aktivoi muita vuotaneita entsyymejä, kuten elastaasin, lipaasin ja fosfolipaasin.
- B. Johtaa haiman parenkyymin nestemäiseen hemorragiseen nekroosiin ja peripankreaattisen rasvan rasvanekroosiin.
- C. Tärkein aiheuttaja on runsas alkoholin kulutus (70%) ja toiseksi tavallisin aiheuttaja sappikivitauti (15-20%); muita aiheuttajia ovat trauma, steroidien käyttö, sikotauti, autoimmuuni, hyperkalsemia ja -triglyseridemia, ERCP, posteriorinen duodenaalisen ulkuksen repeämä, pancreas divisum, tietyt lääkkeet (esim. atsatiopriini, furosemidi, eksenatidi...), haiman tai papillan tuumori, idiopaattinen (5%)
1. I GET PP SMASHED
- D. Kliininen kuva ja diagnosointi
1. Merkittävin oire on ylävatsakipu, joka säteilee n. puolella selkään
 2. Pahoinvointi ja oksentelu
 3. Hemorragiasta johtuva tumma alue navan seudulla (Cullenin oire) tai kyljessä (Gray-Turnerin oire) ilmaantuu päiviä kestäneessä ja vaikeassa haimatulehduksessa
 4. Laboratoriodiagnostiikassa käytetään entsyymimäärityksiä; amylaasi ja lipaasi koholla
 - a. Amylaasi vähemmän spesifinen pankreatiitille ja voi nousta myös monissa muissa tiloissa, esim. ulkustaudissa ja suolinekroosissa; nousee kuitenkin nopeammin (24h sisällä), kuin lipaasi (72-96h sisällä).
 - b. Verikokeissa todetaan usein myös hypokalsemiaa (dystrofien kalkkiutumisen rasvanekroosissa), mutta sen korjaaminen ei ole yleensä aiheellista, sillä korkea solunsisäinen kalsiumpitoisuus on tärkeää entsyymien aktivaatiolle.
 5. Kuvantaminen tarpeellista vain epäselvissä tilanteissa.
 - a. Jos tyyppinen vatsakipu ja amylaasi >3x -> diagnoosi ilman kuvantamista
- E. Komplikaatiot
1. Sokki – yleisin systeemilöydös on hypovolemiasta, joka johtuu tulehdusalueelle kertyvästä nesteestä ja systeemisestä mikroverenkierron häiriintymisestä
 - a. Vaikeassa haimatulehduksessa inflammatorisia välittäjäaineita vapautuu haiman alueelta systeemikiertoon, mikä lisää kapillaarien läpäisevyyttä muissa elimissä (sepsismäinen systeeminen tulehdusreaktio ja elinvaurio).
 2. DIC ja ARDS – systeemikiertoon vapautuneet entsyymit voivat aktivoida koagulaatiotekijöitä sekä vaurioittaa alveoliseinämiä
 3. Pseudokysta ja seinämällinen nekroosi (WON) – pseudokysta ympäröi peripankreatiittista nestekertymää ilman epiteeliä (->pseudo); WON taas kudostuhoalueelle muodostunutta nestemäistä nekroottista kudosta

- a. Voivat suurina aiheuttaa vatsakipujen lisäksi sappi- tai suolitukoksen.
- b. Altis bakteeritulehduksille ja puhjetessa vatsaonteloon voi aiheuttaa peritoniitin.
- ii. Yleisin aiheuttaja E. coli.

IX. KROONINEN PANKREATIITTI

- A. Haiman pitkittynyt tulehdusreaktio, joka johtaa parenkyyminen hitaaseen tuhoutumiseen ja fibroosiin; johtuu yleensä toistuvista akuuteista haimatulehduksista (alkoholi useimmiten), mutta voi kehittyä ilman aikasempaa akuuttia vaihetta.
 - 1. Lapsilla voidaan tavata harvinaisesti perinnöllistä muotoa, joka johtuu yleensä trypsinogeenin (PRSS1) mutaatiosta, jonka takia trypsinogeenin autoaktivaatio on lisääntynyt.
 - a. Kystinen fibroosi on tärkein geneettinen tausta krooniselle pankreatiitille.
- B. Oireet ilmenevät yleensä vasta pitkälle edenneessä vaiheessa, kun haima on laajalti fibroottinen ja normaali lohkorakenne puuttuu.
- C. Kliiniselle kuvalle on tyypillistä jatkuva tilanteen heikkeneminen eikä parantavaa hoitoa ole.
 - 1. Ylävatsakipu, joka voi säteillä vyömäisesti selkään; usein myös pahoinvointia ja oksentelua
 - 2. Rasvaripuli ja rasvaliukoisten vitamiinien vajuus – eksokriinisen haiman vajaatoiminta aiheuttaa malabsorptiota
 - a. Vähentynyt bikarbonaattieritys ja häiriintynyt entsyymieritys matalassa pH:ssa johtaa lipaasin inaktivoitumiseen ja siten steatorreaan sekä ADEK-vitamiinien vajaukseen.
 - b. Ilmeentyy myöhäisessä vaiheessa vasta, kun eritystoiminta on vähentynyt yli 90%.
 - i. Ulosteen elastaasi 1 -mittaus on helpoin ja tärkein mittaus eksokriinisen vajaatoiminnan tutkimisessa; seerumin amylaasi ja lipaasi eivät hyödyllisiä (voivat olla normaaleja tai hieman koholla).
 - 3. Haiman kalkkiumat – TT-kuvauksessa näkyvät haimakalkit ovat käytännössä patognominen löydös; tyypillistä on myös haimatiehyeen dilatoituminen ja helminauhakuvio ("chain of lakes")
 - 4. Sekundaarinen diabetes mellitus – Saarekkeiden solut tuhoutuvat viimeisenä ja ilmenee diabeteksena
 - 5. Lisää riskiä haimasyövälle – n. 4% kehittyy 20 vuoden sisällä haimasyöpä

X. HAIMAN KASVAIMET

- A. Haiman solideista kasvaimista n. 80-90% on haiman duktaalista adenokarsinoomaa.
 - 1. Suomessa vain 3,5% kaikista syövistä, mutta 3. yleisin syöpäkuoleman aiheuttaja (n. 5% viisivuotiselossaolo-osuus) ; tavallisesti yli 60-vuotiaat sairastuvat (mediaani-ikä 73).
- B. Etiologia tuntematon, mutta mm. ikä, tupakointi, runsas alkoholin käyttö krooninen haimatulehdus ja ylipaino.
- C. Kliiniselle kuvalle on tyypillistä oireiden ilmeneminen hyvin myöhään, minkä takia tuumori on ehtinyt metastasoida ja kuolleisuus on hyvin suuri.
 - 1. Ylävatsakipu, joka voi säteillä selkään; ilmenee pankreatiittimaisesti (voi myös aiheuttaa pankreatiitin ja kaikki sen komplikaatiot)
 - 2. Laihtuminen

3. Ikterus ja haaleat ulosteet – Useimmiten kasvain esiintyy haiman päässä, jolloin se voi obstruoida sappiteitä ja aiheuttaa keltaisuutta, jonka yhteydessä voidaan havaita kivuton palpoitavissa oleva sappirakko (Courvoisierin oire).
 - a. Haiman pään kasvain voidaan poistaa pankreatikoduodenektomiassa (Whipplen leikkaus).
 4. Laskimotromboosit ja migroiva tromboflebiitti (Trousseauin oireyhtymä) – Verenkiertoon vapautuvat entsyymit johtavat lisääntyneeseen koagulaatioon, joka voi ilmetä toistuvina laskimotukoksina (SLT) ja pinnallisten laskimoiden tulehduksina useissa eri kehon osissa (migroiva tromboflebiitti).
 5. Kliinisesti käytetyin merkkiaine on hiilihydraattiantigeeni CA 19-9, myös mm. CEA voi olla koholla
- D. Haiman kystiset muutokset ovat usein täysin oireettomia ja löytyvät sattumalta kuvantamistutkimuksissa (insidentalooma)
1. Mahdolliset oireet voivat johtua massavaikutuksesta (kompressoit ympäristöään, sappiteitä tai haimateitä) -> kipu, laihtuminen keltaisuus, pankreatiittialttius
 2. Jaetaan epiteelittömiin ja epiteelillisiin, sekä ei-neoplastisiin ja neoplastisiin muutoksiin
 - a. Epiteelittömiä, ei-neoplastisia muutoksia ovat mm. pseudokystat (pankreatiitin komplikaatio)
 - i. Nice to know: Harvinaisia epiteelittömiä neoplastisia muutoksia ovat mm. lymfangioomat ja sarkoomat. Myös epiteelilliset, ei-neoplastiset kystat ovat harvinaisia; näitä ovat mm. synnynnäiset (kongenitaaliset) haimakystat ja retentiokystat
 - b. Suurimman ryhmän muodostavat epiteelilliset, neoplastiset kystat, jotka ovat ns. varsinaisia haiman kystisia kasvaimia
 - i. Neljä yleisintä kasvaintyyppiä käsittää 90 prosenttia haiman kystisista kasvaimista. Nämä neljä yleisintä ovat intraduktaalinen papillaarinen musinootinainen neoplasia (IPMN, yleisin), musinoosi kystinen neoplasia (MCN), seroosi kystinen neoplasia (SCN) ja solidi pseudopapillaarinen neoplasia (SPN).
 - ii. IPMN-muutokset jaetaan edelleen kolmeen alatyypin: päätiehyen (main duct, MD-IPMN) ja sivutiehyiden (branch duct, BD-IPMN) tautiin sekä edellisten välimuotoon (mixed type, MxT-IPMN)
 - iii. SCN ei vaadi seurantaa tai hoitoa
 - iv. Operatiivisesti hoidetaan (tai ainakin seurataan) IPMN, MCN, SPN
- E. Haiman neuroendokriiniset kasvaimet (NET) käsitellään endokriinisen haiman kappaleen yhteydessä.

12 MUNUAISTEN JA VIRTSAITEIDEN PATOLOGIA

SYNNYNNÄISET HÄIRIÖT

I. HEVOSENKENKÄMUNUAINEN

- A. Yleisin synnynäinen munuaisten rakenteellinen häiriö (n. 1/500).

- B. Munuaiset ovat liittyneet yhteen hevonkengän malliseksi ja sijaitsevat ektoppisesti alavatsaontelossa.
 - 1. Hevosenkenkämunuainen jää kiinni a. mesenterica inferiorin juureen noustessaan pelviksestä.
- C. Toimii normaalisti ja on lähes aina oireeton, mutta alttius hydronefroosille, virtsakivitaudille ja virtsatieinfektioille.
- D. Yhteydessä Turnerin oireyhtymään (45,XO) ja trisomioihin 13,18 ja 21

II. MUNUAISTEN AGENEESI

- A. Munuaisen tai munuaisten kehittymättömyys; unilateraalisenä toinen kompensoi, mutta bilateraalisenä elinkelvoton.
 - 1. Unilateraalinen ageneesi johtaa kehittyneen munuaisen hypertrofiaan.
 - a. Yleensä oireeton, mutta lisää riskiä munuaisen vajaatoiminnalle myöhemmin.
 - 2. Bilateraalissa voidaan raskauden aikana todeta oligohydramnion ja sen aiheuttamana vastasyntyneellä Potterin syndrooma eli tyypilliset litistyneet kasvonpiirteet, retrognatia ja matalasti sijoittuneet korvat, pieni rintakehä ja keuhkojen kypsymättömyys sekä raajojen kehityshäiriöitä.

III. RENAALINEN DYSPLASIA JA RAKKULAMUNUAISTAUDIT

- A. Renaalinen dysplasia on munuaisten synnynnäinen spontaani kehityshäiriö, jossa on kyse nefronien ja duktusten kehityshäiriöstä; munuainen on yleensä suurentunut ja täynnä kystia ja rustoa (multicystic dysplastic kidney, MCDK).
 - 1. Yleensä unilateraalinen, mutta voi olla todella harvoin bilateraalinen, jolloin se tulee erottaa polykystisestä munuaistaudista.
 - a. Unilateraalinen ei yleensä vaikuta elämänlaatuun, mutta bilateraalinen on fataali.
- B. Rakkulamunuaistaudeista yleisin on polykystinen munuaistauti (PKD), joka on munuaisten synnynnäinen periytyvä kehityshäiriö, jossa munuaiset ovat bilateraalisesti suurentuneet ja täynnä korteksissa ja medullassa sijaitsevia kystia.
 - 1. Autosomissa resessiivisesti periytyvä muoto (ARPKD) ilmenee tyypillisesti syntymähetkellä tai varhaislapsuudessa; harvinaisempi muoto.
 - a. Kystia muodostuu kokoojaputkeen; johtuu kromosomin 6 PKHD1-geenin mutaatiosta (PKHD1:n tuottama fibrokystiini on proteiini, jota ilmenee munuaisissa ja maksassa)
 - b. Usein todettavissa viimeisellä kolmanneksella kaikututkimuksessa Potterin syndroomana.
 - c. Lievänä voi ilmetä vasta myöhemmin lapsuudessa pahenevana munuaisten vajaatoimintana ja hypertensiona.
 - d. Assosiaatio maksan synnynnäiseen fibroosiin (periportaalin fibroosi ja sappiteiden proliferoituminen ja laajeneminen), joka ilmenee ennen kaikkea porttilaskimopaineen kasvuna ja sen seurauksina.
 - 2. Autosomissa dominoivasti periytyvä muoto (ADPKD) ilmenee tyypillisesti nuorilla aikuisilla munuaisten jatkuvana kasvuna ja pahentuvana vajaatoimintana, virtsatietulehdusina, hematuriana ja hypertensiona (RAAS-aktivoituminen intrarenaalisen verenkierron heikkenemisen takia; yleensä ensimmäinen oire).
 - a. Kystia muodostuu kaikkiin nefronin osiin

- i. Taustalla yleensä (85%) ajasta kromosomin 16 PKD1-geenin mutaatio (geeni tuottaa polykystiini 1); aiheuttaa vaikeamman taudinkuvan
 - ii. N. 15% tapauksista johtuu kromosomin 4 PKD2-geenin mutaatiosta (polykystiini 2 tuotteena)
 - iii. Polykystiinit 1 ja 2 ovat solukalvon glykoproteiineja, jotka säätelevät solujen sisäistä signalointia mm. munuaisissa, hepatosyyteissä ja verisuonten endoteelissä/sileässä lihaksessa ja sydämessä
 - b. Rakkuloita esiintyy myös muissa elimissä, kuten (erityisesti) maksassa, haimassa ja pernassa.
 - c. Epiteelisolujen muutoksia tavataan mm. sydämessä (läppäviat, erityisesti mitraaliläppäprolapsi), valtimoissa (aivovaltimoiden aneurysmia) ja paksusuoleissa (divertikkelit).
- C. Muita munuaisrakkulatauteja ovat medullaarinen kystinen munuaistauti, nefronoftiisi, tuumorisyndroomiin yhteydessä olevat kystat (mm. tuberoosiskleroosi, Meckelin oireyhtymä ja Von Hippel-Lindau tauti) ja medullaarinen sienimunuainen.
 - 1. Medullaarinen kystinen munuaistauti (autosomissa vallitsevasti) ja nefronoftiisi (autosomissa resessiivisesti) muodostavat medullaarisen kystisen tautikompleksin; tyypillistä määrältään vaihtelevat medullaariset tai kortikomedullaariset rakkulat, progressiivinen tubulaarinen atrofia ja glomeruloskleroosi ja väistämätön eteneminen kohti vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa
 - a. Medullaarinen kystinen munuaistauti on huono nimi, sillä suurella osalla potilaista ei ole rakkuloita eivätkä ne ole diagnostinen kriteeri; pääasiassa biopsiassa nähdään diffuusi tubulointerstitiaalinen fibroosia -> uusi nimi on autosomaalisesti dominantti tubulointerstitiaalinen munuaistauti (ADTKD)
 - i. Tubulusten toimintahäiriönä todetaan miltei kaikilla potilailla jonkinasteinen väkeväimiskyvyn vaje
 - 2. Medullaarinen sienimunuainen on suhteellisen tavallinen (jopa 1:5000) useimmiten ei-periytyvä synnynnäinen kehityshäiriö, jossa kystia muodostuu terminaalisiin kokoojaputkiin.
 - a. Tautia sairastavat ovat yleensä oireettomia ja epätietoisia taudistaan. Diagnoosi tehdäänkin useimmiten 40–60 vuoden iässä selvitetessä virtsakivitaudin, hematurian tai virtsatieinfektion taustoja (tärkeimmät kliiniset ilmentymät)
 - i. Ei useimmiten johda munuaisten toiminnan heikkenemiseen, elleivät em. manifestaatiot ja niistä ennen kaikkea kivitauti sitä tee
 - ii. Vaikea diagnosoida ultraäänellä, pääasiassa kontrasti-TT:llä diagnoosi

AKUUTTI MUNUAISVAURIO (AKI)

I. PERIAATTEET

- A. AKI tarkoittaa munuaisten toiminnan nopeaa (päivissä; määritelmän mukaan <7vrk; kun 1vk-3kk -> akuutti munuaissairaus (AKD)) huononemista; glomerulusten suodatuskyky (GFR) heikentyy äkillisesti.
 - 1. Huom! GFR on laskennallinen arvo ja se useimmiten lasketaan P-Krean (kreatiniini) perusteella. Kreatiniini on hitaasti nouseva arvo, joten laskennallinen GFR ei kerro todellista GFR:ää akuutissa tilanteessa.

- a. Kreatiniinin tulkitsemisen vaikeutta lisää myös lihasmassan vaihtelut, korkea ikä, nestehoito, vajaaravitsemus...
 - b. NGAL (neutrophil gelatinase associated lipocalin) on AKI:ssa muutamassa tunnissa kohoava munuaistubuluksen epiteelin syntetisoima proteiini, joka on lupaava Kreaan korvaava mittari; ei kuitenkaan rutiinikäytössä.
 2. Ajatusharjoitus: Solmin munuaisvaltimosi umpeen nyt. Mikä on GFR:si?
 - a. 0. Jos ottaisın nyt verinäytteen, mikä olisi kreatiniinisi?
 - b. Normaali. Tämän takia laskettu GFR olisi normaali, mutta lääkkeet tulee kuitenkin annostella oikean GFR:n mukaisesti.
 - c. Toisin päin: injektoin ruiskun täynnä kreatiniinia suoneesi. Mikä on laskennallinen GFR:si? Todella korkea. Kuitenkin oikea GFR on hyvä ja kreatiniiniarvosi laskee hiljalleen.
- B. Tunnusmerkkinä on aina nopeasti kehittyvä atsotemia ja tavallisesti havaitaan myös oliguriaa tai anuriaa (mutta ei aina! intrarenaalisissa syissä voi olla jopa virtsaamisen lisääntymistä konsentraatiohäiriön takia).
1. Atsotemia tarkoittaa veren typpiyhdisteiden (mm. urea ja kreatiniini) pitoisuuden nousua
 - a. Kun atsotemia alkaa ilmetä kliinisesti eli urea nousee tarpeeksi korkeeksi, sitä kutsutaan uremiaksi; mahdollisia piirteitä ovat mm. enkefalopatia, perifeerinen neuropatia, oksentelu, kutina, perikardiitti
 - b. Molemmat urea ja kreatiniini filteröityvät glomeruluksessa, mutta kreatiniinia ei voida reabsorboida takaisin munuaisissa, kun taas ureaa voidaan.
 - i. Tietoa voidaan käyttää ns. urea/krea-suhteen (BUN/creatinine ratio) laskemisessa ja sen avulla AKI:n etiologian päättelyssä, mutta tätä ei käytetä kovinkaan paljoa kliinisesti, vaikka monissa opetusvideoissa siitä vaahdotaan (USMLE-tenteissä hyödyllisiä työkaluja).
 2. Oliguria eli vähävirtsaisuus tarkoittaa tilaa, jossa vuorokautinen virtsan määrä on <400 ml.
 - a. Anuria = alle 100ml/vrk
 3. AKI on KDIGO-kriteerien perusteella kyseessä, kun joku seuraavista täyttyy:
 - a. S-Kreaan suureneminen > 26,5 $\mu\text{mol/l}$ 48 tunnin aikana
 - b. Vähintään 1,5-kertainen suureneminen perustasosta edellisten 7 vuorokauden aikana
 - c. Virtsaneritys < 0,5 ml/kg/h vähintään 6 tunnin ajan
- B. Kohonneen Kreaan havaitsemisen jälkeen tulee ajatella onko potilaalla täysin uusi AKI, CKD vai acute-on-chronic AKI
1. CKD (krooninen munuaistauti) tarkoittaa munuaisvauriota, joka on kestänyt ≥ 3 kk
 2. Luokittelu AKI:ksi on selvästi helpompaa, jos tiedetään aikaisempi kreatiniinitaso; jos ei ole tiedossa, niin mm. ultraääni auttaa erottamaan kroonisesta vajaatoiminnasta (CKD).
 - a. Jos UÄ:ssä munuaiset ovat pienet on kyseessä todennäköisesti krooninen tilanne. Muita CKD:n suuntaan vihjaavia tekijöitä ovat mm. oirehistoria (pitkäkestoinen väsymys, hypertensio, pruritus, pahoinvointi), normosyyttinen anemia tai viitteet renaalisesta osteodystrofiasta.

- i. Mikään testi ei kuitenkaan pysty täydellisesti poissulkemaan acute-on-chronic AKIa.

C. Syyt voidaan ryhmittää prerenaalisiin (syy ennen munuaisia), renaalisiin (syy munuaisten sisäinen) ja postrenaalisiin (syy munuaisten jälkeinen).

- 1. AKI ei siis suoraan tarkoita, että olisi tapahtunut vaurio itse munuaisissa; voi olla AKI ilman itse munuaisparenkymin vauriota.

II. PRERENAALINEN AKI

A. Munuaisten hypoperfuusio johtaa GFR:n laskuun ja sitä seuraavaan atsotemiaan ja oliguriaan, vaikka itse munuaiset toimivat normaalisti.

- 1. Syynä on useimmiten hypotensio joko oikean verivolyymin supistumisen (esim. diureesi, ripuli, palovammat, verenvuoto, vähäinen juonti), vähentyneen sydämen minuuttitilavuuden tai systeemisen vasodilataation (sepsis, anafylaksia, maksakirroosi) kautta; syy voi myös olla obstruktiivinen (munuaisvaltimotukkeuma) tai johtua glomeruluksen autoregulaation häiriöstä (usein lääkkeellinen, kuten ACEi/ATR-salpaajat, NSAIDit)
 - a. Sydämen vajaatoiminnan aiheuttamaa munuaisten vajaatoimintaa kutsutaan kardiorenaaliseksi oireyhtymäksi
 - b. Kirroosin aiheuttamaa munuaisten vajaatoimintaa kutsutaan hepatorenaaliseksi oireyhtymäksi (HRS)
 - i. Maksakirroosi -> Portahypertensio -> suoliston alueen hiussuonipaineen nousu -> kompensatorinen vasodilataattorien erittyminen -> suoliston alueen (myös systeeminen) vasodilataatio -> systeemisen vaskulaariresistenssin tippuminen ja veren pakkautuminen suolistoon -> pääte-elinten (munuaisten) hypoperfuusio -> vasokonstriktorijärjestelmien (esim. RAAS, sympaattinen hermosto, AVP) aktivaatio -> renaalinen vasokonstriktio -> munuaisten perfuusio vähenee entisestään -> AKI
 - ii. Tilanteeseen vaikuttaa myös mm. maksan vajaatoiminnan aiheuttama hypoalbuminemia, joka johtaa ödeemaan ja ns. "third-space" verivolyymin menetykseen kudokseen -> munuaisten hypoperfuusio

B. Havaittu hypovolemia johtaa verivolyymin palauttamiseen pyrkivään reaktioon eli virtsaan erittyvä natrium vähenee ja virtsamäärä pienenee samalla kun nestettä ja ureaa reabsorboidaan enemmän.

- 1. Urea/Krea-suhde >20 (ei erityisen tärkeä mittari; hyvä tunnistaa, sillä siitä puhutaan todella monella opetusvideolla yms.)
- 2. Virtsan osmolaalisuus on normaali/suurehko (>500 mosm/kg) ja natriumpitoisuus pieni (< 20 mmol/l) ja fraktionaalinen natriumin erityys (FENa) $< 1\%$.
 - a. Näitä mittareita ei myöskään käytetä kovinkaan paljoa, mutta voivat olla hyödyllisiä erotusdiagnostiikassa. Auttavat myös ymmärtämään patofysiologiaa.
 - i. Ongelmia ilmenee mm, jos potilaalla on aikaisempi CKD, diureettien käyttöä, oksentelua

C. Prerenaalinen vajaatoiminta korjautuu, kun altistavat tekijät poistuvat.

1. Tauota ongelmalliset lääkkeet (metformiini, NSAID:t, ACEi/ARB, SGLT2i...), optimoi hemodynamiikka (tarkoin seurattu nesteytys, hypotensiivisilla potilailla inotropit/vasopressorit esim. noradrenaliini, volyymiylimäärässä (sydämen vajaatoiminta) loop-diureetit), korjaa elektrolyyttihäiriöt (esim. hyperkalemia)

D. Jatkuessaan munuaisen verenkierron vajaus johtaa renaaliseen iskemian aiheuttamiin kudosaivuriioihin ja kehittyy ns. akuutti iskeeminen tubulusnekroosi (ATN).

1. Prerenaalinen AKI (ja postrenaalinen AKI) ja sen aiheuttama renaalinen AKI (ATN) ovatkin jatkumolla.

- a. Tämän takia FENa ei ole kovinkaan hyvä, sillä FENa:n ollessa $<1\%$, voi kyseessä olla käytännössä mikä tahansa AKI.

III. POSTRENAALINEN AKI

A. Munuaisista distaalisten virtsateiden obstruktio häiritsee virtsan ulosvirtausta (obstruktiivinen uropatia/nefropatia) ja johtaa GFR:n laskuun ja sitä seuraavaan atotemiaan ja oliguriaan; täydellinen anuria on yleensä postrenaalista syystä johtuvaa.

1. Syy voi olla mm. virtsatiekivi tai BPH tai jopa ulkoinen kompressio (esim. tuumori).
2. Normaali diureesi ei poissulje osittaista obstruktiota ja merkittävässäkin obstruktiossa potilas voi virtsata (usein tihentynyttä; ns. ylivuotoinkontinenssi)
3. Toisen puolen obstruktio ei aiheuta AKIa, jos molemmat munuaiset ovat terveet.

B. Yleensä helppo diagnosoida ultraäänellä

1. Nähdään hydronefroosia (postrenaalinen obstruktio johtaa nesteen kertymiseen munuasiin, nähdään ultraäänessä) (ja obstruktion lokaatiosta riippuen hydroureter tai laajentunut rakko (BPH, neurogeeninen rakko))
2. Epäselvässä tapauksessa TT voi vahvistaa tai poissulkea diagnoosin

C. Ilmenee suhteellisen samoilla laboratorioarvoilla kuin prerenaalinen; lisääntynyt tubuluspaine pakottaa urean reabsorptiota (Urea/Krea-suhde >15) samalla kun tubulusten toiminta on vielä normaalia (virtsan osmolaalisuus > 500 mosm/kg, virtsan natriumpitoisuus pieni < 20 mmol/l ja FENa $<1\%$).

1. Pitkäaikaisessa obstruktiossa tubulukset vaurioituvat, mikä ilmenee renaalisen AKI:n laboratorioarvoilla: Urea/Krea-suhde < 15 , virtsan osmolaalisuus < 350 mosm/kg, virtsan natriumpitoisuus $> 20-40$ mmol/l ja FENa $> 2\%$.

- a. Samoin käy prerenaalisessa

B. Postrenaalinen vajaatoiminta paranee obstruktion poistuessa tai ohittamalla se (katetri).

IV. (INTRA)RENAALINEN AKI

A. Monta eri etiologiaa ja selvittely yleensä monimutkaisempaa kuin prerenaalisen/postrenaalisen.

1. Etiologiat kannattaa jaotella munuaisten affisioituneiden osien perusteella: tubulaarinen, interstitiaalinen (tubulointerstitiaalinen, tubulukset ja interstitium yleensä affisioituvat yhdessä), glomerulaarinen, intrarenaaliset verisuonet

B. Yleensä (n. 85%) johtuu akuutista tubulusnekroosista (ATN), missä tubulusten solut kuolevat, mikä häiritsee nefronin toimintoja ja aiheuttaa GFR:n laskua ja sitä seuraavaa atotemiaa ja mahdollista oliguriaa; virtsassa voidaan havaita mikroskopoinnissa ruskeita granulaarisia sakkautuneita tubulussoluja ("muddy brown casts").

1. Syy voi olla iskeeminen tai nefrotoksinen tai näiden yhdistelmä.
 - a. Iskeeminen – vähentynyt verenkierto tubulussoluihin johtaa nekroosiin; yleensä aikaisempi prerenaalinen AKI taustalla.
 - i. Erityisesti proksimaalinen tubulus ja paksun nousevan Henlen lingon medullaarinen segmentti ovat alttiita iskeemiselle vauriolle.
 - b. Nefrotoksinen – toksiset tekijät suoraan vaurioittavat tubulussoluja; esim. lääkkeet (mm. aminoglykosidit), myoglobiini (rhabdomyolyysi), varjoaine ja kidenefropatiat (mm. etyleeniglykoli, uraatti (tuumorilyysioireyhtymä), asikloviiri)
- C. Vaurio johtaa aluksi oliguuriseen vaiheeseen, mutta vaurion parantuessa virtsaneritys alkaa lisääntyä (diureettinen vaihe) ja lopulta toiminta palaa suhteellisen normaaliksi.
 1. Oliguurinen(/normaalin diureesin) vaihe – tubulustoiminnan häiriö johtaa vähentyneeseen urean reabsorptioon (Urea/Krea-suhde < 15), vähentyneeseen natriumin reabsorptioon (virtsan natriumpitoisuus > 20-40mmol/l ja FENa > 2%) ja virtsan konsentroinnin estymiseen (virtsan osmolaalisuus < 350 mosm/kg).
 - a. Vakava ATN voi johtaa hengenvaaralliseen hyperkalemiaan (kaliumin erityksen estyminen) ja metaboliseen asidoosiin (vetyionien erityksen ja bikarbonaatin reabsorption estyminen).
 2. Diureettinen vaihe – Tubulustoiminnan palaaminen muutaman viikon kuluessa vauriosta (stabiileja soluja) voi johtaa polyuriaan, joka voi johtaa ilman seurantaa hypovolemiaan ja hyponatremiaan.
- D. Myös akuutti (tubulo)interstitiaalinen nefriitti (ATIN, AIN) voi aiheuttaa renaalisen AKI:n.
 1. Interstitiumin (ja levinneenä tubulusten) tulehdus, joka johtuu lääkkeen (allerginen nefriitti) tai harvemmin virusinfektion (mm. puumala-virus eli myyräkuume) indusoimasta immunologisesta yliherkkyysoireyhtymästä; myös autoimmuunitilat (esim. TINU eli tubulointerstitiaalinen nefriitti ja uveitti -oireyhtymä) ja infiltraatio (esim. sarkoidoosi) voivat olla taustalla
 - a. Yleisimmät aiheuttajat ovat tulehduskipulääkkeet, antibiootit (erityisesti penisilliini) ja diureetit.
 2. Ilmenee oliguriana ja mahdollisena eosinofiliaa (lopulta valkosolusakkautumina) virtsassa sekä toisinaan myös flunssan kaltaisena taudinkuvana (mm. kuume) tai ihottumana; myös kylkikipu yleistä (munuaisten aristus)
 - a. Ns. klassinen allergisen AIN:n triadi: kuume, ihottuma ja eosinofilia (näkyvää vain harvoin täydellisenä)
 3. Interstitiaalinen tulehdus voi myös olla muutakin kuin immunologista; tulehdus ja/tai iskemia (mm. obstruktio, kompressio) voi johtaa papillanekroosiin, joka ilmenee hematuriana ja kylkikipuna; tyypillisiä aiheuttajia ovat krooninen tulehduskipulääkkeiden käyttö, diabetes mellitus, sirppisoluanemia ja vakava akuutti pyelonefriitti (munuaisten infektio).
 - a. Papillanekroosi ei tyypillisesti aiheuta unilateraalista AKIa (yleisestikin unilateraaliset prosessit muuten tervemunuaisilla eivät aiheuta AKIa)
- E. Glomerulaarinen vaurio voi johtua mm.
 1. Hematologinen syy: HUS tai TTP
 2. Inflammaatio: nefroottiset ja nefriittiset oireyhtymät (yleensä aiheuttavat munuaisten kroonista vajaatoimintaa)

- a. Mm. kuitenkin nopeasti etenevä glomerulonefriitti ja postinfektioosi glomerulonefriitti voivat aiheuttaa akuutin munuaisvaurionkin.
- 3. Virtsassa voidaan havaita sakkautuneita dysmorfisia punasoluja
- F. Intrarenaalisten verisuonien aiheuttamasta AKI:sta klassinen esimerkki on hypertensiivinen hätätilanne (maligni hypertensio), joka aiheuttaa hyperplastista arterioloskleroosia.
- G. Diagnostiikassa ei useimmiten oteta munuaisbiopsiaa, mutta on mahdollinen diagnostinen testi, jos pre- ja postrenaalinen AKI sekä iskeeminen/nefrotoksinen AKI ovat epätodennäköisiä ja diagnoosi ei ole selvä
 - 1. Hoitona on suurimmassa osassa tapauksista odottelu, haitallisten tekijöiden lopettaminen ja joskus immunosuppressio (esim. glomerulonefriitit)

GLOMERULUSTEN TAUDIT

I. PERIAATTEET

- A. Munuaisten glomerulukset eli munuaiskeräset filtteröivät verta alkuvirtsaan; glomerulusten vaurio häiritsee suodatusestettä ja johtaa siihen, että virtsaan pääsee asioita, joiden ei tulisi olla siellä.
 - 1. Suodatuseseen muodostavat munuaiskeräsen kapillaarisykerön seinämän endoteelisolut (aukolliset, fenestroidut) -> niiden tyvikalvo (GBM, glomerular basement membrane) -> epiteelisolut eli podosyytit (näiden jalkalisäkkeiden väliin jää aukkoja, joita peittää ohut kalvo (slit diaphragm, joka koostuu pääasiassa nefriinistä)
 - a. Tyvikalvo on kolmiosainen ja on pääasiassa negatiivinen -> hylkii negatiivisia plasmaproteiineja, kuten albumiinia -> tyvikalvovauriossa albumiinia pääsee kalvon läpi normaalia enemmän
 - i. Podosyyttien jalkalisäkkeetkin ovat negatiivisia -> vaurioituessa albumiinia pääsee enemmän suodatuseseen läpi
 - ii. Albumiinia pääsee normaalistikin hieman virtsaan (n. 8-10mg/päivä)
 - b. Glomeruluksen tulehduksessa (glomerulonefriitti) endoteeli vaurioituu -> punasoluja pääsee suodattumaan -> hematuria
 - i. Hematuria ei aina viittaa glomerulonefriittiin, mutta ns. glomerulaariseksi hematuriaksi kutstuaan hematuriaa, jossa todetaan punasolulieriöitä ja/tai dysmorfisia punasoluja; punasolulieriöt (ja muutkin lieriöt) muodostuvat Henlen lingon paksussa nousevassa osassa, johon Tamm-Horsfall-proteiinia eritetään. Proteiini sitoo lumenin sisäisiä kappaleita ja muodostaa mikroskoopin alla nähtäviä erilaisia lieriöitä
 - ii. Samaan aikaan vaihtelevan asteista proteinuriaa
 - iii. Glomerulonefriitissa voidaan usein myös todeta steriiliä pyuriaa eli valkosoluja virtsassa ilman virtsateiden bakteeri-infektiota
 - 2. Glomeruluksen tukikudoksena on hiussuonien välissä mesangium
- B. Glomerulopatiat eli glomeruluksen vauriot voidaan pääpiirteisesti jakaa immunologiseen ja ei-immunologiseen
 - 1. Immunologinen johtuu useimmiten paikallisesti muodostuvista antigeeni-vasta-aine-komplekseista (in situ) tai verenkierron mukana tulleista

immuunikomplekseista, jotka aktivoivat komplementtia ja kutsuvat paikalle tulehdussoluja

- a. Voi myös mm. olla suoraa komplementin aktivaatiota (C3-nefropatiat)
 - b. Aina ei ole selvää, onko tauti ns. immunologinen vai ei; esim. minimal change -taudin oletetaan olevan T-solujen tuottamien sytokiinien välittämä, mutta itse glomeruluksessa ei todeta kertymiä tai tulehdusta.
2. Ei-immunologiset glomerulopatiat voidaan jakaa geneettisiin, metabolisiin ja iskeemisiin/toksisiin; eivät ilmene tulehduksellisena infiltraattina/immuunikompleksien kertymisenä biopsioissa
- a. Geneettiset: esim. Alportin oireyhtymä
 - b. Metaboliset: diabeteksen munuaistauti, amyloidoosi
 - c. Iskeeminen/toksinen: Lääkkeet, raskasmetalliset
- C. Glomerulopatioiden taudinkuvat voidaan jakaa nefroottiseen ja nefriittiseen syndroomaan, näiden yhdistelmään tai vain lievään hematuriaan/proteinuriaan ilman oikean syndrooman piirteitä
1. Nefroottisessa oireyhtymässä virtsan proteiinieritys on $>3\text{--}3,5\text{g/vrk}$ (U-AlbKrea-suhde $>200\text{ mg/mmol}$), mikä aiheuttaa tyypilliset seuraamukset:
 - a. Hypoalbuminemia ($<25\text{--}30\text{g/l}$) – perifeerinen kuoppautuva ödeema, periorbitaalinen ödeema
 - i. Määritelmällisesti nefroottinen oireyhtymä = päivävirtsan proteiini $>3\text{--}3,5\text{g}$ ja seerumin albumiini $\leq 25\text{--}30\text{ g/l}$ ja ödeeman toteaminen
 - ii. Maksa yrittää kompensoida kiihdyttämällä proteiinisynteesiä -> aiheuttaa myös hyperlipidemiaa -> Rasvaiset sedimentit virtsassa
 - b. Hypogammaglobulinemia – infektioriski
 - c. AT III:n menetys virtsaan – hyperkoagulatiivinen tila
 2. Nefriittisessä oireyhtymässä virtsan proteiinieritys on $<3\text{--}3,5\text{g/vrk}$, mutta todetaan:
 - a. Hematuria – Punasolusedimenttejä ja dysmorfisia punasoluja virtsassa
 - i. Usein myös steriili pyuria (valkosoluja virtsassa ilman bakteriuriaa)
 - b. Oliguria ja atsotemia
 - c. Hypertensio – GRF:n lasku ja veden/suolan retentio -> perifeerinen/periorbitaalinen ödeema, painonnousu ja hypertensio
 3. Yhdistelmässä voi olla esim. hematuriaa, GFR:n laskua, ödeemaa ja nefroottistasoista proteinuriaa.
 4. Sama taustapatologia voi moniassa tapauksissa aiheuttaa toiselle ihmiselle nefroottisen ja toiselle nefriittisen oireyhtymän; tyypillisesti taudit vain jaotellaan sen perusteella, kumpaa ne aiheuttavat pääasiassa.
- D. Diagnoosit perustuvat useimmiten munuaisbiopsiaan, josta voidaan tutkia valomikroskopia, elektronimikroskopia ja immunofluoresenssi.
1. Immunofluoresenssissa voidaan tutkia immuunikompleksien asettumista: onko kyseessä lineaarinen vai granulaarinen kuva; voidaan myös osoittaa, mistä kertymät koostuvat (IgG, C3, C1q...)?
 2. Elektronimikroskopiassa nähdään mihin kertymät ovat sijoittuneet (subendoteliaalinen, subepiteliaalinen, intramembranoosi, mesangiaalinen)
- E. Kaikki glomerulustaudit voivat johtaa munuaisten vajaatoimintaan (usein krooniseen (CKD), mutta välillä akuuttiinkin (AKI)).

F. Selkeästi sanottuna, seuraavia tauteja kannattaa ajatella seuraavan skeeman kautta:

1. Todettavissa lisääntyntä albuminuriaa tai glomerulaarista hematuriaa -> glomerulopatia
2. Onko kyseessä immunologinen prosessi (glomerulaarinen hematuria/pyuria/biopsiassa tulehdusta)?
 - a. Jos on tulehdusta, tila on glomerulonefriitti
 - i. Biopsian perusteella tarkempi diagnoosi.
 - b. Jos ei ole tulehdusta, tila on jokin muu glomerulopatia
3. Onko kyseessä nefroottisena vai nefriittisenä oireyhtymänä vai molempina vai vain lievänä proteinuriana/hematuriana ilmenevä tauti?
 - a. Nefroottinen oireyhtymä: runsas proteinuria + hypoalbuminemia -> ödeema, infektioriski, hyperkoagulatiivinen tila
 - b. Nefriittinen oireyhtymä: lievempi proteinuria, hematuria, vähentynyt filtraatio -> hypertensio, oliguria, ödeema
 - c. Lievä hematuria/proteinuria, mutta ei oikein kummankaan oireyhtymän ilmentymiä (esim. IgA-nefropatia ja Alportin oireyhtymä; seuraavassa tekstissä listattu nefriittisten oireyhtymien alle, koska edenneenä voivat aiheuttaa sen ilmentymiä)
 - d. Molemmat: nefroottistasoinen proteinuria, hematuria, vähentynyt filtraatio

NEFROOTTISENA OIREYHTYMÄNÄ MANIFESTOITUVAT TAUDIT

I. VÄHÄMUUTOKSINEN NEFROPATIA (MINIMAL CHANGE DISEASE, MCD, MCN)

- A. Tavallisin syy lasten nefroottiselle oireyhtymälle (70-90% tapauksista), mutta esiintyvyys laskee murrosiän jälkeen (10-15% aikuisten tapauksista).
- B. Yleensä etiologia on idiopaattinen (primaarinen podosytopatia), mutta voi myös olla assosioitunut mm. maligniteetteihin (Hodgkinin lymfooma).
 1. Uskotaan olevan T-solujen tuottamien sytokiinien aiheuttamaa; glomeruluksen podosyytit ja tyvikalvo (anionit) vaurioituvat laaja-alaisesti, mikä johtaa selektiiviseen proteinuriaan (albumiinin menetys, mutta tyypillisesti ei immunoglobuliinin).
- C. Valomikroskopia ja immunofluoresenssilöydökset ovat lähes normaalit (vähämuutoksen).
1. Valomikroskopiassa (H&E-värjäys) glomeruluksissa ei muutoksia; proksimaalisen tubuluksen soluissa saatetaan nähdä lipidikertymiä (lipoid nephrosis).
 2. Elektronimikroskopiassa havaitaan podosyyttien jalkalisäkkeiden yhteensulautumista/tuhoutumista.
 3. Immunofluoresenssi on negatiivinen eli immunokompleksien kertymistä ei havaita
- D. Koska T-solujen aiheuttamaa, voidaan hoidossa käyttää glukokortikoideja; ennuste hyvä, vaikka uusiutuu usein.

II. FOKAALINEN SEGMENTAALINEN GLOMERULOSKLEROOSI (FSGS)

- A. Yleinen (tummaihoisten yleisin) aikuisten nefroottisen oireyhtymän aiheuttaja, mutta ilmenee myös lapsilla kohtalaisen yleisesti.
- B. Etiologia on yleensä idiopaattinen, mutta voi olla assosiaatio mm. HIV-infektioon, heroiinin käyttöön, sirppisolutautiin, synnynnäisiin munuaismalformaatioihin tai metaboliseen oireyhtymään (sairaalainen lihavuus BMI $\geq 40 \text{ kg/m}^2$).

1. Idiopaattisen muodon ajatellaan olevan usein MCN:n vaikeampi (myöhempi?) muoto.

C. Mikroskopia:

1. Valomikroskopiassa osassa glomeruluksista (fokaalinen) on glomeruluksen osan (segmentaalinen) skleroosia ja hyalinoosia.
2. Elektronimikroskopiassa havaitaan podosyyttien jalkalisäkkeiden yhteensulautumista.
3. Ei immunofluoresenssihavaintoja.

D. Glukokortikoidivaste on paljon huonompi ja hitaampi kuin vähämuutoksisessa nefropatiassa; ennuste huono ja etenee usein krooniseen munuaisten vajaatoimintaan.

III. MEMBRANOOSI GLOMERULONEFRIITTI (MGN)

A. Yleinen (valkoihoisten yleisin) aikuisten nefroottisen oireyhtymän aiheuttaja.

B. Etiologia on yleensä idiopaattinen, mutta voi olla assosiaatio mm. HBV/HCV-infektioon, syöpätauteihin, immunologisiin tauteihin (mm. SLE -> tyypin V lupusnefriitti = membranoosi lupusnefriitti) tai lääkkeisiin (mm. NSAIDit, probenesidi, penisillamiini).

1. Patogeneesi on selvästi immunologinen (autovasta-aineita transmembraanista fosfolipaasi A2-reseptoria vastaan) ja tyvikalvon ulkopuolelle epiteelisolujen alle kertyvät immunokompleksit ja aktivoivat komplementtisysteemiä, mikä vaurioittaa podosyyttejä ja tyvikalvon negatiivista varausta.

C. Mikroskopia

1. Valomikroskopiassa havaitaan glomeruluskapillaarien paksuuntuneet tyvikalvot.
2. Elektronimikroskopiassa havaitaan subepiteelisiä kertymiä, jotka taudin kehittyessä saavat reunoilleen uutta tyvikalvomateriaali (piikkimäiset ulokkeet, matala kampamaisuus, spike and dome) ja lopulta täysin sulautuvat tyvikalvoon; usein eri vaiheissa olevia kertymiä havaitaan samaan aikaan.
3. Immunofluoresenssissä havaitaan pienijyväinen (granulaarinen) kuva, joka johtuu diffuuseista subepiteeliaalisista IgG-saostumista (spike and dome-appearance).

D. Huono glukokortikoidivaste; ennuste yleensä hyvä, mutta etenee n. 1/4 potilaista krooniseksi munuaisten vajaatoiminnaksi.

IV. MEMBRANOPROLIFERATIIVINEN GLOMERULONEFRIITTI (MPGN)

A. Harvinainen aikuisten ja varttuneiden lasten glomerulonefriitti (n. 5-10% tapauksista).

B. Etiologia yleensä idiopaattinen; mutta immuunikompleksivälitteinen MPGN (IC-MPGN, aikaisempi tyyppi I) voi olla assosioitunut mm. SLE:hen tai infektioihin (mm. HBV, HCV, puumala).

1. Patogeneesiin liittyy komplementin klassisen tien tai oikotiereitin aktivaatiosta seuraava immunoglobuliinien tai komplementin osien tarttuminen ja saostuminen munuaiskeräsiin; immunofluoresenssilöydöksen perusteella membranoproliferatiivinen glomerulonefriitti jaetaan immuunikompleksivälitteiseen (IC-MPGN, Ig-MPGN) (vanha tyyppi I) ja komplementtivälitteiseen (C-MPGN, C3-glomerulopatia) tyyppiin
 - a. Karkeasti jaettuna IC-MPGN:ssä komplementin klassinen tie on aktivoitunut verenkierrassa kiertävien immuunikompleksien takia ja C-MPGN:ssä komplementin oikotiereitti on yliaktiivinen säätelyhäiriön vuoksi.
 - i. Molemmissa tapauksissa C3-komplementin tasot laskevat

- b. C-MPGN:n taustalla on yleensä autovasta-aine C3-konvertaasia vastaan (C3-nefriittinen tekijä), joka estää C3bBb:n hajoamisen ja siten mahdollistaa jatkuvan C3:n katabolian ja komplementin aktivaation.
 - i. C3-glomerulopatiat jaetaan dense deposit diseaseen (DDD, tiivissaostumatauti, vanha tyyppi II) ja C3-glomerulonefriittiin elektronimikroskopian avulla.

C. Mikroskopia:

1. Valomikroskopiassa havaitaan glomerulusten hypersellulaarisuutta ja tyvikalvojen paksuuntumista ja ne ovat usein kaksikerroksisia (junaratamainen).
 - a. Junaratamaisuutta tyypillisesti IC-MPGN:ssä eikä niinkään C-MPGN:ssä mutta entiteettejä ei voida nykytiedon valossa luotettavasti erottaa toisistaan; Taudin jakaminen alaluokkiin tehdään immunofluoresenssitutkimuksella
 2. Immunofluoresenssissa havaitaan granulaarinen kuva.
 3. Elektronimikroskopiassa havaitaan elektronitiiviitä kertymiä, jotka ovat IC-MPGN:ssä subendoteelisiä, DDD:ssä intramembranoottisia ja C3-glomerulonefriitissä mesangiaalisia/subendotelialisia/subepitelialisia
- D. Huono glukokortikoidivaste; ennuste hyvä, jos sekundaarisissa taudeissa taustatekijä voidaan hoitaa (muissa tapauksissa huono ja etenee krooniseksi munuaisten vajaatoiminnaksi).
- E. Taudinkuva yleensä nefroottinen, mutta voi esiintyä myös sekä nefriittisenä taudinkuvana että näiden yhdistelmänä.
1. IC-MPGN useammin nefroottinen, C-MPGN useammin nefriittinen.

V. DIABEETTINEN NEFROPATIA

- A. Diabetes mellitukseen liittyvä munuaissairaus aiheuttaa pahenevaa proteinuriaa ja on yleisin munuaissiirron indikaatio Suomessa.
1. Yleisin sekundaarinen syy ja yleisin syy ylipäätään krooniselle munuaistaudille.
- B. Hyperglykemia ja lisääntynyt oksidatiivinen stressi johtavat vaskulaarisen tyvikalvon nonentsymaattiseen glykosylaatioon eli glykosyloituneiden lopputuotteiden kertymiseen soluihin.
1. Johtaa endoteelin vaurioon ja toimintahäiriöön, mikä lisää suonten läpäisevyyttä; proteiineja vuotaa suonen seinämään ja aiheuttaa hyaliinia arterioskleroosia.
- C. Hyaliini arterioliskleroosi ahtauttaa vahvemmin efferenttia kuin afferenttia arteriolia, mikä nostaa GFR:ää ja esiintyy taudin alkuvaiheissa pelkästään mikroalbuminuriana.
1. Taudin edetessä mesangiumin väliaine lisääntyy progressiivisesti ja aiheuttaa glomeruloskleroosia.
- D. Mikroskopia:
1. Valomikroskopiassa havaitaan mesangiumin skleroosia ja Kimmelstiel-Wilsonin noduluksia.
 2. Elektronimikroskopiassa havaitaan diffuusia tyvikalvon paksuuntumista.
 3. Immunofluoresenssissa havaitaan negatiivinen löydös tai diffuusi lineaarinen glomerulusten ja tubulusten tyvikalvojen korostuminen.
- E. Muutosten hidastamisessa tärkeää on systeemisen hypertension ja hyperfiltraation kontrollointi; ACE:n estäjät tärkeimpiä.

VI. MUNUAISAMYLOIDOOSI

- A. Systeemisessä amyloidoosissa munuaisten sairastuminen on erittäin yleistä (80-90%), sillä munuaisissa on hyvin runsas verisuonitus.
- B. Amyloidi kertyy etenevissä määrissä mesangiumiin ja aiheuttaa nefroottista oireyhtymää ja lopulta munuaisten terminaalisen toiminnanvaurion.
- C. Kongonpunalla värjättyä biopsianäytettä tarkastellessa polaroidussa valossa havaitaan omenanvirheä kahtaistavuus.
- D. Ennuste on huono ja parantavaa hoitoa ei ole.

NEFRIITTISENÄ OIREYHTYMÄNÄ MANIFESTOITUVAT TAUDIT

- I. AKUUTTI POSTINFEKTIOOSI (EKSUDATIIVINEN, POSTREPTOKOKKI) GLOMERULONEFRIITTI (PSGN)
 - A. Nykyisin harvinainen glomeruluksen tulehdus, joka klassisesti ilmenee A-ryhmän beetahemolyyttisten streptokokkien aiheuttaman faryngiitin tai iho-infektion (impetigo) jälkeen (n. 1-4vk).
 - 1. Muutkin organismit voivat aiheuttaa, mm. stafylokokki-infektio.
 - B. Oireilee nefriittisen oireyhtymän taudinkuvana eli hematuriana, oliguriana, hypertensiona ja periorbitaalisenä ödeemana sekä kuumeena.
 - C. Mikroskopia:
 - 1. Valomikroskopiassa havaitaan hypersellulaariset glomerulukset ja kapillaarit ovat tukkeutuneet inflammatorisista soluista.
 - 2. Elektronimikroskopiassa subepiteelisiä kupolimaisia kertymiä.
 - 3. Immunofluoresenssissa granulaarinen kuva (IgG- ja C3-saostumia).
 - D. Yleisempi lapsilla kuin aikuisilla, mutta lapsilla paljon parempi ennuste.
 - 1. N. ¼:lla aikuisista tauti etenee nopeasti eteneväksi glomerulonefriitiksi.
- II. NOPEASTI ETENEVÄ (KRESKENTTINEN) GLOMERULONEFRIITTI (RPGN)
 - A. Nefriittinen munuaistauti, joka etenee hoitamattomana nopeasti (päivissä-viikoissa) munuaisten vajaatoimintaan ja lopulta kuolemaan.
 - B. Määritelmään kuuluu myös valomikroskopiassa havaittava morfologia: glomerulusten puolikuumuodostumat (crescents) Bowmanin tilassa.
 - 1. Ekstrakapillaarinen proliferaatio aiheuttaa muodostumat; koostuvat mm. proliferoituvista epiteelisoluista, fibriinistä ja makrofageista.
 - C. Immunofluoresenssi ja kliininen kuva auttavat jakamaan RPGN:n kolmeen luokkaan.
 - 1. Tyyppi I – Immunofluoresenssi on lineaarinen ja johtuu glomeruluksen tyvikalvovasta-aineista (antityvikalvonefriitti).
 - a. Tyvikalvovasta-aineita yleensä myös alveolien tyvikalvoa vastaan, jolloin esiintyy sekä hematuriaa että hemoptyyysiä (Goodpasturen oireyhtymä).
 - 2. Tyyppi II – Immunofluoresenssi on granulaarinen ja johtuu immunokompleksien depositiosta (tyypissä I ja III ei saostumia elektronimikroskopiassa).
 - a. PSGN yleisin aiheuttaja (ainakin kehitysmaissa); elektronimikroskopiassa havaitaan subepiteelisiä saostumia.
 - b. Diffuusissa proliferatiivisessa glomerulonefriitissa (tyypin IV lupusnefriitti) havaitaan yleensä subendoteelisiä (joskus intramembranoosit ja vielä harvemmin subepiteliaalisia) immunokomplekseja; yleisin munuaistauti SLE:ssä.

- c. Myös mm. IgA-glomerulonefriitti ja Henoch-Schönleinin purppura ovat yleisiä aiheuttajia
- 3. Tyyppi III – Ei immunosaostumia glomeruluksissa eikä immunofluoresenssia havaita tai se on hyvin niukka (pauci-immuunitauti); tavallisesti kyseessä on munuaisia affisioiva ANCA-vaskuliitti.
 - a. Granulomatoottinen polyangiitti (GPA) on yhteydessä c-ANCA:an (PR3-ANCA).
 - b. Mikroskooppinen polyangiitti (MPA) ja eosinofiilinen granulomatoottinen polyangiitti (EGPA) ovat yhteydessä p-ANCA:an (MPO-ANCA).
 - i. Granulomatoottinen inflammaatio, eosinofilia ja astma erottavat EGPA:n MPA:stä.

III. IgA-GLOMERULONEFRIITTI (BERGERIN TAUTI)

- A. Ihmisen tavallisin glomerulonefriitti; voidaan todeta missä tahansa iässä (tavallisimmin lapsilla ja nuorilla aikuisilla)
- B. Ilmenee tyypillisesti asymptomattisena mikroskooppisena hematuriana ja mahdollisesti lievänä proteinuriana ilman muuta tyypillistä nefriittistä oireyhtymää; hematuria usein muuttuu makroskooppiseksi mukosaalisten kuumetautien yhteydessä tai 1-2vrk viiveellä (eroaa PSGN:stä, joka on viikkojen viiveellä).
 - 1. IgA:n tuotanto lisääntyy infektion aikana mukoosapinnoilla.
 - 2. Voi harvoin myös olla vakava ja aiheuttaa nopeasti etenevää glomerulonefriittia (RPGN)
- C. Seerumin IgA yleensä koholla, mutta diagnoosi perustuu biopsianäytteeseen, jossa havaitaan immunofluoresenssissa mesangiaalista IgA-saostumaa.
 - 1. Henoch-Schönleinin purppuran aiheuttama munuaisten muutos on sama kuin IgA-GN:ssä.
 - a. Bergerin ja Henoch-Schönlein purppuran ero on siinä että Bergerin taudissa on IgA-nefropatiaa ilman vaskuliittia, kun taas HSP on systeeminen vaskuliitti.
 - 2. Suurin osa on primaarisia; mutta voi harvoin johtua mm. keliakiasta tai maksakirroosista (yleensä ei kuitenkaan kliinisiä oireita)
- D. Ei parantavaa hoitoa, etenee hitaasti ja riski munuaisten vajaatoimintaan etenemiselle kasvaa iän mukana.

IV. ALPORTIN OIREYHTYMÄ

- A. Perinnöllinen laaja-alainen tyvikalvojen häiriö, joka esiintyy glomerulaarisena hematuriana, sensorineuraalisena kuulohäiriönä ja silmän mykiön ja verkkokalvon rakennemuutoksina.
 - 1. Johtuu tyypin IV kollageenin rakennehäiriöstä, jonka seurauksena glomeruluksen tyvikalvo paikoin ohenee/paikoin paksune (ensimmäinen muutos on oheneminen) ja on pirstaleinen; yleensä periytyy X-kromosomissa vallitsevasti ja esiintyy miehillä naisia vakavampana.
- B. Yleensä periytyy X-kromosomissa; esiintyy miehillä naisia vakavampana.
 - 1. Miehillä vakava tauti ja johtaa usein munuaisten vajaatoimintaan.
 - 2. Kantajanaisilla yleensä lievä tauti, johon kuuluu vain hematuria ja lievä proteinuria.

KROONINEN MUNUAISTEN VAJAATOIMINTA / KROONINEN MUNUAISTAUTI (CKD)

I. PERIAATTEET

- A. Kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa GFR ja munuaistoiminta heikkenee hitaasti yli kolmen kuukauden aikana; aina on kyse munuaisten vaurioitumisesta ja toimivien nefronien vähenemisestä.
1. Tärkeimmät aiheuttajat ovat diabetes, hypertensio ja glomerulusten taudit; GFR laskee normaalisti myös iän mukana.
- B. Voidaan jakaa GFR:n (G1-G5) ja albuminurian (A1-A3) mukaan vaiheisiin, joissa oireita ilmenee etenevässä määrin.
1. Vaiheet G1 ja G2 (eGFR vähintään 60) munuaiset toimivat vielä hyvin, eikä oireita tyypillisesti tavata
 - a. On mahdollista diagnosoida CKD jos todetaan albuminuria (A2-A3)
 - i. Normaalilla albuminurialla ja normaalilla GFR:lläkin voidaan todeta CKD, jos on muita viitteitä yli 3kk kestäneestä munuaisten vauriosta/rakennehäiriöstä (vihreä alue kaavakkeesta esim. ADPKD ja normaali GFR ja albuminuria)
 2. Vaiheessa G3 eli kohtalaisessa vajaatoiminnassa (eGFR 30-59ml/min) filtraatio on jo selkeästi heikentynyttä ja oireita voi alkaa ilmentyä
 - a. Jaetaan vaiheisiin 3a ja 3b
 3. Vaiheessa G4 on jo vaikea-asteinen vajaatoiminta (alle 15-29ml/min)
 4. Vaihetta G5 kutsutaan myös loppuvaiheen munuaistaudiksi (ESRD, alle 15ml/min).

				Pysyvä albuminuria (U-AlbKre)		
				A1	A2	A3
				Normaali	Kohtalaisesti lisääntynyt	Voimakkaasti lisääntynyt
				< 3 mg/mmol	3–30 mg/mmol	> 30 mg/mmol
Kroonisen munuaistaudin vaiheet GFR (ml/min/1,73 m ²)	G1	Normaali tai suuri	≥ 90			
	G2	Lievästi pienentynyt	60–89			
	G3a	Lievästi–kohtalaisesti pienentynyt	45–59			
	G3b	Kohtalaisesti–vaikeasti pienentynyt	30–44			
	G4	Vaikeasti pienentynyt	15–29			
	G5	Loppuvaiheen munuaisvaurio	< 15			

Kuva 1. Munuaistaudin ennuste GFR- ja albuminurialuokkien perusteella. Vihreä kuvastaa pientä riskiä (jos ei ole muita merkkejä munuaistaudista), keltainen kohtalaisesti suurentunutta, oranssi suurta ja punainen erittäin suurta riskiä (kuva mukailtu lähteestä KDIGO 2024).

C. Kliininen kuva

1. Uremia – oireita aiheuttavaa atsootemiaa; tyypipitoiset kuona-aineet aiheuttavat mm. pahoinvointia, ruokahaluttomuutta, ihon kutinaa ja pigmentoitumista (ureakristallien kertyminen ihoon), ureemista enkefalopatiaa, levottomat jalat- oireyhtymää ja perikardiittia.

2. Natriumin ja veden retentio – hypertensio
 3. Hyperkalemia – rytmihäiriöt
 4. Metabolinen asidoosi
 5. Hypokalsemia – Kasvanut hyperfosfatemia ja proksimaalisen tubuluksen solujen 1-alfa-hydroksylaasiaktiiviteetti heikentynyt
 - a. Tilanne näyttää pitkään normaalilta, sillä PTH:n lisääntynyt erityys lisäkilpirauhasista lisää fosfaatin eritystä, D-vitamiinin 1a-hydroksylaatiota sekä kalsiumin resorptiota.
 - i. Johtaa taudin edetessä renaaliseen osteodystrofiaan (osteitis fibrosa cystica, osteomalasia ja osteoporoosi).
 6. Anemia – Peritubulaariset interstitiaaliset solut tuottavat liian vähän EPO:a -> normosytäärinen ja normokrominen anemia
- D. Hoidon keskeinen tavoite on hidastaa taudin etenemistä; erityisesti hypertension ja aineenvaihdunnan häiriöiden (diabetes) hoito.
1. Aktiivihoido eli dialyysihoito tai munuaisensiirto tärkeitä ESRD:ään edenneessä vajaatoiminnassa.

VIRTSATEIDEN INFEKTIOT

I. PERIAATTEET

- A. Useimmiten suolistoperäisen gramnegatiivisen bakteerin aiheuttama nouseva infektio; voi olla paikantunut alempiin virtsateihin (rakko, virtsaputki) tai ylempiin virtsateihin (munuaiset).
 1. Aiheuttava taudintekijä nousee virtsateitä pitkin, minkä takia virtsatieinfektiot ovat yleisempiä naisilla (lyhyt uretra ja uretran aukon sijainti).
- B. Riskiä nousevalle infektiolle lisää mm. sukupuoliyhdyntä, virtsarakon katetrointi ja virtsan staasis.
- C. Yleisin virtsateiden infektioiden aiheuttaja on ylivoimaisesti E. coli; muita ovat mm. Staph. saprophyticus (erit. nuorilla seksuaalisesti aktiivisilla naisilla), Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis.
 1. Harvinaisesti tapahtuva munuaiskudoksen pesäkkeestä alkava laskeva infektio on yleensä S. aureuksen aiheuttama ja liittyy lähes aina septiseen infektiin.

II. KYSTIITTI JA URETRIITTI

- A. Alempien virtsateiden infektoita
 1. Kystiitti = Virtsarakon infektio/inflammaatio
 2. Uretriitti = virtsaputken infektio/inflammaatio
- B. Tyypillisiä kystiitin oireita ovat tihentynyt virtsaamistarve, kirvely virtsatessa (dysuria, erityisesti virtsaamisen lopussa) ja alavatsan jomotus; systeemiset oireet harvinaisia.
- C. Diagnosointi – Perusterveen (ei raskaan) 18-65-vuotiaan naisen hoito voidaan aloittaa ilman laboratoriotutkimuksia vain tyypillisten oireiden perusteella; muilla tulehdus varmistetaan laboratoriotutkimuksilla.
 1. Mikroskopia – virtsan sedimentissä runsaasti valkosoluja mikroskopiassa (pyuria); ei yleensä tarvita toteamisessa, vaan liuskatesti tai U-Solut (partikkelitutkimus) riittää
 2. U-KemSeul – virtsassa kastettava liuskatesti
 - a. Leukosyytit tunnistetaan niiden esteraasin avulla

- b. Tiettyt bakteerit (esim. E. coli; yleisin VTI:n aiheuttaja) tuottavat yleensä nitriittiä (pelkistävät nitraatteja nitriiteiksi nitraatireduktaasilla), jonka pitoisuudet voidaan mitata
 - i. Useammin gramnegatiivisten aiheuttama löydös
 - c. Bakteerit aiheuttavat yleensä ammoniakkin lisääntymistä, mikä nostaa pH:ta
 - 3. Keskivirtsan bakteeriviljely – kultastandardi infektiolla on $>10^5$ bakteeria/ml ; erottelua ei usein tarvita hoitovalintaan, sillä aiheuttavat bakteerit ja niiden antibioottiherkkydet tunnetaan kokemukseen pohjautuen tarkasti.
 - D. Jos havaitaan pyuriaa, mutta bakteeriviljely on negatiivinen (steriili pyuria), on aiheuttajana yleensä seksitautiperäinen uretriitti (yleensä Chlamydia trachomatis tai Neisseria gonorrhoeae eli tippuri).
 - 1. Uretriitissa kirvely virtsatessa erityisesti virtsaamisen alussa.
 - 2. Kystiittiin verraten oireet tulevat vähitellen ja ovat lievempiä sekä taudinkuvaan kuuluu limaismärkäinen erite.

III. PYELONEFRIITTI (MUNUAISALTAANTULEHDUS)

- A. Munuaisten bakteeri-infektio; voi esiintyä akuuttina tai kroonisena.
- B. Akuutti pyelonefriitti aiheuttaa yleensä sekä paikallis- että yleisoireita: kuume ja kylkien sekä selän alueen kipu; vain harvoin virtsaamisvaivoja.
 - 1. Diagnoosi perustuu oireisiin ja positiiviseen virtsaviiljelytulokseen; CRP yleensä koholla.
 - 2. Komplikaatioita on mm. perinefrinen absessi ja jopa ns. urosepsis (virtsatietähtöinen systeeminen infektio)
- C. Krooninen pyelonefriitti johtuu toistuvista akuuteista pyelonefriiteistä; taustalla on yleensä jokin rakenteellinen tai toiminnallinen poikkeavuus (vesikoureteraalinen refluksi, obstruktio).
 - 1. Arpeuttava sairaus; interstitiaalinen munuaiskudos fibrotisoitunut ja tubulukset atrofioituneet
 - a. Tylpistyneiden pikarien yläpuolella oleva ytimen ja kuorikerroksen arpeutuminen; histologisesti atrofisten tubulusten lumeni sisältää eosinofiilistä proteiinirikasta materiaalia (kidney thyroidization).
 - 2. Vesikoureteraalinen refluksi tarkoittaa virtsan virtaamista rakosta takaisin virtsanjohtimeen; havaitaan yleensä lapsuudessa toistuvina pyelonefriitteinä.
 - a. Voi johtua mm. ureterin poikkeavasta tulokulmasta rakkoon nähden tai synnynnäisestä rakennepoikkeavuudesta vesikoureteraalisessa läpässä.
 - 3. Virtsatietukoksen tavallisimpia syitä ovat mm. virtsatiekivitauti, BPH tai kasvaimet (esim. kohdunkaulan tai eturauhasen karsinoma); johtaa alussa hydronefroosiin eli munuaisaltaan ja -pikarien laajenemiseen.

VIRTSATIEKIVITAUTI

I. PERIAATTEET

- A. Virtsaan liuenneet aineet voivat ylikyllästyessään kiteytyä kiveksi; syntyvät useimmiten munuaisistasolla (nephrolithiasis).
 - 1. Joskus (n. 5%) myös esim. rakkotasolla johtuen useimmiten rakon staasista (esim. BPH tai neurogeeninen rakko)

- B. Ilmenee äkillisesti alaselässä tai -vatsassa yleensä unilateraalisesti alkavana kipuna, joka voi säteillä nivustaipeisiin; useimmiten myös hematuriaa (yleensä mikroskooppista).
1. Diagnostiikassa tärkein tutkimus on ilman varjoainetta kuvattava virtsateiden tietokonekerroskuvaus (vt-kivi-TT)
 - a. Jos kyseessä on raskaana oleva tai lapsipotilas, voidaan tehdä virtsateiden ultraäänitutkimus (pääosin hoito ESH kuitenkin)
 - b. Avohoidossa voidaan myös tehdä UÄ ja jos oirekuva sopii yksiselitteisesti kivitautiin (yleensä potilaalla ollut samanlaisia ennenkin), niin mahdollisesti hoito avohoidossa mahdollista
 2. Labroissa tulehdusarvot lievästi koholla (esim. 40-80 mg/l), krea koholla virtsankulun estyessä, virtsanäytteessä punasoluja
- C. Pienet kivet (alle 5mm) yleensä poistuvat itsestään 1kk kuluessa, suuremmat hoidetaan kiirellisesti kehonulkoisesti murskaamalla kivi shokkiaalloilla (ESWL), perkutaanisesti (PCNL) tai tähytysleikkaushoidolla.
1. Akuutissa vaiheessa NSAID (vaikeassa kivussa yleensä suoneen), yleensä voidaan odottaa kiven poistumista konservatiivisesti, jos kivut poistuvat ja labrat suht. normaalit
 - a. Kiven poistumista nopeuttamaan voidaan käyttää alfasalpaajaa, jota jatketaan, kunnes kivi on poistunut
 2. Hoito päivystyksellisesti, jos kivi aiheuttaa täydellisen tukoksen, potilas on kivulias kipulääkityksestä huolimatta tai on kehittynyt kuumetta ja virtsatieinfektio
 - a. Infektiossa punktiopyelostomialektku tai ureterkatetri ja varsinainen kiven hoito tehdään tavallisimmin tulehduksen rauhoituttua
- D. Tärkeimpiä riskitekijöitä ovat vähäinen juominen (pieni virtsamäärä), virtsaan liuenneiden aineiden korkeat pitoisuudet (mm. ruokavalio, imeytymishäiriöt); virtsan pH ja koostumus vaikuttaa siihen, minkä tyyppinen virtsakivi voi syntyä.
1. Runsas veden juominen tärkeää hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.
 2. Enemmän miehillä (n. 3:1)

II. KIVILAJIT

- A. Kivianalyysin perusteella voidaan tunnistaa potilaan riskitekijät ja suunnitella ennaltaehkäisevää hoitoa.
- B. Tärkein etiologinen tekijä on hyperkalsiuria; virtsakivistä n. 90% sisältää kalsiumia.
- C. Kalsiumoksalaatti- ja/tai kalsiumfosfaattikivet – Kalsiumoksalaattikivet ovat yleisin kivityyppi
1. Suurimmalla osalla potilaista ei havaita hyperkalsemiaa, vaan todetaan idiopaattinen hyperkalsiuria.
 - a. Hyperoksaluria (mm. Crohnin tauti) ja hypositraturia lisäävät riskiä kalsiumoksalaatin kiteytymiselle.
 - i. Crohnin taudissa (tai esim. suolistoleikkauksessa) rasvahappojen malabsorptio -> lisääntynyt rasva suolistossa sitoo kalsiumia -> vähemmän Ca^{2+} vapaana sitomaan oksalaattia -> lisää oksalaation absorptiota
 - ii. Sitraatti sitoo kalsiumia virtsassa ja tämä liukoinen kompleksi ei saostu kiveksi

- iii. Hypositraturia voi olla idiopaattista tai taustalla esim. ripulointi ja sitä kautta metabolinen asidoosi -> sitraattia reabsorboidaan enemmän vereen bufferoimaan asidoosia
- 2. Tiatsididiureetit vähentävät hyperkalsiuriaa ja vähentävät kivien uusiutumista.
 - a. C-vitamiinilisää kannattaa välttää, jos potilaalla ollut kalsiumoksalaattikivi (C-vitamiinia metaboloituu oksalaatiksi)
 - i. Kalsiumia ei rajoiteta, koska rajoitus lisää oksalaatin imeytymistä ruoansulatuskanavasta ja altistaa siten virtsakivitaudin uusimiselle
 - b. Hypositraturiassa virtsan alkalisointi voi auttaa; ei alkalisoida kalsiumfosfaattikivien yhteydessä (pahentaa, koska fosfaattia sisältävät kiteytyvät korkeassa pH:ssa)
 - i. Ensimmäisessä kaliumsitraatilla, toissijaisesti natriumbikarbonaatilla
- B. Magnesiumammoniumfosfaattikivet (struviitti) – Infektiokivet ovat yleensä struviittikiviä; yleisempiä naisilla
 - 1. Ureaasipositiiviset gramnegatiiviset bakteerit (esim. Proteus, Klebsiella, Pseudomonas) hajottavat ureaa muodostaen ammoniumia ja bikarbonaattia; pH nousee ja kivet kiteytyvät.
 - 2. Taipumus kasvaa suuriksi ja täyttää munuaisaltaan (korallikivi, staghorn calculi), minkä takia tulee hoitaa nefroskooppisesti (PCNL; ensisijainen >20mm kivien kanssa).
- C. Uraattikivet – Kolmanneksi yleisin tyyppi; taustalla usein kihti
 - 1. Nestehukka ja matala virtsan määrä tärkeimmät riskitekijät uraatin ylisaturoitumiselle; yleisin kivityyppi kihtipotilailla ja myeloproliferatiivisesti sairauksista kärsivillä (hyperurikemia).
 - 2. Tärkein vihje kemseulassa on pieni pH; hoito perustuu virtsan alkalisoinniseen, joten uraattimäärityksestä ei ole hyötyä
- D. Kystiinikivet – Harvinaisia kiviä, jotka liittyvät perinnölliseen kystinuriaan; useimmiten lapsilla
 - 1. Kystinuria johtuu proksimaalisten tubulusten häiriintyneestä aminohappokuljetuksesta.
 - 2. Kiteytyy, kun virtsan pH matala; ehkäisevänä hoitona ja kivien poistossa auttaa virtsan alkalisointi

MUNUAISTEN KASVAIMET

I. HYVÄNLAATUISET KASVAIMET

- A. Yleensä yksittäisiä ja oireettomia, mutta isoiksi kasvaessaan voivat aiheuttaa mm. selkä- ja kylkikipua.
- B. Tärkeimmät hyvänlaatuiset epiteliaaliset kasvaimet ovat papillaarinen adenooma ja onkosytooma.
 - 1. Papillaarinen adenooma on yleensä täysin kliinisesti merkityksetön sen pienen kokonsa takia.
- C. Tärkein mesenkyymiperäinen hyvänlaatuinen munuaiskasvain on angiomyolipooma.
 - 1. Verisuonista, sileälihaskudoksesta ja rasvakudoksesta koostuva hamartooma.
 - 2. Voi liittyä tuberoosiskleroosioireyhtymään.

II. MUNUAISKARSINOOMA

- A. Lähes kaikki aikuisten pahanlaatuisista munuaiskasvaimista ovat munuaisen tubulusepiteelistä lähtöisin olevia munuaiskarsinoomia.
- B. Voi esiintyä klassisena triadina: kivuton hematuria (yleisin oire), palpoitava massa ja tylsä kylkikipu.
 - 1. Kuume ja paraneoplastiset oireet ovat harvinaisempia oireita.
 - a. Kasvain voi tuottaa mm. EPO:a (polysytomia), reniiniä, PTHrP:a tai ACTH:a.
 - 2. Voi myös aiheuttaa vasemmanpuoleisen varikoseelin kasvaimen obstruktoidessa vasemman munuaislaskimon (oikea kiveslaskimo laskee suoraan alempaan onttolaskimoon).
- C. Makroskooppisesti havaitaan keltainen massa; mikroskooppisesti voidaan jakaa pääasiassa kolmeen päätyyppiin.
 - 1. Kirkassoluinen (70-80%) – Koostuu kirkassytoplasmaisista soluista; usein havitaan kystisyyttä, hemorragioita ja nekrooseja.
 - 2. Papillaarinen (10-15%) – Fibrovaskulaarisista ytimistä muodostuvia papillaarisia rakenteita
 - 3. Kromofobinen (5%) – Suuria selkeärajaisia soluja, joissa perinukleaarinen kirkastuma.
- D. Patogeneesi on yleensä sporadinen, mutta voivat olla myös perinnöllisiä.
 - 1. Sporadiset ovat yleensä unilateraalisia yksittäisiä munuaisen yläosissa ja esiintyvät keskimäärin 60-vuotiailla; perinnölliset ovat esiintyvät nuoremmilla aikuisilla ja yleensä multippeleita ja bilateraalisia.
 - 2. Kirkassoluisia karsinooma esiintyy von Hippel-Lindan (VHL) oireyhtymään liittyvinä.
 - a. VHL-tuumorisuppressorigeenin molempien alleelien mutaatio on tärkeä tekijä karsinooman muodostumisessa; VHL-oireyhtymässä on perinnöllinen toisen alleelin mutaatio.
 - b. Johtaa IGF-1:n (kasvutekijä) ja HIF:n (VEGF ja PDGF ekspressiota ajava transkriptiotekijä) inhibition estymiseen ja siten kasvuun.
 - c. VHL-oireyhtymässä tavataan myös muita kasvaimia, kuten verkkokalvon, pikkuaivojen ja selkäytimen hemangioblastoomia sekä feokromosytoomaa.
- E. Ennuste riippuu kasvaimen levinneisyydestä; jos leviää munuaislaskimoon tai munuaisen viereiseen rasvaan 5-vuotisennuste on vain n. 15-20% (kaikilla potilailla n. 70%).

III. WILMSIN TUUMORI (NEFROBLASTOOMA)

- A. Nuorten lasten vatsan alueen malignin möykyn yleisin syy; keski-ikä diagnoosille on n. 3 vuoden ikä.
 - 1. Oireilee hematuriana ja hypertensiona.
- B. Pahanlaatuinen embryonaalinen kasvain, joka koostuu kolmesta eri komponentista: erilaistumaton blasteema (epäkypsä munuaisen mesenkyymi, pieniä ja niukkasytoplasmaisista soluja), epiteeli (tiehyitä, primitiivisiä glomeruluksia ja tubuluksia) ja strooma (yleensä fibrosyyttistä).

ALEMPIEN VIRTSATEIDEN KASVAIMET

I. PERIAATTEET

- A. Valtaosa virtsateiden syövästä sijaitsee virtsarakossa ja ovat karsinoomia.
 - 1. Alempien virtsateiden syövät ovat munuaissyöpiä yleisempiä (miesten 4. ja naisten 11. tavallisin syöpä Suomessa).
- B. Suurin osa on uroteelisyöpiä, mutta myös levyepiteeli- ja adenokarsinoomia esiintyy.

C. Yleensä keski-ikäisten ja sitä vanhempien kasvaimia.

II. UROTEELISYÖPÄ

- A. Munuaisallasta, ureetteria, rakkoo ja uretraa verhoaa sisäpinnalta uroteeli (välimuotoinen epiteeli), jonka pahanlaatuinen proliferaatio on alempien virtsateiden yleisin kasvaintyyppi.
- B. Yli puolet potilaista on tupakanpolttajia; myös aniliiniväriaineille altistumisen teollisuudessa ja syklofosfamidin käyttö lisäävät riskiä.
- C. Tavallisin oire on kivuton hematuria.
- D. Voidaan jakaa karsinogeneesiin kautta kahteen eri tyyppiin
 - 1. Papillaarinen – kehittyy matala-asteisena papillaarisena tuumorina, joka kehittyy korkea-asteiseksi ja lopulta etenee lihasinvasiiviseksi; ei aikaisia TP53-mutaatioita.
 - a. Prognoosi perustuu gradukseen, joka perustuu rakenteeseen ja sytologiaan; voidaan jakaa PUNLMP (harvinainen), matala-asteiseen ja korkea-asteiseen.
 - b. Vain pieni osa papillaarisista tuumoreista invasoii.
 - 2. Litteä – kehittyy korkea-asteisena litteänä tuumorina (karsinooma in situ, CIS) ja kasvaa lihasinvasiivisesti; aikainen TP53-mutaatio.
 - 3. Totetamishetkellä suurin osa on vielä pinnallisia.
- E. Suurella osalla karsinooma uusiutuu (kenttäkarsinogeneesi).

III. VIRTSAKARON LEVYEPITEELIKARSINOOMA

- A. Krooninen ärsytys johtaa rakon levyepiteelimetaplasiaan ja jatkuessaan mahdolliseen levyepiteelikarsinoomaan.
- B. Yleisimpiä ärsyttäviä tekijöitä ovat krooninen kystiitti ja toistuva virtsatiekivitauti sekä endeemisissä maissa skistosomiaasi; Suomessa levyepiteelikarsinooma hyvin harvinainen, mutta mm. Egyptissä yleisin rakon karsinooma.

13 GYNEKOLOGINEN JA RASKAUSAJAN PATOLOGIA

ULKOSYNNYTINTEN SAIRAUDET

I. PERIAATTEET

- A. Ulkosynnyttimet eli vulva tarkoittaa hymenin ulkopuolella olevaa aluetta.
 - 1. Käsittää häpykukkulan (mons pubis), isot ja pienet häpyhuulet (labia major/minor), klitoriksen sekä vestibulumin limakalvot ja rauhasrakenteen (erityisesti Bartholinin rauhaset).
- B. Levyepiteeli verhoaa vulvaa.

II. RAUHASRAKENTEIDEN TAUDIT

- A. Bartholiniitissa Bartholinin rauhanen tulehtuu yleensä bakteeri-infektion aiheuttamana; voi johtaa sen tukkeutumiseen.
 - 1. Bartholinin rauhaset ovat n. kahvipavun kokoisia rauhasia, joita on yksi molemmilla puolilla emättimen kanavaa ja tuottavat limaista nestettä; kulkee tiehyitä pitkin vestibulumin alaosaan ja voitelee vaginan aukkoa.
- B. Bartholinin rauhaseen voi muodosta kysta sekundaarisena sen obstruktiolle.
 - 1. Oireilee unilateraalisena, joskus kivuliaana suurena kyhmynä labian alla; esiintyy pääosin lisääntymisikäisillä.
 - 2. Tulehtuessaan muodostuu paise, joka on yleensä kivulias.

III. KONDYLOMA ACUMINATUM

- A. Kondyloomat eli visvasyyvät ovat vulvan iholla esiintyviä suhteellisen suuria (muutama mm - cm) eksofyyttisiä syylämäisiä neoplastisia muutoksia.
- B. Yleensä matalan riskin HPV-infektion aiheuttamia (HPV6 ja HPV11), joten kondyloomat etenevät karsinoomaksi vain hyvin harvoin.
- C. Histologisesti havaitaan koilosyyttejä, jotka ovat matalan riskin HPV-infektoituneitten solujen tunnusmerkki.
 - 1. Koilosyyteissä on perinukleaarinen kirkastuma ja hyperkromaattinen, kuhmurainen tuma.

IV. LICHEN SCLEROSIS (VALKOJÄKÄLÄ)

- A. Yleinen tulehduksellinen krooninen ihosairaus, joka ilmenee pääosin häpyhuulilla alussa limakalvon punoituksena ja taudin edetessä edetessä ilmaantuu vaaleita paksuuntuneita läiskiä (leukoplakia), jotka usein kutisevat ja kirvelevät.
 - 1. Voi aiheuttaa häpyhuulten surkastumista ja emättimen aukon pienenemistä, mikä aiheuttaa yhdyntäkipuja.
- B. Etiologia tuntematon, mutta todennäköisesti autoimmuuniperäinen.
 - 1. Kaksi esiintymishuippua, alle kouluikäiset lapset ja keski-ikäiset aikuiset.
- C. Histologisesti havaitaan epidermoksen ohenemista, reteharjanteiden oientumista ja dermoksen solukatoa sekä fibroosia.
- A. Hyvänlaatuinen muutos, mutta lisää riskiä levyepiteelikarsinoomalle.

V. LICHEN SIMPLEX CHRONICUS (NEURODERMATIITTI)

- A. Kutina-raapimiskierteen aiheuttama ihon paksuuntumista ja jäkälöitymistä.
 - 1. Kierteen voi aloittaa pitkittynyt vulviitti (mm. hiivatulehdus tai kosketusallergia).
- B. Histologisesti havaitaan epidermoksen hyperplastista paksuuntumista ja reteharjanteiden epäsäännöllistä venyttyneisyyttä.
- C. Hyvänlaatuinen muutos, eikä lisää riskiä karsinoomalle.

VI. VULVAN KARSINOOMA

- A. Esiintyy samoja benignejä ja maligneja muutoksia kuin muuallakin ihossa.
- B. Levyepiteelikarsinooma on vulvasyövän yleisin tyyppi; Suomessa harvinainen (alle 100/v).
 - 1. Muut naisten sukuelinten syövästä paljon yleisempiä.
- C. Esiintyy kutiavana, paksuuntuneena ja vaalenana ihoalueena (leukoplakia); biopsia tarpeellinen karsinooman erottamiseen muista leukoplakian aiheuttajista.
- D. Levyepiteelikarsinoomat ja niiden esiasteet voidaan jakaa HPV-taustaisiin ja HPV:sta riippumattomiin.
 - 1. HPV-taustaisen karsinooman voi aiheuttaa korkean riskin HPV-tyypit (yleensä 16 tai 18).
 - a. Esiastemuutos on HSIL-muutos (squamous intraepithelial lesion, aikaisemmin VIN2-3); kondyloomissa nähdään LSIL-muutos
 - i. HSIL-muutoksessa runsaampi atypia eli solut ovat pienempiä, tuma/sytoplasma-suhde on suurempi ja hyperkromasia on vahvempaa kuin LSIL-muutoksessa; koilosytaarinen muutos on enemmän LSIL-muutosta kuvastavaa.
 - b. Riskitekijät perustuvat HPV:lle altistumiseen, joten varhainen yhdyntöjen alkamisikä on tärkein riskitekijä; esiintyy yleensä lisääntymisikäisillä naisilla.

2. HPV:sta riippumaton karsinooma on harvinaisempaa ja syntyy yleensä pitkäaikaisen valkojäkälän taustalta; esiintyy yleensä postmenopausaalisilla naisilla.
 - a. Esiastemuutos on dVIN, jolle on tyypillistä basaalikerrokseen rajoittuneet dysplastiset solut.
 - i. Progressioriski levyepiteelikarsinoomaksi korkeampi kuin HSIL-muutoksella.

VII. VULVAN (EKSTRAMAMMAARINEN) PAGETIN TAUTI

- A. Harvinainen ulkosynnytyksen epidermisen epiteelisolujen maligni muutos.
- B. Esiintyy punoittavina, hilseilevinä ja kutisevina läiskinä häpyhuulessa tai sen ympäristössä (voi näyttää hiivasienien aiheuttamalta inflammatoriselta dermatiitiltä).
- C. Histologisesti havaitaan suuria haaleasytoplasmaisia adenokarsinoomasoluja intaepidermaalisesti koko epidermisen paksuudelta, mutta ei invaasiota; ei liity yleensä invasiivista adenokarsinoomaa (vrt. rinnan Pagetin tauti).
 1. Tulee erottaa melanoomasta; musiinia tunnistava PAS-värijäys positiivinen Pagetin soluissa.
 - a. Myös keratiini- ja S-100-värijäykset auttavat tunnistamisessa; keratiini positiivinen ja S-100 negatiivinen Pagetin soluissa.
- D. Progressio hidasta, mutta jos invasoi epidermisen ulkopuolelle, on ennuste huono.

VAGINAN TAUDIT

I. PERIAATTEET

- A. Emätin tarkoittaa kanavaa, joka johtaa kohdunkaulaan; ulottuu kohdunsuusta vestibulumiin.
- B. Koostuu mukoosasta, jota verhoaa ei-keratinisoituvasta levyepiteelistä.

II. EMÄTTIMEN HIIVATULEHDUS

- A. Candida albicansin liikakasvun aiheuttama vaginiitti; lähes kaikilla naisilla vähintään kerran elämässä.
- B. Oireilee kutisevana/kirvelevänä lisääntyneenä, mahdollisesti kokkareisena hajuttomana valkovuotona; esiintyy tyypillisesti hedelmällisessä iässä.
 1. Valkovuodon pH on normaali eli 3.8-4.5.
 2. Kutina-kirvelyoireet voidaan sekoittaa sytolyysiin, joka johtuu emättimen maitohappobakteeriston runsaasta määrästä, mikä laskee valkovuodon pH:ta ja aiheuttaa oireita emättimen suulle.
 3. Myös matalat estrogeenitasot voivat aiheuttaa kutinaa/kirvelyä, sillä estrogeenivaikutuksen ollessa vähäinen (vaihdevuosien jälkeen/esimurrosikä) emättimen limakalvo on ohut eikä emättimeen erity limaa.
- C. Kandidan liikakasvulle altistaa mm. antibiootit, raskaus, diabetes ja yhdistelmäehkäisytabletit.

III. BAKTERERIVAGINOOSI

- A. Emättimen normaaliflooraan kuuluvan Gardnerella vaginaliksen liikakasvun aiheuttama vaginiitti; suunnilleen yhtä yleinen kuin hiivatulehdus.
- B. Oireilee runsaana, pahanhajuisena maitomaisena valkovuotona, johon voi liittyä kutina tai kirvely; esiintyy yleensä hedelmällisessä iässä.
 1. Valkovuodon pH nousee yli 4,5:een.

IV. ADENOOSI

- A. Vaginan yläosissa ei havaita normaalia kerrostunutta levyepiteeliä, vaan lieriöepiteeliä.
 - 1. Johtuu yleensä sikiöaikaisesta altistumisesta dietyylistilbestrolille (DES), mikä estää vaginan yläosien lieriöepiteelin muuttumista kypsäksi kerrostuneeksi levyepiteeliksi kehityksen aikana.
- B. Yleensä täysin oireeton, mutta voi harvoin aiheuttaa esimerkiksi emättimen verenvuotoja tai yhdyntäkipuja (dyspareunia).

V. EMÄTINSYÖPÄ

- A. Valtaosa emätinsyövistä on levyepiteelistä alkavia, mutta myös adenokarsinomia tavataan; Suomessa vain parikymmentä vuosittain, suurin osa yli 50-vuotiailla.
- B. Levyepiteelikarsinoomien synnyssä hrHPV-infektio on suuressa roolissa; adenokarsinooma (clear cell adenocarcinoma) taas on harvinainen DES-altistumisen ja adenoosin komplikaatio.
 - 1. Vulvan, kohdunkaulan ja emättimen levyepiteelineoplasiat ovat patogeneesiltään ja morfologialtaan samanlaisia, joten niistä voidaan käyttää samoja diagnooseja (LSIL/HSIL).

VI. EMBRYONAALINEN RABDOMYOSARKOOMA (SARCOMA BOTRYOIDES)

- A. Maligni mesenkyymituumori, joka koostuu eri kypsyysasteisista luustolihas soluista (tyyppisolun on rhabdomyoblasti); pienten lasten (yleensä <5v.) harvinainen syöpä.
- B. Esiintyy verta vuotavana rypälemäisenä massana, joka työntyy ulos vaginasta tai vielä harvemmin peniksestä.

KOHDUNKAULA (CERVIX)

I. PERIAATTEET

- A. Kohdun ulkosuusta (os externum) kohtuontelon sisäsuulle (os internum) ulottuva kaulakanava.
- B. Voidaan erottaa emättimeen ulottuvaksi alueeksi (ektocervix eli portio) ja varsinaiseksi kaulakanavaksi (endocervix)
 - 1. Emättimestä portioon ulottuu kerrostunut ei-keratinisoitunut levyepiteeli, endokerviksestä kohdun ulkosuuhun lieriöepiteeli ja näiden välissä on metaplastisen levyepiteelin vyöhyke eli ns. muuntumisalue (transformation zone, TZ).

II. KOHDUNKAULAN HPV-INFEKTIO

- A. Valtaosa ihmisistä (yli 80%) saa nuorena aikuisena HPV-infektion, joka on seksitauti ja infektoi erityisesti kohdunkaulan muuntumisaluetta.
 - 1. Infektio on yleensä oireeton ja paranee spontaanisti parissa vuodessa, mutta pitkäaikaisena voi aiheuttaa esiastemuutoksien (CIN, LSIL/HSIL) kautta invasiivista karsinoomaa.
- B. Riski kohdunkaulan intraepiteelisellem neoplasialle riippuu HPV:n tyypistä.
 - 1. Korkean riskin HPV (hrHPV) – Pääasiassa HPV 16,18,31 ja 33
 - 2. Matalan riskin HPV – Pääasiassa HPV 6 ja 11
- C. Esiasteiden patogeneesin kannalta keskeisin tapahtuma on hrHPV:n DNA:n integroituminen muuntumisalueen solujen genomiin, mikä johtaa virusproteiinien E6 ja E7 yli-ilmentymiseen.
 - 1. Pilkkovat ja inaktivoivat kasvunrajoiteproteiineja: E6 aiheuttaa p53:n pilkkoutumista ja E7 inaktivoi Rb:a.

III. KOHDUNKAULAN INTRAEPITEELISET NEOPLASIAAT

- A. Jaetaan sen mukaan, kuinka suuren osan epiteelin paksuudesta kypsyttömät dysplastiset solut käsittävät.
1. LSIL (aikaisemmin CIN1) – 1/3 epiteelin paksuudesta
 - a. Atypia on vähäistä ja havaitaan koilosytoosia
 - b. Regressoituu n. 2/3 tapauksista.
 2. HSIL (aikaisemmin CIN2/3) – <2/3 (CIN2) – lähes koko epiteelin korkeus (CIN3)
 - a. Korostunut atypia ja runsaammin mitosisuhteita.
 - b. CIN2 regressoituu n. 1/3 tapauksista, CIN3 regressoituu hyvin harvoin.
 3. Karsinoma in situ – Koko epiteelin paksuus, mutta ei invasiota
 - a. Ei regressoidu ja etenee yleensä invasiiviseksi karsinomaksi.
 - b. Yleensä säästetty määritelmänä adenokarsinomialle in situ (AIS), kun taas nykyään koko paksuuden kattava HSIL (CIN3) käsittää levyepiteelikarsinoman in situ.
- B. Matalan riskin HPV-infektiot yleensä eivät etene LSIL-vaiheesta eteenpäin, kun taas HSIL-muutokset ovat lähes aina hrHPV:n aiheuttamia.

IV. KOHDUNKAULAN SYÖPÄ

- A. Kohdunkaulan epiteelistä lähtöisin oleva invasiivinen karsinoma; tavataan tyypillisesti 40-50-vuotiailla.
- B. Oireilee poikkeavana verenvuotona emättimestä (erityisesti yhdynnän jälkeinen) tai pahanhajuisena valkovuotona.
- C. HPV-infektioille altistavan toiminnan lisäksi riskiä lisää mm. tupakointi ja immunosuppressiiviset tilat.
- D. Jaetaan levyepiteeli- (60%) ja adenokarsinomaan (40%), jotka molemmat ovat lähes aina HPV-taustaisia.
- E. Komplikaatiot liittyvät yleensä invasioon anteriorisen kohdunseinämän läpi rakkoon asti, jossa kasvain voi obstruoida ureetterit ja aiheuttaa postrenaalisen munuaisvaurion.

V. KOHDUNKAULAN SYÖVÄN EHKÄISY

- A. HPV-rokotteet ovat vähentäneet vaikeiden esiasteiden muodostumista runsaasti; rokotusohjelmassa tarjotaan rokotetta tyypeille 16 ja 18 (Cervarix) sekä tytöille että pojille (10-12v.).
1. Käytössä on myös toinen rokote (Gardasil 9), joka ehkäisee lisäksi HPV-tyyppejä 6 ja 11 ja siten myös kondyloomia.
- B. Syövän kehittyminen esiasteiden läpi kestää yleensä n. 10-20-vuotta, joten tehokkaalla seulonnalla muutos voidaan havaita ennen kuin se kehittyy karsinomaksi.
1. Kohdunkaulan syövän seulonta kohdistetaan 5 vuoden välein (25)30-65-vuotiaisiin naisiin.
- C. Seulonta perustuu kohdunkaulan muutosalueelta otettuun sivelynäytteeseen, josta voidaan havaita mahdolliset papilloomavirukset (HPV-testi); samasta näytteestä voidaan tehdä myös papakoe, jos HPV-testi on positiivinen.
1. Papakokeessa näytteestä tutkitaan solukuva ja jos havaitaan epätyypillisiä soluja, tehdään jatkotutkimuksia (yleensä kolposkopia ja biopsia).
 - a. Papakokeen rajoitteita on sen heikko tehokkuus adenokarsinomien tunnistamisessa sekä mahdollinen heikko näytekapale.

- i. Adenokarsinoomien suhteellinen määrä levyepiteelikarsinoomiin verrattuna onkin kasvanut.
2. Kolposkopian ja biopsian tulokset ohjaavat hoitoa.
 - a. LSIL – seuranta riittää, sillä spontaani paraneminen on tavallista
 - b. HSIL tai AIS – yleisin hoitomuoto on sähkösilmutkahoito (LOOP), jossa muutosalueet poistetaan laserilla.
3. Seulonta on rokotteista riippumatta tarpeellista, sillä rokotteet eivät kata kaikkia HPV-tyyppejä.

KOHDUN TAUDIT

I. PERIAATTEET

- A. Kohdun limakalvo (endometrium) koostuu funktionaalisesta ja basaalisesta kerroksesta.
- B. Endometriumissa on kohdun lihaseinämä eli myometrium.
- C. Endometrium on sukupuolihormoneihin reagoiva, ja kuukautiskierrossa muuttuvat hormonipitoisuudet voidaan havaita endometriumissa eri vaiheina.
 1. Proliferatiivinen vaihe – estrogeeni lisää endometriumien kasvua
 2. Sekreetiovaihe (postovulatorinen vaihe) – Ovulaation seurauksena lisääntynyt progesteronin erityis keltarauhasesta saa endometriumien muuttumaan implantaatiolle soveltuvaksi.
 3. Kuukautisvuoto – Jos implantaatiota ei tapahdu, progesteroni- ja estrogeenitasot laskevat, mikä johtaa limakalvon ohenemiseen ja spiraaliarteroiden kasaanpainumiseen, limakalvon iskemiaan ja lopulta irtoamiseen.

II. VUOTOHÄIRIÖT

- A. Verinen kohtuvuoto, joka on poikkeava ajankohdaltaan, kestoltaan tai määrältään, on yleinen oire kaikenikäisillä; vuotohäiriöt voidaan jakaa pääasiassa toiminnallisiin ja kohdun muutoksista riippuviin.
 1. Menorragia – runsaat kuukautisvuodot
 2. Polymenorea – tiheät kuukautisvuodot
 3. Metrorragia – Epäsäännöllisin väliajoin tapahtuvaa kuukautiskierrosta riippumatonta vuotoa; välivuoto
 4. Oligomenorea – harvat kuukautiset
 5. Hypomenorea – niukat kuukautiset
 6. Amenorea – kuukautisten puuttuminen
- B. Toiminnallinen (dysfunktionaalinen) vuoto voi johtua häiriöstä keltarauhasen toiminnassa (ovulatorinen) tai ovulaation puuttumisesta (anovulatorinen).
 1. Liian vähäisen progesteronin erityksen takia proliferatiivista vaihetta ei seuraa sekreetiovaihe ja proliferatiiviset rauhaset painuvat kasaan ja vuotavat normaalista syklistä poiketen.
 2. Dysfunktionaaliset ja erityisesti anovulatoriset vuodot ovat yleisimpiä menarken ja menopaussin aikaan.
- B. Kohdun muutoksista mm. tulehdukset, raskaus ja sen komplikaatiot, neoplasiat sekä Ashermanin oireyhtymä voivat aiheuttaa verisiä vuotoja.
 1. Ashermanin oireyhtymässä keskenmenon tai synnytyksen jälkeisen vuodon jälkeen tehty liian aggressiivinen kaavinta on voinut aiheuttaa endometriumien basaalisien

kerroksen menetyksen ja arpeutumista; voi ilmetä myös sekundaarisena amenorreana ja hedelmättömytenä.

III. ENDOMETRIITTI

- A. Kohdun limakalvon nouseva bakteeri-infektio, jonka taustalla on usein kohtuonteloon kohdistunut toimenpide tai ”vierasesine” eli kierukka tai synnytyskomplikaationa kohtuun jäänyt materiaali.
 - 1. Valtaosa alkaa oirehtia n. 4-10 päivää synnytyksestä; ilmenee kuumeena, verisenä vuotona ja lantion aristuksena.
 - 2. Aiheuttajabakteerit voivat olla synnytyskanavan normaaleja bakteereja, kuten B-ryhmän streptokokki, E. coli, Actinomyces (kierukka) tai seksitauteja, kuten klamydia ja tippuri.
- B. Akuutissa vaiheessa diagnoosi perustuu yleensä kliinisiin löydöksiin, kroonisessa endometriitissä histologinen kuva auttaa diagnoosissa.
 - 1. Tyypillinen piirre on limakalvon sisäiset plasmasolut; endometriumissa nähdään normaalisti lymfosyyttejä, joten pelkät lymfosyytit eivät riitä diagnoosiin.
- C. Tulehdus voi levitä mm. munanjohtimiin (salpingiitti) ja munasarjoihin, jolloin infektiota kutsutaan sisäsynnytintulehdukseksi (PID).
 - 1. Altistaa ektooppisille raskauksille ja hedelmättömyydelle.
 - 2. Yleensä seksitautien (klamydia/tippuri) komplikaatio; erityisesti klamydian aiheuttama tulehdus on lievä-oireinen.

IV. ENDOMETRIUMIN POLYYPIT

- A. Pehmeitä, pitkänomaisia hyperplastisia endometriumin pullistumia; jopa yli 10% yli 30-vuotiaista naisista.
 - 1. Syntyvät lisääntyneen paikallisen estrogeeniherkkyyden tai vähentyneen progesteroniherkkyyden takia eivätkä irtoa kuukautisvuodon aikana.
 - a. Voivat siis syntyä tamoksifeenihoidon sivuvaikutuksena (estrogeeninen vaikutus endometriumiin, anti-estrogeeninen vaikutus rintakudokseen).
- B. Yksi yleisimmistä vuotohäiriön syistä, erityisesti 40-50-vuotiailla (jopa puolet poikkeavista vuodoista).

V. ENDOMETRIOOSI

- A. Endometriumien kaltaista kudosta esiintyy kohtuontelon ulkopuolella (koristooma); yleinen (n. 6-10% fertiili-ikäisistä).
 - 1. Todennäköisesti syntyy retrogradisen kuukautisvuodon aiheuttamana (regurgitaatioteoria); muita mahdollisia syntytapoja ovat lymfaattinen leviäminen ja suora solumetaplasia.
- B. Ilmenee sijainnista riippuen eri paikkoihin lokalisoituvana kipuna, joka on pahinta kuukautisvuodon aikaan, sillä endometriumien solut reagoivat vähentyneeseen hormonistimulaatioon ja aiheuttavat vuotaessaan verta kyseisen alueen inflammaatiota.
 - 1. Inflammaatio voi myös johtaa kiinnikkeiden muodostumiseen, mikä johtaa krooniseen, ei sykliseen kipuun.
- C. Tyypillisin sijainti on munasarjoissa (suklaakysta), mikä ilmenee mm. lantiokipuna, kivuliaina kuukautisina ja lapsettomuutena.
 - 1. Muita yleisiä sijainteja ovat mm. peritoneumilla (lantiokipua) rektovaginaalitila (pouch of Douglas, kipu ulostaessa), suolen seinämä (kipu ulostaessa), virtsarakon seinämä (kipu virtsatessa), kohdun kiinnityssiteet (lantiokipu) ja munanjohtimet

(lisää ektooppisen raskauden riskiä) ja myometrium (adenomyoosi, vuotohäiriöt ja kuukautiskivut).

D. Endometrioosi voi harvoin malignisoitua, erityisesti munasarjoissa.

VI. ENDOMETRIUMIN HYPERPLASIA

A. Pitkään jatkunut voimakas estrogeenivaikutus ilman tasapainottavaa progesteronia voi johtaa endometriumien rauhasen liikakasvuun suhteessa stroomaan.

1. Estrogeenivaikutusta voi lisätä mm. lihavuus, munasarjojen monirakkulaoiryhtymä (PCOS) tai estrogeenikorvaushoito.
2. Rauhasolut ovat hormonien vaikutukselle herkempiä kuin stroomasolut.

B. Aiheuttaa varsinkin vaihdevuotisilla vuotohäiriöitä ja varsinkin postmenopausaalista verenvuotoa.

C. Jaetaan solujen poikkeavuuden ja rauhasrakenteen kompleksisuuden perusteella vaikeusasteisiin.

1. Yksinkertaisessa hyperplasiassa paksuuntuminen on normaalin histologian kaltaista, kun taas kompleksissa strooman hyperplasia on suhteessa rauhasiin paljon vähäisempää.
2. Kompleksisuudella ei niin suurta merkitystä kuin atypialla;
 - a. Kompleksinen atyyppinen hyperplasia pahanlaatuistuu n. 30% tapauksista
 - b. Yksinkertainen atyyppinen hyperplasia pahanlaatuistuu n. 8% tapauksista
 - c. Ilman atypiaa pahanlaatuistumisriski on alle 3%

D. Voidaan hoitaa ilman atypiaa progestiinihoidolla, mutta kompleksi atyyppinen muoto tulee hoitaa hysterektomialla, ellei potilas ole poikkeuksellisen nuori.

VII. ENDOMETRIUMIN KARSINOOMA

A. Kohtusyövät ovat lähes aina endometriumien rauhasen maligneja proliferaatioita eli adenokarsinomia; Suomessa n. 700/v. eli naisten sukuelinten yleisin invasiivinen syöpä.

B. Tyypillisin oire on postmenopausaalinen verenvuoto.

C. Jakautuvat histologian perusteella tyyppin 1 (n. 80%) ja tyyppin 2 karsinomiin.

1. Tyyppi 1 - Endometroidi eli normaalin endometriumien kaltainen histologia; kehittyy endometriumien hyperplasiasta.
 - a. Riskitekijät liittyvät estrogeenivaikutuksen lisääntymiseen ja pitkittymiseen (mm. ikä, ylipaino, varhainen menarke/myöhäinen menopausi, synnyttämättömyys, monirakkulaiset munasarjat).
 - b. Mutaatiot mismatch-repair-geeneissä tai PTEN-tuumorisuppressorigeneissä ovat yleisiä aikaisia mutaatioita.
 - c. Ennuste on tyyppiä 2 parempi (hyvin erilaistuneella jopa 90%); keski-ikä esiintymiselle on n. 60v.
2. Tyyppi 2 – Ei-endometroidi (yleensä seroosi ja kasvaa papillaarisesti); kehittyy sporadisesti ilman aikaisempaa hyperplasiaa
 - a. TP53-mutaatiot lähes kaikissa tapauksissa; MMR- ja PTEN-mutaatiot taas harvinaisia
 - b. Aggressiivisempi kuin tyyppin 1; keski-ikä esiintymiselle on n. 70v.

VIII. LEIOMYOOMA (MYOOMA, FIBROIDI)

A. Myometriumien benigni sileälihaskasvain, naisten yleisin kasvain (jopa 80%).

B. Usein multippeleina ja kutistuvat menopaussin jälkeen ja laajenevat raskaudessa, joten ovat yhteydessä estrogeenistimulaatioon; ei tavata ennen puberteettia.

- C. Eivät malignisoidu, mutta voivat sijainnista ja koosta riippuen aiheuttaa oireita; yleensä kuitenkin oireettomia.
 - 1. Tyypillisiä oireita ovat vuotohäiriöt, lantiokivut ja hedelmättömyys.
- D. Makroskooppisesti ovat yleensä selkeästi erottuvia, vaaleita massoja, joilla kehrällä oleva leikkauspinta.
 - 1. Suuret myoomat voidaan todeta gynekologisessa sisätutkimuksessa suurentuneena ja kyhmyisenä kohtuna; pienet löytyvät vain ultraäänitutkimuksessa.
- B. Histologisesti näyttää normaalilta myometriumin sileältä lihakselta; mukana voi olla fibroosia.
- E. Yleensä eivät vaadi hoitoa, mutta nopeasti kehittyneet suuret kasvaimet ja hankalia oireita aiheuttavat tulee leikata; yleisin kohdun poiston syy.

IX. LEIOMYOSARKOOMA

- A. Myometriumista lähtöisin oleva maligni sileälihaskasvain; suhteellisen harvinainen.
- B. Syntyvät de novo (ei leiomyoomasta) ja ovat leiomyoomiin verrattuna yleensä yksittäisiä ja esiintyvät postmenopausaalisilla naisilla.
- C. Makroskooppisesti on epätarkasti rajoittuva, verekäs ja nekroottinen massa.
- D. Histologisesti havaitaan nekroosia, merkittävää tuma-atypiaa ja mitoosi-aktiivisuutta.

MUNASARJOJEN TAUDIT

I. PERIAATTEET

- A. Munasarjan tehtävä on tuottaa hedelmöityskelpoisia munasoluja.
- B. Munasolut kypsyvät munarakkuloissa eli follikkeleissa, jotka koostuvat oosyytistä, jonka ympärillä on granuloosa- ja teekasoluja.
- C. Kuukautiskierto perustuu pääasiassamunasarjan tuottamien steroidihormoneiden pitoisuuksiin.
 - 1. LH stimuloi teekasoluja tuottamaan androgeeneja.
 - 2. FSH stimuloi granuloosasoluja muuttamaan androgeeneja estradioliksi, joka aiheuttaa endometriumin proliferatiivisen vaiheen.
 - 3. Estradioli indusoi LH-piikin, mikä aiheuttaa ovulaation.
 - 4. Ovulaation jälkeen jäljelle jääneestä follikkelista muodostuu progesteronia erittävä keltarauhanen (corpus luteum), mikä ajaa endometriumin sekreetiovaihetta.

II. MUNASARJAN KYSTAT

- A. Munasarjassa usein todetaan muutamia suuria yksilokeroisia nesteentäyttämiä rakkuloita eli kystia, joista yleisimmät ovat hedelmällisessä iässä kehittyviä ns. toiminnallisia kystia.
 - 1. Follikkelikysta tai keltarauhaskysta muodostuvat nesteen kertyessä rakkulaan ja turvottaessa sen jopa 5-6cm:n kokoiseksi.
 - 2. Yleensä surkastuvat itsestään seuraavan kuukautiskierron aikana, mutta joskus kystaan sisälle vuotava veri voi turvottaa kystan niin suureksi, että se repeää ja aiheuttaa vuodon vatsaonteloon.
- B. Monirakkulaisessa munasarjaoireyhtymässä (PCOS) tarkoittaa tilaa, jossa naisella on ainakin kaksi seuraavista oireista: oligomenorrea, hyperandrogenismi tai ultraäänitutkimuksessa todettavat monirakkulaiset munasarjat (>20 follikkelikystaa ainakin toisessa munasarjassa).

1. Selkeää aiheuttajaa ja patogeneesia ei tiedetä, mutta uskotaan olevan geneettistä taustaa; häiriötä useissa endokriinisissä toiminnoissa.
2. Yksi mahdollinen taustatekijä on häiriö, jossa aivolisäkkeen etulohko erittää tiheällä frekvenssillä GnRH:a, mikä stimuloi hypotalamusta erittämään enemmän LH:ta kuin FSH:ta ($LH:FSH > 2$).
 - a. LH stimuloi teekasoluja tuottamaan runsaasti androgeeneja, mikä aiheuttaa hirsutismia eli naisen liiallista karvankasvua miestyypisillä ihoalueilla.
 - i. Suurin osa potilaista ovat keskivartalolihavia ja insuliiniresistenssiä, mikä aiheuttaa kompensatorista hyperinsulinemiaa; insuliini stimuloi androgeenien eritystä munasarjoista, estää SHBG:n synteesiä sekä voimistaa LH:n eritystä.
 - b. Androgeenit konvertoidaan estroniksi perifeerisessä rasvakudoksessa.
 - i. Estroni vähentää FSH:n eritystä negatiivisella palautesäätelyllä, mikä johtaa follikkelien degeneraatioon ja kystien muodostumiseen.
 - ii. Kohonneet estronitasot lisäävät riskiä endometriumien karsinoomalle.
3. Oligomenorrea, lapsettomuus ja hirsutismi tavallisia oireita; riski laskimotukoksille ja sairastua diabetekseen ovat suurentuneet.

MUNASARJAN NEOPLASTISET TAUDIT

I. PERIAATTEET

- A. Munasarja koostuu kolmesta solutyypistä: itusolut, sukupiena-stroomasolut (sex-cord stroma) ja pintaepiteeli.
- B. Kaikista kudostyypeistä voi syntyä sekä hyvänlaatuisia että pahanlaatuisia kasvaimia.
- C. Yleensä pitkään oireettomia, mutta kookkaina voivat aiheuttaa mm. paineoireita lantioon ja tihentynyttä virtsaamistarvetta.
- D. Riski korreloi ovulaatioon liittyvään traumaan ja estrogeenille altistumiseen.

II. EPITELIAALISET KASVAIMET

- A. Yleisin munasarjakasvaimen tyyppi (65-75%, mutta n. 90% maligniteeteista)
- B. Munasarjoja verhoava multipotentti epiteeli on samaa alkuperää kuin munanjohdinten (seroosi), endometriumien ja endokerviksin epiteeli (musinoosi).
 1. Voi siis neoplastisessa muutoksessa tuottaa näiden kudosten kaltaisesta epiteelistä koostuvan massan.
- C. Yleisin epiteliaalinen kasvaintyyppi on seroosi (täynnä vetistä nestettä) ja toiseksi yleisin on musinoosi (täynnä limaista nestettä).
- D. Seroosit ja musinoosit voivat olla benignejä eli kystadenoomia (60% ja 80%) , rajalaatuisia (15% ja 10%) tai maligneja eli kystadenokarsinoomia (25% ja 10%).
 1. Kystadenoomat esiintyvät tyypillisesti yhtenä suurena sileäpintaisena kystana, jota verhoaa histologisesti ei-tyyppinen epiteelikerros.
 - a. Tyypillisesti premenopausaalisilla naisilla (n. 40-50v.)
 2. Malignit kasvaimet esiintyvät tyypillisesti rakenteeltaan komplekseina (monilokeroinen) ja pinnaltaan rosoisina kystina, joita verhoaa atyyppinen invasoiva karsinoomasolukko.
 - a. Tyypillisesti postmenopausaalisilla naisilla (n. 60-70v.).
 - b. Leviävät tyypillisesti lokaalisesti, erityisesti peritoneumiin.

3. Rajalaatuisissa kasvaimissa pintasolukko on muuttunut atyyppiseksi, mutta invaasiota ei havaita ja kasvaimet käyttäytyvät yleensä hyvänlaatuisesti; voivat kuitenkin lähettää implantteja peritoneumille.
 4. Seroosit tuumorit ovat musinooseja paljon useammin bilateraalisia (n. 25%), kun taas musinoosit ovat useammin monilokeroisia ja suurempia.
 5. N. 5-10% munasarjasyövistä ovat perinnöllisiä ja tärkeimmät mutaatiot ovat perinnöllisiä BRCA1- ja BRCA2-tuumorisuppressorimutaatioita (yhteydessä myös munanjohtimien syöpään ja rintasyöpään); yleensä aiheuttavat huonosti erilaistuneen seroosin kasvaimen.
- E. Harvinaisemmin epiteliaalinen kasvain voi olla endometrioidinen, kirkassoluinen tai välimuotoinen.
1. Endometrioidinen kasvain on yleensä maligni ja muistuttaa endometriumien adenokarsinoomaa.
 - a. Munasarjan endometrioosi todennäköisin lähtökohta.
 - b. N. 15-30% potilaista on myös erillinen endometriumien karsinooma.
 2. Kirkassoluinen kasvain on myös yleensä maligni ja liittyy endometrioosiin.
 3. Välimuotoiset kasvaimet koostuvat uroteelia muistuttavasta solukosta ja ovat yleensä benignejä; yleisin tyyppi on Brennerin tuumori.
- F. Eitelialisyöpien ennuste huonoin kaikista gynekologisista syövästä; kaikki levinneisyyslukat huomioiden <50%.
- G. Epäiltäessä syöpää verestä tutkitaan kasvainmerkkiaineet, joista yleisin on CA 125; myös HE4 käytössä.
1. Voivat nousta muissakin tilanteissa, kuten PID ja endometrioosissa, joten ovat parhaita hoidon vasteen ja uusiutumisen seurannassa.

III. ITUSOLUKASVAIMET

- A. Toiseksi yleisimpiä munasarjakasvaimia (15-20%); esiintyvät pääasiassa hedelmällisessä iässä olevilla naisilla.
- B. Kasvainten alaluokat muistuttavat itusolun mahdollisia erilaistumissuuntia.
1. Sikiökudos (embryonaalisia kerroksia) – teratooma ja embryonaalinen karsinooma
 2. Oosyytit – dysgerminooma
 3. Ruskuaispussi – ruskuaispussikasvaimet (endodermial sinus tumor)
 4. Istukka – korionkarsinooma
- C. Hyvänlaatuinen dermoidikysta eli kypsä kystinen teratooma – yleisin itusolukasvain
1. Koostuu erilaistuneesta ja aikuistyyppisestä solukosta, joka on peräisin yhdestä tai useammasta alkiokerroksesta.
 - a. Sisäpinnalla voidaan havaita mm. ihoa, karvaa, luuta, rustoa, hampaita, rasvaa, gliasolukkoa ja kilpirauhasta.
 - i. Jos kasvain koostuu lähes kokonaan kilpirauhaskudoksesta, kutsutaan kasvainta struma ovariksi – voi mahdollisesti aiheuttaa hypertyreoidismia.
 2. Benignejä, mutta mikä tahansa kypsän teratooman osa voi malignisoitua ja näyttää samalta kuin muualla elimistössä syntyvä kasvain.
 3. Epäkypsät teratoomat ovat harvinaisempia ja ovat mahdollisesti maligneja; yleensä todetaan embryonaalista neuroektodermaalista kudosta ja huonosti kypsyntä gliasolukkoa.

- D. Embryonaalinen karsinoma - Suurista alkiolevyjen soluista koostuva kasvain; yleensä aggressiivisia ja metastasoivat aikaisin.
- E. Dysgerminoma – yleisin pahanlaatuinen itusolukasvain
 - 1. Koostuvat huonosti kohesiivisesta monotonisesta kirkassytoplasmaisesta oosyttejä muistuttavasta solukosta (sentraaliset tumat), jota erottaa lymfosyyttirikkaat fibroottiset septat.
 - 2. Morfologia on identtinen miehillä todettavan seminooman kanssa.
 - 3. Hyvä prognoosi ja vaste sädehoidolle.
- F. Ruskuaispussikasvaimet – pahanlaatuisia; yleisin itusolukasvain lapsilla
 - 1. Morfologialtaan vaihtelevaa; histologisesti yleensä havaitaan Schiller-Duvalin kappaleita eli glomeruloidi rakenne, jossa sentraalista verisuonta ympäröi tuumorisolut kystisessä tilassa.
 - 2. Seerumin AFP on yleensä koholla.
- G. Korionkarsinoma – pahanlaatuisia
 - 1. Koostuu istukkaa mimikoivasta kudoksesta (syto- ja synsytiotrofoblasteja), mutta villuksia ei havaita.
 - 2. Beeta-hCG yleensä koholla.
 - 3. Huono ennuste ja vaste kemoterapialle; leviäminen eroaa muista munasarjakasvaimista (aikainen hematologinen leviäminen).

IV. SUKUPIENA-STROOMASOLUKASVAIMET

- A. Munuaisten hormonaalisesti aktiivista solukkoa (granuloosa- ja teekasolut) muistuttavia kasvaimia.
- B. Granuloosa-teekasolutuumorit – yleisin pahanlaatuinen sukupiena-stroomasolukasvaintyyppi, mutta metastasoivat vain harvoin
 - 1. Koostuvat vähäisesti atyyppisistä, niukkasytoplasmaisista granuloosa- ja teekasoluista; muodostavat Call-Exner-kappaleita (eosinofiilisen materiaalin täyttämiä rakenteita).
 - 2. Voivat tuottaa estrogeenia.
 - 3. Jaetaan aikuistyyppin (huomattavasti yleisempiä, varsinkin postmenopausaaliset) ja juveniileihin kasvaimiin.
 - a. Aikuistyyppin kasvaimen tuottama estrogeeni voi aiheuttaa vuotohäiriöitä ja endometriaalista hyperplasiaa sekä karsinoomaa.
 - b. Juveniilit kasvaimet voivat aiheuttaa varhaisen murrosiän alkamisen.
- B. Tekooma-fibrooma – benignejä; fibroomat yleisimpiä sukupieni-stroomasolukasvaimia
 - 1. Teekasoluista ja fibroosista tai pelkästään munasarjojen strooman fibroblasteista koostuva kasvain (fibrooma).
 - 2. Liittyy Meigsin oireyhtymään; triadi, jossa havaitaan askiittes, pleuran effuusioita ja munasarjakasvain (yleensä fibrooma).
- C. Sertolin-Leydiginsolukasvaimet – yleensä benignejä, mutta voivat harvoin olla maligneja
 - 1. Muistuttavat kiveksen stroomasoluja; histologisesti havaitaan Sertolin solujen muodostamia tubuluksia ja näiden välisissä fibroottisissa septoissa Leydig-tyyppisiä soluja.
 - a. Leydigin solut sisältävät Reinken kristalleja.
 - 2. Voivat tuottaa androgeeneja, mikä ilmenee virilisaationa ja hirsutismina.

V. METASTAASIT

- A. N. 6-7% munasarjojen kasvaimista ovat metastaattisia alkuperältään.
- B. Tärkein munasarjoihin metastasoiva primaarisyöpä on gynekologisten syöpien lisäksi GI-kanavan karsinoomat.
 - 1. Metastaattinen bilateraallinen musinoosi tuumori, jossa havaitaan sinettisormussoluja on nimeltään Krukenbergin tuumori ja on yleensä peräisin diffuusista mahalaukan karsinoomasta.
 - a. Primaarinen musinoosi tuumori on yleensä unilateraalinen.
 - 2. Umpilisäkkeen musinoottisen neoplasian metastasoidessa peritoneumiin ja munasarjoihin havaitaan yleensä runsaasti limaa peritoneumissa (peritoneaalinen pseudomyksooma).

RASKAUTEEN LIITTYVIÄ ONGELMIA

- I. EKTOPPINEN RASKAUS
 - A. Kohdunulkoinen raskaus eli implantaation sijoittuminen kohtuontelon ulkopuolelle; n. 2% raskauksista.
 - B. Lähes kaikki sijaitsevat munanjohtimessa (erityisesti ampulla).
 - C. Implantaatiolle väärään paikkaan altistaa kulun häiriintyminen eli sisäsynnytintulehdukset, lantion alueen leikkaukset, endometrioosi, aikaisemmat ektooppiset raskaudet ja keisarileikkaukset.
 - D. Epäily yleensä herää, kun lisääntymisikäisellä naisella on alavatsakipua ja/tai ylimääräistä veristä vuotoa muutama viikko kuukautisten myöhästymisen jälkeen (myös normaalissakin alkuraskaudessa).
 - 1. N. kolmasosalla lähes oireettomia ja kudokset häviävät itsestään eli resorboituu.
 - 2. Komplikaationa munanjohtin voi revetä ja aiheuttaa runsaan verenvuodon vatsaonteloon.
- II. KESKENMENO
 - A. Raskauden spontaani keskeytyminen eli abortti tapahtuu ennen sikiön elinkykyiseksi kehittymistä (22vk tai alle 500g); n. 15 kaikista raskauksista.
 - B. Tavallisin oire on verenvuoto ja siihen liittyvät alavatsakivut; yleensä alkuraskaudessa kuten ektooppisessa raskaudessakin.
 - C. Suurin osa keskenmenoista johtuvat sikiön kromosomipoikkeavuuksista.
 - D. Muut etiologiset tekijät ovat yleensä naisesta johtuvia, kuten tukostaipumus (erityisesti hankinnainen fosfolipidivasta-aineoireyhtymä), infektiot (mm. TORCH-infektiot) ja altistuminen teratogeeneille.
 - 1. Teratogeenien annoksen suuruus ja aikainen altistuminen lisäävät riskiä.
 - 2. Myös miehen tupakointi ja runsas alkoholin käyttö vaikuttavat negatiivisesti.
- III. LOPPURASKAUDEN VERENVUODOT
 - A. Loppuraskauden vuoto liittyy usein raskauteen ja ovat epäselvinäkin riskiraskauksia; n. 2-5% raskauksista.
 - B. Etinen istukka eli placenta praevia tarkoittaa istukan sijoittumista niin, että se peittää osan tai kaiken kohdun sisäsuusta.
 - 1. Tyypillisin oire on kivuton vuoto viimeisessä kolmanneksessa, mutta suurin osa havaitaan jo aikaisemmin sikiön rakennetutkimuksessa.

- a. Suurin osa siirtyy pois kohdunsuun välittömästi läheisyydestä, mutta todella myöhään vuotavat sekä vuodottomat sisäsuuta peittävät tulee hoitaa keisarileikkauksella.
- C. Myös istukan kiinnittymissyvyys voi olla poikkeava, mikä voi aiheuttaa epätyypillistä verenvuotoa sekä ennen että jälkeen synnytystä ja vaikean synnytyksen jälkeisvaiheen. (istukan synnyttäminen).
 1. Istukan villukset voivat tarttua myometriumiin (placenta accreta), tunkeutua myometriumiin syvemmälle (placenta increta) tai jopa sen läpi (placenta percreta).
 2. Mitä syvempi invaasio, sitä suurempi synnytyksenaikainen verenvuodosta johtuva kuolleisuus.
 3. Tärkeimmät riskitekijät ovat etinen istukka ja aiempi keisarileikkaus.
- D. Istukan ennenaikainen irtoaminen eli ablaatio tarkoittaa istukan irtoamista katokalvosta (desiduasta) osittain tai kokonaan ennen lapsen syntymää.
 1. Johtuu spiraalivaltimon repeämisestä ja verenvuodosta katokalvon ja istukan väliin; pelätyn tapaturman aiheuttama raskauskomplikaatio.
 2. Tyypillisin oire on verenvuoto ja vatsakipu; yli puolessa tapauksista sikiö kokee hapenpuutetta ja n. 10% tapauksista johtaa kohtukuolemaan.
 - a. Vaarallinen myös äidille; voi kehittyä DIC ja sokki.

IV. PRE-EKLAMPSIA JA EKLAMPSIA

- A. Pre-eklampsia tarkoittaa 20. raskausviikon jälkeen puhjennutta raskaushypertensiivistä tilaa, johon liittyy proteinuriaa.
 1. Voi aiheuttaa turvotusta, voimakasta päänsärkyä ja jopa näköhäiriöitä.
 2. Voi muuttua hengenvaaralliseksi kouristuskohtaukseksi (eklampsia).
- B. Laukaiseva tekijä tuntematon, mutta johtuu trofoblastien implantaatiohäiriöstä kohdun seinämään ja verisuoniin, mikä vähentää sikiön verenkiertoa ja johtaa endoteelin toimintahäiriöön.
 1. On siis istukkasairaus; tauti paranee pian istukan synnyttyä.
 2. Voi johtaa mm. istukan infarkteihin ja istukanalaiseen verenvuotoon.
- C. Vaikeaan pre-eklampsiaan saattaa liittyä HELLP-oireyhtymä, joka on mikroangiopaattinen hemolyyttinen anemia: hemolyysi, kohoolla olevat maksa-arvot ja trombosytopenia.
 1. Hypertensio ja tukokset maksassa vaurioittavat kudosta, mikä aiheuttaa oireyhtymälle tyypillisen ylävatsakivun.
- D. Oireyhtymään ei ole muuta parantavaa hoitoa kuin raskauden päättäminen ja yleensä raskaus päätetään heti diagnoosin jälkeen.

V. RYPÄLERASKAUS (MOLA HYDATIDOSA)

- A. Raskauteen liittyviä trofoblastisairauksia, jotka johtuvat häiriöstä munasolun hedelmöitymisessä.
 1. Hedelmöityshäiriö aiheuttaa trofoblastisolukon runsasta proliferaatiota ja verisuonittomia korionvilluksia.
- B. Voidaan jakaa häiriön perusteella täydelliseen ja osittaiseen rypäleraskauteen.
 1. Täydellinen rypäleraskaus – tumattoman munasolun hedelmöittää kaksi siittiötä tai hedelmöittävän siittiön kromosomisto kahdentuu; homotsygoottinen diploidi genomi (46, XX) ((46, XY) kahden siittiön hedelmöittäessä mahdollinen).
 - a. Sikiökudokset puuttuvat kokonaan
 - b. Normaaleja korionvilluksia ei ole ja ne ovat ödeemisia.

- c. Trofoblastisolukko ympäröi villuksia ja on diffuusisti hyperplastista.
 - d. Etenee n. 2-4% ajasta korionkarsinoomaksi.
- 2. Osittainen rypäleraskaus – Kaksi siittiötä hedelmöittää yhden normaalin haploidisen munasolun; triploidinen karyotyyppi (69 kromosomia)
 - a. Sikiökudoksia voidaan havaita.
 - b. Osa villuksista on normaaleja, osa ödeemisia.
 - c. Trofoblastihyperplasia ei ole diffuusia ja vain osittain ympäröi ödeemisia villuksia.
 - d. Etenee hyvin harvoin korionkarsinoomaksi.
- C. Ilmenee verisenä emätinvuotona ensimmäisessä kolmanneksessa ja raskauden keston nähden liian kookkaana kohtuna ja b-hCG-pitoisuutena.
 - 1. Kaikututkimuksessa havaitaan sikiön puuttuminen ja ”lumisademainen” istukan rakenne.
- D. Hoidetaan kohdun imutyhjennyksellä ja hCG-pitoisuutta seurataan 6kk ajan.
 - 1. hCG-pitoisuudet voivat pysyä koholla tai nousta puuttellisen poiston tai jälkeenpäin kehittyneen koriokarsinooman takia.
 - a. Suurin osa korionkarsinoomista liittyy rypäleraskauteen, mutta myös muut keskenmenot lisäävät riskiä; n. 25% korionkarsinoomista liittyy normaaliin raskauteen.
 - b. Myös munasarjojen itusolukasvaimet voivat olla korionkarsinoomia; näiden vaste solunsalpaajille on huonompi verrattuna raskauteen liittyviin (yleensä varsin herkkiä).
 - 2. Korionkarsinooma metastasoi aikaisin, erityisesti keuhkoihin.

14 MIEHEN SUKUELINTEN PATOLOGIA

PENIKSEN TAUDIT

I. SYNNYNNÄISET ANOMALIAIT

- A. Yleisin (n. 1/300) synnynnäinen rakennehäiriö on hypospadiia eli virtsaputken aukeaminen peniksen alapinnalle (virtsaputken alahalkio).
 - 1. Lievimät jäävät usein huomaamatta, vaikeat voivat sijaita siittimen tyvessä tai jopa välilihan alueella.
 - 2. Johtuu urogenitaalipoimujen vajavaisesta sulkeutumisesta.
- B. Epispadiia eli ylähalkio on huomattavasti harvinaisempi kuin hypospadiia (alle 1:100 000).
- C. Mikropenis eli peniksen pituus 2,5SD alle ikäkohtaisen venytetyn mitan keskiarvon
 - 1. Riippuu väestöstä, mutta usein määritellään alle 1,9cm vastasyntyneen venytettynä peniksen mittana ja aikuisilla alle 7cm (joissain lähteissä alle 9,3cm).
 - a. Siitin mitataan asettamalla jäykkä mitta suoraksi vedetyn siittimen yläpinnalle symfyysistä (prepubinen rasva kompressoidaan viivottimella symfyysiä vasten) alkaen.
 - 2. Mikropenis voi olla itsenäinen anomalia, mutta usein se liittyy hypotalamuksen ja aivolisäkkeen häiriöihin sekä kromosomipoikkeamiin (esim. Klinefelterin oireyhtymä) -> hypogonadismi

- a. Hypogonadisilla aikaisella testosteronihoidolla saadaan aikaan siittimen kasvu
- D. Fimoosissa (ns. ahdas esinahka) esinahan aukko on niin pieni, ettei sitä voi vetää terskan taakse.
 - 1. Voi olla fysiologista tai patologista
 - a. Fysiologisessa fimoosissa esinahan kireys on primaarinen, eli esinahan ihossa ei ole arpeutumista. Liikkumaton esinahka on yleinen löydös nuorilla pojilla ja osa esinahan normaalia kehitystä.
 - i. Vähitellen esinahka alkaa irtoamaan terskasta ja tila väistyy yleensä itsestään
 - ii. Hoitona siis prepubertaalisilla pojilla on ensisijaisesti odotus
 - 2. Usein hankittu eli patologinen; johtuu arpeutumisesta, jonka on tuottanut joko suora trauma, peniksen valkojäkälä (BXO, autoimmuunireaktio) tai smegman kertyminen ja sen aiheuttamat toistuvat tulehdusepisodit (postiitti/balanopostiitti/balaniitti).
 - a. Hoito voi olla konservatiivinen tai operatiivinen
 - i. Konservatiivisena hoitona venyttely ja glukokortikoidivoide voi auttaa esinahan löystyttämisessä
 - ii. Operatiivisena hoitona esinahkaplastia tai ympärileikkaus
 - 3. Voi johtaa parafimoosiin, jossa ahdas esinahka ei pääse taakse vetämisen jälkeen takaisin terskan päälle.
 - a. Häätätilanne, sillä obstruktoi terskan verenkiertoa; joskus päivystysluonteinen kirurginen hoito on tarpeen tilanteen laukaisemiseksi (usein kuitenkin saadaan manipuloitua konservatiivisesti takaisin paikoilleen)
 - 4. Altistaa peniksen karsinoomalle, koska voi altistaa pitkäaikaisena heikolle hygienialle ja siten krooniselle ärsytykselle

II. EREKTIOON LIITTYVÄT ONGELMAT

- A. Peyronien tauti - peniksen käyristyminen, joka johtuu paisuvaista ympäröivän valkokalvon idiopaattisesta progressiivisesta arpeutumisesta.
 - 1. Ilmenee useimmiten 40-60-vuotiailla ja harvinainen nuorilla
 - 2. Johtunee traumaista (merkittävämmistä tai mikrotraumoista), jotka paranevat ja aiheuttavat fibrotisoitumista ja kalkkeutumista
 - 3. Diabetes tärkeä riskitekijä; monia muitakin (esim. verenpainetauti, tupakointi, alkoholi, testosteronivaje, transuretraaliset toimenpiteet...)
 - 4. Etenee vaihteittain
 - a. Alkuvaihe eli akuutti inflammatorinen vaihe: Arpikudosta muodostuu ja oireena esiintyy usein erektionaikainen kipu ja tunnusteltavissa oleva patti tai kovettuma jo ennen käyristymisen ilmaantumista
 - b. Kroonisessa fibroottisessa vaiheessa siittimessä selkeä kovettuma, joka kalkkeutuu ja aiheuttaa siittimen käyristymisen (käyristyy kovettuman suuntaan; useimmiten plakki on dorsumissa -> käyristyy ylöspäin, mutta plakki voi muodostua minne vain)
 - c. Aiheuttaa kipua erityisesti erektioissa, ajan kuluessa kipu helpottaa (kipuvaihe eli alkuvaihe saattaa kestää useita kuukausia)

5. Ei ole tehokasta lääkehoitoa (injisoitava kollageenaasi poistunut markkinoilta), akuutissa vaiheessa tulehduskipulääkkeitä kivunhoidossa ja PDE5:n estäjät, jos potilaalla samanaikaisesti erektiohäiriö.
 - a. Ensisijainen hoitokeino on operatiivinen, mutta mahdollinen oikaisuleikkaus tehdään vasta, kun kipuvaihe on ohi ja tilanne on ollut stabiili vähintään 3 kk
 - i. Useimmat potilaat pystyvät yhdyntään, jolloin kirurginen hoito ei ole tarpeen
- B. Priapismi eli kestoerektio – kivulias, pitkään (>4h) jatkuva erektio, joka ei yleensä liity kiihottumistilaan eikä laukea ejakulaatiosta.
 1. Paisuvaiskudos voi vaurioitua pysyvästi iskemian takia.
 2. Aiheuttajia mm. suora trauma syvään siitinvaltimoon, sirppisolutauti, neurogeeninen (esim. selkäydinvamma) ja tietyt lääkkeet (esim. PDE-5-inhibiittorit, tratsodoni, paisuvaiseen ruiskutettavat erektiohäiriölääkkeet).
 - a. Voidaan jakaa syntymekanismien perusteella vähävirtauksiseen (iskeemiseen) ja runsasvirtauksiseen (ei-iskeemiseen) (ja vielä intermittoivaan eli toistuvaan iskeemiseen)
 - i. Iskeeminen on yleisempi, kivuliaampi ja vakavampi; siittimen laskimopaluu on hidastunut tai estynyt kokonaan
 - ii. Ei-iskeeminen on harvinainen ja varsin vähäkivulias eikä niin vakava kuin iskeeminen (aikaa hoidolle on kauemmin); aiheutuu yleisimmin välilihan ja peniksen vamman yhteydessä syvään siitinvaltimoon (a. profunda penis) syntyvästä vauriosta, jolloin runsaasti valtimoverta ohjautuu suoraan paisuvaiskudoksen laskimosinuksiin valtimo-laskimofistelin kautta ilman minkäänlaista säätelyä
 - iii. Toistuva iskeeminen ilmenee toistuvina iskeemisinä kivuliaina priapismijaksoina; yhteydessä sirppisoluanemiaan (sirppiytyneet punasolut aiheuttavat tukoksia ja estävät peniksen laskimopaluuta -> aiheuttavat toistuvasti iskeemistä priapismia)
 3. Hoitona voidaan mahdollisesti aluksi kokeilla fyysistä rasitusta ja hikoilun jälkeen viileää suihkua, mutta invasiivisten apujen tulee olla saatavilla: tarvittaessa paisuvaisen aspiraatio, adrenergisten lääkkeiden (esim. Effortil) ruiskuttaminen paisuvaiseen tai näiden pettäessä operatiivinen hoito
- C. Erektiohäiriöllä (ED, impotenssi) tarkoitetaan kyvyttömyyttä saavuttaa tai ylläpitää riittävä erektio seksuaalisesti tyydyttävän toiminnon suorittamiseksi; ei ole itsenäinen sairaus vaan oire jostain taustalla piilevästä ongelmasta
 1. Häiriön esiintyvyys kasvaa iän myötä seuraavasti: alle 40-vuotiaat n. 10 %, 40–70-vuotiaat 35 % ja yli 70-vuotiaat > 50 %
 2. Yleisin taustatekijä on vaskulaariset sairaudet (hypertensio, ateroskleroottinen valtimotauti yms ja kaikki näiden riskitekijät, kuten tupakointi)
 - a. Muita on mm. neurogeeniset syyt (esim. diabeettinen neuropatia), hormonaaliset tekijät (esim. hypogonadismi), psykogeeniset syyt (esim. masennus, parisuhdeongelmat), eturauhasen sairaudet (esim. BPH, prostatiitti, prostata-ca), peniksen anomaliat (esim. Peyronien tauti), ylipaino ja lääkkeet (esim. masennuslääkkeet, beetasalpaajat)

- b. Normaali masturbaatio viittaa enemmänkin psykogeeniseen syyhyn, aamuerektioiden puuttuminen viittaa enemmänkin somaattiseen syyhyn
 - c. Useimmiten monitekijäinen ongelma: taustalla on somaattinen ongelma, jota ovat ajan mittaan lähes aina tulleet pahentamaan psyykkiset suorituspaineeet ja joskus parisuhderistiriidat
- 3. Hoitona elintapojen muuttaminen, mahdollisesti vaikuttavien perussairauksien hoidot ja spesifinen lääkehoito; seuraavat tiedot ei sinänsä patologian kurssille tärkeitä, mutta erektioista kiinnostuneille:
 - a. Fosfodiesteri-5-inhibiittorit (PDE5-estäjät), kuten sildenafili ja tadalafil ovat ensilinjan lääkkeitä; tarvittaessa voidaan yhdistellä (esim. siltsu ennen yhdyntää ja pitkävaikutteisempi tadalafil päivittäin pohjalla)
 - i. Vaikutus riippuu seksuaalisesta kiihottumisesta
 - ii. Haittana päänsärky, huimaus, verenpaineen lasku ja naaman punoitus (kaikki liittyvät vasodilataatioon); ei saa käyttää nitrojen kanssa (synergistinen vaikutus ja voi aiheuttaa massiivisen verenpaineen romahduksen)
 - b. Mahdollisesti paikallisesti annosteltavat (esim. intrakavernootinen injektiohoito tai siittimen kärkeen annosteltava voide; molemmat yleensä alprostadiilia eli synteettistä prostaglandiini E1:stä; vaikutus ei riipu seksuaalisesta kiihottumisesta), välinehoito (tyhjiöpumppu, penisrengas tai uudempana LI-ESWT eli iskuaaltohoito) ja jopa kirurgiset hoidot (inflatable penile implant; peniksen paisuvalskudokset korvataan keinopaisuvalisilla -> lantion alueella olevassa säiliössä on nestettä, joka nappia painamalla siirtyy paisuvalisiin, ja syntyy erektio)
 - i. Injektiohoidossa on haittana pistospaikan fibrotisoituminen ja suurempi priapismiriski kuin muissa hoidoissa

III. PAPILLOMAT

- A. Condyloma accuminatum eli pienet hyvänlaatuiset syylämäiset näppylät (kondyloomat eli visvasyyllät) sukuelinten iholla johtuvat matalan riskin HPV-infektiosta (6 ja 11).
- B. Histologisesti havaitaan koilosyyttinen muutos.

IV. PENIKSEN KARSINOOMA

- A. Peniksen pahanlaatuiset kasvaimet ovat lähes aina levyepiteelikarsinoomia; harvinaisia ja yleensä yli 40-vuotiailla (muutamia kymmeniä vuodessa Suomessa).
- B. Mm. tupakointi, huono hygienia (tiukka esinahka ja krooninen tulehdus) ja hrHPV-infektio (useat seksikumppanit ja varhainen seksin aloittamisikä) ovat tärkeitä riskitekijöitä; ympärileikkaus on suojaava tekijä.
- C. Noin 50 % karsinoomista esiintyy terskan alueella, kolmannes esinahan alueella ja loput peniksen varressa tai multifokaalisesti
- D. Kasvaa yleensä esiastevaiheen eli peniksen intraepitelialisen neoplasian (PeIN) kautta.
 - 1. Peniksen Bowenin tauti – peniksen varren tai kivespussin in situ karsinooma; beigenvärinen tai erytematoottinen ihomuutos
 - a. Erythroplasia Queyrat – Bowenin tauti glansin tai esinahan mukoosan alueella; tarkkarajainen erythroplakia
 - 2. Bowenoidi papuloosi – hrHPV:n karsinoomaa in situ; ilmenee useina pieninä punaisina näppylöinä

- a. Useimmiten n. 30-vuotiailla seksuaalisesti aktiiveilla miehillä; hyvin helposti tarttuva.
 - b. Verrattuna Bowenin tautiin, Bowenoidin papuloosin dysplasia on heikompaa ja malignisoituminen hyvin harvinaista.
- E. Leviää imuteitse nivusimusolmukkeisiin ja lantion alueen syviin imuteihin sekä siittimen paisuvaiskudokseen ja edelleen veriteitse
 - 1. Paikallisena tautina ennuste on hyvä (>80% paranee)
 - 2. Lantion imusolmukkeisiin metastasoituneissa tapauksissa 5-vuotiselossaoloennuste on 33 % ja kaukometastasoituneissa ei kukaan ole hengissä viiden vuoden kuluttua

KIVESTEN TAUDIT

- I. KRYPTORKIDISMI
 - A. Kivekset normaalisti kehittyvät vatsaontelon takaseinämässä ja laskeutuvat sikiön kasvaessa nivuskanavan kautta kivespussiin 35. raskausviikkoon mennessä.
 - B. Kryptorkidismi eli piilokiveksisyys tarkoittaa tilaa, jossa toinen tai kumpikaan kiveksistä ei laskeudu kivespussiin.
 - 1. N. 5% vastasyntyneistä pojista; suurimmalla osalla normalisoituu spontaanisti ensimmäisen puolen vuoden aikana.
 - a. Kirurginen korjaus toteutetaan yleensä vasta 6-12kk iässä, kuitenkin 18kk ikään mennessä.
 - 2. Lisää riskiä kivesten atrofialle ja hedelmättömyydelle sekä kivessyövälle (erityisesti seminoomalle).
 - C. Hyppivä kives (testis saltans) on erittäin tavallinen leikki-ikäisillä ja tarkoittaa, että yliaktiivisen kremasterrefleksin takia kivekset sijaitsevat vain ajoittain kivespussissa
 - 1. Hyppivä kives ei sinänsä tarvitse hoitoa, mutta pieni osa hyppivistä kiveksistä voi vetäytyä ylös pysyvästi, jolloin leikkaushoito on tarpeen
 - 2. Yleensä ilmiö rauhoittuu kouluiässä
- II. ORKIITTI JA EPIDIDYMIITTI
 - A. Orkittii tarkoittaa kiveksen tulehdusta; liittyy usein lisäkiveksen tulehdus (raja häilyvä -> epididymo-orkiitti).
 - 1. Isoloitu orkiitti harvinainen, kun sikotautia ei enää esiinny
 - B. Ilmenee kiveksen arkuutena ja turpoamisena; lisää riskiä lapsettomuudelle.
 - C. Epididymiitin (epididymo-orkiitin) tunnetuimpia aiheuttajia
 - 1. Seksitaudit (Chlamydia trachomatis D-K, Neisseria gonorrhoeae) – Yleensä nuorilla miehillä.
 - 2. Virtsatieinfektion leviäminen kivekseen (E. coli ja Pseudomonas) – Yleensä nuorilla lapsilla ja vanhemmilla miehillä.
 - 3. Rokottamattomilla sikotautivirüs – Havaitaan yleensä teineillä, ei nuorilla lapsilla
- III. FOURNIER’N GANGREENI
 - A. Välilihan ja genitaalialueen nekrotisoiva faskiitti
 - 1. Tavataan yleisimmin miehillä, alkaa yleensä kivespussin faskian nekroosina ja aiheuttaa ulospäin kivespussin ja välilihan ihon punoitusta/mustaa kuolioitumista, turvotusta ja ritinää

- B. Tärkeimpiä riskitekijöitä ovat diabetes, alkoholismi, voimakas obesiteetti sekä äskettäiset genitaalialueen ja alavatsan kirurgiset toimenpiteet tai traumat
- C. Vaarallinen tila ja kuolleisuus jopa 10%
- D. Hoito sama kuin muutenkin kaasukuoliossa ja nekrotisoivassa faskiitissa: radikaali kirurginen revisio ja laajakirjoinen antimikrobihoito sekä mahdollisesti ylipainehappihoito

IV. TESTISTORSIO

- A. Kives ja distaalinen siemennuora kiertyvät niin, että kiveksen ohutseinäiset laskimot obstruktoituvat, mikä johtaa kongestioon ja hemorragiseen infarktiin.
 - 1. Vaikeassa kiertymässä myös a. testicularis voi painua umpeen.
- B. Suurin osa johtuu synnynnäisestä rakennehäiriöstä, jossa kivekset eivät ole kiinnittyneet kivespussin sisäreunaan normaalisti (bell-clapper deformity).
 - 1. Tunica vaginalis insertoituu liian korkealle
- C. Valtaosa tapauksista todetaan perinataalikaudella ja murrosiässä (13-16), mutta voi esiintyä milloin tahansa; esiintyy unilateraalisesti kivuliaana kiveksenä.
 - 1. Voidaan erottaa epididymiitistä: kipu yleensä voimakkaampaa ja akuutimpaa sekä Cremaster-heijaste puuttuu. (Prenn sign?)
- D. Kiveslisäkkeen kiertymä (appendix testis torsio) voi ilmentyä samalla tavalla, mutta yleensä lievempänä
 - 1. Arviolta 90 %:lla miehistä on kiveksen yläosissa tai lisäkiveksessä sikiökaudelta jäänyt muutaman millimetrin mittainen varrellinen lisäke, joka saattaa kiertyä oman vartensa ympäri ja mennä nekroosiin
 - 2. Ennen kuin kivespussin turvotus on ehtinyt ilmaantua voi kivespussin läpi nähdä kuolioon menneen mustan kudokappaleen ("blue dot sign") ja tämä tumma alue on palpoiden arka toisin kuin muu osa kivistä.
 - 3. Lisäkkeen kiertymää ei tarvitse leikata, mutta erotusdiagnostisista ongelmista johtuen leikkaus tyypillisesti tehdään varmuuden vuoksi

V. HYDROSEELE, HEMATOSEELE, SPERMATOSEELE JA VARIKOSEELE

- A. Hydroseelessä eli vesikiveksessä tuppikalvon lehtien väliin kertyy kudostettua.
 - 1. Synnynnäinen muoto on yleensä yhteydessä processus vaginaliksen epätäydelliseen sulkeutumiseen, minkä takia kivespussi on suorassa yhteydessä vatsaonteloon (kommunikoiva hydroseele).
 - 2. Hankittu vesikives (nonkommunikoiva hydroseele) taas yleensä johtuu lymfaattisten kierron obstruktiosta; yleensä idiopaattinen, mutt taustalla voi olla esim. infektio tai trauma.
 - 3. Hematoseelessä onteloon kertyy verta samalla tavalla.
- B. Spermatoseelessä eli siemennestekystassa lisäkivekseen muodostuu kystamainen muutos, joka täyttyy siittiöistä.
 - 1. Etiologiaa ei tiedetä, johtunee lisäkiveksen tubuluksia obstruktiivasta traumasta tai inflammaatiosta.
- C. Varikoseelessä eli kiveskohjussa siemennuorapunoksen laskimoissa (plexus pampiniformis) on suonikohjuja ja kiveslaskimo on dilatoitunut heikon laskimopaluun takia.
 - 1. Yleensä sijaitsee vasemmalla puolella, koska oikea kiveslaskimo laskee viistosti alaonttolaskimoon, kun taas vasen laskee vertikaalisemmin suoraan munuaislaskimoon.

- a. Vasemmanpuolinen munuaiskarsinoma invasoituu usein munuaislaskimoon ja aiheuttaa sen obstruktion kautta varikoseelen.
- D. Ilmenevät usein kivuttomana turvotuksena kivespussissa; tarkastelu, tunnustelu ja läpivalaisututkimus (esim. taskulampulla) auttavat erottamisessa toisistaan.
 - 1. Transilluminaatio positiivinen (kuultaa läpi) – Hydroseele, hematoseele, spermatoseele
 - 2. Transilluminaatio negatiivinen (ei kuulla läpi) – Varikoseele, kivistuumori
 - a. Varikoseele tuntuu tunnustellessa käärmetytteiseltä säkiltä.
 - 3. UÄ tarvittaessa
- E. Eivät yleensä vaadi hoitoa oireettomina, mutta voidaan hoitaa toimenpiteillä aiheuttaessa oireita tai epäillessä tilan aiheuttavan lapsettomuutta.
 - 1. Esim. hydroseelen hoidossa hoitovaihtoehtot ovat vesikiveksen punktio yhdistettynä skleroterapiaan ja isoissa kertymissä leikkaushoito

KIVESKASVAIMET

I. PERIAATTEET

- A. Kivessyövät ovat suhteellisen harvinaisia (n. 110-160/v), mutta ovat länsimaissa 15-40-vuotiaiden miesten yleisin maligniteetti.
- B. Ilmenevät kumimaisena ja yleensä kivuttomana massana, joka ei kuulla läpi läpivalaisussa.
- C. Tärkeimpiä tunnettuja riskitekijöitä ovat mm. (hoidettukin) kryptorkidismi, sukurasitus ja Klinefelterin oireyhtymä
 - 1. Myös erityisesti marijuanan polton on todettu lisäävän riskiä kivessyövälle
- D. Biopsiaa missään muodossa ei yleensä tehdä, koska se rikkoisi erittäin tehokkaan luonnollisen kasvuesteen (kiveksen valkokalvo).
 - 1. Ultraäänitutkimuksen sensitiivisyys lähes 100%; merkkiaineet auttavat diagnoosissa.
 - a. Erotusdiagnostiikassa ja hoidon seurannassa voidaan käyttää apuna seerumin alfa₁-fetoproteiinia (AFP), beeta-istukkagonadotropiinia (b-hCG) ja laktatidehydrogenaasia (LDH), jotka määritetään ennen ja jälkeen orkiektomian ja myös seurannan yhteydessä.
 - i. Normaalit eivät poissulje syövän mahdollisuutta
- E. Tavallisesti hoidetaan koko kiveksen ja siemennuoran poistona kalvostoinaan (radikaalinen orkiektomia) ja levinneiden hoitoa jatketaan sädehoidolla/solunsalpaajahoidolla.
 - 1. Ennuste on todella hyvä ja useimmiten hyvä levinneenäkin (varsinkin seminoomalla; seminoomaan ei sairastu potilaita, joilla olisi huono ennuste)
- F. Voivat olla lähtöisin itusoluista (95%) tai sukupiena-strooma-soluista.
 - 1. Sekundaariset tuumorit ovat yleensä lymfoomia.

II. ITUSOLUKASVAIMET

- A. Jaotellaan kliinisesti usein seminoomiin (yleisin kivistuumori, 50-60% itusolukasvaimista) ja non-seminoomiin hoidollisista syistä.
 - 1. Seminomat ovat erittäin herkkiä sädehoidolle, metastasoivat myöhään ja ennuste erinomainen metastasoineenakin.
 - 2. Non-seminomat vastaavat vaihtelevasti hoitoon ja metastasoivat varhain.
- B. Seminooma vastaa histologisesti dysgerminoomaa ja koostuu suurista kirkassytoplasmaisista soluista, joilla on sentraaliset tumat.

1. Makroskooppisesti kasvain on kiinteä, vaalea ja hemorragioita tai nekrooseja ei havaita.
2. AFP- ja hCG-tasot yleensä normaaleja, harvoin hCG lievästi koholla.
3. Harvinainen spermatosyyttinen tuumori aikaisemmin luokiteltiin seminoomaksi (aikaisempi nimi oli spermatosyyttinen seminooma), mutta nykyään se on oma luokkansa.
 - a. Esiintyy yleisimmin yli 50-vuotiailla.
 - b. Ei synny itusolujen in situ -neoplasian pohjalta toisin kuin muut itusolukasvaimet.
 - c. Kasvaa hitaasti eikä metastasoi

C. Embryonaalinen karsinooma koostuu epäkypsästä vahvasti atyyppisestä solukosta, joka voi muodostaa rauhasmaisia rakenteita.

1. Toiseksi yleisin kiveksen pahanlaatuinen kasvain.
2. Makroskooppisesti kasvaimessa on mukana usein nekroosia ja verenpurkaumia.
3. AFP ja/tai hCG ovat yleensä koholla.
4. Kemoterapia voi indusoida maturaatiota ja muutoksen toiseksi itusolukasvaimeksi.

D. Ruskuaispussikasvain koostuu ruskuaispussin rakenteita muistuttavasta kudoksesta, klassinen histologinen piirre on Schiller-Duvalin kappaleet.

1. Yleisin prepubertaalinen kiveskasvain; harvinainen postpubertaalina.
2. AFP tyypillisesti koholla.

E. Koriokarsinooma koostuu syto- ja synsytiotrofoblasteista ilman villuksia.

1. Makroskooppisesti havaitaan hemorragiaa ja nekrooseja; puhas muoto on hyvin harvinainen, mutta usein (7-18%) mukana sekamuotoisissa kasvaimissa
2. Invasoi aikaisin verisuoniin; huono ennuste.
3. hCG tyypillisesti todella koholla.
 - a. Voi aiheuttaa hypertyroidismia tai gynekomastiaa, sillä hCG:n alfa-alayksikkö on samankaltainen kuin FSH, LH ja TSH.

B. Teratooma koostuu yhdestä tai useammasta alkiokerroksen kudostyyppistä.

1. Verrattuna naisten teratoomiin, kypsätkin teratoomat ovat miespuolisilla maligneja (prepubertaaliset kuitenkin yleensä hyvänlaatuisia).
2. AFP ja/tai hCG voi olla koholla.

F. Useimmiten (n. 60-70 %) non-seminoomat ovat sekasoluisia ja ennuste perustuu huonoimman komponentin ennusteeseen.

III. SUKUPIENA-STROOMASOLUKASVAIMET

A. Leydigin tai Sertolin soluista peräisin olevia kasvaimia; valtaosa hyvänlaatuisia.

B. Leydiginsolukasvain koostuu eosinofiilisen solukon muodostamista diffuuseista alueista ja sidekudosjuosteista; Reinken kristalloideja voidaan nähdä histologiassa.

1. Tuottavat androgeenejä tai estrogeeniä ja aiheuttavat varhaista murrosikää lapsilla tai gynekomastiaa aikuisilla.
2. Yleisin ei-itusoluperäinen primaarinen kasvain.

B. Sertolinsolukasvain koostuu tubuluksista ja niukkasoluisesta tukikudoksesta.

1. Ei useimmiten tuota hormoneja (usein kliinisesti hiljainen), mutta joskus voi aiheuttaa estrogeenisia oireita

IV. LYMFooma

A. N. 5% kaikista kiveksen kasvaimista on lymfoomia; yleisin yli 60-vuotiaiden kiveskasvain.

- B. N. 80-90% diffuuseja suurisoluisia B-solulymfoomia; ennuste kohtalaisen huono.

ETURAUHASSEN TAUDIT

I. PROSTATIITTI

- A. Eturauhastulehdus eli prostatiitti jaetaan neljään tyyppiin etiologian ja keston perusteella:
1. Akuutti bakteeriperäinen eturauhastulehdus
 2. Krooninen bakteeriperäinen eturauhastulehdus
 3. Krooninen eturauhastulehdus ilman bakteerilöydöstä (krooninen lantion kiputila, CPPS); Yleisin tyyppi
 4. Oireeton eturauhastulehdus (histopatologinen löydös)
- B. Akuutti prostatiitti (tyyppi 1) ilmenee dysuriana, alavatsakipuna ja suurella osalla yleistaudin oireina, kuten kuumeena ja lihassärkyinä.
1. Vanhemmilla aikuisilla erityisesti E. coli, mutta myös muut uropatogeenit (esim. Klebsiella) voivat olla taustalla
 - a. Nuorilla seksuaalisesti aktiivisilla aikuisilla tyypillisimmät aiheuttajat ovat seksivälitteisiä bakteereja, kuten Chlamydia trachomatis (klamydia) ja Neisseria gonorrhoeae (tippuri)
 2. Tuseeratessa prostata on turvonnut ja hyvin arka sekä normaalia pehmeämpi (boggy)
 - a. Akuutin tilan aikana kovakätistä eturauhasen hierontaa ei suositella bakteremiariskin takia
 3. Diagnoosi pääasiassa perustuu kliiniseen kuvaan ja virtsaviiljelyyn.
 - a. Virtsassa valkosoluja ja viljelyssä bakteereita.
- C. Krooninen bakteeriperäinen prostatiitti (tyyppi 2) on lieväoireisempi ilman yleistaudin oireita ja ilmenee dysuriana sekä usein lonkka- tai alaselkäkipuna.
1. Potilas sairastuu toistuvasti saman mikrobin aiheuttamiin virtsatieinfektioihin; yleensä E. coli
 2. Usein ilmenee BPH:n tai muun retentiota aiheuttavan tilan kanssa samanaikaisesti; retentio altistaa bakteeri-infektioille
- D. Krooninen nonbakteriellinen prostatiitti (tyyppi 3) eli miehen lantion krooninen kiputila (CPPS)
1. Yleisin tyyppi; n. 90% kroonisista protatiiteista on ilman bakteerilöydöstä
 - a. Syy ei aina selvä ja usein jää idiopaattiseksi; tärkeää sulkea pois ainakin eturauhassyöpä (voidaan ottaa eturauhasbiopsia), vaikka potilas olisikin alle 50v
 2. Tulehdus kroonistuu tai uusiutuu helposti ja oireita on usein eniten talviaikaan (kylmäältistus)
 - a. Kroonisen eturauhastulehduksen keskeisiä oireita ovat lantion, alavatsan, välilihan ja nivusalueen kipu -> CPPS-nimi
 - i. Kipu on usein vaikeasti paikannettavissa ja säteilee sukuelimiin, reisien sisäpinnoille ja ristiselkään
 - b. Virtsamisoireita, kuten tiheävirtsaaisuutta (pollakisuria), virtsaamispakkoa ja kirvelyä, esiintyy yli puolella potilaista
 - c. Kivulias siemensyöksy ja verinen siemenneste ovat myös yleisiä oireita
 3. Diagnoosi perustuu kliiniseen kuvaan, eturauhasen tunnusteluun ja virtsanäytteet.
 - a. Tunnustellessa eturauhanen on aristava, turvottava ja normaalia pehmeämpi.

- b. Virtsanäytteiden perusteella jaetaan kahteen alatyyppiin (virtsan bakteeriviljely on molemmissa negatiivinen):
 - i. Tulehduksellisessa alatyypissä potilailla on valkosoluja eturauhasen eritteessä, virtsassa tai siemennesteessä (tyyppi 3a)
 - ii. Ei-tulehduksellisessa tyyppissä tulehdussoluja ei todeta (3b)
- c. Virtsanäytteet voidaan ottaa eturauhasen hierontatestillä (PPMT, pre and post massage test), jossa otetaan kaksi virtsanäytettä.
 - i. Ensimmäisestä tutkitaan sakka ja tehdään bakteeriviljely. Tämän jälkeen eturauhasta hierotaan usean minuutin ajan ja otetaan heti uusi alkuvirtsanäyte (jälkihierontanäyte, 10–20 ml virtsasuihkun alusta).
 - ii. Kroonisessa eturauhastulehduksessa ilman bakteerietiologiaa (tyyppi 3) hierontanäytteet ovat steriilejä, mutta tyypin 3a eturauhastulehduksessa esiintyy valkosoluja jälkihierontanäytteessä ($> 10/nk$), kun taas tyyppissä 3b ne puuttuvat
- E. Oireeton prostatiitti (tyyppi 4) on nimensä mukaan oireeton ja diagnosoidaan usein muiden tutkimusten yhteydessä
 - 1. Esim. PSA-koholla testeissä ja otetaan prostatabiopsia, jossa todetaan tulehdus
- F. Yksi erikoistyyppi on granulomatoottinen prostatiitti, jossa prostata on tunnustellessa kova ja voi herättää epäilyn syövästä
 - 1. Epäspesifinen granulomatoottinen tulehdusreaktio voi liittyä esimerkiksi eturauhashöyläyksen jälkitilaan tai systeemiseen vaskuliittiin
 - 2. Joissakin tapauksissa kyseessä virtsarakkosyövän BCG-hoitoon käytetyn heikennetyn tubibakteerin aiheuttama granulomatoottinen tulehdus
- G. Bakteeriperäisessä taudissa ensisijainen hoito on antibioottihoito eturauhaseen penetroituvalla lääkkeellä; hoitoaika akuutissa 2-4vk ja kroonisessa jopa 2-3kk
- H. Lantion ja eturauhasen krooniseen kipuun ei tunneta parantavaa hoitoa; usein käytetään monia lääkkeitä yhdessä
 - 1. Tärkeimpiä lääkkeitä ovat NSAIDit, alfasalpaajat (sileän lihaksen rentoutuminen -> virtsausvastuksen ja kudospaineen pienentyminen), 5-alfareduktaasin estäjät (erityisesti jos suurentunut eturauhanen), tarvittaessa trisykliset lääkkeet (hyviä monissa kroonisissa kipuoireyhtymissä)
 - 2. Mikrobilääkkeistä voi olla hyötyä ja muun muassa kinoloneilla, on osoitettu esiintyvän sytokiinivälitteistä anti-inflammatorista vaikutusta, joka saattaa selittää niiden oireita lievittävän vaikutuksen; kannattaa harkita, jos oireet esiintyvät ensimmäistä kertaa
 - 3. Eturauhashieronta on vanhin eturauhastulehduksen hoitomuodoista. Jotkut potilaat tuntevat saavan apua säännöllisesti toistetusta eturauhashieronnasta, mutta hankalan toteutettavuuden takia eturauhashierontaa ei juurikaan käytetä
- II. ETURAUHASSEN HYVÄNLAATUINEN LIIKAKASVU (BPH)
 - A. Eturauhasen strooman ja rauhasen hyperplasiaa (myofibrogländulaarinen); jopa 80% yli 60-vuotiaista.
 - B. Eturauhanen koostuu rauhaskudoksesta ja fibromuskulaarisesta stroomasta, joiden aktiivisuutta säätelevät androgeenit, erityisesti dihydrotestosteroni (DHT).

1. Kivesten erittämä testosteroni muuttuu stroomasoluissa 5-alfa-reduktaasin vaikutuksesta DHT:ksi.
 2. DHT vaikuttaa androgeenireseptorin kautta strooma- ja epiteelisoluihin.
- C. Hyperplasia alkaa nodulaarisena kasvuna virtsaputkea ympäröivällä alueella (transitioalue; välivyöhyke).
1. Nodukset painavat virtsaputkea kasaan ja tukostilan takia rakon seinämän lihas myös hypertrofioituu ja seinämä arpeentuu, mikä heikentää rakon supistuskkyä.
- D. Kliininen kuva
1. Rakon heikentynyt tyhjeneminen aiheuttaa tyypilliset oireet, mm. virtsaamisen aloituksen vaikeudet, virtsauksen keskeytyminen ja retentiosta aiheutuva tiheä virtsaamistarve (pollakisuria) ja pakkoincontinenssi (urgency).
 - a. Kerääntymisoireiden (pollakisuria ja urgency) taustalla on tavallisesti detrusorlihaksen hyperrefleksia johtuen suurentuneesta rakkopaineesta ja prostatahyperplasian aiheuttamien uretran muutosten aikaansaamasta sensorisesta ärsytyksestä -> lisääntynyt rakon supisteluherkkyys (detrusorinstabiliteetti)
 - i. Pollakisuriaa voi arvioida virtsaamispäiväkirjalla
 - b. Vajaa tyhjeneminen myös altistaa infektioille ja hydronefroosille.
 - c. Oireita arvioidaan anamneesin ja kyselykaavakkeiden (DAN-PSS-1 ja IPSS) avulla
 2. Rakon seinämän sileän lihaksen hypertrofia ja kohonnut rakkopaine lisää riskiä rakkodivertikkeleille.
 3. Tuseeratessa eturauhanen suurentunut ja normaalisti tunnettava keskiuurre voi olla kadonnut suurenemisen myötä
 4. Labroissa tulee ottaa vähintään U-KemSeul, Krea ja PSA (prostataspesifinen antigeeni)
 - a. PSA koholla (yleensä kuitenkin alle 10µg/l)
 - i. Prostataspesifinen antigeeni on eturauhasen rauhasen tuottama valkuaisaine, joka tekee siemennesteestä nestemäisemmän ja helpompikulkuisemman siittiöille.
 - ii. Jos kokonais-PSA on välillä 2,5–10 µg/l, mitataan automaattisesti myös vapaan ja kokonais-PSA:n suhde; Mitä matalampi on vapaan PSA:n osuus, sitä suurempi on eturauhassyövän riski (jos suhde on >25%, niin riski alle 10%)
 - iii. Jos kokonais-PSA >10 -> lähetetään urologille (syöpäepäily)
 - b. Virtsanäytteessä saatetaan havaita mikroskooppista (tai harvoin jopa makroskooppista) hematuriaa
- E. Hoito voidaan toteuttaa vakavuudesta riippuen pelkällä seurannalla, lääkehoitona (5-alfa-reduktaasin salpaajat tai alfa-1-reseptorien salpaajat) tai aiheellisena jopa leikkaushoitona (perinteisesti TURP eli höyläysleikkaus)

III. ETURAUHASEN SYÖPÄ

- A. Miesten yleisin syöpä Suomessa (n. 5000/v) ja toiseksi yleisin kuolemaan johtava syöpä (n.900/v) keuhkosyövän jälkeen; yleensä prostatakarsinomapotilas kuitenkin kuolee johonkin muuhun syyhyn sairaudestaan tietämättömänä ja oireettomana

- B. Tärkeimmät riskitekijät: ikä tärkein (yli 50v.), periytyvä alttius (todettu perheessä) ja rotu (tummaihoisilla yleisempää).
1. Muita: runsas eläinrasvan käyttö, lihavuus, tupakointi
 2. Tiedetyt periytyvät mutaatiot on liitetty eturauhassyövän alttiuteen.
 - a. Riskigenejä on useita, mutta yleisempiä ovat esim. BRCA1- ja BRCA2-variantit (breast cancer susceptibility), jotka ovat hyvin keskeisessä asemassa myös rintasyövässä
 3. Karsinogeneesin yleisin geenimuutos on TMPRSS2-ERG-translokaatio.
- C. Yleensä oireeton ja ensioireet ovat yleensä samankaltaisia kuin BPH:ssa tai etäpesäkkeistä johtuvaa luustokipua.
1. Suomessa ei ole kansallista eturauhassyövän seulontaohjelmaa ja PSA-arvoa hyödyntävä oireettomien potilaiden seulonta on edelleen kiistanalaista.
 - a. Testin suurin ongelma ovat harmia aiheuttamattomien syöpien löytymisestä johtuva ylidagnostiikka ja siihen liittyvät turhat hoidot ja komplikaatiot
 - b. Eturauhassyövä ovat usein hyvin lieviä kliiniseltä kulultaan ja vain n. yksi kymmenestä latentista eturauhassyövästä kehittyy kliiniseksi syöväksi (eturauhassyöpää esiintyy vain histologisesti todettavana 30 %:lla yli 50-vuotiaista ja 70–80 %:lla yli 80-vuotiaista miehistä)
 - c. Jos oireettoman miehen PSA-testausta harkitaan, hänelle pitää kertoa eturauhassyövän varhaiseen toteamiseen liittyvistä hyödyistä ja haitoista;
ÄLÄ OTA OIREETTOMALTA POTILAALTA PSA KERTOMATTA POTILAALLE AIKOMUKSESTASI JA SEN SEURAUKSISTA (älä sekoita PSA-testin käyttöön osana kliinistä tutkimusta potilaalla, jolla voidaan epäillä eturauhassyöpää)
 - i. Älä suosittele PSA-testiä oireettomille yli 70-vuotiaille tai miehille, joilla on eliniänodotetta merkittävästi lyhentävä sairaus
 - ii. PSA-arvon mukaan arvon jatkoseuranta
 - d. Hyötyjä:
 - i. Parhaimmassa tapauksessa voidaan löytää kapselin ulkopuolelle levinnyt tai muuten suuren etenemisriskin omaava eturauhassyöpä, jonka radikaali kirurginen tai sädehoito saattaisi parantaa ja siten pelastaa potilaan hengen
 - ii. Hyvin matala arvo voi toimia mieltä rauhoittavana löydöksenä, jos potilas stressaa eturauhassyöpämahdollisuudesta; syöpää ei kuitenkaan koskaan voida varmuudella poissulkea
 - e. Haittoja:
 - i. Ylidagnostiikka ja siihen liittyvät turhat hoidot ja komplikaatiot (esim. infektiot, verenvuodot, krooniset erektiohäiriöt/inkontinenssi; suuri osa löydetyistä syövästä ei aiheuttaisi ongelmia potilaan elinaikana
 - ii. PSA seurannassa potilasta seuraa jatkuva huoli PSA-arvon kehittymisestä
- D. Epäiltäessä eturauhassyöpää toteutetaan tuseeraus ja PSA-mittaus.
1. Syöpä aiheuttaa usein kyhmyn posteriorisesti perifeeriseen osaan, minkä takia tuseeraus mahdollistaa sen tunnustelemisen
 - a. Lokaation takia kyhmy ei myöskään aiheuta oireita pitkään (ei obstruktoi uretraa)

- b. Kyhmyn tunteminen ei aina viittaa syöpään, mutta on aina aihe urologin konsultaatiolle
- 2. Kokonais-PSA:n viitealue riippuu iästä, mutta $>10\mu\text{g/l}$ on huolestuttavaa iästä riippumatta (lähetetään urologille, koska syöpäepäily).
 - a. Vapaan PSA:n osuuden pieneneminen auttaa diagnostiikassa (mitataan automaattisesti jos PSA 2.5-10; ei diagnostista merkistystä, jos kokonais-PSA >10)
 - i. Jos $<10\%$, on riski yli 50% (syöpäsolut tuottavat sitoutunutta PSA:a)
 - ii. Jos suhde on $>25\%$, niin riski alle 10%
 - b. Myös PSA-kinetiikka eli sen muuttuminen ajan myötä voi olla merkittävä löydös; jos kokonais-PSA:n nousunopeus on yli $0.75\mu\text{g/l}$ vuodessa (arvioituna vähintään kolmesta mittauksesta vuoden aikana), tehdään lähete urologian poliklinikalle
 - c. PSA ei kuitenkaan ole tarkin mittari, sillä se kasvaa mm. tulehduksissa ja BPH:ssa sekä syöpää voi esiintyä myös pienillä PSA-arvoilla.
- E. Transrektaalisessa kaikututkimuksessa (TRUÄ) otetaan 6 paksuneulanäytettä eturauhasen kummastakin lohkoista; magneettikuvauksessa voidaan tarkastella eturauhasta ja mahdollistaa kohdennettujen koepalojen otto epäilyttävistä alueista
 - 1. Herkkyys ei ole kovinkaan korkea (n. 60%) -> tarvittaessa uudet biopsiat, jos PSA jatkaa nousuaan
- F. Biopsia (paksuneula, jopa 6 näytettä molemmista lohkoista) eturauhasesta vaaditaan diagnoosin asettamiseksi.
 - 1. Yleensä adenokarsinomia eli havaitaan rauhasrakenteita, joista puuttuu tyvisolukko ja tyvikalvo (nähdään paremmin keratiini 5/6 immunovärjäyksessä) ja solujen tumissa korostuneet tumajyvät.
 - a. Erotusdiagnostiikassa auttaa AMACR-värjäys (rasemaasi), joka on valtaosin negatiivinen hyvänlaatuisissa rauhasissa.
 - 2. Syövän erilaistumisasteen arviointiin käytetään Gleasonin luokitusta, joka perustuu vain kasvaimen rauhasarkkitehtuuriin.
 - a. Näytteitä arvioitaessa rauhasarkkitehtuurit jaetaan viiteen gradukseen (1-5, matala hyvä erilaistuminen) ja kasvaimesta määritetään yleisin tyyppi ja toiseksi yleisin tyyppi.
 - b. Vallitsevan ja väistävän tyyppin lukuarvot lasketaan yhteen, jolloin saadaan Gleason-summa asteikolla 2-10.
 - i. Arvoja 1-2 ei anneta niiden epäluotettavuuden takia, joten arvot käytännössä ovat 6-10
 - c. Mitä suurempi summa, sitä heikompi ennuste (sama arvo ei aina ole yhtä merkitsevä, sillä esim. 4+3 on pahempi kuin 3+4).
 - i. Heikosti erilaistuneet rauhaset pienissäkin määrin lisäävät riskiä -> tertiäärisen korkeagraduksisen komponentin läsnäolo voidaan ilmoittaa raportissa
 - d. Jaetaan Gleasonin ryhmiin (grade group) 1-5
 - i. $1 = 3+3$
 - $2 = 3+4$
 - $3 = 4+3$

$$4 = 4+4 / 3+5 / 5+3$$

$$5 = 4+5 / 5+4 / 5+5$$

ii. 1 on matalan riskin, 2/3 kohtalaisen riskin ja 4/5 korkean riskin

3. Mahdolliset eturauhasen intraepiteliaalinen neoplasia (PIN) -muutokset voidaan myös ilmoittaa (ei tavallisesti kirjasta syövän yhteydessä)

- a. Tarkoittaa eturauhasen tiehyitä ja asinuksia verhoavan epiteelin neoplastista transformaatiota
- b. Korkea-asteista PIN-muutosta (high-grade PIN) pidetään invasiivisen karsinooman todennäköisimpänä preinvasiivisena esiasteena; basaalinen solurivi osin olemassa -> ei invasioi

G. Metastasoituu usein luustoon (varsinkin lumbaaliselkärankaan tai pelvikseen), mikä aiheuttaa osteoblastisia metastaaseja.

1. Ilmenee alaselän kipuna ja kohonneena P-AFOS-arvona; joskus ensioire voi jopa olla patologinen murtuma
2. Luustokartta (radioisotooppitutkimus) on ensisijaistutkimus luustometastaasien varmistamiseksi
 - a. Luuston isotooppikuvantaminen tulisi tehdä niille eturauhassyöpäpotilaille, joilla on luustoperäisiä kipuja, PSA-pitoisuus on yli 20 µg/l, syöpä on huonosti erilaistunut (Gleason 8–10) tai AFOS on koholla
 - i. Jos PSA alle 20, niin luustometastaasien todennäköisyys on alle 1%

H. Hoitovalintaan vaikuttavat eniten syövän kliininen luokitus (TNM-luokitus), kasvaimen histopatologinen luokitus sekä potilaan ikä, yleiskunto ja muut sairaudet; hoidon päättää urologi yhteisymmärryksessä potilaan kanssa

1. (Passiivinen) Seuranta / Aktiivinen seuranta on usein hyväksyttävä hoitokeino
 - a. Seuranta (watchful waiting) jos potilaan odotettavissa oleva elinikä on todennäköisesti alle kymmenen vuotta diagnoosista, syöpä ei aiheuta oireita, on paikallinen ja kyseessä on pienen tai kohtalaisen riskin syöpä (Gleason-pistemäärä enintään 6 ja PSA alle 20 µg/l).
 - i. Mikäli syöpä etenee ja alkaa aiheuttaa oireita, aloitetaan endokriininen hoito.
 - b. Aktiivinen seuranta = urologin seurannassa PSA määritetään 6–12 kuukauden välein ja uudet koepalat otetaan vuoden, kolmen ja viiden vuoden kuluttua; MRI-seuranta myös käytössä
 - i. Tarkoitus on, että nämä potilaat voidaan hoitaa parantavasti, ennen kuin karsinoma ehtii levitä.
 - ii. Aktiiviseurantaa voidaan harkita, mikäli PSA on alle 10 µg/l, Gleason-pistemäärä on enintään 6, syöpä löytyy enintään kahdesta näytteestä, kun niitä on otettu 12, ja potilaan odotettavissa oleva elinikä on yli kymmenen vuotta
2. Paikalliset kasvaimet yleensä hoidetaan radikaalisella prostatektomialla; mahdollinen silloin, kun syöpä ei ole levinnyt viereisiin kudoksiin eikä lähettänyt etäpesäkkeitä. Käytännössä tehdään vain jos odotettavissa oleva elinikä yli 10 v
 - a. Leikkaushoidon yleisimpiä haittavaikutuksia ovat virtsainkontinenssi ja erektiohäiriöt (näistä voi kertoa oireettomalle potilaalle hänen halutessaan PSA-seulan)

- b. Mahdollisesti sädehoito hoitovaihtoehtona (haittana rakon ja peräsuolen ärsytysoireet sekä impotenssi)
- 3. Levinneet hoidetaan ensivaiheessa endokriinisesti: androgeenivaikutuksen estoa, sillä prostatan kudoksen toiminta on riippuvainen miessukupuolihormoneista; hormonitoiminnan vähentyessä syöpäkudosta alkaa kuolla ja mennä nukkuvaan tilaan, joka voi jatkua montakin vuotta
 - a. Voidaan tehdä kirurginen tai lääkkeellinen (GnRH-agonistit/antagonistit) kastreatio
 - b. Kastreatioresistenssin kehittyessä antiandrogeenit eli androgeenireseptoriantagonistit (ARTA) ensilinjan lääkkeitä (esim. entsalutamidi)
 - i. Solunsalpaajahoidot oireisille muuten suht. hyväkuntoisille (voi myös antaa jo ennen resistenssiä)

15 ENDOKRIININEN PATOLOGIA

AIVOLISÄKE

I. PERIAATTEET

- A. Aivolisäke (hypofyyysi) koostuu kahdesta erillisestä osasta: etulohkosta (adenohypofyyysi) ja takalohkosta (neurohypofyyysi).
- B. Etulohko koostuu hormoneja (TSH, ACTH, GH, FSH, LH ja prolaktiini) tuottavasta rauhaskudoksesta.
 - 1. Hormonien eritystä säätelee erityisesti hypotalamuksen tuottamat hormonit.
- C. Takalohko toimii hypotalamuksessa tuotettujen ADH:n ja oksitosiinin varastona, josta nämä hormonit vapautuvat verenkiertoon.
 - 1. ADH-vaikuttaa nefronin distaaliin tubuluksiin ja kokoojaputkeen lisäten veden imeytymistä.
 - 2. Oksitosiinilla on rooli kohdun supistuksissa synnytyksen aikana sekä auttaa maidon erityksessä supistamalla rintarauhasen maitotiehyitä.

AIVOLISÄKKEEN ETULOHKON SAIRAUDET

II. AIVOLISÄKKEEN ADENOOMAT

- A. Aivolisäkkeen kasvaimista yleisimmät ovat etulohkon rauhassoluista lähtöisin olevia hyvänlaatuisia tuumoreita eli adenoomia.
 - 1. Adenohypofyyysin karsinoomat ovat hyvin harvinaisia.
- B. Voivat olla funktionaalisia (tuottaa hormoneita) tai non-funktionaalisia (n. 20-50%).
 - 1. Vaikka non-funktionaaliset kasvaimet eivät tuota hormoneita, ne usein aiheuttavat massavaikutuksia (tilaa vievän prosessin yleisoireita).
 - a. Päänsärky – kasvain venyttää aivokalvoja
 - b. Hypopituitarismi – tuumori painaa normaalia hypofyyssikudosta
 - c. Näkökenttäpuutos (yleensä bitemporaalinen hemianopsia) - tuumori painaa näköratojen risteystä eli optista kiasmaa, joka sijaitsee yleensä suoraan sellan yläpuolella

- d. Erityisen vahvat oireet ilmenevät pituitaarisessa apopleksiassa, joka tarkoittaa aivolisäkkeeseen äkillisesti ilmaantuvaa verenvuotoa tai infarktia.
 - i. Infarkti voi olla hemorraaginen tai nonhemorraaginen
 - 2. Funktionaalisten oireet perustuvat massavaikutuksen lisäksi niiden tuottamaan hormoniin.
 - a. Hormonituotanto voidaan tunnistaa immunohistokemiallisesti, jonka mukaan jaottelu tapahtuu.
- C. Prolaktinooman (laktotrooppinen adenooma) tuottama hyperprolaktonemiaa aiheuttaa fertiili-ikäisille naisille galaktorreaa, amenorreaa ja lapsettomuutta, kun taas miesten oireet ovat epäselvempiä (mm. matala libido ja pääkipu); yleisin aivolisäkkeen adenooma.
 - 1. Voidaan hoitaa lääkityksellä (dopamiiniagonisti kabergoliini supressoi prolaktiinin tuotantoa) tai suurempien tapauksessa leikkaushoidolla.
- D. Kasvuhormonia tuottava adenooma (somatotrooppinen adenooma) on toiseksi yleisin adenoomatyyppi.
 - 1. Aiheuttaa lapsilla gigantismia eli jättikasvuisuutta – kiihtynyt pituuskasvu, koska epifyysit eivät ole vielä sulautuneet yhteen
 - 2. Aiheuttaa aikuisilla akromegaliaa
 - a. Luuston kärkeosat (kädet, jalat, nenä, leuka) suurenevat
 - b. Sisäelinten liikakasvu ja seuraava vajaatoiminta
 - i. Tärkeimmät aikaiseen kuolemaan johtavat komplikaatiot ovat sydämen vajaatoimintaan liittyviä.
 - c. Ihon paksuuntuminen ja öljyyntyminen
 - d. Kieli kasvaa – aiheuttaa kuorsausta ja uniapneaa
 - 3. GH stimuloi myös mm. maksan glukoneogeneesiä, mikä usein aiheuttaa sekundaarista diabetes mellitusta.
 - 4. Epäilyn herättyä määritetään seerumin IGF-1 ja kasvuhormonipitoisuudet, jotka ovat koholla.
 - a. Diagnoosi varmistetaan ESH:ssa 2h oraalisella glukoosirasituskokeella – ei GH:n supressiota
 - 5. Voidaan hoitaa lääkityksellä (somatostatiinianalogi oktreotidi supressoi GH:n vapautusta) tai leikkaushoidolla (ensisijainen).
- E. Kortikotrooppinen (ACTH) adenooma on tavallisin Cushingin oireyhtymän eli kortisolin liikatuotannon syy
 - 1. Nimenomaan adenoomasta johtuvaa Cushingin oireyhtymää kutsutaan Cushingin taudiksi.
- F. Gonadotrooppiset (LH/FSH) ja tyreotrooppiset (TSH) adenoomat ovat todella harvinaisia.

III. HYPOPITUITARISMI

- A. Anteriorisen aivolisäkkeen lohkon hormonituotannon vajaatoimintaa, yleensä panhypopituitarismia eikä selektiivistä tietyn hormonin puutetta.
 - 1. Tyypillinen hormonivaikutusten loppumisen järjestys: GH -> LH/FSH -> TSH -> ACTH -> PRL
- B. N. ¾ aivolisäkkeen etulohkosta tulee tuhoutua, ennen kuin adenohipofyyysin vajaatoimintaa havaitaan.
- C. Oireet ovat hormonispesifisiä ja täydellisessä tuhoutumisessa hyvin moninaiset.

1. ↓ TSH – hypotyreoosi
2. ↓ ACTH – hypokortisolismi
3. ↓ GH – pituuskasvun hidastuminen; aikuisilla mm. väsymystä, vyötärölihavuutta, osteopeniaa
4. ↓ LH ja FSH – hypogonadismi ja infertiliteetti
5. ↓ Prolaktiini – imetyksen vaikeus

D. Tunnettuja aiheuttajia ovat mm.

1. Aivolisäkkeen adenooma (lapsilla kraniofaryngiooma) – massavaikutus tai pituitaarinen apopleksia; yleisin syy (>50%)
2. Kallovario, kirurginen hoito tai sädehoito – hypotalamuksen vauriot vaikuttavat aivolisäkkeen toimintaan.
3. Sheehanin oireyhtymä – Raskauden aikana tapahtuu fysiologista aivolisäkkeen suurenemista (suurenee n. 2x), mutta verenkierto aivolisäkkeeseen ei lisäännä. Synnytyksen yhteydessä tai sen jälkeinen runsas verenvuoto ja hypovolemia aiheuttaa etulohkon äkillisen iskeemisen vaurion (on siis yksi pituitaarisen apopleksian tyyppi).
 - a. Ensioireita synnytyksen jälkeen on mm. huono maidontulo, häpykarvojen heikko kasvu, hypotensio, väsymys
 - i. Voi aiheuttaa myös mm. amenorreaa ja intoleranssia kylmälle.
4. Tyhjän sellan oireyhtymä – Sella turcica näyttää radiologisesti tyhjältä; yleensä syynä on poikkeava kongenitaalinen aukko sellan diafragmassa, minkä takia lukinkalvon muodostama likvorpussi on hernioitunut turkinsatulaan tuhoten aivolisäkkeen.

AIVOLISÄKKEEN TAKALOHKON SAIRAUDET

I. DIABETES INSIPIDUS (VESITYSTAUTI)

- A. Diabetes insipidus on vanha nimi; uudet nimitykset ovat arginiinivasopressiinin puutos (AVP-D) ja argiinivasopressiiniresistenssi (AVP-R)
- B. Tila, joka johtuu aivolisäkkeen takalohkon erittämän ADH:n puutteesta (sentraalinen, AVP-D) tai sen heikosta vaikutuksesta munuaisissa (renaalinen, AVP-R).
 1. Sentraalinen voi johtua hypotalamuksen ja/tai aivolisäkkeen häiriöistä (esim. kasvaimet, vamma, kirurgia, infektio, autoimmuuni, perinnöllinen).
 2. Renaalinen johtuu ADH-resistenssistä ja voi olla periytyvä (lapsilla) tai hankittu (lääkkeet, kuten litium).
- B. ADH:n vaikutuksen puutteessa vettä ei pystytä reabsorboida distaalisissa tubuluksissa ja kokoojaputkessa, mikä johtaa runsaaseen veden menetykseen.
- C. Kliininen kuva
 1. Polyuria ja polydipsia – nestehukan riski jos virtsataan enemmän kuin ehditään juoda
 2. Hypernatremia (>144 mmol/l)/plasman hyperosmolaliteetti (>295 mOsm/kg) ja pieni virtsan osmolaliteetti (< 300 mOsm/kg)
 - a. Nämä yhdessä viittaavat ADH:n tai sen vaikutuksen puutteeseen; virtsan osmolaliteetti on suurempi muissa hypernatreemisissa tiloissa (mm. liiallinen suolan saanti, veden puute)

- i. Tarvittaessa (esim. osittaisen AVP-D:n/AVP-R:n diagnostiikassa) voidaan tehdä myös vesipaasto ja siihen yhdistettyä hypertonisen keittosuolan infuusiokoe (VHKI); tehdään endokrinologian yksikössä.
 - b. Hypernatremia aiheuttaa aivosolujen kutistumista; hitaasti kehittyvässä tilassa neurologiset oireet yleensä vähäisiä.
 - i. Neuronit adaptoituvat tilaan, mutta nopea hypernatremian korjaus voi johtaa aivoödeemaan.
 - D. Sentraalinen hoidetaan desmopressiinillä (ADH-analogi), renaalinen diureeteilla (tiatsidit, amiloridi).
- II. ADH:N EPÄTARKOITUKSEN MUKAISEN ERITYKSEN OIREYHTYMÄ (SIADH)
- A. Tila, joka johtuu ADH:n liikaerityksestä; johtuu yleensä ektooppisesta tuumorista (mm. keuhkojen pienisoluinen karsinooma), mutta myös kallovarsi, hypofyysikirurgian jälkitila ja lääkkeet (esim. SSRI:t, syklofosfamidi) voivat olla taustalla.
 - 1. SIAD = laajempi käsite, joka huomioi myös antidiureettisen hormonin tehostuneen vaikutuksen munuaisen kokoojaputkissa joko perinnöllisestä syystä tai tiatsididiureetin aiheuttamana
 - B. ADH:n vaikutuksen ollessa tarpeettoman suurta veden retentio on voimakasta.
 - C. Kliininen kuva
 - 1. (Euvoleeminen) Hyponatremia ja korkea virtsan osmolaliteetti
 - a. Neurologiset oireet (sekavuus, kouristukset) ilmenevät myöhään (<120 mmol/l) – hyponatremia johtaa neuronien turpoamiseen ja aivoödeemaan.
 - i. Liian nopea pitkäaikaisen vakavan hyponatremian korjaaminen voi aiheuttaa aivojen osmoottista myeliinivauriota aivosillan alueella.
 - D. Hoidetaan vesirajoituksella ja mahdollisesti mineralokortikoideilla
 - 1. ADH:n antagonistin tolvaptaanin asema ja indikaatiot ovat vielä vakiintumassa

KILPIRAUHASSEN KEHITYSHÄIRIÖT

- I. EKTOOPPINEN KILPIRAUHANEN
 - A. Kilpirauhasen synnynnäiset anomaliat ovat yleensä seurausta häiriöistä kilpirauhasaiheen laskeutumisessa.
 - 1. Kilpirauhanen vaeltaa kielen tyvestä pitkin tyroglossaalitiehyttä kilpiruston alapuolelle trakean etupinnalle.
 - a. Tyroglossaalitiehyt involoitus laskeutumisen jälkeen.
 - i. Jättää jälkeensä foramen cecumin kielen tyveen.
 - B. Tavallisin paikka ektooppiselle kilpirauhaselle on kielen tyvi; havaitaan makroskooppisesti massana kielen tyvessä.
 - C. Tyroglossaalinen kysta (mediaalinen kaulakysta) saa alkunsa involoitusmattoman tyroglossaalitieheen jäänteestä, joka muuttuu kystaksi; yleensä havaitaan massana kieliluun alueella keskiviivassa.
 - 1. Lisää riskiä kilpirauhaskarsinoomalle.

HYPERTYREOOSI

- I. PERIAATTEET
 - A. Kilpirauhasen liikatoiminta tarkoittaa sekä hypertyreosia että tyreotoksikoosia, mutta usein termejä käytetään vaihtokelpoisesti.

1. Vain hypertyreoosi tarkoittaa kilpirauhasen liikatoimintaa; tyreotoksikoosi tarkoittaa suurentunutta kilpirauhashormonien pitoisuutta verenkierron ja kudoksissa (voi johtua muustakin syystä kuin hypertyreosista).
- B. Kilpirauhashormonien suurentunut pitoisuus verenkierron aiheuttaa metabolisia muutoksia.
 1. Lisää perusaineenvaihduntaa (lisää Na^+ - K^+ -ATPaasin synteesiä).
 2. Lisää sympaattisen hermoston aktiivisuutta (lisää beeta1-adrenergisten reseptorien ekspressiota).
- C. Oireet
 1. Yleisoireet
 - a. Painon lasku riippumatta lisääntyneestä ruokahalusta
 - b. Lisääntynyt hikoilu, lämmönsiedon heikentyminen
 2. Verenkiertoelimistön oireet
 - a. Takykardia ja iskutilavuuden suureneminen; riski rytmihäiriöille (eteisvärinä) erityisesti vanhuksilla
 3. Neuropsykiatriset oireet
 - a. Hermostuneisuus, emotionaalinen tasapainottomuus, vapina, unettomuus
 - b. Nopeat refleksit
 4. Lihasoireet
 - a. Lihasheikkous ja -atrofia
 5. Ruuansulatuskanavan oireet
 - a. Kiihtynyt suolen motiiviteetti ja mahdollinen ripuli
 6. Iho- ja hiusoireet
 - a. Käsien lämmin kosteus, Plummerin kynnet (onykolyysi)
 - b. Hiukset ohuet ja hairaat
 7. Luustomuutokset
 - a. Luun hajoaminen kiihtyy enemmän kuin rakentuminen – hyperkalsemia ja riski osteoporoosille
 8. Steroidihormonien muutokset - Androgeenien lisääntynyt muuttuminen estrogeeneiksi ja SHBG:n lisääntynyt tuotanto
 - a. Miehillä gynekomastia ja naisilla oligomenorrea
 9. Hypokolesterolemia (lipolyysi>lipogeneesi) ja hyperglykemia (glukoneogeneesi ja glykogenolyysi)

II. BASEDOWIN TAUTI (GRAVESIN TAUTI)

- A. Yleisin syy hypertyreosille.
- B. Kilpirauhasen autoimmuunipohjaista diffuusia hyperplasiaa ja kilpirauhashormonien liikaeritystä; selvästi enemmän naisilla, yleensä 30-40 vuoden iässä.
 1. Johtuu kiertävistä IgG-autovasta-aineesta (LATS, TSHRab), joka stimuloi TSH-reseptoreita ja kiihdyttää kilpirauhasen toimintaa (tyypin II yliherkkyysreaktio).
- C. Oireet
 1. Hypertyreoosi ja diffuusi kilpirauhasen suureneminen (struuma)
 2. Eksoftalmos ja harvemmin pretibiaalinen myksoedeema
 - a. Autovasta-aineet vaikuttavat myös retro-orbitaaliin ja dermaalisiin fibroblasteihin (ja vähemmässä määrin T-lymfosyytteihin), mikä aktivoi ne erittämään enemmän glykosaminoglykaaneja (GAG), mikä johtaa alueen

osmoottiseen turpoamiseen, tulehdukseen, fibroosiin ja lisääntyneeseen adiposyyttimäärään.

- D. Histologisesti nähdään normaali lobulaarinen yleisrakenne, mutta follikkelit ovat epäsäännöllisiä (yleensä pienehköjä), niiden epiteeli on hyperplastista ja poimuttunutta ja kolloidi on vaaleaa ja vakuolisoitunutta. T-lymfosyyttikertymiä havaitaan, mutta vähäisempänä kuin Hashimoton tyreoidiitissa.
- E. Diagnostiikka perustuu pääasiassa laboratoriotuloksiin ja kliiniseen kuvaan.
 - 1. Totaalit (T4 ja T3) ja vapaat kilpirauhashormonit (T4v ja T3v) koholla; TSH pienentynyt negatiivisen säätelyn kautta
 - a. Yleensä havaitaan myös hypokolesterolemiaa ja hyperglykemiaa.
 - 2. Kuvantamisessa havaitaan diffuusi struuma.
- F. Hoidetaan beetasalpaajilla ja tioamideilla (tyreostaatteja) sekä mahdollisesti radiojodihoidolla (ablaatio).
- G. Kilpirauhasmyrsky eli hypertyreootinen kriisi on hengenvaarallinen komplikaatio.
 - 1. Kehittyy hypertyreosia sairastavalle potilaalle äkillisesti kohonneiden katekolamiinien seurauksena (infektio, trauma, muu stressitilanne).
 - 2. Oireilee mm. kuumeena, voimakkaana hikoiluna, hyperkinesiana, rytmihäiriöinä, oksenteluna ja voimakkaana dehydraationa, joka voi johtaa hypovolemiseen sokkiin.

III. KYHMYSTRUUMA

- A. Basedowin tautiin liittymätön struuma on usein kyhmyistä.
- B. Voi johtua endeemisestä jodin puutteesta (hypotyreoosi) tai olla sporadinen.
- C. Kyhmystruuma on yleensä pienikokoinen ja oireeton; vain osa on liikatoimivia ja hypertyreosia aiheuttavia.
 - 1. Joskus kyhmyt voivat muuttua autonomisiksi, jolloin ne eivät tarvitse TSH:n stimulaatiota erittämään T4-hormonia (toksinen kyhmystruuma).
 - a. Johtuu useimmiten TSH-reseptorin mutaatioista (n. 60% tapauksista).

HYPOTYREOOSI

I. PERIAATTEET

- A. N. 95% hypotyreoosista ovat primaarisia eli kilpirauhasperäisiä.
 - 1. Maailmanlaajuisesti yleisin syy on jodinpuutos; Suomessa krooninen autoimmuunireoidiitti.
 - a. Myös aikaisempi radiojodihoito, kilpirauhasleikkaus tai lääkkeet (mm. litium) voivat aiheuttaa hypotyreoosia.
- B. Oireet vaihtelevat ihmisestä toiseen vaikeusasteen mukaan; oireisto perustuu vähentyneeseen perusaineenvaihtoon ja vähentyneeseen sympaattiseen toimintaan.
 - 1. Yleisoireet
 - a. Painon nousu normaalista tai vähentyneestä ruoanhalusta riippumatta
 - b. Vähentynyt hikoilu ja kylmänsiedon heikkeneminen
 - 2. Myksödeema – glykosaminoglykaanien kertyminen ihoon ja pehmytkudoksiin
 - a. Johtaa äänen madaltumiseen ja käheyteen, paksuun kieleen ja pöhöttyneisyyteen (erityisesti perifeerisesti ja periorbitaalaisesti).
 - 3. Verenkiertoelimistön oireet

- a. Bradykardia ja iskutilavuuden pieneneminen; johtaa hengenahdistukseen ja uupumukseen
- 4. Neuropsykiatriset oireet
 - a. Hidas puhe, muistihäiriöt
 - b. Hitaat refleksit
- 5. Lihasoireet
 - a. Lihasen jäykkyys, särky ja heikkous
- 6. Ruuansulatuskanavan oireet
 - a. Hidastunut suolen motiliteetti ja mahdollinen ummetus
- 7. Iho- ja hiusoireet
 - a. Kylmä ja kuiva iho; hauraat ja hitaasti kasvavat kynnet
 - b. Hiukset käyvät kuiviksi ja hauraiksi
- 8. Luustomuutokset
 - a. Luun yleinen metabolia hidastunutta (sekä resorptio että formaatio) -> jossain määrin kohonnut murtumariski, mutta hypertyreoosissa paljon merkittävämpää
 - i. Joskus kuitenkin esiintyy hyperkalsemiaa, vaikka luun hajoaminen hidastunutta; johtuu PTH stimuloimasta 1,25(OH₂D-vitamiinin synteesistä -> kalsiumin suolistoimeytyminen ja reabsorptio munuaisista tehostuu
- 9. Steroidihormonien muutokset – TSH:ta tuottavien solujen hyperplasia vähentää LH:n eritystä
 - a. Naisilla oligomenorreaa, miehillä impotenssia ja oligospermiaa
- 10. Hyperkolesterolemia ja hypoglykemia

II. KRETINISMI

- A. Vastasyntyneen vaikea hypotyreoosi johtaa oireyhtymään, johon liittyy mm. luuston kasvuhäiriöt, lyhytkasvuisuus, henkinen jälkeenjääneisyys, suurentunut kieli ja umbilikaalinen hernia ja pullottava vatsa.
 - 1. Suomessa synnynnäinen hypotyreoosi johtuu yleensä kilpirauhasen kehityshäiriöstä: hypoplasia, aplasia, ektopia; useimmiten syy jää tuntemattomaksi.
 - a. Johtuu maailmanlaajuisesti yleensä äidin hypotyreoosista jodinpuutteen takia(sikiön oma kilpirauhashormonituotanto käynnistyy n. vk20).
 - 2. Voi johtua myös kilpirauhashormonin synteesin perinnöllisestä häiriöstä (dys hormonogeneettinen struuma; esim. TPO:n ekspression puute)
- B. Vastasyntyneiden TSH seulotaan Suomessa napaverinäytteestä (muut seulonnat kantapäästä kuivaverinäytteestä 2-5vrk iässä) ja tarpeen mukaan aloitetaan tyroksiinihoito.

TYREIDIITIT

I. HASHIMOTON TYREIDIITTI (AUTOIMMUUNITYREIDIITTI, DIFFUUSI LYMFOSYYTTINEN TYREIDIITTI)

- A. Autoimmuunisairaus, joka johtaa kilpirauhasen kroonisen tulehdukseen ja tuhoutumiseen; yleisin hypotyreoosin syy Suomessa, yleensä 30-50-vuotiailla naisilla.
 - 1. Yli 95% todetaan anti-TPO- ja TG-autovasta-aineita; liittyy usein HLA-DR3 tai DR5-kudostyyppiin.

- a. Myös Basedowin taudissa voidaan tavata näitä; voikin harvinaisesti muuttua ajan kuluessa hypotyreoottiseksi.
 - B. Taudin alussa yleensä havaitaan hypertyreoottisia piirteitä kilpirauhaskudoksen vaurioituessa ja vapauttaessa normaalia enemmän hormoneja, mutta vaurioitumisen jatkuessa tauti etenee klassiseen muotoonsa hypotyreoottiseksi.
 1. Ilmenee hypertyreosoosin oireina ja struumana.
 - C. Histologisesti havaitaan runsasta kroonista inflammaatiota ja itukeskuksia, jotka vaurioittavat follikkelirakenteita, minkä takia voidaan havaita Hürthlen soluja (follikkeleja verhoavien solujen eosinofiilista (onkosyyttistä) metaplasiaa).
 - D. Lisää riskiä marginaalivöhykkeen lymfomalle kilpirauhasessa.
 1. Ilmenee myöhään kasvavana kilpirauhasena.
- II. SUBAKUUTTI GRANULOMATOOTTINEN TYREOIDIITTI (DE QUERVAININ TYREOIDIITTI)
- A. Kilpirauhasen granulomatoottinen tulehdus; virusinfektio (coxsackia-, influenssa-, echo-, adeno-, ja sikotautivirukset) on todennäköisin etiologia.
 1. Yleisintä naisilla 40-50v. iässä.
 2. Bakterielli tyreoidiitti on erittäin harvinainen ja aiheuttaa usein vakavamman akuutin tyreoidiitin.
 - B. Oireiden voimakkuus vaihtelee, mutta tyypillistä on kuumeilu ja kivulias, suurentunut kilpirauhanen, joka aiheuttaa ohimenevää hypertyreosoosia.
 1. Usein oireiden alusta kehittyä parin kuukauden kuluessa ohimenevä hypotyreoosi ja toiminta palaa normaaliksi vuoden sisällä.
 - C. Yleensä itsestään rajoittuvaa ja tulehdukkipuläkkeillä/kortisoina hoituvaa.
- III. RIEDELIN (FIBROOTTINEN/SKLEROSOIVA) TYREOIDIITTI
- A. Harvinainen, idiopaattinen, kilpirauhasta voimakkaasti fibrotisoiva krooninen tulehdustauti; pääasiassa keski-ikäisillä naisilla.
 1. Uskotaan olevan yksi IgG4-ään liittyvän sairauden manifestaatio.
 - B. Rauhanen on kivimäisen kova ja herättää pahanlaatuisuuden (anaplastinen karsinoma) epäilyn.
 1. Potilaat ovat nuorempia ja maligneja soluja ei havaita.
 - C. Hypotyreoosi on harvinainen; oireet tulevat lähiympäristön elinten kompressiosta.

KILPIRAUHASEN KASVAIMET

I. PERIAATTEET

- A. Kilpirauhasen kasvaimet ovat useammin benignejä kuin maligneja ja esiintyvät yksittäisenä, hyvin erottuvana kyhmynä.
- B. Ultraääni pystyy yleensä erottamaan pahanlaatuisia ja hyvänlaatuisia muutoksia toisistaan.
 1. Diagnoosi saattaa vaatia ohutneulabiopsian tai epävarmoissa tilanteissa koko kyhmyn poistoa.
- C. Pahanlaatuiset muutokset hoidetaan kilpirauhasen poistolla ja jatkohoitona mahdollisena radiojodiablaatiohoitona.
 1. ¹³¹I-radioaktiivinen jodi kertyy kilpirauhaskudokseen ja tuottaa hajotessaan elektronisäteilyä, joka tuhoaa jäljelle jääneet syöpäsolut ja normaalin kudoksenkin (123-I-jodia käytettiin aikaisemmin enemmän kilpirauhaskyhmien diagnostiikassa;

voitiin jakaa kyhmyt kertymisen määrän perusteella ”kuumiksi” (tuottavat kilpirauhashormonia) ja ”kylmiksi” (eivät tuota kilpirauhashormonia))

- a. Kuuma kyhmy havaitaan Basedowin taudissa tai monikyhmyisessä struumassa.
- b. Kylmä kyhmy havaitaan adenoomassa ja karsinoomassa.
- c. Nykyään käytetään erikoissairaanhoidossa tietyin indikaatioin (esim. toksinen adenooma, joskus kilpirauhassyövän seuranta)

D. Kyhmyt ovat yleensä non-funktionaalisia ja aiheuttavat vain kompressio-oireita tai metastaaseista johtuvia oireita.

II. FOLLIKULAARINEN ADENOOMA

- A. Yleisin hyvänlaatuinen kilpirauhasen neoplasia; lähtöisin follikkeliepiteelistä.
- B. Yleensä pieni, oireeton ja non-funktionaalinen (vain 1% on toksisia); suurena voi aiheuttaa kompressio-oireita.
- C. Fibroottinen kapseli eikä invaasiota kapselin läpi tai kapselin sisäisiin verisuoniin.

III. FOLLIKULAARINEN KARSINOOMA

- A. Follikkeliepiteelistä lähtöisin oleva invasiivinen syöpä; toiseksi yleisin kilpirauhassyöpä.
- B. Ionisoiva säteily ja jodin puute tärkeimmät riskitekijät.
- C. Fibroottinen kapseli, mutta invasoi sen läpi tai kapselin sisäisiin verisuoniin.
 1. Ohutneulabiopsia ei mahdollista yleensä verisuoni- tai kapseli-invaasion havaitsemista; vain koko kyhmyt tarkastelu voi erottaa follikulaarisen adenooman karsinoomasta.
 - a. Ohutneulabiopsian lausunto onkin follikulaarinen neoplasia ja muutoksen poistoa suositellaan diagnoosia varten.
- D. Verisuoni-invaasion takia metastasointi tapahtuu yleensä hematogeneettisesti (erityisesti keuhkoihin ja luustoon); imusolmukemetastaasit harvinaisia.
- E. Minimaalisesti invasiivisilla hyvä ennuste (10v – n. 90%), kun taas runsaasti invasoivista puolet kuolee 10 vuoden sisällä.

IV. PAPILLAARINEN KARSINOOMA

- A. Follikkeliepiteelistä lähtöisin oleva papillaarisia rakenteita muodostava pahanlaatuinen kasvain; yleisin kilpirauhassyöpä (n. 80%).
- B. Ionisoiva säteily tärkein riskitekijä.
- C. Sytologisesti havaitaan hypokromaattisia soikeita tumia (ground glass/Orphan Annie eye) ja myös soluja, joiden tumissa on uurteita ja vakuoleja (pseudoinklusio).
 1. Histologisesti yleensä epätarkkarajainen (yleensä kapseliton) ja havaitaan Orphan Annie eye-soluilla verhottuja papillaarisia rakenteita, joiden sisällä on usein psammomakappaleita; myös lymfosyyttireaktiota havaitaan.
- D. Leviää usein imuteitse kaulan imusolmukkeisiin, mutta ennuste on näissäkin tapauksissa hyvä (10-vuotiselossaolo-osuus > 90%).

V. MEDULLAARINEN KARSINOOMA

- A. C-soluista (parafollikulaariset solut) peräisin oleva neuroendokriininen kilpirauhasen karsinooma; n. 1-2% kilpirauhaskarsinoomista.
- B. Tuumori on yleensä kova ja tarkkarajainen, mutta ei kapseloitunut.
- C. Morfologia moninainen; sytologisesti yleensä korkeasta erilaistumisesta huolimatta huono koheesio.

D. Histologisesti piireitä sidekudosseptoilla erottuneet kasvainsolusaarekkeet amyloidisessa stroomassa.

1. C-solut tuottavat kalsitoniinia, joka lisää kalsiumin eritystä munuaisissa, inhiboi osteoklasteja ja voi täten aiheuttaa hypokalsemiaa.
2. Kalsitoniini kertyy kasvaimeen amyloidina.

E. N. 25% medullaarisista kasvaimista on perinnöllisiä ja esiintyvät sporadisista poiketen yleensä molemminpuolisena ja multippelina.

1. RET-proto-onkogeenin gain-of-function mutaatiot ovat molemmille tyypeille tyypillisiä; MEN 2A ja MEN 2B-oireyhtymissä havaitaan itusolulinjan RET-geenimutaatio.
2. Multippeli endokriininen neoplasia (MEN) -oireyhtymät johtavat samanaikaisiin kasvaimiin useissa hormonirauhasissa.
 - a. MEN2A – medullaarinen kilpirauhaskarsinoma (päälöydös), feokromosytooma, lisäkilpirauhasten hyperplasia(/adenoomat)
 - b. MEN2B – medullaarinen kilpirauhaskarsinoma (päälöydös), feokromosytooma, suun mukoosan ganglioneuroomat, marfanoidi habitus
3. Itusolulinjamutaation toteamisen jälkeen suositellaan profylaktista kilpirauhasen poistoa.

F. Ennuste vaihtelee (10v: 50-90%) levinneisyyden perusteella.

VI. ANAPLASTINEN (ERILAISTUMATON) KARSINOOMA

- A. Kokonaan tai suurelta osin erilaistumattomista soluista koostuva kilpirauhaskarsinoma; <2% kilpirauhaskarsinomista ja lähinnä yli 60-vuotiailla.
- B. Nopeakasvuinen, lähikudoksiin invasoiva (dysfagia/hengitysvaikeudet) ja helposti metastasoiva; ennuste huono (n. 3-6kk mediaanielossaoloaika).

LISÄKILPIRAUHASSEN SAIRAUDET

I. PERIAATTEET

- A. Ihmisillä on useimmiten neljä lisäkilpirauhasta; kaksi molemmin puolin posteriorista kilpirauhasta tai sen sisällä.
- B. Lisäkilpirauhaset koostuvat pääsoluista, rasvasta ja oksifiilisista (onkosyyttisistä) soluista; pääsolut tuottavat lisäkilpirauhashormonia (PTH), mikä säätelee pääasiassa kalsium- ja fosfaattiaineenvaihduntaa.
 1. Luustossa PTH aktivoi (epäsuorasti) osteoklasteja ja lisää kalsiumin ja fosfaatin mobilisaatiota luusta.
 - a. Osteoklasteilla ei ole PTH-reseptoreita, mutta PTH stimuloi aluksi ja transientisti osteoblasteja (jaksoittainen vähäannoksinen PTH-analogin eli teriparatidin annostelu onkin yksi osteoporoosin hoitokeino)
 - b. Osteoblastit erittävät osteoklasteja stimuloivia sytokiineja (RANKL, IL-1), jonka takia yhtäjaksoisesti pitkään vaikuttavan PTH:n vaikutus onkin luun resorptio
 2. Munuaisissa PTH lisää kalsiumin reabsorptiota ja fosfaatin eritystä sekä lisää 1-alfa-hydroksylaasin toimintaa (kalsitriolin tuotanto).
 - a. Epäsuora vaikutus kalsitriolin kautta suolistoon: kalsiumin ja fosfaatin lisääntynyt imeytyminen.

- C. Muista endokriinisistä elimistä poiketen aivolisäkkeen hormoneilla ei ole suurta roolia lisäkilpirauhasen säätelyssä; pääasiassa veren vapaan ionisoituneen kalsiumin tasot säätelevät (pääsolujen pinnan Ca^{2+} tunnistavat reseptorit)

1. Vapaan kalsiumin määrän pieneneminen veressä johtaa PTH:n syntetisoitumiseen ja eritykseen
 - a. Myös magnesiumtasoilla samankaltaisia vaikutuksia (paitsi vaikea hypomagnesemia $\rightarrow$ PTH:n erityksen väheneminen)
 - b. Myös fosfaattitasot säätelevät (kohonnut fosfaatti $\rightarrow$ lisää PTH)

II. PRIMAARINEN HYPERPARATYREOOSI (PHPT)

- A. Lisäkilpirauhasen toimintahäiriö, jossa lisäkilpirauhasen tuottaa autonomisesti liikaa PTH:ta; valtaosa potilaista yli 60-vuotiaita naisia.
- B. Yleisin syy (75-85%) on yksittäinen hyvänlaatuinen lisäkilpirauhasen adenooma; muita syitä ovat mm. useamman lisäkilpirauhasen sporadinen hyperplasia (10-15%) ja lisäkilpirauhasen karsinooma (>1%).
1. Hyperplasia/Adenooma voi liittyä usein MEN 1 tai MEN 2A- oireyhtymään
 - a. MEN 1: Lisäkilpirauhasen adenoomat (päälöydös), haiman endokriinisten neoplasioiden ja aivolisäkkeen adenoomien kanssa.
 - b. MEN 2A -oireyhtymä: medullaarinen kilpirauhaskarsinooma (päälöydös), feokromosytooma, lisäkilpirauhasen hyperplasia (myös adenoomat)
- C. Tärkein piirre on hyperkalsemia, joka kohonneen PTH:n kanssa aiheuttaa vaihtelevia oireita; PHPT on yleisin hyperkalsemian syy.
1. Luun resorptio – luukipu, osteoporoosi, osteitis fibrosa cystica, brown-tuumorit
 2. Munuaisoireet – nefrolitiaasi (kalsiumoksalaattikiviä), nefrokalsinoosi (tubulusten metastaattinen kalsifikaatio, mikä johtaa mahdollisesti muinaisten vajaatoimintaan ja polyuriaan)
 3. Ruuansulatuskanavan oireet – ummetus, sappikivet, haimatulehdus, mahahaava
 4. Neuropsykiatriset oireet – lihasheikkous, muistihäiriöt, depressio, kohtaukset
- D. PHPT:n diagnoosi perustuu pääasiassa laboratoriotutkimuksiin.
1. Kohonnut seerumin intakti PTH (P-PTH), kalsium (S-Ca-Ion tai P-Ca) riittävät diagnoosiin; ns. PTH:sta riippuvainen hyperkalsemia
 - a. Muita löydöksiä on kohonnut AFOS (käytetään leikkauksen jälkeisen hypokalsemian vaaran arvioimisessa), matala seerumin fosfaatti
- E. Ainoa parantava hoito on affisioituneen rauhasen poistaminen; adenoomaa ja hyperplasiaa ei ole mahdollista erottaa histologisesti.
1. Jos leikkauksen jälkeinen PTH- ja kalsiumarvot eivät pienene, on useaa lisäkilpirauhasta affisioiva hyperplasia todennäköistä.
 - a. Hyperplasiassa yleensä poistetaan 3,5 rauhasta ja viimeinen puolikas voidaan istuttaa käsivarteeseen.

III. SEKUNDAARINEN HYPERPARATYREOOSI

- A. PTH:n liikatuotantoa, joka johtuu lisäkilpirauhasten ulkoisesta prosessista ja siitä johtuvasta hypokalsemiasta ja lisäkilpirauhasten kompensatorisesta yliaktiivisuudesta.
- B. Yleisin syy on krooninen munuaisten vajaatoiminta.
1. Munuaisten vajaatoiminnassa fosfaatin erityks on vähentynyt.
 2. Vapaa seerumin fosfaatti sitoo kalsiumia.
 3. Vapaan kalsiumin määrän laskeminen stimuloi lisäkilpirauhasia tuottamaan PTH:ta.

4. PTH aiheuttaa luuresorptiota (renaalinen osteodystrofia).

C. Laboratoriotutkimukset:

1. Kohonnut P-PTH, fosfaatti (P-Pi) (ja AFOS), matala seerumin kalsium.

D. Pitkään jatkuessaan sekundaarinen hyperparatyreoosi voi johtaa pitkittyneeseen hyperplasiaan, autonomiseen liikatoimintaan ja hyperkalsemiaan (tertiäärinen hyperparatyreoosi).

1. Tyypillisintä kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa (CKD) erityisesti munuaissiirteen jälkeen.

IV. HYPERKALSEEMINEN KRIISI

- A. Hyperkalsemia voi aiheuttaa korkeaksi noustessaan (S-Ca-lon $>1,75-2,0$ mmol/l tai P-Ca yli 3,5-4,0mmol/l) henkeä uhkaavan kriisitilan.
- B. Ilmenee sekavuutena, lihasheikkoutena, oksenteluna, kuumeiluna, polyuriana ja -dipsiana (lopulta munuaisten toiminta loppuu).
- C. Tavallisimmat syyt ovat lisäkilpirauhasen karsinooma tai adenooma ja D-vitamiini-intoksikaatio.
- D. Hoidetaan nestehoidolla ja läkehoidolla (mm. bisfosfonaatit estämään luun hajoamista ja D-vitamiiniriippuvaisissa hyperkalsemioissa glukokortikoidit)

V. HYPOPARATYREOOSI

A. Matala PTH; harvinainen hypokalsemian syy

1. Hypokalsemian syyt voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: PTH:n tai sen vaikutuksen puute, D-vitamiinin tai sen vaikutuksen puute ja muut syyt

B. Syitä ovat mm. kilpirauhasleikkauksen jälkeinen tila (yleisin), autoimmuunisairaus (itsenäinen tai perinnöllinen APS-1:n osa) tai CATCH-22 (DiGeorgen oireyhtymä).

1. CATCH-22:n taustalla on kromosomialueen 22q11.2 mikroleetio, joka aiheuttaa kolmannen ja neljännen kidustaskun kehityshäiriön.

- a. Cardiac abnormality, abnormal facies, thymic hypoplasia, cleft palate, hypoparathyreosis

C. Hypokalsemian oireet

1. Neuromuskulaarisen ärtyvyyden lisääntyminen (– sormien ja varpaiden pistely, suun seudun parestesiat ja tetania (lihasspasmit, laryngeaalinen stridor (lanryksspasmi) ja kouristukset).

- a. Piilevä tetania voidaan osoittaa Chvostekin tai Trousseauun kokeilla.

- i. Chvostekin koe – refleksivasaralla kopautetaan kasvohermon seutua poskessa; aiheuttaa kasvolihasten kontraktion hypokalsemiassa

- ii. Trousseauun koe – verenpainemittarin mansetilla ylläpidetään systolisen paineen ylittävää painetta yläraajassa; aiheuttaa käteen kouristuksen kolmessa minuutissa hypokalsemiassa

- b. $\downarrow$ ekstrasellulaarinen $Ca^{2+} \rightarrow \downarrow$ kynnyspotentiaali $\rightarrow$ solujen

depolarisaatio helpompaa

2. Altistaa vaarallisille rytmihäiriöille (QT-ajan piteneminen $\rightarrow$ Torsades de pointes)

A. Laboratoriotutkimuksissa havaitaan matala seerumin P-PTH ja kalsium sekä kohonnut seerumin fosfaatti

B. Liian matalaa PTH:ta voidaan myös havaita vaikeassa magnesiumin puutoksessa.

- C. PTH:lle voi myös harvinaisesti ilmetä resistenssiä pääte-elimissä, mikä esiintyy myös hypokalsemiana (ja hyperfosfatemiaa); PTH on kuitenkin koholla (pseudohypoparatyreoosi).
1. Yleisin tyyppi on autosomissa vallitsevasti periytyvä tyypin 1A pseudohypoparatyreoosi, joka johtuu GNAS1 (Gs-alfa)-mutaatiosta -> aiheuttaa erityisesti munuaisten ja luun kudoksen resistenssiä PTH:lle
 2. Potilaille (tyypin 1A, 1C ja pseudopseudohypoparatyreoosi) tyypillistä Albrightin hereditaarinen osteodystrofia (AHO) eli yhteisnimitys somaattisille piirteille, joita ovat mm. lyhytkasvuisuus, pyöreät kasvot, neljänsien kämmenluiden ja muiden luiden lyhentymät sekä ihonalaiset kalkkeutumat.
 - a. Pseudopseudohypoparatyreoosissa todetaan AHO, mutta ei kalsiumaineenvaihdunnan häiriötä; johtuu siitä, että mutatoitunut GNAS1-geeni peritään isältä (munuaisissa ilmennetään vain äidiltä perittyä alleelia, joka on tässä tapauksessa normaali)
 - i. Mutaatio aiheuttaa siis kalsiumaineenvaihdunnan häiriön, jos se peritään äidiltä

ENDOKRIININEN HAIMA

I. PERIAATTEET

- A. Endokriininen haima käsittää vain n. pari prosenttia koko haimasta ja koostuu eri puolilla haimaa sijaitsevista Langerhansin saarekkeista.
- B. Saarekkeet koostuvat erilaisista solutyypeistä, jotka tuottavat erilaisia hormoneja: alfasolut (glukagoni), beetasolut (insuliini), deltasolut (somatostatiini), PP-/gamma-solut (haiman polypeptidi).
 1. Beetasolut sijaitsevat saarekkeen keskellä
 - a. Paketoivat insuliinia C-peptidin kanssa rakkuloihin Golgin laitteessa.
 - i. Eritetään ekvimolaarisissa määrissä -> voidaan käyttää endogeenisen insuliinituotannon mittaamiseen.
- C. Insuliini on anabolinen hormoni, jolla on tärkeä rooli mm. veren sokeripitoisuuden säätelyssä.
 1. Insuliinia erittyy erityisesti ruokailun jälkeen verensokerin kohotessa.
 - a. Erityy oraalinen glukosin saanti johtaa suureen insuliinivasteeseen; inkretiinivaikutus eli suoliston mukoosa erittää insuliinia stimuloivia GIP ja GLP-1 vasteena sokeripitoiselle ruualle (tapahtuu siis jo ennen verensokerin nousua).
 2. Insuliiniriippuvainen glukositransportteri (GLUT4) luustolihasissa ja rasvakudoksessa mahdollistaa glukosin pääsyn soluihin.
 3. Stimuloi glykogeeni- ja proteiinisynteesiä ja lipogeneesiä ja estää maksassa glukoneogeneesiä.
 - a. Lisää myös aminohappojen ottoa soluihin, lisää proteiinisynteesiä lihaksissa (anabolinen) sekä lisää kaliumin ottoa soluihin.
 4. Alfasolujen tuottama glukagoni toimii insuliinin vastavaikuttajana: lisää veren glukosia stimuloimalla glykogenolyysia ja lipolyysiä.
 - a. Voidaan käyttää ensiapuna vaikeassa hypoglykemiassa.

II. TYYPIN 1 DIABETES MELLITUS

- A. Haiman beetasoluihin kohdistuva autoimmuunitulehdus, joka johtaa insuliinierityksen häviämiseen ja glukoosiaineenvaihdunnan krooniseen häiriötilaan.
1. Ilmenee vasta, kun n. 90% beetasoluista on tuhoutunut.
- B. Autoimmuunireaktion uskotaan olevan T-soluperäinen.
1. Histologisesti voidaan yleensä osoittaa insuliitti eli B- ja T-lymfosyytti-infiltraatio saarekesolujen ympärillä.
 - a. Pitkälle kehittyneessä vaiheessa voidaan todeta beetasolujen tuhoa tai totaalista katoa.
 2. Prosessia heijastaa autovasta-aineiden muodostuminen. Tärkeimpiä ovat GAD-, IA2- ja insuliinivasta-aineet (IAA)
 - a. Usein voidaan havaita autovasta-aineita jo vuosia ennen kliinisiä oireita.
 3. Liittyy yleensä HLA-genotyyppeihin HLA-DR3, -DR4 tai -DQ.
 - a. Riskiä sairastua tyypin 1 diabetekseen voidaan ennustaa HLA- ja autovasta-ainemääritysten sekä aineenvaihduntatutkimusten avulla, mutta toistaiseksi ei tunneta mitään menetelmää, jolla tyypin 1 diabetesta voitaisiin ehkäistä.
- C. Usein käytetään nimitystä lapsuusiän diabetes, koska insuliinin puuttumisesta aiheutuvat oireet ilmenevät klassisesti lapsuusiässä; ei kuitenkaan rajoitu lapsiin, mutta yleensä alle 40v. (70 % tyypin 1 diabetekseen sairastuvista on alle 20-vuotiaita, 15 % yli 30-vuotiaita)
1. Korkea verensokeri – Insuliinin puutteessa rasva- ja lihaskudos ei pysty ottamaan sitä sisälleen insuliiniriippuvaisesti.
 - a. Polyuria, polydipsia, glukosuria – Sokerin ylittäessä munuaisen glukoosireabsorptiokyvyn, sitä erittyy runsaasti virtsaan ja vetää elimistöstä vettä mukanaan (osmoottinen aine).
 2. Painon putoaminen ja vähäinen lihasmassa polyfagiasta riippumatta
 - a. Glukagonin vaikutus vähäisessä insuliinin ympäristössä lisää glukoneogeneesiä, glykogenolyysiä ja lipolyysiä.
- D. Hoitona toimii insuliinihoito.
1. Liian suuri insuliiniannos on yleinen syy diabeetikoiden vakavalle hypoglykemialle; tajuttomalle voidaan antaa ensiapuna i.m. glukagonia.
- E. Jos tyypin 1 diabeteksen aiheuttamia oireita ei tunnisteta riittävän nopeasti, potilas lopettaa insuliinihoidon käytön tai potilaan sairastuessa vaikeaan akuuttiin infektiin, on riski diabeettiseen ketoasidoosiin (DKA) etenemiselle.
1. Insuliinin puutteesta johtuva hengenvaarallinen tila.
 2. Glukagonin vapaa toiminta insuliinin puutteessa aiheuttaa lipolyysiä (ja glukoneogeneesiä sekä glykogenolyysiä), jonka tarkoituksena on tuottaa ketoaineita energianlähteeksi.
 - a. Lipolyysissä vapautuu vapaita rasvahappoja, jotka muunnetaan ketoaineiksi maksassa (beeta-hydroksibutyraatti ja asetoasetatti).
 3. Laboratoriotutkimuksissa havaitaan hyperglykemia (yleensä >11 mmol/l), S-ketoaineet koholla ja metabolinen asidoosi sekä hyperkalemia ja mahdollisesti hypertoninen hyponatremia.
 4. Oireilee mm. pahoinvointina, kuivumisena, heikentyneenä tajuntana, syvästä hyperventilaationa (Kussmaulin hengitys) ja asetoninhajuisena hengityksenä.
 5. Hoidetaan nestehoidolla, insuliinihoidolla ja kaliumvajauksen korjaamisella.

III. TYYPIN 2 DIABETES MELLITUS

- A. Kohdekudosten heikentynyt herkkyys insuliinille (insuliiniresistenssi); kehittyy yleensä aikuisiällä (entinen nimitys aikuistyyppin diabetes).
 - 1. Yleisin diabeteksen tyyppi; Suomessa n. 300 000 lääkähoidettua ja määrä nousee koko ajan.
 - 2. Sukuhistoria vahvemmin yhteydessä T2DM kuin T1DM.
- B. Liittyy keskeisesti metaboliseen oireyhtymään (MBO); alttius on vahvasti sidoksissa perimään (paljon suurempi kuin T1DM perinnöllinen sitoisuus).
 - 1. MBO tarkoittaa tilaa, jossa henkilöllä on useita terveyttä uhkaavia tekijöitä samaan aikaan.
 - a. Vyötärölihavuus (miehillä 100cm, naisilla 90cm), hypertriglyseridemia ($>1,7\text{mmol/l}$), matala HDL (miehillä $<1,0\text{mmol/l}$, naisilla $<1,3\text{mmol/l}$), verenpaine $\geq 130/\geq 85\text{ mmHg}$ (tai verenpainelääkitys) ja kohonnut paastottu glukoosipitoisuus ($>5,6\text{mmol/l}$); vähintään kolme näistä.
 - 2. Viskeraalinen rasvakudos erittää inflammatorisia tekijöitä ja häiritsee maksan toimintoja ja vähentää insuliinireseptoreiden määrää kohde-elimissä.
- C. Taudin alkuvaiheissa insuliinintuotanto kasvaa kompensatorisesti vastaamaan lisääntyntä resistenssiä, mutta lopulta beetasolut "uupuvat", jolloin insuliinia ei synny tarpeeksi tarpeeseen nähden.
 - 1. Beetasolut siis kyllä tuottavat insuliinia, mutta eivät tarpeesti.
 - 2. Saarekkeissa yleensä vain lieviä muutoksia, kuten fibroosia tai amyloidin kertymistä.
- D. Oireet kehittyvät hitaasti ja ovat usein pitkään havaitsemattomissa.
 - 1. Polyuria, polydipsia ja hyperglykemia.
- E. Diabeteksen (tyypistä riippumatta) diagnoosi perustuu veren sokeripitoisuuden määrittelyyn.
 - 1. Todetaan parhaimmillaan kahden tunnin sokerirasituskokeella ($>11\text{mmol/l}$), mutta myös kohonnut paastoverensokeri ($>7\text{mmol/l}$) ja "pitkäsokeri" eli HbA1c ($>48\text{mmol/l}$, $>6,5\%$) voivat toimia diagnoosin pohjana.
 - a. Esidiabetekseksi kutsutaan tilaa, jossa 2h sokerirasituskokeen tulos on ($7,8\text{mmol/l}$ - $11,0\text{mmol/l}$) (IFG) ja/tai paastoarvo on $6,1$ - $6,9\text{mmol/l}$ (IGT).
- F. Painonpudotuksella on usein mahdollista hoitaa tauti remissioon (ei tarpeellista pitkäaikaista lääkettä); usein vaatii kuitenkin lääkkeellistä hoitoa (ensisijainen lääke metformiini).
 - 1. T2DM:sta ei siis voida parantua, mutta remissio on mahdollista.
- G. Akuutissa infektiossa riski non-ketoottiselle hyperosmolaariselle koomalle (hyperglykeeminen hyperosmolaarinen oireyhtymä, HHS).
 - 1. Akuutin sairauden provosoima hyperglykemia ei johda diabeettiseen ketoasidoosiin, jos potilaalla on vielä omaa insuliinieritystä (ketoainemuodostusta ei tapahdu).
 - 2. Aiheuttaa vaikea-asteista diureesia, hypotensiota ja koomaa; jopa 25-50% kuolleisuus
 - 3. Hyperglykemia tyypillisesti DKA:ta vakavampaa, lievästi/ei betavoihappoa veressä (ei asidoosia), hypertoninen hyponatremia ja mahdollisesti hyperkalemia.
 - 4. Hoidetaan nestehoidolla, insuliinihoidolla ja kaliumvajauksen korjaamisella.

IV. VÄHEMMÄN MAINITTUJA DIABETEKSEN TYYPEJÄ

- A. Tyypin 1 ja 2 DM ei ole ainoat diabeteksen tyypit, ja kuvastavat vain ääripäitä, joiden väliin mahtuu paljon potilaita, joilla on molempien pääryhmien piirteitä.
1. Epäselvissä tilanteissa kannattaa käyttää diagnoosia ”epävarma diabetestyyppi”.
- B. MODY (maturity onset diabetes of the young)
1. Todetaan tyypillisesti alle 25-vuotiailla, usein jo kymmenen vuoden iässä.
 - a. Potilaat yleensä normaalipainoisia.
 - b. Arviolta 1–2 % diabeteksista
 2. Glukokinaasidiabetes (GCK-diabetes, MODY2) on yleisin (>50%) Suomessa. Syynä on glukoosipitoisuuden havaitsemisen häiriö haiman beetasoluissa (glukokinaasi- eli GCK-geenin mutaatio) -> entsyymi alkaa toimia ja sen seurauksena insuliinieritys käynnistyy vasta korkeammalla verenglukoositasolla (noin 7 mmol/l) kuin terveillä henkilöillä (”termostaatissa lämmityksen käynnistävä lämpötila liian korkealle säädetty”) -> paastoverenglukoosi on vain lievästi kohonnut ja aterioiden jälkeen tapahtuva verenglukoosin nousu on normaali
 - a. Ei tyypillisesti muutu vaikeammaksi iän lisääntyessä; hoidoksi riittää useimmiten pelkkä ruokavaliohoito, mutta raskauden aikana hoidossa on erityispiirteitä
 - b. HNF-1-alfa-diabetes (30-40%) eli MODY3 taas johtuu haiman jäämisestä pieneksi sikiökehityksen aikana -> insuliinierityksen määrä jää normaalia pienemmäksi.
 - i. Häiriö pahenee ajan myötä ja verenglukoositasot nousevat lisääntyvästi sekä paastotilassa että aterioiden jälkeen; hoidoksi riittävät aluksi suun kautta otettavat diabeteslääkkeet, mutta lopuksi yleensä päädytään insuliinihoitoon.
 2. Diagnoosi perustuu DNA-testiin.
- B. LADA (latent autoimmune diabetes in adults)
1. Määritelmät ja kriteerit vaihtelevia; diagnoosi vakiintumaton ja jopa olemassaolo kiistanalainen.
 - a. Useimmiten sisällytetään luokituksissa T1DM:n alle.
 2. Insuliininpuute kehittyy yleensä nopeammin kuin tyypin 2 diabeteksessa ja hitaammin kuin tyypin 1 diabeteksessa.
 - a. LADA:n toteaminen perustuu GAD-vasta-aineiden positiivisuuden osoittamiseen yhdessä aikuisiällä tapahtuvan sairastumisiän ja hiljalleen loppuvan oman insuliinituotannon kanssa.
 - i. Aikuisiässä todetun tuoreen diabeteksen diagnostiikassa on syytä herkästi kertaalleen tarkistaa GAD-vasta-aineet (jopa 10%:lla yli 35v sairastuneista potilaista).
- C. Sekundaarinen diabetes
1. Diabetes voi johtua myös muista sairauksista tai tiloista, jotka vaikuttavat insuliinieritykseen tai insuliiniherkkyyteen.
 - a. Esim. haimatulehdus ja muut haiman sairaudet, hemokromatoosi, kystinen fibroosi
- B. Raskausdiabetes
1. Kohonnut verenglukoosi (kriteerit eroavat normaalista) todetaan ensimmäistä kertaa raskauden toisen tai kolmannen trimesterin aikana.

- a. Diagnoosi perustuu glukoosirasitukseen (OGTT), joka tehdään raskausviikoilla 24-28.
2. Johtuu raskauteen liittyvistä hormonimuutoksista ja painonnoususta -> lisääntynyt insuliinin tarve ja insuliiniresistenssi -> beetasolujen suhteellisesti puutteellinen insuliinin erityis
3. Paranee useimmiten synnytyksen jälkeen, mutta on kohonnut vaara sairastua T2DM myöhemmin (n. 10x 10v. aikana)
4. Noin 5 % raskausdiabeteksestä aiheutuu MODY:n eri muodoista.

V. DIABETEKSEEN LIITTYVÄT ELINMUUTOKSET

- A. Tärkeimmät diabeteksen aiheuttamat muutokset kohdistuvat verisuoniin ja hermoihin.
- B. Proteiinien ja lipidien glykaatio glukoosialtistuksessa (non-entsymaattinen glykosylaatio) tuottaa AGE:ja (advanced glycation end-products), jotka muodostavat poikkisidoksia verisuonten basaalimembraanin kanssa; hermoglobiinin glykaatio tuottaa pitkän glukoosikontrollin mittarin HbA1c:n.
 1. Makrovaskulaarisesti aiheuttaa ateroskleroosia ja sen komplikaatioita (mm. sepelvaltimotauti, aivohalvaus, perifeerinen verenkiertohäiriö).
 - a. Diabeetikoiden tärkein kuolinsyy on kardiovaskulaariset sairaudet (sydäninfarkti).
 - b. Alaraajojen valtimotauti johtaa jalkojen iskemiaan ja pitkittyneeksi jalkahaavaksi, joka voi tulehtuessaan johtaa amputaation tarpeeseen.
 - i. Perifeerinen neuropatia johtaa myös siihen, että jalkojen vaurioita ei tunnisteta.
- C. Mikrovasculaariset muutokset johtuvat glykaatiosta sekä polyolitiestä.
 1. Glukoosi pääsee vapaasti perifeerisiä hermoja myelinisoiviin Schwannin soluihin, retinan verisuonten perisyytteihin ja linssiin sekä arterioliin endoteelisoluihin.
 - a. Polyolitiessä aldoosireduktaasi pelkistää glukoosia sorbitoliksi, joka kertyessään soluihin toimii osmoottisesti vetäen vettä perässään ja aiheuttaen vaurioita.
 - i. Reaktiot kuluttavat myös NADPH:tä ja lisäävät oksidatiivista stressiä.
 - b. Aiheuttaa silmäoireita (retinopatiaa (perisyyttien vauriot -> aneurysmat-> sokeutumisvaara), myopiaa ja kaihia) ja autonomista sekä perifeeristä neuropatiaa (klassinen ”sukka-hansikas”-tyyppinen puutuminen ja pisteleminen).
 2. Johtavat munuaisissa hyaliiniseen arterioloskleroosiin.
 - a. Munuaisten arterioliin skleroosi johtaa diabeettiseen nefropatiaan, jossa munuaiset ovat pienet ja arpeutuneet.
 - i. Mikroalbuminuria on varhaisin merkki; hyaliininen arterioloskleroosi vaikuttaa suosivasti alussa efferenttiin arterioliin ja aiheuttaa hyperfiltraatiota.
 - ii. Histologisesti havaitaan nodulaarista glomeruloskleroosia ja Kimmelstiel-Wilson-noduluksia.

VI. ENDOKRIINISEN HAIMAN KASVAIMET

- A. Haiman neuroendokriinisia kasvaimia; n. 2-5% haimakasvaimista.
- B. Yli 90% kasvaimista on sporadisia ja yleensä aikuisiällä ilmeneviä; periytyvät liittyvät usein MEN1-oireyhtymään lisäkilpirauhasen hyperplasian ja aivolisäkkeen adenoomien kanssa.

1. Yleensä haiman hännän alueella.
- C. Yleensä hormonaalisesti inaktiivisia ja pieniä (mikroadenoomia); aktiiviset nimetään erittämänsä hormonin perusteella.
 1. Mikroadenoomaa lukuun ottamatta potentiaalisesti maligneja.
- D. Insulinooma on yleisin aktiivinen kasvaintyyppi; paras ennuste (todetaan usein pieninä hypoglykemian vuoksi).
 1. Aiheuttaa hypoglykemiaa.
 2. Laboratoriokokeet: matala seerumin glukoosi, korkea C-peptidi (ja insuliini)
- E. Glukagonooma aiheuttaa hyperglykemiaa, joka voi johtaa mm. diabeteksen puhkeamiseen ja painonlaskuun.
 1. 6D:tä: **dermatitis** (necrolytic migratory erythema), **diabetes**, **DVT** (SLT), **declining weight**, **depression**, and **diarrhea**
- F. Haiman gastrinooma voi aiheuttaa Z-E-oireyhtymän, jossa mahalaukun suolahapon liikaeritys johtaa peptisiin haavoihin duodenumissa ja jopa jejunumissa.
 1. Yleisempi syy Z-E-oireyhtymälle on duodenumin seinämän gastrinooma.
 2. Luetaan saarekesolukasvaimiin, vaikka G-soluja ei normaalisti esiinny Langerhansin saarekkeissa.
- G. VIPoomat ovat D1-soluperäisiä kasvaimia, jotka tuottavat VIP (vasoaktiivinen suolipeptidi).
 1. Aiheuttaa vesiripulia ja sen yhteydessä hypokalemiaa, hypokalsemiaa, metabolista asidoosia ja aklorhydriaa (WDHA-oireyhtymä)
- H. Somatostatinooma (deltasoluperäinen) tuottaa somatostatiinia -> inhiboi insuliinia -> diabetes

LISÄMUNUAISKUOREN SAIRAUDET

I. PERIAATTEET


- A. Kuorikerroksessa on kolme vyöhykettä, joiden entsyymiprofiilien eroavaisuuksien takia ne tuottavat niille tyypillisiä hormoneita.
 1. Zona glomerulosa (uloin) – aldosteronin tuotanto
 - a. AT II säätelee toimintaa.
 2. Zona fasciculata (keskimmäinen) – glukokortikoidien tuotanto (kortisoli)
 3. Zona reticularis (sisin) – lisämunuaisperäisten heikkojen androgeenien tuotanto (DHEA)
- B. Kortikotropiini (ACTH) stimuloi steroidisynteesiä kaikissa kerroksissa, mutta erityisesti kahdessa sisimmässä kerroksessa ja vielä erityisemmin zona fasciculatassa.
 1. Hypotalamus tuottaa CRH -> stimuloi anteriorista aivolisäketä syntetisoidaan POMC, josta pilkkoutuu ACTH -> ACTH vaikuttaa kaikkiin lisämunuaisen kuorikerrokseen (zona glomerulosaa reguloi pääasiassa angiotensii II), mutta erityisesti zona fasciculataan -> kortisolin tuotanto
- C. Kaikki kuorikerroksen tuottamien steroidihormonien synteesin lähde on kolesteroli.
 1. Kolesteroli kulkee StAR-valkuaisen säätelemänä sytoplasmasta mitokondrioihin, joissa CYP-entsyymit toteuttavat steroidien biosynteesiä.

II. HYPERALDOSTERONISMI

- A. Seerumin aldosteronipitoisuus on suurentunut; voi olla joko primaarista tai sekundaarista.
- B. Ilmenee hypertensiona (primaarinen hyperaldosteronismi on yleisin sekundaarisen hypertension syy), hypokalemiana ja metabolisena alkaloosina.

1. Aldosteroni toimii vasokonstriktorina sekä lisää munuaisten distaalisissa tubuluksissa ja kokoojaputkessa natriumin absorptiota sekä kaliumin ja vetyionien eritystä.
 - a. Kohonnut plasmavolyymi ja hypertensio lisäävät ”pressure” natriureesia (peritubulaaristen kapillaarien hydrostaattinen kohonnut paine ajaa Na⁺ ja H₂O takaisin tubuluksiin) ja ANP:n tuotantoa ja GFR:ää, mikä lisää natriumin eritystä; rajoittaa ödeemaa ja hypernatremiaa (”aldosterone escape”).
2. Hypokalemia on suhteellisen lievää ilman runsassuolaista ruokavaliota.
- C. Primaarisen hyperaldosteronismien yleisin syy on lisämunuaisten bilateraalin hyperplasia (60-75%); toiseksi yleisin on adenooma (Connin syndrooma, 30-35%).
 1. Kohonnut aldosteroni, volyymi ja hypertensio negatiivisesti takaisinsäätävät reniinin eritystä, mikä ei kuitenkaan estä aldosteronin autonomista eritystä.
- D. Sekundaarinen hyperaldosteronismi johtuu reniinin aktiivisuuden lisääntyneestä aktiivisuudesta, joka aktivoi koko RAA-järjestelmän; mm. diureetit, renovaskulaarinen hypertensio tai turvotustilat (tai jukstaglomerulaaristen solujen tuumori (reninooma))
 1. Volyymivaje stimuloi reniinin ja lopulta aldosteronin muodostusta.
 2. Plasmavolyymien korjaantuminen vähentää reniinin (ei reninoomassa) ja edelleen aldosteronin eritystä.
- E. Primaarinen ja sekundaarinen hyperaldosteronismi eroavat reniinin ja ödeeman perusteella.
 1. Primaarisessa reniini ja AT II ovat matalat ja ödeemaa ei havaita ”aldosterone escapen” takia.
 2. Sekundaarisessa reniini ja siten AT II ovat korkeammat ja ödeemaa usein havaitaan.
 - a. AT II vaikuttaa proksimaaliseen tubulukseen stimuloiden Na⁺ reabsorptiota
 - i. ANP vaikuttaa pääasiassa kokoojaputkeen, joten sen mahdollinen lisääntyminen ei vaikuta AT II:n toimintaan
 - ii. Munuaisten verenvirtaus on monessa sekundaarisen aldosteronismien aiheuttajan tapauksessa matala (esim. renovaskulaarinen hypertensio), jonka takia ei myöskään saada apua ”pressure” natriureesilta -> ei aldosterone escapea
 3. Voidaan seuloa A/R-suhteella (vahvasti koholla eli >30 primaarisessa), jonka jälkeen voidaan tarvittaessa toteuttaa lisää seulontakokeita (3vrk suolarasitus), lisämunuaisten TT ja vielä mahdollisesti lisämunuaislaskimoiden katetrisaatio (jos ei adenooma kuvaudu; lateralisaation selvittely).
 - a. Adenoomat voidaan leikata (adrenalektomia); hyperplasia hoidetaan ensisijaisesti spironolaktonilla.
- F. Tyypin 1 perinnällinen hyperaldosteronismi johtuu 11β-hydroksylaasia koodittavan geenin mutaatiosta; n. 1% hyperaldosteronismitapauksista.
 1. Eritys on ACTH:sta riippuvaa ja glukokortikoideilla jarrutettavaa.
 2. Ilmenee yleensä alle 25 vuoden iässä primaarisena hyperaldosteronismina.
 - a. Diagnoosi varmistetaan geenitestin.
- G. Hyperaldosteronismia mimikoivia sairauksia:
 1. Liddlen oireyhtymä on harvinainen autosomissa vallitsevasti periytyvä sairaus.

- a. Nefronien kokoojaputkien EnaC-kanavien vähentyneen pilkkoutumisen takia toimivia natriumkanavia on normaalia enemmän.
 - b. Ilmenee nuorena iässä vakavana verenvuotautautina, hypokalemiana ja metabolisena alkaloosina, mutta reniinin sekä aldosteronin matalina pitoisuuksina.
 - c. Hoidetaan amiloridilla tai triamtereenilla, jotka ovat kaliumia säästäviä diureetteja, jotka toimivat natriumkanavia sulkemalla.
2. Mineralokortikoidien näennäinen ylimäärä (AME-oireyhtymä, lakritsoireyhtymä)
- a. 11 β -HSD2:n geneettinen tai hankittu heikko aktiivisuus mahdollistaa kortisolin vaikutuksen mineralokortikoidireseptoriin.
 - i. Normaalisti munuaisissa 11 β -hydroksisteroididehydrogenaasientsyymin tyypin 2 isomeerin (11 β -HSD2) aktiivisuus suojaa mineralokortikoidireseptoria (MKR) liialliselta kortisolin vaikutukselta (muuttaa kortisolia kortisoniksi).
 - b. Ilmenee hypertensiona, hypokalemiana ja metabolisena alkaloosina, mutta reniinin sekä aldosteronin matalina pitoisuuksina.
 - c. Diagnosoidaan kortisolin metaboliittien lisääntyneen virtsaan erityksen avulla.
 - i. Lakritsin käytön tieto on tärkeää saada, sillä lakritsin glykyrritsiinihaposta muodostuva glykyrritiinihappo estää 11 β -HSD2:n aktiivisuutta; väistyy muutamassa viikossa.



III. HYPERKORTISOLISMI (CUSHINGIN OIREYHTYMÄ)

- A. Seerumin glukokortikoidien (pääasiassa kortisolin) määrä on lisääntynyt.
- B. Kliininen kuva
 1. Vyötärölle painottuva lihavuus, niskan rasvapahka (buffalo-hump) ja kuukasvot – kortisoli stimuloi glukagonin eritystä ja maksan glukoneogeneesiä, mitkä nostavat veren sokeritasoja ja siten myös insuliinin tasoja; insuliini lisää rasvan kertymistä.
 - a. Heikentynyt glukoosin sieto ja diabetes yleistä Cushingin oireyhtymässä
 2. Lihashyökkäys ja raajojen hoikkisuus – Lisääntyneeseen glukoneogeneesiin tarvitaan aminohappoaineita; kortisoli aiheuttaa lihasten kataboliaa.
 3. Hypertensio sekä mahdollinen hypokalemia ja metabolinen alkaloosi
 - a. Kortisoli upreguloi endoteelin alfa-1-reseptoreita ja siten lisää verisuonten herkkyyttä katekolamiinien (adrenaliini, noradrenaliini) vasokonstriktiivisella vaikutuksella.

- b. Kortisoli voi myös korkeina pitoisuuksina vaikuttaa mineralokortikoidireseptoreihin (MKR) ja siten aiheuttaa aldosteronin kaltaisia vaikutuksia.
 4. Vartalon striat – Kortisoli häiritsee kollageenin synteesiä ja siten johtaa ihon ohenemiseen ja lisää verisuonten repeytymisalttiutta.
 5. Osteoporoosi ja mahdolliset munuaiskivet – Kortisoli lisää luiden resorptiota, lisää kalsiumin imeytymistä suolistosta ja vähentää kalsiumin reabsorptiota munuaisissa.
 6. Immunosuppressio – kortisoli inhiboi fosfolipaasi A2:a ja NFκB-transkriptiotekijää (mm. IL-2, TNF-alfa, neutrofiilien adheesiomolekyylit) sekä histamiinin vapautumista.
- C. Hyperkortisolismin diagnosointi
1. Kliinisen epäilyn jälkeen toteutetaan seulontakokeita: lyhyt deksametasonikoe (1mg/1,5mg) tai vuorokausivirtsan kortisolimääritys (dU-Kors-V) tai syljen kortisolipitoisuus klo 23 (Sa-Korsol).
 - a. Deksametasoni suppressoi terveellä kortisoliarvoja, mutta Cushingin oireyhtymässä suppressio on puutteellista.
 - i. Tietyillä lääkityksillä deksametasonikoe ei toimi, jolloin vuorokausivirtsa on ensisijainen seulontakoe.
 2. Diagnoosi varmistuu, jos ainakin 2 hyperkortisolismin ensilinjan seulontatutkimusta on yksiselitteisesti positiivisia eikä fysiologinen hyperkortisolismi (pseudo-Cushing; esim. lihavuuden, vakavan masennuksen, vaikean fyysisen/psyykkisen rasitustilan ja alkoholismin yhteydessä) selitä tilannetta
 3. Erotusdiagnoosi perustuu plasman ACTH:n määrittämiseen; tehdään endokrinologisessa yksikössä
 - a. Jos koholla, on Cushingin oireyhtymä ACTH:sta riippuva ja tulee suorittaa CRH-koe (mahdollisesti korkean annoksen deksametasonikoe).
 - b. Jos todella pienet, tulee suorittaa lisämunuaisten TT.

Cushingin oireyhtymän erotusdiagnoosi

	Lisämunuaisperäinen (20%)	Pituitaarinen (adenooma eli Cushingin tauti, 70%)	Ektooppinen ACTH:n erityy (10%)	iatrogeeninen (yleisin)
ACTH-pitoisuus	↓	↑	↑↑	↓
CRH-koe	-	vaste	ei vastetta	-
Kuvantaminen	lisämunuaisten TT:ssä kasvain (adenooma/karsinoma ja kontralateraalinen atrofia tai bilateraalinen nodulaarinen hyperplasia)	aivolisäkkeen MRI:ssä adenooma	ACTH:ta tuottava ektooppinen kasvain (yleensä keuhkojen pienisolainen syöpä tai neuroendokriininen kasvain)	-
Hoito	Adenooman, karsinoman tai hyperplasioituneiden	Ensisijainen hoito on transsfenoidaalin	Ektooppisen tuottajan leikkaus; jos	Steroidilääkityksen vähentäminen

	lisämunuaisten poisto ja hydrokortisonikorvaushoito.	en leikkaus; uusiutuvisissa tapauksissa voidaan tehdä bilateraalinen adrenalektomia, joka voi johtaa Nelsonin oireyhtymään (pituitaarisen adenooman suureneminen, hyperpigmentaatio, pääkivut ja bitemporaalinen hemianopsia)	tuottajaa ei löydetä niin adrenalektomia	mahdollisuuksien mukaan
--	--	---	--	-------------------------

IV. SYNNYNNÄINEN LISÄMUNUAISHYPERPLASIA

- A. Lisämunuaiskuoren steroidigeneesin synnyttäisiä entsyymivajeita (autosomaalisesti resessiivisiä), jotka johtavat kortisolin tuotannon estymiseen.
 1. Kortisolin puutteessa ACTH:in kohdistuva negatiivinen palautesäätely on vajavaista, mikä johtaa korkeisiin seerumin ACTH:n tasoihin.
 2. ACTH stimuloi molempia lisämunuaisia ja aiheuttaa bilateraalista lisämunuaishyperplasiaa.
 - a. Samalla steroidisynteesi ohjautuu androgeenien (tai mineralokortikoidien) suuntaan, ellei kyseessä ole steroidisynteesin alkuvaiheen defekti.
- B. 21-hydroksylaasivaje on ylivoimaisesti tavallisin aiheuttaja; Suomessa yli 95% kaikista lisämunuaishyperplasioista
 1. Johtaa kortisolivajeeseen; aldosteronin synteesiä tapahtuu lievemmissä vajeissa (mineralokortikoidien tuotantoon tarvitaan pienempi entsyymiaktiivisuus kuin kortisolisynteesiin).
 - a. Steroidisynteesi ohjautuu androgeenien tuotantoon.
 2. Jaetaan vaikeusasteen mukaan klassiseen (vaikea) ja ei-klassiseen muotoon.
 - a. Klassisessa havaitaan mineralokortikoidivaje, joka aiheuttaa hyponatremiaa ja hyperkalemiaa ja hengenvaarallista hypotensiota (suolanmenetyskriisi); tytöt ovat virilisoituneet (klitorishyperplasia tai häpyhuulten yhteenkasvu).
 - b. Ei-klassinen muoto ilmenee myöhemmin lapsuusiässä tai vasta aikuisiässä; pojilla aikainen murrosikä, tytöillä hirsutismi ja kuukautishäiriöt.
- C. 11 β -hydroksylaasivaje on Suomessa toiseksi yleisin muoto (<5%).
 1. Hypokortisolismi ja mineralokortikoidiesiasteinen (DOC) kertyminen (hypermineralokortikoidismi), mikä johtaa hypertensioon ja hypokalemiaan.
 - a. Reniini ja aldosteroni ovat matalat.
 - b. Steroidisynteesi ohjautuu androgeenien tuotantoon.
 2. Esintyy tytöillä samalla tavalla virilisaationa kuin 21-hydroksylaasivajekin.

- D. Puutteet 17-hydroksylaasissa tai 3 β -hydroksisteroididehydrogenaasissa ovat harvinaisempia.
- E. Vastasyntyneillä voidaan heti epäilyn herättyä seuloa 17-hydroksiprogesteronin määrä plasmassa; koholla 21-hydroksylaasivajeessa ja 11 β -hydroksylaasivajeessa.
 - 1. 11 β -hydroksylaasivajeessakoholla oleva 11-deoksikortisolipitoisuus
- F. Hoidetaan glukokortikoidisubstituutiohoidolla ja tarvittaessa myös mineralokortikoidisubstituutiolla.

V. KUORIKERROKSEN VAJAATOIMINTA

- A. Kuorikerroksen vajaatoiminnassa havaitaan kuorikerroshormonien vajetta; voi olla akuuttia tai kroonista.
- B. Kroonisen kuorikerroshormonien vajeen oireet johtuvat gluko- ja mineralokortikoidien puuteesta.
 - 1. Glukokortikoidien puute - aiheuttaa mm. väsymystä ja voimattomuutta, pahoinvointia, ripulia ja oksentelua, painonmenetystä, hypoglykemiaa ja hyperkalsemiaa.
 - 2. Mineralokortikoidien puute – dehydraatio ja suolan nälkä (hyponatremia ja hyperkalemia), hypotensio
 - a. Ei merkittävästi sekundaarisissa/tertiäarissa syissä
 - 3. Naisilla voidaan myös havaita lisämunuaisperäisten androgeenien puutteen aiheuttamaa karvoituksen vähenemistä, ihon kuivumista ja libidon laskua.
- C. Addisonin tauti (primaarinen kuorikerroksen vajaatoiminta) johtuu yleensä progressiivisesta lisämunuaisten vauriosta; yleensä oireet havaitaan vasta n. 90% tuhoutumisen jälkeen.
 - 1. Tuberkuloosi on kehitysmaissa yleisin syy; länsimaissa autoimmuuniadrenaliitti (sporadinen, APECED-oireyhtymään tai APS 2 liittyvä).
 - a. Myös muut infektiot (mm. CMV, levinneet sieni-infektiot) ja metastaasit (mm. rinta- tai keuhkosityöpä) voivat olla taustalla.
- D. Lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta voi myös olla sentraalista eli sekundaarista (pituitaarinen) tai harvinaisesti tertiäarista (hypotalaaminen).
 - 1. Aivolisäkkeen tai hypotalamuksen vajaatoiminta johtaa matalaan ACTH:n määrään ja siten myös kuorikerroshormonien heikkoon tuotantoon; aldosteronia kuitenkin tuotetaan (AT II stimuloimaa), joten mineralokortikoidioireet ovat vähäisempiä.
 - a. Yleisin syy on pitkäkestoinen glukokortikoidihoito.
 - 2. Primaarisessa vajeessa yleensä havaitaan hyperpigmentaatiota, sillä kohonnut ACTH ja muut POMC-peptidit (alfa-MSH) stimuloivat ihon melanosyyttejä; sekundaarisessa tai tertiäarisessä hyperpigmentaatiota ei esiinny.
- D. Akuutti lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta eli Addisonin kriisi kehittyy äkillisesti ja ilmenee sokkina, neuropsykiatrisina häiriöinä ja vaikeina Addisonin taudin oireina.
 - 1. Voi kehittyä pitkäkestoisen glukokortikoidihoidon äkillisen lopettamisen takia; krooninen kortisonihoito aiheuttaa lisämunuaiskuoren atrofiaa.
 - a. Krooninen kortisonihoito tulee lopettaa vähitellen.
 - 2. Sepsis (erit. meningokokkisepsis) ja siihen liittyvä DIC voi aiheuttaa Waterhouse-Friedrichsenin oireyhtymän, jossa todetaan lisämunuaisten hemorraagista nekroosia.

- a. Ilmenee useimmiten lapsilla ja nuorilla sokkina, verenpurkaumina iholla ja vaikeina Addisonin taudin oireina.
- E. Addisonin tauti hoidetaan gluko- ja mineralokortikoidikorvaushoidolla; glukokortikoidien annosta kohotetaan infektioiden aikana.
 - 1. Riittämätön glukokortikoidiannos infektioiden aikana voi johtaa akuuttiin Addisonin tautiin.

LISÄMUNUAISEN YTIMEN SAIRAUDET

I. PERIAATTEET

- A. Lisämunuaisen ydin koostuu hermopienasta peräisin olevista kromaffiinisoluista ja niitä ympäröivistä tukisoluista.
- B. Kromaffiinisot solut tuottavat ja erittävät katekolamiineja (adrenaliinia, noradrenaliinia ja hieman dopamiinia).
 - 1. Periaatteessa sympaattisen hermoston ganglio (paraganglio eli hermostopienasta peräisin olevien non-neuronaalisten solujen kerääntymä); ei post-ganglioniermoitusta.

II. FEOKROMOSYTOOMA

- A. Kromaffiinisot solujen neuroendokriininen kasvain, joka tuottaa ja erittää katekolamiineja yleensä jaksottaisesti.
 - 1. Yleisin lisämunuaisen ytimen tuumori aikuisilla.
 - 2. Ilmenee mm. kohtauksittaisena (<1h kohtaukset) hypertensiona, päänsärkynä, hikoiluna, sydämentykytyksenä, vapinana ja ahdistuneisuutena.
- B. Usein seuraa "rule of 10s"; joka on jo hieman vanhentunut
 - 1. 10% (oikeasti vähintään 15% aikuisilla ja enemmän lapsilla) ovat ekstra-adrenaalisia (paragangliooma); yleisimmät paikat ovat ylempi kaulaganglio, Zuckerkindlin elin ja virtsarakon seinämä.
 - 2. 10% ovat bilateraalisia
 - 3. 10% pahanlaatuisia
 - 4. 10% ei liity hypertensio
 - 5. 10% lapsilla
- C. Diagnoosi perustuu katekoliamiinien metaboliittien (metanefriinit, normetanefriinit) kohonneeseen määrään seerumissa (S-MetNor) tai vuorokausivirtsassa (dU-MetNor).
 - 1. Jatkotutkimuksena kuvantaminen (yleensä tuumori lisämunuaisissa)
 - 2. Alle 50-vuoden iässä tulee selvittää perinnöllisyys; feokromosytooma liittyy MEN 2- ja VHL-oireyhtymiin sekä tyypin 1 neurofibromatoosiin.
- D. Hoidetaan kasvaimen paikantamisen jälkeen adrenelektomiolla.
 - 1. Preoperatiivisesti tulee estää leikkauksen aikana verenkiertoon vuotavien katekoliamiinien liiallinen vaikutus; yleensä fenoksibentsamiini (irreversiibeli alfasalpaaja), jonka jälkeen propranololia (beetasalpaaja).

III. NEUROBLASTOOMA

- A. Nuorten lasten (<5v.) yleisin ekstrakraniaalinen kiinteä tuumori.
- B. Sympaattisen hermokudoksen blastien muodostama pahanlaatuinen kasvain, joka usein tuottaa katekolamiineja.
- C. Oireet ilmenevät yleensä vasta tuumorin levittyä; yleensä alkaa lisämunuaisesta, mutta voi lähteä myös mm. välikarsinasta tai kaulasta.

1. Yleisin ilmenemismuoto on vatsan massa, joka voi ylittää keskilinjän.
 2. Voi aiheuttaa hypertensiota (harvemmin kuin feokromosytooma), periorbitaalisia ekkymooseja ja harvinaisesti opsoklonus-myoeklonus-ataksia-oireyhtymän.
- D. Diagnoosissa auttaa virtsan/seerumin katekolamiinien metaboliatuotteiden kohonaisuus.
1. Histologisesti havaitaan pieniä pyöreitä/sukkulaisia soluja ja Homer-Wright-rosettimuodostusta.
 2. Yhteydessä n-myc-geenimonistumaan, jolla on epäsuotuista ennuste.
- E. Ennuste riippuu histologiasta, geenipoikkeavuuksista ja levinneisyydestä; voivat joskus regressoitua spontaanisti.

16 RINTAPATOLOGIA

RINNAN PERIAATTEET

I. PERIAATTEET

- A. Maitorauhaset kehittyvät ektodermin parillisista maitojuosteista; rakenteellisesti ovat muunneltuja hikirauhasia.
1. Ektodermin paksuuntumisia esiintyy rinnalla ja muodostavat alkukantaisen maitorauhasen; ylimääräisiä nänniä voi esiintyä missä tahansa paikassa maitolinjaa kainalosta perineumiin saakka.
- B. Maitorauhaset koostuvat epäsäännöllisistä lohkoista (n.15-20kpl), jotka ympäröivät nänniä ympyrämaisesti.
1. Lohkot ovat täynnä putkimaisia rauhasliuskoja (lobuluksia), jotka päätyvät terminaaliseen ductukseen (terminaalinen tiehyt-lobulusyksikkö; TDLU), jotka lopulta avautuvat maitopoukaman kautta nänniin.
 2. Erillisten lohkojen sisällä ja niiden ympärillä on intralobulaarista stroomaa; lohkoja erottaa toisistaan interlobulaarinen strooma.
- C. Lobuluksia ja tiehyitä verhoaa kaksi solukerrosta.
1. Sisempi tiehytepeeli tuottaa maitoa TDLU:ssa.
 2. Ulompi myoepeeli avustaa maidon erityksessä.
- D. Rintakudos on hormonaalisesti reaktiivista.
1. Poikien ja tyttöjen rintakudos on suhteellisen samankaltaista ennen murrosikää; koostuu suurista tiehyistä nännin alla.
 2. Murrosiässä kohoavat estrogeeni- ja progesteronimäärät johtavat lobulusten ja pienten tiehyiden muodostumiseen.
 - a. TDLU:ien suurin tihentymä on rinnan yläneljänneksessä.
 - b. Myös ravitsemustila ja rintojen herkkyys hormoneille vaikuttavat rintojen kokoon.
 - c. Useilla murrosikäisillä pojillakin tavataan ohimenevää rintojen kasvua (gynekomastia).
 3. Premenstruaalinen rintojen arkuus on yleinen oire.
 4. Raskauden aikana rintakudos kasvaa hyperplastisesti.
 - a. Imetyksen päätyttyä lobulukset surkastuvat.
 5. Menopausin jälkeen rintakudosta atrofioiduu, mutta myös postmenopausaalisilla naisilla esiintyy lobuluksia.

E. Galaktorrea eli maitovuoto rinnoista, joka ei liity imetykseen tai raskauteen, on yleinen oire ja yleensä hyvänlaatuisen taustatekijän aiheuttamaa.

1. Harvoin taustalla on rintasyöpä, muita yleisempiä syitä ovat mm. nännistimulaatio, aivolisäkkeen prolaktinooma, intraduktaalinen papilloomia tai tietyt lääkkeet (mm. risperidoni, opioidit).

RINNAN TULEHDUKSELLISET SAIRAUDET

I. PUERPERAALIMASTIITTI

- A. Rinnan tulehdukselliset sairaudet tapahtuvat yleensä imettävillä naisilla, jolloin mastiittia nimitetään puerperaaliksi.
- B. Imetyksessä rinnan iholle muodostuu pieniä haavoja, joiden kautta tiehyitä pitkin pääsee nousemaan bakteeritulehdus (yleensä *S. aureus*).
- C. Oireilee punoittavana, kuumottavana ja arkana rintana sekä mahdollisena märkävuotona rinnasta.
 1. Voi harvoin johtaa paiseen tai fistelin muodostumiseen.
- D. Hoidetaan antibiooteilla ja jatkamalla imettämistä.

II. PERIDUKTAALIMASTIITTI (ZUSKAN TAUTI)

- A. Imetykseen liittymätön areolan takana olevien tiehyiden tulehdus; johtuneen normaalia syvemmälle tiehytjuustoon tunkeutuvasta proliferoituneesta levyepiteelistä ja tiehyeen tukkeutumisesta.
 1. Tupakointi tärkein riskitekijä; suhteellinen A-vitamiinin vaje johtaa tiehyiden levyepiteelimetaplasiaan.
- B. Oireilee punoittavana, kuumottavana ja arkana massana areolan alla sekä mahdollisena märkävuotona ja jopa nännin retraktiona.
- C. Hoitona vaurioituneen tiehyen kirurginen poisto ja tupakoinnin lopettaminen.

III. DUKTAALINEN EKTASIA (DUKTEKTASIA)

- A. Hyvänlaatuinen maitotiehyen laajentuma; yleisimmin keski-ikäisillä naisilla
- B. Etiologia tuntematon; tupakointi altistaa muutokselle (liittyy myös ikääntymiseen ja useisiin raskauksiin)
 1. Ei kuitenkaan lisää rintasyöpäriskiä
 2. Elastaani katoaa rauhastiehyen seinämästä ja sen ympärillä esiintyy kroonista tulehdussoluja (erit. plasmakkeja)
 3. Tupakoinnin yhteydessä klassisesti osa oireyhtymää, jossa laajentunut tiehyt tukkeutuu, mikä altistaa bakteeritulehduksille eli periduktaalimastiitille ja nänninpihan alaisille märkäpesäkkeille sekä fisteille
- C. Usein oireeton kuvantamislöydös, mutta voi myös aiheuttaa periaareolaarisen massan palpaatiossa, liittyä vaaleaan/vihertävään nännieritykseen ja ym. tulehdusten kautta nännin sisäänvetäytymiseen
 1. Mammografiassa mikrokalkkeja ja periaareolaaristen maitotiehyiden dilataatio
- D. Leikkausta voidaan harkita, jos oireet häiritseviä

IV. RASVANEKROOSI

- A. Rintakudos koostuu suurelta osin adiposyyteistä, jotka voivat vaurioituessaan trauman seurauksena joutua nekroosiin.
- B. Esiintyy palpoitavissa olevana massana tai epänormaalina kalsifikaationa mammografiassa (saponifikaatio).

1. Usein vaaditaan avoin biopsia varmistamaan diagnoosi.
- C. Histologisesti voidaan todeta nekroottista rasvakudosta, kalkkeutumia ja jättisoluja sekä vaahtosoluja.

RINNAN HYVÄNLAATUISET MUUTOKSET

I. PERIAATTEET

- A. Rintakudoksen muutokset voidaan jakaa epiteliaalisiin ja strooma-/fibroepiteelimuutoksiin.
- B. Epiteliaaliset muutokset voivat olla joko hyvänlaatuisia tai pahanlaatuisia (ISC/invasiivinen karsinoma):
1. Hyvänlaatuiset muutokset jaetaan non-proliferatiivisiin ja proliferatiivisiin.
 - a. Non-proliferatiivisia – fibrokystiset muutokset, apokriininen metaplasia
 - b. Atypittomat proliferatiiviset – epiteelihyperplasia, sklerosoiva adenoosi, papillooma
 - c. Atyyppiset proliferatiiviset – atyyppinen duktusten tai lobulusten hyperplasia
- B. Strooma- tai fibroepiteelimuutoksia ovat mm. fibroadenooma ja fylloidi kasvain.

II. MASTOPATIA (FIBROKYSTINEN TAUTI)

- A. Rintojen yleisin muutos premenopausaalisilla (n.1/3 fertiili-ikäisistä naisista).
- B. Fibrokystiset muutokset ovat ei-proliferatiivisia hyvänlaatuisia muutoksia, jotka syntyvät maitorauhasen epiteelisolukon ja intralobulaarisen sidekudoksen reagoidessa epänormaalisti munarauhasen hormoneiden vaihteluun.
1. Sidekudosta tuotetaan liikaa ja tiehyisiin muodostuu kystisia laajentumia.
- C. Kliininen kuva ja diagnosointi
1. Ilmenee kuukautiskierron mukaan vaihtelevina, aristavina kyhmyinä (oireet usein pahimmat 1-2vk ennen kuukautisia); yleensä rinnan yläneljänneksellä.
 - a. Makroskooppisesti kyhmyt ovat kooltaan vaihtelevia, sinertäviä ja nestetäytteisiä kystia.
 2. Mammografiassa todetaan normaalia tiiviimpi rintakudos ja vaihtelevia kystia.
 - a. Yksiselitteisenä oireidenmukainen hoito, mutta jos muutokset antavat tuumorimaisen vaikutelman, tulee histologinen tutkimus tehdä.
 3. Histologisesti havaitaan sidekudoslisää, rauhasepiteelin verhoamia kystia ja rauhasia, joissa mahdollisesti apokriinista metaplasiaa.
 - a. Eivät lisää riskiä syövälle.
- D. Fibrokystisten muutosten yhteydessä nähdään usein myös rintakudosten proliferatiivisia muutoksia, jotka lisäävät riskiä karsinoomalle.

1. Ilman atypiaa (1,5-2x riski) – kohtalainen epiteelihyperplasia, sklerosoiva adenoosi (lobulusten asinusten määrän kasvu ja mikrokalkkeutumia), papillooma
2. Atyyppisiä (4-5x riski) – duktaalinen tai lobulaarinen atyyppinen hyperplasia

III. RINNAN PAPILLOOMA

- A. Hyvänlaatuinen maitorauhasen papillaarinen intraduktaalinen muutos; tyypillisesti yksittäinen kokoojatiehyen papillooma premenopausaalisella naisella.
1. Riski malignisoitumiselle n. 5%; multippeleina papilloomat sijaitsevat yleensä rinnan reuna-alueilla ja niiden riski malignisoitua on suurempi.
- B. Harvoin tunnistettavissa kliinisesti; klassisesti oireilee rinnan kirkkaana/verisenä eritteenä.

- C. Kuvantamisen perusteella ei voida asettaa diagnoosia; tarvitaan koepala (paksuneulanäyte).
1. Papillaarinen karsinooma voi aiheuttaa myös veristä nännieritystä, mutta se eroaa histologisesti papilloomasta.
 - a. Papilloomaa verhoaa kaksi kerrosta (epiteeli ja myoepiteeli), kun taas karsinoomassa havaitaan fibrovaskulaarisia projektioita, joita verhoaa vain epiteelisolut ilman myoepileelikerrosta.
 - b. Karsinooma on yleisempää postmenopausaalisilla naisilla.
- D. Papilloomakasvain ja koko sen affisioima tiehyt tulee poistaa kokonaan malignisoitumisriskin takia.

IV. FIBROADENOOMA

- A. Maitorauhasen yleisin hyvänlaatuinen kasvain; tavallisesti premenopausaalisilla naisilla.
- B. Liikuteltavissa oleva sileäpintainen, yleensä aristamaton kyhmy.
1. Reagoi hormonivaihteluihin (suuri estrogeenipitoisuus verrattuna progesteroniin) ja voi kasvaa raskauden tai imetyksen aikana hyvin suureksi.
 - a. Kyhmyä saattaa aristaa muutama päivä ennen menstuaatiota.
- C. Kyhmyt ovat yleensä oireettomia ja pienikokoisia eikä palpoitavissa; kookkaat ja oireilevat sekä nopeasti kasvavat ja palpoiden/kuvantaen epätyypilliset tulee poistaa ja arvioida histologisesti.
1. Mikroskooppisesti koostuu tiehytrakenteista sidekudoksisessa stroomassa.
 2. Ei merkityksellisesti kohonnutta rintasyöpäriskiä.

V. FYLLOIDI KASVAIN (PHYLLOIDES-TUUMORI)

- A. Fibroadenoomaa harvinaisempi, mutta sen tyyppinen fibroepitelialinen kasvain; yleisemmin postmenopausaalisilla naisilla.
- B. Histologisesti havaitaan lehdykkämäisiä, epiteeliverhottuja rakenteita ja sidekudoksista stroomaa, joka on fibroadenoomaa runsaampaa ja solukkaampaa.
- C. Yleensä hyvänlaatuinen (n. 80%), mutta voi olla myös rajalaatuinen tai pahanlaatuinen -> hoitona kirurginen poisto.

RINTASYÖPÄ

I. PERIAATTEET

- A. Suomalaisten naisten yleisin syöpä; esiintyvyys on lisääntymässä.
1. Vuosittain n. 5000 naista ja 30 miestä.
 2. Tällä hetkellä suurin vuosittainen syöpäpohjainen tappaja naisilla (työikäisten naisten yleisin tappaja on rintasyöpä; n. 800-900 naista vuodessa); suolistosyöpä välillä nro1.
- D. Rintasyövät ovat lähes aina adenokarsinomia.
1. Rintasyövät jaetaan invasiivisiin ja ei-invasiivisiin
 - a. Invasiivisista yleisimmät ovat duktaalinen (tiehytperäinen, n. 70%) ja lobulaarinen (rintarauhasperäinen, n. 20%); muita on mm. tubulaarinen, papillaarinen, musinootinen
 - b. Ei-invasiivisia (in situ karsinooma) on duktaalinen karsinooma in situ (DCIS) (ja lobulaarinen intraepitelialinen neoplasia (LIN))
- E. Hormonaaliset tekijät (elinikäinen estrogeenivaikutus) ja perintö ovat tärkeimmät riskitekijät.

1. Naissukupuoli
 2. Ikä – keskimääräinen toteamishetken ikä on n. 60 vuotta; perinnöllinen esiintyy aikaisemmin.
 3. Varhainen menarke/myöhäinen menopausi, synnyttämättömyys, myöhäinen ensisynnytys
 4. Ylipaino
 5. Pitkäaikainen estrogeenikorvaushoito
 6. Lähisuvun rintasyöpä (äiti, sisar)
- B. Diagnostiikka perustuu kliiniseen tutkimukseen + anamneesiin, kuvantamiseen (ensisijaisesti mammografia ja ultraääni) ja näytteisiin (paksuneulabiopsia ensisijaisesti).
1. Jos yksikin diagnostiikan osa viittaa pahanlaatuisuuteen, muutosta ei saa jäädä seuraamaan.
 - a. Toisin sanoen kolmoisdiagnostiikan periaate: Jokaisen yllä mainitun löydöksen oltava ilman ristiriitaa hyvänlaatuisia, jotta rinnan muutos voidaan jättää poistamatta. Epäselvissä tapauksissa muutos poistetaan.
 2. Mammografiaseulonnat ovat parantaneet varhaisvaiheen diagnostiikkaa; 50-69-vuotiaat naiset kutsutaan tutkimukseen kahden vuoden välein.

II. ENNUSTEELLISET TEKIJÄT

- A. Rintasyövän ennuste on yleisesti hyvä (yli 90% 5-vuotiselossaoloennuste).
- B. Rintasyövän prognoosi perustuu pääosin TNM-luokitukseen ja syöpäbiologisiin ominaisuuksiin.
1. Kaukaisia metastaaseja todetaan vain alle 5-10% tapauksista diagnoosihetkellä, joten yleensä ne eivät ole käytettävissä ennusteellisenä tekijänä.
 2. Kainaloimusolmukestatus on tärkein yksittäinen ennustetekijä; tila selvitetään kuvantamisella (UÄ), neulanäytteellä ja lopulta vartijaimusolmuketutkimuksessa.
 - a. Jos kainalon UÄ:ssä ja mahdollisissa neulanäytteissä ei todeta kainalon imusolmukkeissa syöpää, on kyseessä ns. kliinisesti imusolmukenegatiivinen rintasyöpä ja tulee tehdä vartijaimusolmuketutkimus
 - i. Ainoa poikkeus tähän on tulehduksellinen eli inflammatorinen rintasyöpä, joka yleensä hoidetaan neoadjuvanttisolunsalpaajin ja tämän jälkeen mastektomialla ja kainaloevakuaatiolla
 - ii. Kliinisesti imusolmukepositiivisessa rintasyövässä (biopsiavahvistettu imusolmukemetastasointi) myös kainaloevakuaatio ensisijainen (ei siis tarvita vartijaimusolmuketutkimusta)
 - iii. Yksittäisen imusolmukemetastaasin kohdalla TNM-luokituksen mukaan metastaasit jaetaan yksittäisiin syöpäsoluihin (*Isolated Tumor Cells*, ITC = solurykelmiä, jotka ovat max 0,2mm läpimitaltaan; ITC:n merkitys ennusteeseen on kiistanalainen), mikrometastaaseihin (0,2mm-2mm) ja makrometastaaseihin (2mm tai suurempi)
 - b. Vartijaimusolmuketutkimus = Vartijasolmukkeet (ensimmäiset imusolmukkeet, jotka ovat matkalla kasvaimesta imunesteen kertymäalueelle)
 - i. Paikannetaan pistämällä rintaan merkkiainetta (^{99m}teknetium-isotoopilla (^{99m}Tc) leimattuja albumiinipartikkeleita), joka kulkeutuu

imuteitä pitkin vartijasolmukkeeseen; joissain paikoissa käytetään kaksoismenetelmää, jossa pistetään myös siniväriä

- ii. Vartijasolmukkeet poistetaan ja arvioidaan histologisesti
 - iii. Tehdään myös DCIS-potilaille (vaikka ei lähetäkään määritelmän mukaan etäpesäkkeitä), jos hoidossa päädytään mastektomiaan (tehdään samalla); leikkauspreparaatista löytyy jopa 40%:lla potilaista invasiivinen kasvain, vaikka paksuneulanäytteessä on pelkästään DCIS
- c. Jos todetaan metastasointia, poistetaan kaikki kainaloimusolmukkeet (kainaloevakuaatio eli kainalon imusolmuketyhjennys).
- i. Yleisiä haittoja ovat vaikea imutieturvotus ja krooninen kipu
 - ii. Kainaloevakuaatio siis tehdään seuraaville potilaille: 1) todetaan ennen leikkausta neulanäytteellä varmistettu kainalometastasointi 2) vartijaimusolmuketutkimuksessa todetut metastaasit 3) inflammatorisen syövän kohdalla tehdään aina kainaloevakuaatio riippumatta kainalon kuvantamis- tai biopsialöydöksestä 4) KIP-leikkauksen todetut metastaasit tai muuten rintaleikkauksen aikana kainaloevakuaatiota indisoiva löydös
- d. Uusi mahdollisuus imusolmukemetastaasien hoidossa on ns. kohdennettu imusolmukepoisto (KIP, TAP, targeted axillary dissection)
- i. Tarkoittaa metastaattiseksi biopsoidun imusolmukkeen radiologista merkitsemistä ennen neoadjuvanttihoitoa, ja hoitojen jälkeistä merkityn imusolmukkeen ja vartijaimusolmukkeiden poistamista jääleiketutkimukseen leikkauksen yhteydessä (jääleiketutkimus = leikkauksen aikainen patologin arvio).
 - ii. Merkittävä osa lähtötilanteessa kainaloposiitivista rintasyöpäpotilaista saa neoadjuvanttihoidolle täydellisen patologisen hoitovasteen myös kainalon osalta (etenkin kolmoisnegatiiviset ja HER2-positiiviset taudit). Tällöin kainaloevakuaatio tehtäisiin turhaan.
 - iii. KIP-toimenpiteeseen soveltuvat lähes kaikki neoadjuvanttihoitoon ohjattavat kainaloposiitiviset potilaat (on joitain poissulkukriteerejä kylläkin). KIP-leikkaus tehdään neoadjuvanttihoidon jälkeen, mikäli kuvantaen saavutetaan hoitovastetta.
 - iv. KIP-leikkauksessa poistetaan ennen neoadjuvanttihoitoa merkitty imusolmuke sekä tehdään vartijaimusolmuketutkimusleikkaus normaaliin tapaan (sisältäen palpoiden epäilyttävien viereisten imusolmukkeiden poiston)
 - v. Mikäli poistetuista imusolmukkeista ei löydy vitaalia kasvainta, ei kainaloevakuaatiota tarvitse tehdä. Kainaloevakuaatio tehdään samassa leikkauksessa, mikäli jääleiketutkimuksessa löytyy edes yksittäisiä eläviä syöpäsoluja (ITC)
3. Kasvaimen koko on myös merkittävä vaikuttava tekijä; alle 2cm kasvaimilla ilman imusolmukemetastaaseja on yleensä todella hyvä ennuste.
- C. Syöpäbiologiset ominaisuudet ennustavat vastetta hoidolle; määritetään immunohistokemiallisesti.

1. Rintasyövät jaetaan neljään molekylaariseen ja geneettiseen alatyyppiin: luminaalinen A (yleisin), luminaalinen B, kolmoisnegatiivinen (kolmoisnegatiivinen/basal like) ja HER2-positiivinen
 - a. Luminaaliset karsinoomasolut näyttävät samanlaiselta kuin maitorauhasduktuksen sisemmät (luminaaliset) solut
 - i. Luminaalisissa A karsinoomissa ER ja/tai PR on positiivinen, HER2 on negatiivinen ja Ki67 on matala
 - ii. Luminaalisissa B karsinoomissa ER ja/tai PR on positiivinen, HER2 on positiivinen tai negatiivinen, mutta Ki67 on korkea. Luminaaliset B karsinoomat ovat kookkaampia ja huonommin erilaistuneita kuin luminaaliset A karsinoomat
 - b. Hoitokäytännössä yleensä puhutaan hormonireseptoriposiitivisista, HER2-positiivisista ja kolmois- eli triplanegatiivisista
2. Estrogeeni- ja progesteronireseptorien runsaus on edullinen prognostinen tekijä; n. 60-85% kasvaimista ER-positiivisia.
 - a. Positiivisilla hyvä vaste antiestrogeenisille lääkkeille, kuten tamoksifeenille.
3. ERBB2 (HER2/neu) on solukalvon läpäisevä solunjakautumista säätelevä glykoproteiini, jonka monistumisen havaitseminen ennustaa aggressiivista taudinkulkua; n. 15% kasvaimista.
 - a. Positiivisilla hyvä vaste HER2-proteiinin monoklonaaliselle vasta-aineelle (trastutsumabi eli Herceptin).
4. Kolmoisnegatiivisilla eli ER-, PR- ja HER2-negatiivisilla paranemisennuste ja hoitomahdollisuudet ovat alatyypeista heikkoimmat.
 - a. Solunsalpaajahoitovaihtoehdot ovat samat kuin hormonireseptoriposiitivisen ja HER2- negatiivisen taudin liitännäishoidossa (esim. dosetakseli ja epirubisiini tai dosetakseli ja syklofosfamidi)
 - b. Kolmoisnegatiivisten syöpien solunsalpaajahoidon valinta poikkeaa muiden alatyyppeiden hoidon valinnasta siltä osin, että leikkaushoitoon soveltumattoman paikallisesti edenneen tai levinneen kolmoisnegatiivisen PDL-1 positiivisen rintasyövän ensilinjan hoitona voidaan käyttää immunologisen tarkastuspisteen estäjää, PD-L1 vasta-aineita (esim. trastutsumabi) yhdistettynä solunsalpaajahoitoon.

III. DUKTAALINEN IN SITU -KRASINOOMA (DCIS)

- A. Invasiivisen rintasyövän esiaste, jossa pahanlaatuisesti proliferoituvat solut ovat rajoittuneet rauhastiehyisiin ja eivät vielä invasoi tyvikalvon läpi.
 1. Lähtenyt atyyppisestä duktaalista hyperplasiasta (ADH) -> DCIS -> invasiivinen duktaalinen karsinooma
- B. Muodostaa harvoin palpituva massan; havaitaankin tavallisesti mammografiaseulonnoissa mikrokalkkilöydösten perusteella.
 1. Kalkkilöydöksiä on myös hyvänlaatuisissa muutoksissa, kuten mastopatiassa, sklerosoivassa adenoosissa ja rasvanekroosissa; biopsiaa yleensä vaaditaan erotusdiagnostiikassa.
- C. Histologisesti havaitaan laajentuneita atyyppisillä soluilla täyttyneitä tiehyitä, joilla ehjä myoepiteliaalinen solukko.

- D. Luokitellaan histologisesti graduksiin 1-3 tuma-atypian ja kasvainsolunekroosin esiintymisen perusteella.
1. Gradus 1 tai 2 – Tiehyiden sisäisen malignin solukon kasvutapa on kribriforminen, solidi tai papillaarinen.
 2. Gradus 3 – Tiehyiden sisäinen maligni solukko muodostaa nekroosialueita (komedonekroosit), jotka voivat kalkkiutua.
- E. Rinnan Pagetin tauti tarkoittaa nännin ihottumaa, joka syntyy rintasyöpäsolujen infiltroidessa epidermikseen.
1. Taustalla on yleensä DCIS tai harvinaisemmin invasiivinen rintasyöpä.
 2. Nännin ihottuma viittaa lähes aina rintasyöpään.
- F. Ennuste on hyvä ja voidaan pienenä hoitaa rintaa säästävällä leikkauksella; laajat muutokset hoidetaan koko rinnan poistolla (mastektomia).

IV. INVASIIVINEN DUKTAALINEN KARSINOOMA

- A. Yleisin invasiivinen rintasyöpätyyppi; n. 70% kaikista rintasyövistä.
- B. Syöpäsolut ovat läpäisseet rauhastiehyen tyvikalvon ja pystyvät leviämään elimistössä; muodostavat klassisesti tiehytmäisiä rakenteita.
- C. Havaitaan palpoidessa tai mammografiassa epätarkkarajaisena massana.
1. Palpoidessa massa havaitaan yleensä vasta n. 2cm kokoisina, kun taas mammografiassa ne voidaan tyypillisesti havaita jo huomattavasti 1cm pienempinäkin (jopa 1-2mm).
 2. Tuumorin kasvaessa ja infiltroidessa ympäröiviin Cooperin ligamentteihin voidaan havaita ihon kuoppautumista tai nännin retraktiota; infiltroituminen aiheuttaa ligamenttien fibrotisoitumista ja lyhentymistä -> vetävät ihoa ja nänniä sisäänpäin
 - a. Cooperin ligamentit ylläpitävät rintojen muotoa (esim. iän myötä venyttävät ja tämä johtaa rintojen roikkumiseen)
- D. Yleensä ei erityisiä morfologisia tunnuspiirteitä (invasive carcinoma of no special type, NST); vaihtelee hyvin kehittyneistä tiehytrakenteista desmoplastisessa stroomassa diffuusiin anaplastiseen kasvuun.
1. Spesifisiä tyyppejä, joissa havaitaan niille tyypillinen kasvutapa ovat mm. tubulaarinen, musinoottinen ja medullaarinen karsinooma, joilla on duktaalista ja lobulaarista karsinoomaa paremmat ennusteet.
 2. Tubulaarinen karsinooma – Hyvin muodostuneita tubuluksia, matala-asteisia tumia ja ei myoepiteelikerrosta.
 3. Musinoottinen karsinooma – Syöpäsolusaarekkeet kelluvat ekstrasellulaarisessa limassa.
 4. Medullaarinen karsinooma – Suuria, korkea-asteisia soluja solusaarekkeissa, joissa on yhteydessä lymfosyytti-infiltraattia ja plasmasoluja.
 - a. Makroskooppisesti kasvain on hyvin erottuva pyöreä massa, joka vaikuttaa usein kuvantamisessa hyvänlaatuiselta.
 - b. BRCA1-kantajilla yleinen alaluokka.
 5. Inflammatorinen rintasyöpä – Kliininen diagnoosi, jossa rinta on punoittava, kuumottava ja turvonnut ja iho paksuuntunut (appelsiini-ihottuma, peau d'orange; johtuu Cooperin ligamenttien kiristymisestä lymfödeeman takia) eikä selkeää massaa löydetä.

- a. Johtuu syöpäsolujen invaasiosta imuteihin, jolloin ne tukkeutuvat ja edeemaa muodostuu iholle
 - b. Huono ennuste (lähteestä riippuen 40-70% 5-vuotiselossaoloennuste).
- E. N. 50-65% duktaalista karsinoomista on ER-positiivisia, 20% HER2-positiivisia ja 15% triplanegatiivisia.

V. LOBULAARINEN INTRAEPITELIAALINEN NEOPLASIA (LIN)

- A. Laajentuneiden lobulusten luumenia täyttää monotoninen, pienikokoinen solukko ilman tyvikalvon invaasiota.
 - 1. Kuvailee atyypista lobulaarista hyperplasiaa (ALH, LIN 1) ja lobulaarista karsinoomaa in situ (LCIS; voi olla klassinen eli LIN 2 tai pleomorfinen eli LIN 3), jotka eivät ole pahanlaatuisia muutoksia (ennen ajateltiin olevan lobulaarisen karsinooman esiaste), vaan osoitus suurentuneesta riskistä sairastua jommankumman rinnan karsinoomaan
 - a. Tosin pleomorfinen LCIS (LIN 3) tulisi hoitaa kuten DCIS, eli poistaa vähintään 2 mm:n terve kudosparginaalein ja antaa tarvittaessa sädehoito leikkauksen jälkeen
- B. Ei muodosta palpoitavaa muutosta eikä tyypillisiä kuvantamislöydöksiä; diagnoosi on harvinainen ja lähes aina sattumalöydös biopsiassa.
 - 1. Syöpäsolukko on löyhästi kiinnittynyttä toisiinsa; havaitaan E-kadheriini-soludheesiomolekyylin puutos.
 - 2. Usein monipesäkkeistä ja bilateraalista.
- C. Hoito on useimmiten seurannan tehostaminen; n. 1/3-osalle potilaista kehittyy pitkällä aikavälillä karsinooma.

VI. INVASIIVINEN LOBULAARINEN KARSINOOMA

- A. Toiseksi yleisin rintasyöpädiagnoosi; n. 5-15% kaikista rintasyövistä.
- B. Ei tyypillisesti muodosta yksittäistä tuumoria vaan on diffuusi, hajapesäkkeinen ja jopa viidenneksessä tapauksista bilateraalin.
- C. Histologisesti havaitaan invaasiota ja pienten solujen muodostamia solujonoja (Indian files) sidekudoksen joukossa.
 - 1. E-kadheriini-soludheesiomolekyylin häiriö johtaa koheesion alentumiseen, jolloin selkeitä tiehytrakenteita ei muodostu.
 - 2. Tuma-atypia on yleensä vähäistä ja voidaan nähdä limavakuoleja (sinettisormussolumorfologia).
- D. Ennuste hieman parempi kuin invasiivisen duktaalisen karsinooman; lähes kaikki lobulaariset karsinoomat ovat hormonireseptoriposiitiivisia.

VII. PERINNÖLLINEN RINTASYÖPÄ

- A. Jos suvussa on useilla ensimmäisen asteen sukulaisilla rintasyöpä, yhdellä sukulaisella nuorena alkanut rintasyöpä, suvussa on rintasyövän lisäksi munasarjasyöpää tai rintasyöpään on sairastunut suvun mies, on riski rintasyöväälle suurentunut; n. 10% rintasyövistä ovat perinnöllisiä.
- B. BRCA1- tai BRCA2-geenin mutaatiot ovat tärkeimmät perinnöllisen rintasyövän riskitekijät; riski sairastumiselle 70. ikävuoteen mennessä on 60-80%.
 - 1. Mutaatiot ovat yhteydessä naisilla rinta-, munanjohdin- ja munasarjasyöpiin
 - 2. Mutaatiot ovat yhteydessä miesten rintasyöpään (myös eturauhassyöpään)
 - 3. Altistavat myös perinnölliselle haiman adenokarsinoomalle

- C. Riskivaarassa oleville tarjotaan geenitason tutkimukset ja positiivisia potilaita seurataan kuvantamistutkimuksilla nuoresta asti; potilaat voivat tahtoessaan myös toivoa rintarauhaskudoksen ennaltaehkäisevää poistoleikkausta.
1. Myös oophorectomia (munasarjojen poistaminen) mahdollinen ((yleensä n. 40 v. tai kun lapset hankittu)

VIII. MIEHEN RINTASYÖPÄ

- A. Miesten rintasyöpä on todella harvinainen; n. 15 tapausta vuodessa Suomessa.
- B. Riskitekijät, tyypit (yleensä invasiivinen duktaalinen), diagnostiikka, hoitolinjat ja ennuste eivät eroa naisten rintasyövästä.
1. Yhteydessä Klinefelter-oireyhtymään ja BRCA1/2-mutaatioihin.
- C. Oireilee yleensä retroareaalisenä massana yli 60-vuotiaalla miehellä.
1. Voidaan havaita joskus myös mm. sisäänvetäytynyt nänni, rinnan kipua, nännieritettä tai kainalon imusolmukesuurentuma.
 2. Miehen rintasyöpä saa yleensä alkunsa rintarauhasen sentraalisista tiehyistä, koska rintakudoksen tiheys on suurin nännin takana ja miehille muodostuu hyvin vähän lobuluksia.

17 NEUROPATHOLOGIA

KEHITYSHÄIRIÖT

I. HERMOSTOPUTKEN SULKEUTUMISHÄIRIÖT (NTD)

- A. Hermostoputken sulkeutumishäiriöissä neurulaatiossa on häiriö, jonka takia hermostoputken tietty osa ei sulkeudu täydellisesti.
1. Neurulaatio alkaa 18. päivänä ja loppuu 28. päivänä hedelmöitymisestä.
 2. Neurulaatiossa notokordin päällä oleva ektodermaalisten solujen muodostama litteä hermostolevy muuttuu ontoksi putkeksi eli hermostoputkeksi.
 - a. Hermostoputken seinämästä muodostuu keskushermosto, luumeni muodostaa ventrikkelit ja selkäydinkanavan; hermostoputken sulkeutuessa hermostolevyn reunan eli hermostopienen solut irtoavat ja vaeltavat eri puolille alkuuta -> hermostopienä muodostaa ääreishermoston.
- B. Synnynnäisten kehityshäiriöiden toiseksi yleisin syy; suurin osa satunnaisia ja geneettisten sekä ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksessa syntyneitä.
1. Riskitekijöitä ovat mm. äidin pieni plasman foolihappopitoisuus eli B9-vitamiini (riittämätön saanti ravinnosta tai synteettisesti), ensimmäisen asteen sukulaisella todettu sulkeutumishäiriö ja tietyt lääkkeet (esim. valproaatti, karbamatsiini).
- C. Seulontaan voidaan käyttää äidin alfafetoproteiinipitoisuutta ja sikiön ultraäänitutkimusta.
1. Lisätutkimuksina tarvittaessa lapsivesipunktio ja sikiön magneettikuvaus.
- D. Kun hermostoputken proksimaalinen osa sulkeutuu epätäydellisesti, voi seuraksena olla enkefaloseele (aivotyrä) tai anenkefalia (aivottomuus).
1. Enkefaloseeleessa aivokudosta pullistuu aivokopasta ulos; laajojakin pullistumia voidaan korjata, mutta suurin osa äideistä päättää valita raskaudenkeskeytyksen.
 - a. Korjatuillakin yleensä myöhemmin ongelmia älyllisessä kehityksessä.
 2. Anenkefaliassa kalloa ja aivoja ei havaita, ja fetus näyttää sammakkomaiselta.
 - a. Johtaa polyhydramnioniin, sillä amnionnesteiden nieleminen on häiriintynyt.

- b. Lapsi syntyy yleensä kuolleena.
- E. Hermostoputken distaalisemman osan (kaudaalipään) sulkeutumishäiriöt ovat huomattavasti yleisempiä; johtavat spina bifidaan eli selkärankahalkioon.
 - 1. Spina bifida occulta (selkärangan piilohalkio) – Ainoastaan avoin nikamankaari ilman pullistumaa; yleensä oireeton.
 - a. Havaitaan usein myöhään ulkoisesti kuoppana tai epänormaalina karvoituksena vaurion kohdalla vauvan selässä.
 - 2. Meningoseele (aivokalvotyrä) ja meningomyeloseele (aivokalvoselkäydintyrä) – aivokalvot (tai aivokalvot ja selkäydin) työntyvät ulos pussiksi selkäydinkanavasta.
 - a. Harvinaisempi kuin piilohalkio; yleensä korjataan leikkauksella mahdollisimman pian syntymisen jälkeen.
 - i. Sulun jälkeen kehittyä useimmiten (n. 90%) hydrokefalus; yksi pääsyy on se, että meningoseele on usein yhteydessä tyypin II Arnold-Chiarin epämuodostumaan. Sulkemisen jälkeen siis menetetään aikaisempi ”pakoreitti” selkäydinkanavan nesteelle ja tämä voi pahentaa jo olemassa olevaa Chiari II-defektin aiheuttamaa likvorin kertymistä.

II. SYNNYNNÄINEN HYDROKEFALUS (VESIPÄÄ)

- A. Aivo-selkäydinnesteen kierron häiriö, jossa aivokammioihin kertyy liikaa nestettä, mikä johtaa kallonsisäisen paineen kasvamiseen ja laajentuneisiin aivokammioihin.
 - 1. Vauvoilla havaitaan nopeaa pään koon kasvua, sillä kallon saumat eivät ole vielä luutuneet.
- B. Yleisin syy synnynnäiselle hydrokefalukselle on aqueductus cerebrin ahtauma, jonka seurauksena aivo-selkäydinnesteen kulku kolmannesta aivokammioista neljänteen estyy ja nestettä kertyy ylempiin ventrikkeleihin.
- C. Muita syitä ovat mm. Arnold-Chiarin ja Dandy-Walkerin epämuodostumat.
 - 1. Tyypin II Arnold-Chiarin epämuodostumassa vermis, pikkuaivorisat sekä osa aivorunkoa ja neljättä aivokammiota työntyvät selkäydinkanavaan eli sijaitsevat osittain foramen magnumin alapuolella, mikä ahtauttaa nesteen kulkua.
 - a. Liittyy lähes aina meningomyeloseele.
 - b. Tyypin I epämuodostumassa vain pikkuaivorisat työntyvät foramen magnumin alapuolelle; paljon lieväoireisempi ja yleensä havaitaan vasta aikuisuudessa.
 - 2. Dandy-Walkerin epämuodostumassa pikkuaivojen vermiksen muodostuminen on puutteellista tai se puuttuu täysin.
 - a. Neljäs ventrikkeli laajenee massiivisesti ja täyttyy aivo-selkäydinnesteellä.
- D. Johtavat usein oppimisen ongelmiin ja epilepsiaan; kuolleisuus pientä 0-3%.
- E. Tärkein hoitomuoto on suntti; yleensä sivukammioista (ventrikuloperitoneaalinen) tai neljänneistä ventrikkelistä vatsaonteloon (kystoperitoneaalinen).

MOTONEURONISAIRAUDET JA SELKÄYDINLEESIOT

I. AMYOTROFINEN LATERAALISKLEROOSI (ALS, LOU GEHRIGIN TAUTI)

- A. Merkittävin ja tavallisin liikehermosolujen degeneraatiosta johtuva tauti (motoneuronitauti).

- B. Kortikospinaalisen lateraalisen radan ylempien motoneuronien (eli siis korteksinkin) ja anteriorisen pylvään alempien motoneuronien degeneraatio aiheuttaa taudin oireet.
1. Alemman motoneuronin oireet – velttohalvaus ja lihasatrofia, faskikulaatiot, hidastuneet refleksit ja negatiivinen Babinskin testi (isovarvan kipristyy jalkapohjan puolelle).
 2. Ylemmän motoneuronin oireet – spastinen paralyysi, hyperrefleksia, positiivinen Babinskin testi
 - a. Puhtaassa ylemmän motoneuronin vauriossa (tai sen ollessa merkittävästi hallitseva) puhutaan primaarisesta lateraaliskleroosista (PLS); yhteys ALS:iin on kuitenkin kiistanalainen
- C. Ensioireena tyypillisesti toispuolisena käden tai alaraajan lihasten heikkous ja atrofia.
1. Voi myös alkaa bulbaarisesti (alkuoireena puheen ja nielemisen heikentyminen; kielessä atrofiaa ja faskikulaatioita)
 2. Tauti on progressiivinen ja lopulta hengityslihaksetkin lamaantuvat (yleisin kuolemansyy).
 3. Sensorisessa hermotoiminnassa häiriötä harvemmin; tosin ovat mahdollisia (jopa 20%:lla lievää distaalista tunnottomuutta, parestesioita tai lievää kipua)
 4. Jopa 50%:lla kognitiivista alenemaa
- D. Suurin osa tapauksista ovat sporadisia ja hermosolujen tuhoutumismekanismita epäselviä; suurin esiintyvyys n. 60-80v (familiaaliset aikaisemmin n. 40-60v).
1. Suvuttaisilla potilailla (Suomessa jopa 30% kaikista tapauksista on geneettisistä syistä johtuvaa; aina ei ole tiedossa suvussa ilmenemistä) yleisimpiä mutaatioita ovat c9orf72-toistojaksomutaatio ja SOD1-mutaatiot (johtaa vapaiden radikaalien aiheuttamaan neuronivaurioon).
 - a. Toistojaksomutaatiossa nähdään kudostasolla TDP-43 sisältäviä inkluusioita jäljellä olevissa motoneuroneissa; SOD1-mutaatioissa näitä ei taas nähdä.
- E. Parantavaa hoitoa ei ole ja hoito on pääosin oireenmukaista (tosin rilutsolin on todettu pidentävän elinikää tai mekaaniseen ventilaatioon päätymistä, vaikkakin vain vähän).
1. Odotettu elinikä diagnoosin jälkeen on n. 2-5 vuotta.

II. SPINAALINEN LIHASATROFIA (SMA)

- A. Periytyviä, eteneviä alempia motoneuroneja vaurioittavia sairauksia, jotka alkavat yleensä lapsuusiässä; jaetaan neljään tyyppiin, jotka poikkeavat toisistaan alkamisikästä ja vaikeusasteelta
1. SMA 1 (vakavin ja yleisin; lapsi ei opi koskaan istumaan tuetta eikä kävelemään) eli Werdnig-Hoffmannin tauti alkaa vauvaiässä (<6kk), jopa kohdussa. SMA 2 alkaa varhaislapsuudessa (6-18kk), SMA 3 eli Kugelberg-Welanderin tauti alkaa leikki-ikästä murrosikään ja SMA 4 on sama kuin SMA 3, mutta oireet alkavat vasta aikuisiässä.
 2. Taustalla SMN1-geenin mutaatiot -> SMN-proteiinin puute
- B. Kun hermoyhteys lihakseen katkeaa, lihassupistus ei enää onnistu ja alun perin terveet lihasryhmät heikkenevät ja surkastuvat vähitellen
1. Symmetristä yleensä
 2. Aivoissa ei ole toimintahäiriötä ja tuntoaistimuksia välittävät hermosäikeet säilyvät normaaleina

- C. Yksi erikoistyyppi on bulbospinaalinen lihasatrofia (Kennedyn tauti), jolle on ominaista proksimaalisten ja bulbaarialueen lihasten heikkous (puhe- ja pureskeluvaikeuksia)
1. Alkaa aikuisiällä, eteneminen on hidasta (vain kolmannes potilaista tarvitsee pyörätuolin 20 vuotta sairastettuaan); vaikutus elinaikaan on vain vähäinen

III. SYRINGOMYELIA

A.

KESKUSHERMOSTON INFEKTIOT

I. POLIOMYELIITTI

- A. Polioviruksen aiheuttama selkäytimen infektio, jossa virus tuhoaa selkäytimen etupylvään alemmat motoriset hermosolut.
- B. Ilmenee alemman motoneuronin vaurion oireina – velttohalvaus ja lihasatrofia, faskikulaatiot, hidastuneet refleksit ja negatiivinen Babinskin testi (isovarvan kipristyy jalkapohjan puolelle).
- C. Rokotusohjelma hävittänyt polioviruksen Suomesta.

II. MENINGIITTI

- A. Aivokalvojen tulehdus, voidaan jakaa leptomeningiitiksi ja pakymeningiitiksi.
1. Leptomeningiitti – Pehmeiden aivokalvon (pia, araknoidea) tulehdus
 - a. Yleensä meningiitillä tarkoitetaan leptomeningiittiä.
 2. Pakymeningiitti – Kovan aivokalvon (dura) tulehdus
- B. Tulehduksen aiheuttaa yleensä infektio; voidaan jakaa pääasiassa akuutteihin purulentteihin (bakterielli) ja aseptisiin (virusperäinen).
1. Aseptinen meningiitti on hermoston tavallisin akuutti infektio ja bakterielli on toiseksi yleisin.
 2. Tärkeimpiä viruksia ovat mm. enterovirukset (mm. coxsackievirukset, echovirus) ja herpesvirukset.
 3. Tärkeimpiä bakteereja ovat mm. N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae, Borrelia burgdorferi, GBS, E. coli ja M. tuberculosis
 4. Myös sienet ja parasiitit voivat aiheuttaa infektiota; mm. Toxoplasma gondii (erit. sikiölle).
- C. Ilmenee klassisena triadina: päänsärky, niskajäkyys ja kuume; myös valoherkkyyttä, oksentelua ja tajunnan tason alenemista voidaan havaita.
1. Oireiden aikataulu antaa vihjeen aiheuttajasta: virustaudissa oireet säilyvät ennallaan tai lievittyvät kolmen ensimmäisen päivän aikana, mutta bakteeritauoissa oireet pahenevat.
 - a. Nyrkkisääntö: bakteerimeningiitti on kaikin puolin rajumpi.
 2. Tajunnan häiriöt eivät yleensä liity virusperäiseen infektiin; jos aseptisessä meningiitissa havaitaan tajunnan tason alenemista, on infektio todennäköisesti levinnyt aivoihin (enkefaliitti/meningoenkefaliitti).
- D. Diagnoosi perustuu kliiniseen kuvaan ja lumbaalipunktioon.
1. Lumbaalipunktiossa otetaan likvornäyte neulalla L4 ja L5 välistä; neula ylittää subaraknoideaan eli neula ylittää ihon, subkutaanisen kudoksen, lig. suprasinalen, lig. interspinaliat, lig. flavumin, epiduraalitalan, duran ja araknoideaan.
 2. Aseptinen – likvori kirkasta ja havaitaan lymfosyyttejä ja normaali glukoosi
 3. Bakterielli – likvori sameaa ja havaitaan granulosyyttejä ja matala glukoosi

4. Likvorista ja seerumista otetaan myös virusvasta-ainenäytteet sekä tehdään bakteeriviljely;

E. Hoito ja ennuste

1. Virusмениngiittipotilaan sairaalahoito on harvoin tarpeen ja oireet kestävät yleensä alle 10 päivää; ei juuri koskaan aiheuta pysyviä neurologisia vaurioita.
2. Bakteerimeningiitti on vaarallinen tila ja vaatii aina i.v. antibiootihoidon sairaalassa sekä usein aivopaineen laskemiseen kortisonivalmisteiden (deksametasoni).
 - a. Ennuste on parantunut, mutta kuolleisuutta ja pysyviä vaurioita tapahtuu vieläkin runsaasti; kuulovaurio on yleisin neurologinen vamma (n. 10-30% potilaista).
 - i. Muita jälkioireita voivat olla mm. hydrokefalus, kognitiiviset vauriot ja epilepsiataipumus.
 - ii. Kuolemaa aiheuttaa mm. aivoödeeman aiheuttama herniaatio.

III. ENKEFALIITTI

A. Aasdas

B. Autoimmuunienkefaliitti on harvinainen (ilmaantuvuuden arvioidaan olevan luokkaa 2/1 000 000) ei-infektiivinen enkefaliittimuoto; yleisimpinä synapsien NMDA-reseptoreita (yleisin) ja LGI1-proteiinia kohtaan suuntautuvien vasta-aineiden aiheuttamat enkefaliitit

1. Oireet etenevät tyypillisesti nopeasti (<3kk) ja useimmiten ilmenee edeltävästi virusinfektion kaltaisia oireita kuten lievää lämmönnousua, pahoinvointia ja päänsärkyä
2. Usein paraneoplastisia; esim. NMDAR-vasta-aineiden tiedetään syntyvän erityisesti munasarjateratooman yhteydessä ja LGI1-vasta-aineiden tymoomissa
 - a. Myös herpes simplex 1- (HSV-1) ja Sars-Cov-2-infektioiden, raskauden sekä syövän hoidossa käytettävien omaa T-solupuolustusta vahvistavien vasta-aineiden eli immuuniaktivaation vapauttajien (checkpoint inhibitors) on kuvattu laukaisseen NMDAR-enkefaliitin
3. NMDAR-enkefaliitissa suurin osa potilaista on lapsia tai nuoria aikuisia (N/M 4:1); mediaani-ikä on 21 vuotta
 - a. Lapsilla NMDAR-enkefaliitin ensioireita ovat epileptiset kohtaukset, liikehäiriöt, ärtyneisyys, raivokohtaukset, unettomuus ja puheen sisällön köyhtyminen.
 - b. Aikuisilla ennako-oireiden jälkeen ilmaantuvat aluksi psykiatriset oireet, joita ovat ahdistuneisuus, unettomuus, harhaluulot, hallusinaatiot, paranoidinen ajattelu ja aggressiivinen käyttäytyminen. Tässä vaiheessa herää usein epäily akuutista psykoosista. Edetessä enemmän orgaaniseen sairauteen viittaavaa (esim. epilepsiaa)
4. LGI1-enkefaliitti taas vanhemmilla aikuisilla (mediaani 64) ja aiheuttaa ns. limbisen enkefaliitin (lähimuistin häiriöt, epileptiset kohtaukset tai limbisen järjestelmän vaurioon viittaavat psykiatriset oireet)
5. Diagnostikassa MRI, EEG ja vasta-aineet sekä seerumista että aivo-selkäydinnesteestä
 - a. Useimmiten likvorin perustutkimuksissa lymfosyyttivaltainen leukosytoosi (yleensä < 100 x10⁶ solua/l), suurentunut proteiinipitoisuus ja IgG:n

oligoklonaalisia alafraktioita, mutta normaali solulöydös ei sulje pois autoimmuunienkefaliittia

6. Hoitona metyyliprednisoloni-infuusio, johon yhdistetään viiden vuorokauden laskimonsisäinen immunoglobuliinihoito (IVIG) (ja/tai plasmafereesi). Toisessa linjassa rituksimabi, syklofosfamidi tai molemmat.
 - a. Myös mahdollisen paraneoplastisen reaktion aiheuttava tuumori tulee mahdollisuuksien mukaan poistaa.

IV. PRIONITAUDIT (SPONGIFORMINEN ENKEFALOPATIA)

- A. Rappeuttavan aivotautien tautiryhmä, jossa muuttunut prioniproteiini johtaa elimistön normaaleja prioniproteiineja patologiseen muotoon.
 1. Prioniproteiinia on normaalisti keskushermoston neuroneissa alfa-kierteisessä muodossa (PrP^c)
 2. Prioniproteiinin rakenteen muuttuminen patologiseen beeta-levymuotoon (PrP^{Sc}) voi olla sporadinen, perinnöllinen tai tartunnallinen.
 - a. Muuttaa normaalit patologisiksi (dominoefekti).
 3. Muuttunut prioniproteiini kertyy amyloidiplakeiksi ja vaurioittaa neuroneita.
 - a. Neuronivaurio havaitaan harmaan aineen voimakkaana vakuolisoitumisena (pesusienimäinen ulkonäkö, spongiforminen enkefalopatia).
- B. Tavallisin ihmisen prionitauti on Creutzfeldt-Jacobin tauti; Suomessa n. 5 tapausta/vuosi.
 1. Yleensä sporadinen (85%, sCJD)); voi myös harvoin olla perinnöllinen (fCJD) tai infektiivinen (CJD-potilaalta saatu kasvuhormoni tai durasiirrännäinen).
 - a. Sporadinen alkaa tavallisesti n. 65 vuoden ja perinnöllisessä n. 50 vuoden iässä.
 2. Oireilee mm. muisti-, kävely-, tasapaino- ja näköhäiriöillä sekä tahdottomina myoklonisina lihasnykäyksinä; etenee nopeasti ja johtaa kuolemaan yleensä alle vuodessa (parantavaa lääkettä ei ole).
 3. Variant CJD (vCJD) johtuu altistuksesta nautakarjan BSE:lle (Bovine Spongiform Encephalopathy, hullun lehmän tauti).
 - a. Tauti kehittyy vasta vuosien kuluttua (jopa kymmeniä vuosia) tartuttavan naudanlihan syönnistä.
 - b. Ensioireina psykiatriset käyttäytymishäiriöt, tasapainon järkkäminen ja tuntohäiriöt (vrt. sporadisessa kognitiiviset oireet ja ataksia)
- C. Familiaalinen fataali insomnia johtuu perinnöllisen Creutzfeldt-Jakobin taudin mukaisesti PRNP-geenin mutaatioista; aiheuttaa pahenevaa unettomuutta, sympaattisen hermoston yliaktiivisuutta, muistihäiriöitä ja myoklonusta.
- D. Oikea diagnoosi varmistetaan kuolemanjälkeisessä neuropatologisessa tutkimuksessa immunohistokemiallisesti.
 1. Nykyään MRI:llä (TT ei riitä), EEG:llä ja likvorilla voi tuoda varmuutta kuolemaa edeltävään diagnostiikkaan CJD:ssä (likvorissa esim. positiivinen 14-3-3-proteiini ja/tai RT-QuIC)

AIVOVERENKIERTOHAIRIÖT JA TRAUMA

I. PERIAATTEET

- A. Aivoissa ei ole energiavarastoja; glukoosin ja hapen saanti riippuu jatkuvasta ja runsaasta verenkierrasta (n. 15-20% minuuttivolyymistä).

- B. Aivoverenkiertohäiriö voi johtua kahdesta erityyppisestä tilasta: iskemiasta (n. 85% tapauksista) tai hemorragiasta (n. 15% tapauksista).
 - 1. Iskemiasta herkimmin vaurioituvat hermosolut, sillä niiden glukoosin tarve on suuri; joutuvat vakavassa iskemiassa nekroosiin n. 3-5 minuutissa.
- C. Johtavat aivohalvaukseen (stroke), jonka tavallisin ilmentymä on toispuolihalvaus (hemipareesi/hemiplegia), tyypillisesti raajan toimintahäiriö ja saman puolen suunpielen roikkuminen.
 - 1. Päänsärkyä on tyypillinen aivoverenvuodolle, kuntaas infarktissa sitä ei yleensä havaita.
 - 2. Aivoverenvuodon ennuste on selvästi huonompi kuin infarktin.

II. YLEISTYNYT (GLOBAALINEN) AIVOISKEMIA

- A. Kaikkien neljän aivoihin verta tuovan valtimon verenkierto vähenee kriittiselle tasolle ja aiheuttaa koko aivojen alueella iskemiaa.
- B. Tavallisin syy on verenpaineen romahtaminen (mm. vakava sokki, sydämenpysähdys)
 - 1. Myös mm. heikko perfuusio (esim. ateroskleroosi), vakava hypoksemia (esim. anemia) tai hypoglykemia (esim. insulinooma) voivat olla taustalla.
- C. Sokin aiheuttama kohtalainen iskemia (relatiivinen) aiheuttaa infarkteja verisuonitusalueiden raja-alueilla (vedenjakaja-alueet) ja lopulta aivoiskemialle herkimmissä rakenteissa.
 - 1. Isoaivokorteksin pyramidisolut (kerrokset 3, 5 ja 6) – kortikaalinen laminaarinen nekroosi
 - 2. Hippokampukset pyramidisolut – pitkäaikaismuisti
 - 3. Pikku-aivojen Purkinjen solut – yhdistää sensoriset havainnot motoriseen toimintaan
- D. Sydänpysähdys johtaa totaaliseen yleistyneeseen aivoiskemiaan, joka johtaa aivojen diffuusiin nekroosiin.
- E. Oireet riippuvat iskemian vakavuudesta ja kestosta.
 - 1. Lievä ja lyhytkestoinen ilmenee ohimenevänä sekavuutena, kun taas kohtalainen iskemia voi johtaa y.m. infarkteihin ja alueille tyypillisiin toiminnan vajeisiin.
 - a. Totaalinen iskemia yleensä johtaa kuolemaan; selviytyjät yleensä jäävät vegetatiiviseen tilaan.

III. ALUEELLINEN (FOKAALINEN) AIVOISKEMIA

- A. Alueellisessa iskemiassa jokin aivojen valtimoista tukkeutuu, mikä aiheuttaa fokaalisia neurologisia oireita.
 - 1. Jos iskemia kestää tarpeeksi pitkään, alueen neuronit vaurioituvat pysyvästi (aivoinfarkti, ischemic stroke).
 - 2. Jos oireet kestävät alle 24 tuntia ja pysyvää kudosaauriota ei havaita, kutsutaan tilannetta ohimeneväksi aivoverenkiertohäiriöksi (TIA).
 - a. Yleensä kestää alle tunnin, tyypillisimmin 2-15 minuuttia.
- B. Voidaan jakaa etiologian perusteella.
 - 1. Embolus (80% tapauksista) – yleensä sydänperäinen embolus (eteisvärinä merkityksellisin syy)
 - a. Yleensä affisioi a. cerebri mediaa.
 - b. Johtaa aneemiseen infarktiin korteksin periferiassa; muuttuu usein hemorragiseksi infarktiksi, jos veri pääsee virtaamaan vaurioituneisiin

suoniin ja vuotaa aivokudokseen (embokus hajooa luonnollisesti tai hoidollisesti).

2. Suurten suonten ateroskleroosi – yleensä ateroskleroottisen plakin repeämän seurauksena muodostuneen trombin seuraus
 - a. Yleensä muodostuu aivoverisuonten haarautumiskohtiin (esim. circulus Willisissä a. carotis internan ja a. cerebri median risteys).
 - b. Johtaa aneemiseen infarktiin korteksin periferiassa.
 3. Pienten suonten tauti (arterioloskleroosi) – muodostuu yleensä hypertension ja diabeteksen komplikaationa; johtaa pienen alueen kudostuhoon eli ns. lakunaariseen infarktiin
 - a. Yleensä affisioi lenticulo-striataalisen valtimohaaran suonitusaluetta.
 - i. Oireisto riippuu infarktoituneen alueen perusteella: capsula internan infarktit aiheuttavat motorisia oireita ja talamuksen infarktit taas sensorisia oireita.
- C. Iskeemisessä aivoinfarktissa voidaan havaita tyypillinen histologinen kehittyminen infarktista kuluneen ajan perusteella.
1. (N. 1h – Hermosolujen mikrovakuolisaatio ja mitokondrioiden turpoaminen)
 2. 12-24h – Hermosolujen solulima värjäytyy voimakkaan eosinofiilisesti ja tumat ovat pyknoottisia.
 3. 24h-2vk – Kudoksen nekroosi (neutrofiilit), makrofagien influksi, vaskulaarinen proliferaatio ja reaktiivinen gliosis (säilyneen kudoksen astrosyytit proliferoituvat).
 - a. Infarkti muuttuu kystiseksi ja astrosyytit muodostavat rajaavan glia-arven.

IV. KALLONSISÄISET VERENVUODOT

- A. Voidaan jakaa kudoksensisäisiin aivoverenvuotoihin (ICH), subaraknoidaalsiin aivoverenvuotoihin (SAV), subduraalivuotoihin (SDV) ja epiduraalisiin verenvuotoihin (EDV).
1. ICH ja SAV ovat tyypillisesti spontaaneita (voivat olla myös traumasta johtuvia), kun taas SDV ja EDV johtuvat yleensä traumasta.
- B. ICH voidaan jakaa syviin (70%) ja lobaarisiin (30%) vuotoihin.
1. Syvä paikantuu tyypillisesti tyvitumakkeisiin ja johtuu yleensä Charcot-Bouchard-mikroaneurysmien repeämisestä.
 - a. Verenpainetauti aiheuttaa aivovaltimoiden fibrinoidia nekroosia ja valtimon seinämään voi muodostua pullistumia painevaikutuksesta.
 2. Lobaariset paikantuvat lähelle aivojen pintaa ja johtuvat yleensä valtimon seinämän primaarisesta sairaudesta (mm. amyloidiangiopatía ja verisuonimalformaatiot).
 - a. Amyloidiangiopatía – Samoja amyloidogeenisiä peptidejä (beeta-amyloidia) kuin Alzheimerin taudissa kertyy keskikokoisten/pienten veiruonten seinämiin, mikä johtaa niiden jäykistymiseen ja vuotoherkkyyteen.
- C. SAV johtuu tavallisesti sakkulaarisen aivovaltimoaneurysman (berry aneurysm) puhkeaminen.
1. Sakkulaariset aneurysmat paikantuvat lähes aina suurten valtimoiden haarautumiskohtiin, erityisesti a. communicans anteriorin haarautumiskohdissa.
 2. Aneurysmat kehittyvät verisuonen median häiriöiden takia; riskitekijöitä ovat mm. verenpainetauti, tupakanpolto, polykystinen munuaistauti ja kollageenin geenivirheet (esim. Ehler-Danlosin ja Marfanin oireyhtymät).
 - a. Lamina elastica interna puuttuu kokonaan aneurysman seinämästä.

- b. Vuotamaton aneurysma ei yleensä aiheuta mitään oireita ja on usein sattumalöydös.
- 3. Muita syitä ovat mm. verisuonimalformaatiot ja antikoaguloitu tila.
- 4. Ilmenee äkillisenä voimakkaana pääsärkynä ("thunderclap") ja niskajäykkyytenä.
- 5. Lumbaalipunktiossa likvori on keltaista bilirubiinin takia.
- 6. Yleinen komplikaatio on vuodon jälkeinen verisuonispasmi, joka johdtaa sekundaariseen iskeemiseen infarktiin; johtuu hajoavast verestä vapautuvista vasokonstriktioivista aineista.
- D. Subduraalivuodossa verta kertyy duran alle, jolloin subduraalitila kasvaa ja veri peittää aivojen pinnan.
 - 1. Johtuu siltalaskimoiden repeämisestä; trauma liikuttaa aivoja laskimoiden sallimaa ulottuvuutta enemmän.
 - a. Ilmaantuminen yleistyy iän ja alkoholinkäytön kasvaessa; iso-aivojen atrofia venyttää siltalaskimoita.
 - 2. TT-kuvauksessa havaitaan sirppimäinen leesio.
 - 3. Oireet vaihtelevat trauman asteesta riippuen akuutista krooniseen; tyypillisesti päänsärkyä ja progressiivista tajunnantason heikkenemistä.
 - 4. Herniaatio on vaarallinen komplikaatio.
- E. Epiduraalivuodossa verta kertyy duran ja kallon väliin, mikä repii duraa irti kallonluusta.
 - 1. Johtuu tavallisesti ohimoluun traumaattisesta murtumasta, jossa a. meningeal media repeää.
 - 2. TT-kuvauksessa havaitaan linssinmuotoinen leesio.
 - 3. Oireet voivat alkaa vasta muutama tunti trauman jälkeen ("kirkas vaihe")
 - 4. Herniaatio on vaarallinen komplikaatio.

V. HERNIAATIO

- A. Kallonsisäisen paineen kohoaminen ja/tai massavaikutus voivat johtaa herniaatioon eli aivokudoksen siirtymiseen.
 - 1. Kallon intrakraniaalinen osaa jakaa vahvat duralaskostusten (falx, tentorium) mukaan; aivojen osat voivat paineen vaikutuksesta siirtyä näiden rakenteiden yli ja kompressoitua kompromisoiden alueen verenkiertoa ja hermoja.
- B. Aivosirpin alainen (subfalcine) – Aivojen pihtipoimu (gyrus cinguli) tunkeutuu aivosirpin alle.
 - 1. Kompressoii a. cerebri anterioria ja voi johtaa alueen infarktiin.
- C. Tentoriaalinen (uncinate) – Ohimolohkon guryks parahippocampaliksens unculus työntyy aivotelttaan.
 - 1. Kompressoii CN III ja johtaa silmän liikkeeseen alaviistoon leesion puolelle sekä pupillin dilataatioon.
 - 2. A. cerebri posteriorin kompressio voi johtaa okkipitaalilohkon infarktiin ja vaurioihin primaariseen visuaaliseen korteksiin.
 - 3. Aivorunko ja sen hengityskeskus voivat myös joutua lopulta puristuksiin.
 - 4. Herniaation progressioon usein liittyy keskiaivojen tai ponsin pieniin verenvuotoihin (Duret-verenvuoto).
- D. Tonsillaarinen – Pikku-aivojen risat työntyvät alaspäin foramen magnumiin.
 - 1. Kompressoii aivorunkoa ja voi johtaa hengityksen ja sydämen toiminnan pysähtymiseen.

DEMYELINAATIOSAIRAUDET

I. PERIAATTEET

- A. Aksoneita ympäröi myeliini, joka muodostaa sähköä eristävän kalvon ja nopeuttaa sähköimpulssien kulkua.
 - 1. Keskushermostossa myeliiniä tuottavat oligodendrosyytit ja ääreishermostossa Schwannin solut.
- B. Demyelinaatiosairauksissa Schwannin soluja ja/tai oligodendrosyyttejä sekä myeliiniä tuhotuu, mutta aksonit yleensä säilyvät ehjinä (tosin myöhäisessä vaiheessa myeliinitupen tuen puuttuminen johtaa usein aksonidegeneraatioon).
 - 1. Demyelinaatio tarkoittaa jo muodostetun myeliinin hajoamista.
 - 2. Dysmyelinaatio tarkoittaa häiriötä myeliinin muodostuksessa tai ylläpidossa.

II. MULTIPPELISKLEROOSI (MS-TAUTI)

- A. Yleisin demyelinaatiosairaus; nuorten aikuisten (20-40v.) yleisin krooninen keskushermostosairaus (Suomessa n. 250 uutta tapausta per vuosi).
 - 1. Yleisempi naisilla
 - 2. Liittyy HLA-DR2 (ja tarkemmin HLA-DRB1*1501) ja on yleisempää mitä enemmän sijainti eroaa päiväntasaajalta (D-vitamiini protektiivinen?).
- B. Krooninen autoimmuunisairaus, jossa tulehdusreaktio johtaa keskushermoston myeliinin ja oligodendrosyyttien tuhoutumiseen.
 - 1. Soluvälitteisen (CD8-T-solut, makrofagit ja mikrogliasolut) tulehduksen ajatellaan olevan keskeisin, mutta myös B-soluilla on todennäköisesti tärkeä rooli.
 - 2. Laukaiseva tekijä on epäselvä, mutta mm. murrosiän jälkeen sairastettu EBV-infektio on merkittävä riskitekijä.
- C. Tauti oireilee yleensä aaltomaisesti (relapsoiva-remittoiva, RRMS) eli havaitaan oireettomia sekä oireellisia jaksoja; n. 10% potilaista oireet ovat jatkuvasti progressiottomia ilman oireettomia vaiheita (primaaris-progressiivinen, PPMS).
 - 1. Aaltomainen tauti voi edetä progressiiviseksi (sekundaarisesti progressiivinen, SPMS); 10 v. päästä sairastumisesta 50%:lla potilaista sekundaarisesti progressiivinen tauti (ja 25v päästä 90%:lla)
 - 2. On myös harvinainen progressiivinen-relapsoiva (PRMS)-tautimuoto, jossa on selviä relapsivaiheita, mutta tauti on myös jatkuvasti progredioiva
- D. Oireet riippuvat demyelinaatiopesäkkeiden sijainnista, esim.
 - 1. Tuntohäiriö tai lihasheikkous käsissä ja/tai jaloissa (isoaivojen valkea aine/selkäydin)
 - 2. Toispuoleinen näön hämärtyminen, värinäön heikentyminen, kipua silmän liikuttamisessa (n. opticus; optikusneuriitti)
 - a. Näkö korjaantuu yleensä hyvin, mutta värinäkö jää usein puutteelliseksi. Uhthoffin oire eli näön hämärtyminen rasituksen tai saunomisen yhteydessä on melko tavallinen jälkioire
 - b. Usein statuksessa ns. Marcus Gunnin pupilli eli heikentynyt pupillaarikonstriktio, kun lamppua näytetään affisioituneen silmän edessä verrattuna terveeseen silmään (voi näkyä dilataationa, kun siirretään lamppu affisioituneeseen silmään terveen silmän jälkeen); ns. relative afferent pupillary defect (RAPD)
 - 3. Tasapaino-ongelmat ja sammaltava puhe (aivorunko)

4. Häiriöt silmänliikkeissä – nystagmus tai internukleaarinen oftalmoplegia (fasciculus longitudinalis medialis)
 5. Virtsarakon, suolen ja seksuaaliset toimintahäiriöt (autonominen hermosto)
 6. Muita oireita ovat mm. kognitiivisen toiminnan heikentyminen ja uupumus.
- E. Makroskooppisesti aivojen valkeassa aineessa nähdään harmaita, pesäkemäisiä muodostumia eli plakkeja, jotka ovat demyelinaatioalueita.
1. Histologisesti (Luxol fast blue-värjäys) MS-plakit keskittyvät laskimoiden ympärille ja plakkeja reunustaa lymfosyyteistä ja makrofageista koostuva solukertymä.
 2. Tulehduksen jäljiltä voi jäädä ns. gliosiarpi, jossa hypertrofiset ja -plastiset astrocytit muodostavat pysyvän ja tiiviin, verkkomaisen rakenteen (tästä tulee nimi multipple skleroosi -> monia arpeutumia).
- F. Diagnoosi perustuu kliiniseen kuvaan, aivojen ja selkäytimen magneettikuvaukseen ja likvoritutkimukseen.
1. Likvorissa havaitaan lievästi suurentunut leukosyyttimäärä (5-20(-50) lymfosyyttiä) ja korkea immunoglobuliinipitoisuus (IgG-indeksi) sekä oligoklonaaliset vyöhykkeet/bandit (likvorin proteiinien elektroforeesissa gamma-alueella näkyvät fraktiot)
 - a. Eivät ole spesifisiä MS-taudille, mutta tukevat diagnoosia
- G. Akuutin relapsin lääkehoitona käytetään steroideja korkeina annoksina, mutta tämä ei vaikuta sairauden etenemiseen.
1. Taudinkulkuun voidaan vaikuttaa lukuisilla lääkkeillä mm. beetainterferonilla, glatirameeriasetaatilla tai natalizumabilla; eivät kuitenkaan paranna tautia.
 2. Hoitovaihtoehtojen kehittymisen myötä potilaiden ennuste ja toimintakyky on kehittynyt suuresti; yli puolet MS-potilaista ovat edelleen työelämässä eikä eliniän ennuste ole merkittävästi vertailuväestöä matalampi.

III. POLYRADIKULIITIT (INFLAMMATORISET DEMYELINOIVAT POLYRADIKULONEUROPATIAT, IDP)

- A. Ryhmä hankittuja sairauksia, joissa elimistön oma immuunijärjestelmä hyökkää ääreishermostoa vastaan
- B. Jaetaan yleensä kahteen pääryhmään sen mukaan, kuinka nopeasti ne etenevät: Guillain-Barrén oireyhtymä (GBS, akuutti) ja CIDP (krooninen)
1. GBS:n yleisin alatyyppejä on akuutti inflammatorinen demyelinoiva polyradikuloneuropatia (AIDP) ja näitä käytetäänkin yleensä synonyymeinä; harvinaisempia tyyppejä ovat mm. AMAN- ja AMSAN-oireyhtymät, joissa vaurio on pääasiassa aksoneihin eikä myeliiniin (AMANissa motoneuronit, AMSANissa moto- ja sensoriset neuronit)
 - a. AIDP:ssä tapahtuu taas immuunihyökkäys ensisijaisesti myeliiniin ja Schwannin soluihin perifeerisissä motorisissa, sensorisissa ja autonomisissa hermojuurissa/hermoissa
 - b. Vuotuinen ilmaantuvuus on 1.5 tapausta 100 000 asukasta kohden
 2. Laukaiseva tekijä on yleensä hengitystie- tai ruuansulatuskanavan infektio (yleisin on kampylobakteeri; muita mm. influenssa, CMV, EBV, mykoplasma ja zikavirus), jota seuraavat oireet noin 2–3 viikon kuluttua; taustalla on siis usein molecular mimicry
 - a. Tyypillisiä ensioireita ovat alaraajoista alkavat pistely, puutuminen ja lihasheikkous, jotka nousevat symmetrisesti jalkateristä ylöspäin. Lihasheikkous dominoi taudinkuvaa.

- i. Hengitystukea vaativa hengityshalvaus voi kehittyä jopa tunneissa (kehittyy jopa 10-30%:lle)
 - b. Voi esiintyä useinkin myös aivohermohalvauksia (esim. facialispareesi jopa 50%:lla potilaista) ja autonomisen hermoston oireita (rytmihäiriöt, verenpaineen vaihtelu, ortostatismi ym.)
 - c. Usein mukana selkä- ja/tai hartiakipu
 - d. Miller-Fisherin oireyhtymä on harvinainen Guillain-Barrén oireyhtymän variantti, jossa todetaan oftalmoplegiaa, ataksiaa sekä arefleksiaa ± raajojen heikkoutta, mutta paralyysi on harvinaisempaa (taustalla on vasta-aineet GQ1b-gangliosidia vastaan, jota löytyy perifeerisistä hermoista ja CN III, IV ja VI)
 - i. Guillain-Barrén oireyhtymästä tunnetaan siis neljä tautimuotoa: AIDP, AMAN, AMSAN ja Miller-Fisherin oireyhtymä
- 3. Statuksessa jänneheijasteet ovat vaimeat tai puuttuvat ja ilmenee vähäisiä tuntohäiriöitä
- 4. Tutkimuksissa selkäytimen MK:ssa voidaan nähdä hermojuurien tehostumista, likvorissa korkea proteiinipitoisuus (1. viikon jälkeen) ja lievä mononukleaarinen pleosytoosi (noin 10 leukosyyttia/mm³) (löydöstä nimitetään albumiinisytologiseksi dissosiaatioksi).
 - a. Merkittävä pleosytoosi (> 50 solua/mm³) viittaa muuhun diagnoosiin.
 - b. ENMG auttaa diagnoosin vahvistamisessa, alatyypin tunnistamisessa ja pysyvän aksonivaurion laajuuden arvioimisessa; varhaisessa vaiheessa usein normaali, usein tarvitaan 2 tutkimusta 1–3 viikon välein
- 5. Hoito sairaalassa, jossa respiraattorihoitomahdollisuus
 - a. Hoitona ensisijaisesti IVIG 5. päivän ajan; plasmafereesi nykyään harvemmin käytetty vaihtoehto
 - i. Akuutissa muodossa ei anneta glukokortikoideja
 - ii. Fysioterapia ja tarvittaessa toiminta- ja puheterapia viimeistään halvauksen etenemisen pysähtyttyä
 - b. Tyypillinen taudinkulku: prodromaalivaihe (infektio tms.) → etenemisvaihe (oireet kehittyvät enimmillään 4 viikkoon asti) → stabiili vaihe (1–4 viikkoa) → toipumisvaihe (kuukausia). Suurin osa potilaista paranee lähes täysin 1-2 vuodessa.
 - c. Kuolleisuus on n. 5%
- B. CIDP on taas hitaammin kehittyvä ja taudin aallonpohja saavutetaan vasta vähintään kahdeksan viikon kuluttua oireiden esille tulosta
 - 1. Ei seuraa infektiota yhtä selvästi kuin GBS ja laukaiseva etiologia epäselvempi (idiopaattinen yleensä); on myös GBS:ää harvinaisempi (CIDP vain n. 50 sairastunutta Suomessa)
 - 2. Taudinkulku on kahdella kolmasosalla aaltomainen ja lopuilla joko tasaisesti tai portaittain etenevä. Tämän piirteen vuoksi CIDP:tä on kutsuttu usein perifeerisen hermoston MS-taudiksi
 - 3. Tyypillisesti symmetrinen heikkous proksimaalisissa ja distaalisissa raajalihaksissa
 - 4. Kortikosteroidit (yleensä monia kuukausia) tunnetuin ensilinjan hoito, IVIG noussut myös rinnalle; plasmafereesi vaikeissa tapauksissa

- a. Usein vaatii säännöllistä hoitoa remission ylläpitämiseksi; vain 40%:lla remissio ilman lääkitystä

IV. SUBAKUUTTI SKLEROSOIVA PANENKEFALIITTI (SSPE)

- A. Progressiivinen aivojen yleistulehdus, joka ilmenee tuhkarokon jälkitautina tyypillisesti vasta vuosien kuluttua alkuperäisinfektiosta.
- B. Tuhkarokkoviruksen sinnikäs infektio johtaa neuronien ja oligodendrosyyttien degeneraatioon.
 - 1. Soluissa voidaan havaita virusinkluusioita.
- C. Ei tavata enää Suomessa rokotusohjelman takia.

V. PROGRESSIIVINEN MULTIFOKAALINEN LEUKOENKEFALOPATIA (PML)

- A. JC-viruksen aiheuttama aivojen valkeaa ainetta tuhoava sairaus, jossa keskushermoston oligodendrosyyttejä ja niiden tuottamaa myeliiniä tuhoutuu.
 - 1. N. puolella aikuisista on aikaisemman lapsena sairastetun oireettoman JC-virusinfektion merkinä JC-virusvasta-aineita.
 - 2. JC-virukset jäävät latentiksi oligodendrosyytteihin ja voi aktivoitua immunosuppressiivisessa tilassa (mm. AIDS, leukemia, lääkitys)
- B. Johtaa progressiivisiin neurologisiin oireisiin, jotka korreloivat demyelinaatioalueiden sijaintiin (mm. kognitiivisten kykyjen lasku, ataxia, näön puutteet, dementia) ja on usein fataali.

VI. SENTRAALINEN PONSIN MYELINOLYYSI (AIVOSILLAN MYELINOLYYSI)

- A. Aivosillan paikallista demyelinaatiota, joka johtuu hyponatremian nopeasta korjaamisesta.
 - 1. Lieväkin hyponatremian korjaus saattaa johtaa osmoottiseen myelinolyysiin, jos taustalla on gliasolujen energiansaantia häiritseviä tekijöitä, kuten aliravitseminen, krooninen alkoholismi ja/tai maksasairaus.
- B. Klassisesti ilmenee dysartriana ja dysfagiana (kortikobulaarisen radan häiriö), tetrapareesina (kortikospinaalisen radan vaurio) ja pahimmissa tapauksissa ”locked-in”-oireyhtymänä.

RAPPEUTTAVAT AIVOSAIRAUDET JA MUISTISAIRAUDET (DEMENTIA)

I. PERIAATTEET

- A. Rappeuttaville aivosairauksille yhteistä on hermosolujen etenevä rappeutuminen ja kuolema; muutokset esiintyvät sairaudelle ominaisilla harmaan aineen aivoalueilla.
 - 1. Hippokampuksen ja muun korteksin degeneraatio johtaa mm. muistin häiriöihin.
 - 2. Tyvitumakkeiden degeneraatio johtaa mm. häiriöihin liikkumisessa.
- B. Solunsisäiset tai solunulkoiset muuntuneiden proteiinien kertymät ovat yhteisiä suurimmalle osalle rappeuttavista aivosairauksista; toimivat eri sairauksien histologisina merkkeinä.

II. ALZHEIMERIN TAUTI (AD, AT)

- A. Yleisin ja parhaiten tunnettu dementiaa aiheuttava rappeuttava aivosairaus; n. 70% kaikista dementiapotilaista (Suomessa n. 70 000 sairasta).
 - 1. Yleensä tauti on satunnainen (98-99%); ikä sekä APOE:n E4-alleeli tärkeimmät riskitekijät.
 - a. Yleensä todetaan vasta yli 50-vuotiailla; n. 4-6% yli 65-vuotiaista ja jopa 15-30%:lla yli 80-vuotiaista.
 - b. APOE:n alleeli epsilon-2 toimii suojaavana tekijänä.

2. Periytyvä sairaus ilmenee aikaisemmin; autosomissa vallitsevasti ja toistaiseksi on tunnistettu kolme aiheuttavaa geenivirhettä: APP- sekä preseniliini 1- ja 2-geenien mutaatiot.

- a. Myös Downin oireyhtymä on yhteydessä aikaiseen Alzheimerin tautiin (<40v.).

- B. Sairaus etenee hitaasti ja tasaisesti; aiheuttaa oireita vaurioituneiden aivoalueiden mukaan tyypillisesti järjestyksellisesti.

1. Alkaa yleensä muistihäiriöillä (alkaa lyhytkestoisen muistin ongelmilla ja etenee pitkäkestoisen muistin ongelmiin)
 - a. Näin siis ns. amnestisessä muodossa, joka on yleisin (n. 85%) Alzheimerin taudin tyyppi
 - i. Varianttimuodoissa varhaisena oireena voi olla jokin muukin kuin muisti; esim. posteriorisessa variantissa hahmottamisen vaikeudet, frontaaliosessa variantissa käytösoireet/toiminnanohjauksen vaikeudet ja logopenisessä afasiassa/etenevässä afasiassa kielellisten toimintojen ongelmat (esim. vaikeus toistaa lauseita tai nimetä esineitä).
2. Muutokset persoonallisuudessa ja käytöksessä.
3. Toiminnanohjauksen vaikeutuminen ja sanahaku
4. Motorisen tai sensorisen toiminnan häiriöitä ei ilmene vasta kuin hyvin myöhäisessä vaiheessa (sensorinen ja näköaivokuori säilyvät).
5. Lopulta potilaista tulee mykkiä ja vuoteenomia; infektio (aspiraatiopneumonia) on tavallisin välitön kuolinsyy.

C. Morfologia

1. Makroskooppisesti voidaan havaita aivojen surkastumista ja harmaan aineen määrän pienenemistä.
 - a. Gyruukset kaventuneet, sulcuukset leventyneet ja ventriikkelit laajentuneet.
2. Olennaisimmat histopatologiset muutokset ovat beeta-amyloidin ja HF-taun kertyminen tiettyihin aivoalueisiin.
 - a. Beeta-amyloidi (A β -amyloidi) kertyy ja muodostaa neuriittiplakkeja soluvälitilaan.
 - i. Muodostuu amyloid precursor proteiinista (APP, kromosomissa 21) sen beta- ja gamma-pilkkoutuessa; normaali alfa-pilkkoutuminen johtaa nonpatogeeniseen peptidiin.
 - ii. Neuriittiplakkikertymät aiheuttavat tulehdusresponssin ympärilleen sekä voivat myös kertyä verisuonien ympärille heikentäen verenkiertoa ja lisäten verenvuodon riskiä. Häiritsevät myös viestivälitystä synapsiväleissä sekä katalysoivat taun aggregaatiota neurofibrillivyyhteiksi (tau trigger), mikä on sytotoksista.
 - b. Hyperfosforyloituneet taukertymät muodostavat neurofibrillivyyhtejä solunsisäisesti.
 - i. Tau on mikrotubuluksiin liittyvä proteiini ja hyperfosforyloituneessaan ei enää pysty stabiloimaan mikrotubuluksia, mikä aiheuttaa neuronien kuolemaa.

D. Diagnoosi ei ole poissulkudiagnoosi, vaan perustuu kliiniseen oirekuvaan ja tutkimuslöydöksiin.

1. Yksittäisistä tutkimuksista yleisin on aivojen magneettikuvaus, jossa jo varhaisessa vaiheessa havaitaan sisemmän ohimolohkon kuduskatoa.
 - a. PET-kuvauksilla voidaan tunnistaa proteiinikertymiä; toinen yleisesti käytetty biomarkeritutkimus on likvoranalyysi, jossa voidaan nähdä fosforyloituneen tau-proteiinin (myös yleensä kokonais-taun) suurentuminen ja/tai beeta-amyloidi 42:n pieneneminen
2. Diagnoosi voidaan varmistaa vasta autopsiassa.

E. Taudin kesto ensioireista kuolemaan on diagnoosi-ikästä riippuen n. 3-12 vuotta.

III. AIVOVERENKIERTOSAIRAUDEN MUISTISAIRAUS (VASKULAARINEN DEMENTIA)

- A. Kognitiivisita heikentymää, joka johtuu vaskulaarisesta taustasta; toiseksi yleisin dementoiva sairaus (n.10-20%)
- B. Keskeisimpiä aiheuttajia ovat pienten ja suurten suonten taudit; esiintyvät usein yhdessä.
 1. Pienten aivoverisuonten tauti (arterioskleroosi) liittyy hypertensioon ja johtaa erityisesti subkortikaalisiin lakunaarisiin infarkteihin ja valkean aineen muutoksiin (leukoaraioosi), mutta myös kortikaalisia mikroinfarkteja havaitaan.
 - a. Muistioireet ovat yleensä vähemmän korostuneita eikä taudin kehittyminen ole yhtä hyvin ennustettavissa kuin esim. AD:ssa.
 2. Suurten suonten taudit liittyvät aterotromboottisiin ja sydänperäisiin aivoinfarkteihin; vaurioittavat tyypillisesti aivokuorta.
- C. Hyvin iäkkäillä sekamuotoinen muistisairaus (AT+AVH) on hyvin tavallista.

IV. FRONTOTEMPORAALINEN LOBAARINEN DEGENERAAATIO (OTSA-OHIMOLOHKORAPPEUMAT, PICKIN RYHMÄ, FTLD)

- A. Otsa- ja ohimolohkoisin painottuvaa aivoatrofiaa; n. 10-15% dementiatapauksista.
- B. Kaksi tyypillistä oirekuva: otsalohkodementia (FTD) ja primaari etenevä afasia (kielelliset alatyytit)
 1. Otsalohkodementiassa oirekuva painottuu alussa käyttäytymisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen muutoksiin ennen muistihäiriöitä; tarkemmalta nimeltään onkin bvFTD (behavioral variant).
 - a. Esim. luonnollisen estyneisyyden väheneminen, apatia, sisäänpäin kääntyneisyys, sympatian/empatian kokemisen menetys, toistuva/stereotyyppinen/pakonomainen käyttäytyminen, hyperoraalisuus (pakonomainen tarve laittaa suuhun jotakin), ruokavalion muutokset
 - b. Usein myöhäisessä vaiheessa esiintyy parkinsonimaisia motorisia piirteitä
 2. Kielellisistä alatyypeistä voidaan vielä erottaa etenevä sujumaton afasia (NfvPPA), semanttinen dementia (svPPA) ja logopeeninen afasia (lvPPA).
 - a. Keskeinen (niin sairauden alkuvaiheessa kuin sairauden edetessä) kliininen oire on kielellinen vaikeus (afasia), joka on tärkein tekijä arkipäivän toimintojen vaikeutumisessa.
 - b. NfvPPA:ssa työläs puheentuotto, virheet puheessa, yksinkertaiset lauserakenteet, mahd. luku- ja kirjoitusvaikeuksia
 - c. SvPPA:ssa puhe sujuvaa mutta sisällöltään tyhjää, vaikeuksia nimeämisessä ja ymmärtämisessä

- d. Logopenisessa afasiassa puhe motorisesti vaivatonta, mutta vaikeuksia spontaanissa puheessa ja toistossa

- i. Tämä muoto on usein biologisesti Alzheimerin taudin epätyypillinen muoto

C. Alkavat usein suhteellisen nuorella iällä (n. 45-70v); usein (n. 30%) perinnöllisiä

D. Otsalohkodementia vaikuttaa olevan erityisen yleinen Suomessa, ja se näyttää liittyvän väestössämme rikastuneeseen C9orf72-geenin toistojaksopidentymän monistumaan

- 1. Histologisesti havaitaan alatyypistä riippuen erilaisia hermosoluihin kertyneitä patologistesti laskostuneita proteiineja (FTLD-TDP43 tässä mutaatiossa; yhteydessä myös ALS:ään ja sairaudet esiintyvätkin usein yhdessä (FTD-ALS)).

- a. Myös mm. FTLD-tau tavallinen (esim. Pickin taudissa Pickin kappaleet ovat tau-proteiinin kertymiä)

V. PARKINSONIN TAUTI (PD) JA LEWYNKAPPALETAUTI

A. Yleinen hermoston rappeumasairaus, n. 15 000 potilasta Suomessa.

- 1. Yleensä sporadinen ja yli 60-vuotiailla.

B. Parkinsonin taudissa neuronien menetys keskittyy mustan tumakkeen (substantia nigra) dopaminergisiin neuronihin.

- 1. Striatumiin kulkeva nigrostriataalinen rata tarvitsee dopamiinia liikkeiden tuottamiseen.
- 2. Hermosoluja tuhoutuu myös muualla hermostossa, mikä aiheuttaa taudin ei-motoriset oireet.

C. Keskeisiä oireita ovat bradykinesia/akinesia, rigiditeetti, lepovapina ja tasapaino-ongelmat.

- 1. Tavallisin havaittu alkuoire on käden tai sormien lepovapina (katoaa liikkeessä).
- 2. Parkinsonin taudin muistisairaus on tyypillisesti pidemmälle edenneen taudin merkkejä ja ilmenee yli vuoden motoristen oireiden jälkeen.
- 3. Yleisimmät kuolinsyyt johtuvat etenevästä motorisen toiminnan laskusta; mm. aspiraatiopneumonia tai kaatumisesta johtuvat traumat.

D. Parkinsonin tauti kuuluu lewynkappaletaudin kanssa Lewyn kappale -tautiryhmään, jossa esiintyy muuntunutta alfasynukleiiniproteiinia (synukleopatia).

- 1. Histologisesti affisioituneissa neuroneissa havaitaan eosinofiilisia alfasynukleiinikertymiä eli Lewyn kappaleita.
- 2. Lewynkappaletaudissa Lewyn kappaleita havaitaan enemmänkin korteksissa sekä limbisen järjestelmän rakenteissa (mm. amygdala), minkä takia taudin oireisto alkaa kognitiivisen tason laskulla ja usein hallusinaatioilla; mukana usein myös parkinsonismia (motorisia oireita).
 - a. Dementia kehittyy alle vuodessa (vrt. parkinsonin taudin dementiassa oireisto alkaa parkinsonismilla ja vasta myöhemmin kognitiiviset oireet; ns. 1-year-rule).
 - b. Oirekuvalle on tyypillistä vireystilan ja kognitiivisen suorituskyvyn fluktuaatio; voi olla hyvinkin nopeaa vaihtelua

VI. HUNTINGTONIN TAUTI (HD)

A. Autosomissa vallitsevasti periytyvä striatumin GABAergisten neuronien degeneratiivinen tauti.

- 1. Striatumin nucleus caudatus ja putamen ovat tärkeitä liikkeiden säätelyssä.

2. Taudin aiheuttaa kromosomi 4:n CAG-trinukleotiditoistojaksogeenivirhe hungtintiiniproteiinia koodavassa geenissä.
 - a. Mitä enemmän toistojaksoja, sitä aikaisemmin alkava tauti.
 - i. CAG-alueen laajentumista tapahtuu spermatogeneesin aikana, joten isältä peritty HD voi johtaa lapsella aikaisemmin alkavaan tautimuotoon ("anticipation").
 - b. Keski-ikä diagnoosille on n. 40 vuotta.
- B. Oireilee ekstrapyramidaalisina liikerataoireina (tyypillisesti hallitsemattomat liikkeet eli korea), jotka etenevät dementiaan ja depressioon.
- C. Tauti on etenevä ja päättyy kuolemaan keskimäärin n. 15 vuodessa.
 1. N. 10% potilaista kuolee itsemurhaan.

VII. NORMAALIPAINEN HYDROKEFALIA (NPH)

- A. Muistioireiden parannettavia syitä ovat mm. masennus, metaboliset häiriöt (esim. hypotyreoosi), puutokset (esim. B12), normaalipaineinen hydrokefalia, subduraalihakematooma ja kasvaimet.
- B. NPH johtuu yleensä idiopaattisesta aivo-selkäydinnesteen imeytymishäiriöstä, mikä aiheuttaa ventrikkeleiden laajenemista.
 1. Sekundaarinen voi syntyä mm. lukinkalvonalaisen verenvuodon seurauksena.
- C. Oirekuva muodostuu klassisesti kolmesta komponentista: kävelyvaikeus (yleisin oire), virtsankarkailua ja muistin huononemisesta.
- D. Hoidetaan sunttileikkauksella (yleensä ventrikuloperitoneaalinen).

KESKUSHERMOSTON KASVAIMET

I. PERIAATTEET

- A. Keskuhermoston primaarisia kasvaimia ilmaantuu Suomessa n. 1000/v; valtaosa näistä on kallonsisäisiä (selkäytimen kasvaimia alle 100).
 1. Lapsilla toiseksi yleisin kasvaintyyppi; aikuisilla yhdeksänneksi yleisimpiä.
- B. Primaariset kasvaimet luokitellaan sen solun mukaan, josta sen arvellaan olevan lähtöisin (esim. glioomat eli astrosyytti-, oligodendrosyytti- tai ependymisoluperäiset).
- C. Lapsuusiän kasvaimet ilmenevät yleensä infratentoriaalisesti posteriorisessa fossassa.
 1. Yleisimmät kasvaintyyppit ovat glioomat, joista erityisesti pilosyyttinen astrosytooma, medulloblastooma ja ependyymooma; non-glioomista yleisin on kraniofaryngiooma.
- D. Aikuusiän kasvaimet ilmenevät yleensä supratentoriaalisesti.
 1. Yleisimmät kasvaintyyppit ovat glioomat (40%), joista astrosytoomat ja oligodendrogliooma sekä non-glioomista meningiooma (40%); hypofyysiadenoomia n. 10%, schwannoomia n. 8%, lymfoomia n. 4%.
- E. Etiologia on pääasiassa tuntematon
 1. Kallon alueen sädehoito (latenssi n. 10-30v, riski silti pieni 1-3%) välillä altistavana tekijänä
 2. Osa kasvaimista liittyy perinnöllisiin syndroomiin (neurofibromatoosi, tuberoosiskleroosi, Von Hippel-Linday, Li-Fraumenin oireyhtymä)
 3. Immunosuppressio ja immunologiset vajavuustilat (2-12% riski primaariin aivolymfoomaan)
- F. Erikoispiirteitä

1. Primaariset kallonsisäiset kasvaimet metastasoivat vain harvoin keskushermoston ulkopuolelle.
 - a. Toisaalta matala-asteisetkin tuumorit voivat koostaan, sijainnistaan ja infiltraatiostaan riippuen aiheuttaa ei-paikallistavia oireita (mm. epileptiset kohtaukset), paikallistavia oireita tai aiheuttaa kallonsisäisen paineen nousua.

2. Kasvaimilla ei ole morfologisesti selkeitä premaligneja tai in situ -vaiheita.

G. Intrakraniaalisista tuumoreista yleisin tyyppi on kuitenkin metastaasi; keuhko-, rinta- ja munuaissyövät sekä melanooma ovat yleisimmät primaariset kasvaimet aivometastaasille.

1. Ilmenevät yleensä multippeleina, hyvin erottuvina leesioina valkoisen ja harmaan aineen junktioalueella.

H. Aivokasvaimille ei ole spesifejä oireita, vaan oirekuvaan vaikuttaa kasvaimen koko, sijainti, kasvunopeus ja kasvutapa

1. Yleensä oireisto kehittyy hitaasti ja salakavalasti ja oirekuva on tavanomaisesti yhdistelmä erilaisia oireita
 - a. Mitä nopeakasvuisempi kasvain, sitä herkemmin kallonsisäinen paine kohoaa ja oireet pahenevat
 - i. Hyvänlaatuiset kasvaimet voivat edetä hitaasti vuosia ja silti aiheuttaa merkittävän aivokudoksen kompression ja hydrokefaluksen ilman voimakkaita oireita
2. Tyypillisin ensioire on epileptinen kohtaus (n. 30-50%:lla); aikuisiällä alkava paikallisalkuinen epilepsia johtuu aivokasvaimesta kunnes toisin todistettu
 - a. Muita ovat fokaaliset neurologiset oireet, kognitiiviset muutokset ja paineoireet (esim. aamu-/aamuyöpainotteinen päänsärky (jota yksiminen ja ponnistelu pahentaa)/pahoinvointi/oksentelu)
 - i. Suurin osa maligneista aivokasvaimista sijaitsee otsalohkojen alueella -> henkisen suorituskyvyn muutokset otsalohkon säätelyn häiriöiden takia
 - ii. Pääsärky ei lähes koskaan ainoa oire; mukana lähes aina jokin muukin ”punainen lippu”

I. Diagnostiikassa varjoainetehosteinen MRI (ja tarvittaessa lisäkuvantamisia ennen leikkausta) ja histologiset tutkimukset

1. Näytteet saadaan tavallisesti kasvaimen neurokirurgisen leikkauksen yhteydessä
2. Jos kasvain pieni ja syvällä tai riittävän resektion ei ajatella olevan mahdollista → stereotaktinen neulabiopsia porareian kautta

J. WHO-luokittelussa

1. Gradus I on benigni (ei infiltroi aivoa)
2. Gradus II on myös matala-asteinen, mutta voi levitä diffuusisti (ei yleensä luokitella benigniksi)
3. Gradus III ja IV ovat nopeasti kasvavia ja hyvinkin maligneja

II. AIKUISTEN ASTROSYTOOMAT

A. Astrosyyttien pahanlaatuisia kasvaimia; aikuisten yleisin aivokasvain.

1. Glioomiin kuuluu hyvänlaatuisia (pääasiassa lapsilla) ja pahanlaatuisia kasvaimia.

B. Voidaan jakaa IDH-mutantteihin ja IDH-wildtype (IDH-mutatoitumattomat) astrosytoomiin.

- C. IDH-wildtype astrozytome viittaavat glioblastoomiin (primaarinen glioblastoma multiforme), jotka ovat aikuisten yleisin aivokasvaintyyppi.
1. Ennuste kaikista astrozytoomista huonoin (gradus IV); hoidonkin kanssa keskimääräinen selviytymisaika on n. 15kk.
 - a. IDH-wildtype on aina gradus IV
- D. IDH-mutantit jaetaan histologisten piirteiden mukaan gradus-luokkiin II-IV (ennuste pahenee graduksen kasvaessa)
1. Gradus I ei ole olemassa
 2. Gradus II (aik. diffuusi astrozytoma)
 3. Gradus III (aik. anaplastinen astrozytoma)
 4. Gradus IV (aik. sekundaarinen glioblastoma, sGBM)
 - a. Eroaa primaarisesta glioblastoomasta (90% glioblastoomista); kehittyy matala-asteisemmasta astrozytoomasta.
 - b. Parempi ennuste kuin primaarisella glioblastoomalla (IDH on suotuisa ennusteellinen tekijä); mediaani elinaika on n. 3 vuotta.
- E. Makros- ja mikroskooppiset piirteet
1. Makroskooppisesti epätarkkarajaiset kasvaimet syntyvät toisessa aivopuoliskossa
 - a. Joskus gr IV-kasvaimet ylittävät corpus callosumin (butterfly glioma, perhosglioma).
 2. Glioblastoomat ja gradus 4 IDH-mutatoituneet astrozytomet (sGBM) ovat morfologialtaan samanlaisia; havaitaan nekroosialuita, joita ympäröi pseudopalisoiivat kasvainsolut ja endoteelisolukon proliferaatiota.
 3. Immunohistokemiallisesti ovat GFAP-positiivisia.

III. OLIGODENDROGLIOMA

- A. Oligodendrosyyteistä lähtöisin oleva pahanlaatuinen kasvain; toiseksi tavallisin aikuisten gliomaryhmä.
1. Yleensä WHO gr II tai gr III (anaplastinen oligodendroglioma)
 2. Oligodendrogliomissa on sekä IDH-mutaatio että 1p- ja 19q-kromosomien deleetiot
 - a. Jos 1p/19q-kodeleetio puuttuu, on kyseessä astrozytoma
 3. Ennuste on parempi oligodendrogliomissa kuin astrozytoomissa
- B. Makroskooppisesti ovat yleensä astrozytomia tarkkarajaisempia ja sisältävät kalkkiutumia; voidaan havaita kuvantamisessa yleensä frontaalilohkoissa.
1. Aiheuttaa tyypillisen lokalisaation takia usein epileptisiä kohtauksia (jopa >60-90%:lla)
- C. Histologisesti kasvainsoluissa havaitaan tumaa ympäröivä soluliman kirkastuma ("fried-egg") ja solut hakeutuvat hermosolujen ympärille ("satellitoosi"); hento kapillaariverkosto myös tyypillinen (chicken-wire)

IV. MENINGEOMA

- A. Araknoidean soluista peräisin oleva yleensä hyvänlaatuinen kasvain; aikuisten yleisin hyvänlaatuinen keskushermoston kasvain.
1. Naisilla selvästi yleisempi (3:1); suuressa osassa meningeomia on progesteronireseptoreita
 - a. Sukupuolen lisäksi aikaisempi sädehoito ja neurofibromatoosi 2 (NF2) -tauti voivat altistaa meningeomille
 2. Lapsilla ja nuorilla harvinaisia; viittaa neurofibromatoosi II:een (NF2)

- B. Makroskooppisesti on tarkkarajainen ja tiivis; yleensä kiinni kovassa aivokalvossa.
 - 1. Painaa korteksia ja voi aiheuttaa epileptisiä kohtauksia ja sijaintinsa mukaisia fokaalioireita.
 - a. Useimmiten kuitenkin oireettomia, koska kasvavat hitaasti; usein siis sattumalöydöksenä muista syistä otetussa CT- tai MRI-kuvantamisissa
 - 2. Eivät tyypillisesti invasoi korteksiin (ekstra-aksiaalisia)
- C. Histologisesti valtaosa meningeoomista ovat gradus I ja voidaan havaita normaalin aivokalvon soluilta näyttäviä kasvainsoluja pyörteisesti ryhmittyneenä: myös psammoomakappaleita havaitaan usein.

V. SCHWANNOOMA

- A. Aivo- ja ääreishermojen Schwannin soluista peräisin oleva hyvänlaatuinen kasvain; yleensä aikuisilla (kallonsisäisistä kasvaimista n. 10% ja selkäytimen kasvaimista n. 30%).
- B. Yleensä kallonsisäinen kasvain lähtee CN VIII:stä ja sijaitsee tällöin ponskulmassa.
 - 1. Aiheuttaa kuulonmenetystä ja tinnitusta (akustikusneurinooma).
 - 2. Jos ilmenee nuorella iällä ja/tai bilateraalisenä, taustalla saattaa olla perinnöllinen neurofibromatoosi 2 (NF2)-tauti.
- B. Immunohistokemiallisesti ovat S-100- ja kollageeni IV-positiivisia

VI. HEMANGIOBLASTOOMA

- A. Hyvänlaatuinen, hitaasti kasvava, tarkkarajainen mutta vahvasti suonittunut keskushermoston kasvain; verisuoniperäinen
 - 1. Useimmiten useimmiten 30–50 vuoden iässä (vain harvoin lapsilla tai >65-vuotiailla)
- B. Sporadisena lähes yksinomaan takakuopassa (usein myös selkäytimessä) -> aiheuttaa tasapainovaikeuksia ja ataksiaa, näköoireita ja hydrokefaluksen kehittyttä paineoireita
 - 1. Potilailla on usein myös polysytomia, koska hemangioblastooma erittää erytropoietiinia
- C. Potilaat tulee tutkia von Hippel–Lindaun taudin (VHL) varalta, jonka riski on noin 20 %; puhkeavat usein varhaisemmassa iässä kuin satunnaiset (sporaadiset) tapaukset
- D. Useimmiten liittyy kysta, jonka seinämässä on kasvainnappula(t)

VII. HYPOFYYSIADENOOMAT

- A. Aivolisäkkeen kasvaimista yleisimmät ovat etulohkon rauhassoluista lähtöisin olevia hyvänlaatuisia tuumoreita eli adenoomia; n. 10% primaareista CNS-kasvaimista
 - 1. Adenohypofyysin karsinoomat ovat hyvin harvinaisia.
- B. Voivat olla hormonaalisesti aktiivisia (n. 50-80%) tai inaktiivisia
 - 1. Yleisimpiä ovat prolaktinoomat, seuraavaksi kasvuhormonia tuottavat (somatotrooppiset), ACTH-erittävät (kortikotrooppiset) ja harvinaisemmin TSH-, LH- tai FSH-erittävät adenoomat
 - 2. Oireet riippuvat tuotetuista hormoneista ja massaefektistä
 - a. Adenoomat tietysti voivat aiheuttaa aivokasvaimien tyypillistä massavaikutuksia (esim. päänsärky), mutta erityisesti tulee pitää mielessä aivolisäkkeen vajaatoiminta (adenooma syrjäyttää normaalia kudosta) ja kiasmakompressio -> näkökenttäpuutos (bitemporaalinen hemianopia)
 - i. Yksi hätätila on pituitaarinen apopleksia (adenooman verenvuoto/infarkti), jolle on tyypillistä äkillinen ja voimakas päänsärky, näköhäiriöt, tajunnantason muutokset ja hormonaalinen

kollapsi (Addisonin kriisi, elektrolyyttihäiriöt); meningismusta usein (veri ärsyttää)

VIII. PRIMAARIT AIVOLYMFOOMAT

- A. Tyypillisesti immunosuppressioon ja immunologisiin vajavuustiloihin liittyviä B-solulyymfoomia (AIDS-defining illness)
 - 1. EBV-infektio on usein osallisena aivolyymfooman synnyssä
- B. Aivolyymfooma on lääke- ja sädeherkkä kasvain. Mikäli potilaan kunto sallii intensiivisen solunsalpaajahoidon (metotreksaatti) toteutuksen, hoidon tavoite voi olla kuraatio

IX. PILOSYYTTINEN ASTROSYTOOMA

- A. Astrosyyteistä lähtöisin oleva hyvänlaatuinen kasvain; lasten yleisin gliooma ja keskushermoston kasvain.
- B. Kuvantamisessa havaitaan solidi, hyvin erottuva kasvain, johon liittyy kystinen komponentti; sijoittuu yleensä takakuoppaan pikkuaivoihin, mutta voivat sijoittua myös hypothalamuksen tai optisen hermon alueelle.
- C. Histologisesti havaitaan tiiviisti pakkautuneita hiusmaisia (pilosyyttisiä) soluja, eosinofiilisiä Rosenthalin säikeitä ja eosinofiilisiä granulaarikappaleita.
 - 1. Kasvainsolut ovat GFAP-positiivisia.
- D. IDH-mutaatiot eivät liity pilosyyttisiin astrozytomaan; BRAF-mutaatiot yleisimpiä.

X. MEDULLOBLASTOOMA

- A. Pahanlaatuinen neuroektodermaalisoluista peräisin oleva pikkuaivojen tuumori, jossa havaitaan hermosolukon suuntaan tapahtuvaa erilaistumista; tavallisin embryonaalinen kasvain ja yleisin lasten CNS-maligniteetti
 - 1. Embryonaalisia kasvaimia voi muodostua myös muualla keskushermostossa ja erilaistua eri suuntaan.
- B. Mikroskooppisesti havaitaan pientä, niukkasytoplasmaista, primitiivisen näköistä solukkoa, jotka paikoin muodostavat ruusukemaisia rakenteita säikeisen ytimen ympärille (Homer-Wright-rosetti).
- C. Geneettisesti voidaan erottaa erilaisia alaluokkia, joiden ennuste vaihtelee.
 - 1. Taipumus levitä paikallisesti ja leptomeningeaalisesti (voi levitä jopa cauda equinaan asti; "drop metastasis").
 - 2. Poikkeuksena muista aivokasvaimista metastasointi keskushermoston ulkopuolelle on mahdollista, mutta harvinaista.

XI. EPENDYMOOMA

- A. Aivokammioita verhoavista ependymisoluista peräisin oleva pahanlaatuinen kasvain; yleensä lasten kasvain.
- B. Sijoittuu tavallisesti IV ventrikkeliin ja aiheuttaa usein hydrokefaluksen ja paineoireita.
- C. Histologisesti voidaan havaita pitkänomaisten kasvainsolujen kehämäistä ryhmittymistä verisuonten ympärille (perivaskulaarinen pseudorosetti).

XII. KRANIOFARYNGEOMA

- A. Hyvänlaatuinen Rathken taskun epiteelijäänteistä alkunsa saava kasvain.
 - 1. Kaksijakoinen potilaiden ikäjakauma: 5-14- ja yli 50-vuotiaat.
- B. Sijoittuvat yleensä samanaikaisesti sekä turkinsatulaan että sen yläpuolelle suprasellaaritilaan, josta se etenee paikallisesti.
 - 1. Havaitaan kuvantamisessa tiivisrakenteisina, mutta osittain kystisina ja kalkkeutuneina.

2. Näköoireet, adenohipofyyysin hormonimuutokset ja diabetes insipidus tavallisimpia oireita.
- C. Muistuttavat histologisesti hammasperäisiä tuumoreita; keratinisoituneita ja kalkkeutuneita levyepiteelisolusaarekkeita, joita ympäröi kehämäisesti lieriömäiset solut.

18 MUSKULOSKELETAALINEN PATOLOGIA

LUUSTO JA LUUN SAIRAUDET

I. KEHITYSHÄIRIÖT

- A. Luuston kehityshäiriöt ovat harvinaisia ja yleensä taustalla on geneettinen tautitila.
- B. Tavallisin geneettinen luuston synnynnäinen sairaus on osteogenesis imperfecta (synnynnäinen luutumisvajausta).
 1. Yleisin tyyppi (tyyppi 1) johtuu autosomissa vallitsevasti periytyvästä mutaatiosta alfa 1- ja alfa 2-kollageenisäiettä koodavassa geenissä, mikä johtaa kollageeni tyyppi 1:n synteesihäiriöön.
 2. Rakennemuutoksia löytyy kaikissa elimissä, joissa on kollageenin tyyppiä 1.
 - a. Tyypillistä on luukudoksen hauras, joka johtaa lukuisiin murtumiin jo lapsuusiässä.
 - b. Silmän kovakalvon sinisyys – Skleran kollageenin oheneminen paljastaa alla olevia laskimoita.
 - c. Kuulonmenetys – Välikorvan luut voivat murtua.
 3. Vaikeusaste voi vaihdella letaalista muodosta lieväoireiseen; riippuu mutaation sijainnista.
- C. Akondroplasia on tavallisin luuston rustoisen komponentin rakenteen ja kasvun häiriötila (kondrodysplasia) -> Johtaa endokondraalisen luun muodostumisen häiriöön.
 1. Johtuu aktivoivasta pistemutaatiosta fibroblastikasvutekijän reseptorin 3 (FGFR3) geenissä.
 - a. Valtaosa mutaatioista ovat sporadisia (>80%) ja muodostuvat spermatogeneesin aikana -> mutaatio saadaan tyypillisesti terveeltä isältä; yhteydessä korkeaan paternaaliseen ikään.
 - i. Kuitenkin 20% tapauksissa ainakin toinen vanhemmista on kääpiökasvuinen (mutaatio aiheuttaa sairautta autosomissa vallitsevasti ja penetraanssi on 100%; homotsygoottisuus on vastasyntyneelle fataalia).
 2. Sairastuneen lapsen vartalo on normaalipituinen, mutta raajojen proksimaaliosat ovat lyhyet ja pää on suhteettoman suuri (normaalikokoinen, mutta iso suhteessa raajiin).
 - a. Yleisin kääpiökasvuisuutta aiheuttava kehityshäiriö.
 - b. Älylliset toiminnot, fertiliteetti ja elinajanodote ovat normaalit.
- D. Osteopetroosi (marble bone disease) on harvinainen perinnöllinen luunkovettumistauti.
 1. Johtuu mutaatioista, jotka häiritsevät osteoklastien toimintaa ja aiheuttavat diffuusia vähentynyttä luun resorptiota.
 - a. Taudin vaikeusaste vaihtelee; autosomissa resessiivisesti periytyvä on vakavampi, lapsuudessa todettava ja usein fataali (pansytopenia), kun taas

autosomissa vallitsevasti periytyvä (Albers-Schönbergin tauti) on lievempi ja usein vasta aikuisuudessa diagnosoitu.

- b. Tyypit voidaan jakaa osteoklastien määrän mukaan kahtia.
 - i. Runsasosteoklastisessa muodossa osteoklastien toiminta on häiriintynyt, mutta erilaistuminen on normaalia; tavallisesti taudin taustalla on mutaatio luun resorptiossa tarvittavan hapon muodostamisessa (TCIRG1- tai CLCN7-geenissä tai CA2-entsyymissä)
 - ii. Niukkaosteoklastisessa muodossa osteoklastien erilaistuminen on puutteellista; tavallisesti taustalla on RANK- tai RANKL-mutaatio.

2. Taudinkuva

- a. Murtumaherkyys
- b. Luuytimen vajaatoiminta – anemia ja infektioalttius, hepatosplenomegalia
- c. Kallon hermokanavien ahtautuminen – Aivohermopinteet, näkö- ja kuulohäiröt
- d. Foramen magnumin ahtautuminen – Hydrokefalus
- e. Renaalinen tubulaarinen asidoosi – CA2-mutaation yhteydessä (autosomaalisesti resessiivinen ja vaikea tautimuoto).
 - i. Hiilihappoanhydraasin puute johtaa HCO_3^- :n vähentyneeseen tubulaariseen reabsorptioon munuaisissa ja aiheuttaa metabolista asidoosia.

II. OSTEOMALASIA JA RIISITAUTI

A. Luustomatriksin mineralisaatiohäiriö, mikä vähentää luiden vahvuutta.

- 1. Osteoblastit tuottavat luukudosta, joka mineralisoituu kalsiumin ja fosfaatin kanssa.

B. Tavallisin aiheuttaja on D-vitamiinin puutos.

- 1. D-vitamiinia saadaan ravinnosta sekä ihon syntetisoimana auringonvalolle (UVB) altistuessa.
 - a. Eläinperäisistä tuotteista (erityisesti kalasta ja keltuaisista) ja auringonvalosta saadaan kolekalsiferolia (D3), kun taas kasvikunnan tuotteista saadaan ergokalsiferolia (D2).
 - b. D3 on potentimpi muoto.
- 2. Maksa valmistaa D3-vitamiinista 25-hydroksivitamiini D3:a (kalsidioli), joka on D-vitamiinin varastomuoto.
- 3. Kalsidioli aktivoidaan munuaisten proksimaalisissa tubuluksissa 1-alfa-hydroksylaation kautta 1,25-dihydroksivitamiini D3:a (kalsitrioli), joka on D-vitamiinin aktiivinen muoto.
 - a. PTH ja matala seerumin kalsium-/fosfaattipitoisuus stimuloi tuotantoa.
 - i. Matala kalsium ja fosfaatti johtaa lisääntyneeseen PTH:n tuotantoon; PTH lisää myös RANK-L ilmentymistä osteoblasteissa ja siten lisää osteoklastien aktivaatiota ja luun resorptiota.
- 4. Kalsitrioli vaikuttaa suolistoon, munuaisiin ja luustoon; nostaa seerumin kalsiumin ja fosfaatin pitoisuuksia.
 - a. Suolisto – lisää kalsiumin ja fosfaatin absorptiota
 - b. Munuaiset – lisää kalsiumin ja fosfaatin reabsorptiota
 - c. Luusto – Lisää kalsiumin ja fosfaatin resorptiota

5. D-vitamiinin puutosta voi aiheuttaa mm. vähäinen UVB-altistuminen, heikko ruokavalio, imeytymishäiriöt tai maksan/munuaisten vajaatoiminta.
- C. Osteomalasia tarkoittaa aikuisten mineralisaatiohäiriötä.
 1. Ilmenee murtuma-alttiutena ja diffuusina luukipuna; laboratoriolöydöksiä ovat matala seerumin kalsium ja fosfaatti sekä korkea PTH ja AFOS.
- D. Lapsilla kehittyvässä luustossa ilmenevää mineralisaatiohäiriötä (tarkalleen ottaen kasvulevyjen tyypin II ruston mineralisaatiohäiriö) kutsutaan riisitaudiksi.
 1. Yleensä havaitaan alle 1-vuotiailla lapsilla tyypillisinä luuston kasvuhäiriöinä.
 - a. Pehmeä kallo ja otsan protrusio - kallon luut ohenevat ja aukileiden luutuminen hidastuu
 - b. Helminauhamuodostus kostokondraaliliitoksissa – ruston määrä suurenee luutumistumakkeissa
 - c. Harrisonin vaot ja kananrinta (pectus carinatum) – Pallealihaksen vetovaikutus kiinnityskohdissaan pehmeisiin kylkiluihin aiheuttaa rintakehän alaosaan molemminpuoliset sisäänvetäytymät samalla kun sternum työntyy ulos.
 - d. Murtuma-alttius ja kävelyiässä alaraajojen alaraajojen pitkien luiden taipumista (genu varum).

III. OSTEOPENIA JA OSTEOPOROOSI

- A. Osteopenia viittaa alentuneeseen luuntiheyteen ja osteoporoosi (luukato) tilaan, jossa osteopenian seurauksena murtumariski on huomattavasti suurentunut.
 1. Osteoporoosiksi luokitellaan lonkan tai lannerangan luuntiheys, joka on vähintään 2,5SD (n. 25%) 20-40-vuotiaiden naisten keskiarvoa pienempi.
 - a. Määritetään luun tiheyttä mittaavalla DXA-laitteella (Dual-energy X-ray absorptiometry).
 - b. Osteopeniassa luuntiheys on 1–2,5 SD pienempi kuin edellä mainittu luun huipputiheys ($-2,5 < T\text{-luku} < -1$)
 - i. On myös käytössä Z-luku (vertaa luuntiheyttä samanikäisiin), jota käytetään premenopausaalisilla naisilla ja alle 50-vuotiailla miehillä; Z-luku vähintään alle 2.0 SD samanikäisten keskitiheydestä viittaa sekundaariseen osteoporoosiin
 2. Luumassan väheneminen jättää luun huokoiseksi ja lisää sen murtumariskiä.
 - a. Vaikea osteoporoosi on tila, jossa osteoporoottiseen luun tiheyteen liittyy yksi tai useampia murtumia; Tiheysosteoporoosi on kyseessä silloin, kun potilaan luuntiheys on pienentynyt osteoporoottiselle tasolle ($T\text{-luku} \leq -2.5$), mutta hänellä ei ole ollut luunmurtumaa
- B. Luukudosta hajoaa ja syntyy jatkuvasti; riski osteoporoosille perustuu maksimaaliseen saavutettuun luumassaan ja sen jälkeisen menetyksen tahtiin.
 1. Kolmeenkymmeneen ikävuoteen asti luukudosta muodostuu enemmän kuin sitä hajoaa.
 - a. Ikävuodet 30-40 luuntiheys pysyy melko muuttumattomana; tämän jälkeen luumassaa menetetään keskiarvolta n. 0,7% vuodessa ja menopausissa kiihtyy vielä enemmän.
 - b. Maksimaaliseen luumassaan sekä luumassan menetykseen vaikuttaa perintö- että ympäristötekijät (mm. ravinto, liikunta).

- C. Osteoporoosi voidaan jakaa etiologian perusteella primaariseen ja sekundaariseen muotoon; primaarinen osteoporoosi on hyvin tavallinen tila (arviolta n. 350 000-400 000 henkilöllä Suomessa).
1. Primaarinen osteoporoosi voi olla menopausin jälkeistä (tyypin 1) tai seniiliä (tyypin 2, ikääntymiseen liittyvää).
 - a. Menopausin jälkeinen seerumin estrogeenipitoisuuden pieneneminen lisää osteoklastiaktiivisuutta ("high-turnover" osteoporosis).
 - i. Testosteronipitoisuuden pieneneminen miesten ikääntyessä on hitaampaa ja tasaisempaa, mikä takia luustomuutoksetkin ovat vähäisempiä.
 - b. Seniili osteoporoosi johtuu osteoblastien proliferaation ja biosynteettisen toiminnan heikentymisestä ("low-turnover" osteoporosis).
 2. Sekundaarinen osteoporoosi voi johtua mm. endokrinologisista tekijöistä (esim. hypertyreoosi, hyperparatyreoosi, hypogonadismi), lääkkeistä (pitkäaikainen glukokortikoidihoito), ravintotekijöistä tai kasvaimista.
- D. Potilas ei sinänsä "tunne" osteoporoosia; oireilee lievätraumaisina murtumina tyypillisesti painoa kannattelevilla/vastaanottavilla alueilla, kuten selkärangassa, lantiossa ja distaaliossa radiuksessa.
1. Selkärangan murtumat voivat johtaa pituuden menetystä ja muita rakennehäiriöitä, kuten lordoosia ja kyfoosia.
- E. Diagnoosi perustuu pääasiassa DXA-määritykseen ja murtumahistoriaan; murtumariskiä voidaan arvioida FRAX-laskurilla.
1. Röntgenkuvaus ei riitä osteoporoosin toteamiseen; näkyy vasta pitkälle edenneet muutokset ja murtumat (esim. nikamamurtumat; käytetään Genant-luokitusta).
 2. Laboratorioarvot eroavat osteomalasiasta: seerumin kalsium, fosfaatti, PTH ja AFOS ovat normaalit.
- F. Hoidossa tärkeintä on huolehtia riittävästä kalsiumin ja D-vitamiinin saannista sekä liikunnasta.
1. Bisfosfonaatit estävät osteoklastien aktiivisuutta ja lisäävät niiden apoptoosia; ovat tehokas lääkehoitomuoto.

IV. LUUN PAGETIN TAUTI (OSTEITIS DEFORMANS)

- A. Epäfysiologista luun remodellaatiota yhdessä tai useammassa luussa, mikä johtuu osteoklastien ja osteoblastien toiminnan epätasapainosta; yleensä oireita vasta yli 50-60-vuotiailla.
1. Polyostoottinen muoto on paljon yleisempi (n. 85%).
- B. Etiologia tuntematon; mahdollinen virusinfektion aikaansaama immunologinen reaktio.
1. Vahva geneettinen yhteys HLA- DQW 1.
- C. Luumutokset syntyvät kolmessa vaiheessa.
1. Kuuma vaihe – Luun hallitsematon resorptio (osteoklastinen/lyyttinen vaihe)
 2. Sekavaihe - Kompensatorinen luun uudismuodostus
 3. Kylmä vaihe – Resorptio lakkaa ja uudismuodostus jatkuu (osteoblastinen/skleroosivaihe)
 4. Lopulta luista tulee inaktiivisia, paksuja ja skleroottisia; murtuvat helposti.
 - a. Histologisesti normaali lamellaarinen luu on korvautunut "mosaiikkiluulla" (selkeät sementointilinjat).


D. Kliininen kuva ja diagnosointi

1. Ei alkuvaiheissa aiheuta vuosikausiin oireita.
2. Yleisin oire on luukipu taudin ilmenemisalueella – affisioituneiden luiden mikromurtumat ja hermopinteet aiheuttavat luukipua; tyyppipaikkoja ovat runsaasti painoa kannattelevat luut (selkäranka, lantio, femur ja tibia) ja kallo.
 - a. Mikromurtumat voivat myös johtaa mm. kyfoosiin ja alaraajojen taipumiseen.
3. Pään koon kasvu – kallo on taudin yksi tyyppipaikoista; potilas saattaa havaita hattujen olevan normaalia tiukempia ja pään suorana pitämisen vaikeana (kallo painaa liikaa)
4. Kuulonmenetys – CNVIII hermopinne
 - a. Harvoin jopa näönmenetystä
5. Leontiasis ossea – kasvoluiden affisioituminen aiheuttaa leijonamaiset kasvot
6. Yksi komplikaatio on high-output-tyyppinen sydämen vajaatoiminta johtuen
 - a. Pagetin tauti -> liiallinen luun remodelaatio -> lisääntynyt verenkierron ja hapen tarve -> uudet verisuonet -> AV-suntit -> systeemisen vastuksen väheneminen -> kompensatorinen vaste tavoitteena ylläpitää systeemisen verenpaine -> lisääntynyt minuuttitilavuus (CO) ja lisääntynyt laskimopaluu -> lopulta sydän väsyy -> korkean minuuttitilavuuden vajaatoiminta (high output heart failure)
7. Kohonnut P- AFOS, mutta normaali kalsium ja fosfaatti ja PTH; todetaan usein sattumalöydöksenä.
 - a. Diagnoosi varmistetaan röntgenkuvauksella
8. N. 1% potilaista kehittyä sekundaarinen osteosarkooma.

E. Hoidon kulmakivi ovat bisfosfonaatit.


V. OSTEOMYELIITTI

- A. Luukudoksessa että luuytimessä esiintyvä tulehdus; useimmiten infektiotauti.
- B. Tavallisimmin bakteeri-infektioita; leviävät joko verenkierron kautta, viereisen infektoituneen kudoksen kautta tai suoraan luuhun avomurtumassa.
 1. Muuten terveillä lapsilla yleisin tapa on transientin bakteremian yhteydessä hematologeeninen leviäminen
 2. Aikuisilla yleisin tapa on leviäminen viereisestä kudoksesta (nuorilla aikuisilla avomurtuma tai kirurginen leikkaushaava; vanhemmilla painehaavat)
 - a. Esim. diabeetikkojen jalkainfektioissa havaitaan usein jalkaterän luiden osteomyeliittiä.
 3. Kehittyy yleensä pitkien luiden metafyysialueille (veri virtaa hitaasti)
 - a. Lapsilla luun kuori on vielä ohut ja luukalvo löyhä, minkä vuoksi infektio leviää usein lateraalisuuntaan
 - b. Nuorilla ja aikuisilla osteomyeliitti pysyy pitkään diafyysin prosessina ja leviää ympäristöön yhä harvemmin



Kuva 1. Diafyysin (osteomyeliitin mielipaikka) ja epifyysin verenkierrolliset olosuhteet vaihtelevat eri ikäkausina, mikä osaltaan selittää taudin osittain erilaista käyttäytymistä lapsilla ja aikuisilla.

- c.
- C. Yleisin aiheuttaja on *S. aureus* (80-90%); toiseksi yleisimpiä ovat streptokokit (erityisesti neonataali-ikässä).
1. Tuberkuloosiosteomyeliitti on Suomessa hyvin harvinainen; yleensä affisioi selkärankaa (Pottin tauti).
 2. Sirppisolutautisilla *Salmonella* spp.
- D. Tulehdukset voivat olla akuutteja tai kroonisia.
1. Akuutti oireilee bakteremian tapaan (mm. korkea kuume, pahoinvointi ja luukipuna, joka johtuu luukalvon turvotuksesta).
 2. Taudin kroonistuessa luun sisään muodostuu nekroottinen tulehduspesäke (sequestrum) ja sen ympärille reaktiivisesti säännötöntä uutta luuta (involocrum).
 - a. Sekvesteri on avaskulaarinen -> antibiootit eivät pääse alueelle
 - b. Periostin repeäminen voi johtaa ympäröiviin kudoksiin muodostuvaan abskessiin, joka voi kanavoitua iholle (draining sinus).
 - i. Sequestrum voi hajota, jolloin sen fragmentteja kulkee sinusta pitkin.



3. Havaitaan röntgenkuvauksessa tummana alueena ja ympäröivänä skleroosina 2-3vk. tulehduksen alkamisesta, TT ja MRI n. viikkoa aikaisemmin.
 - a. MRI on spesifisin ja sensitiivisin.
4. Bakteeri löydetään yleensä verestä hyvin harvoin kroonisessa vaiheessa; bakteeriviljelyä varten otetaan joko neulapunktionäyte tai luupala leikkauksella tulehduskohdasta (kultastandardi).

VI. AVASKULAARINEN NEKROOSI (OSTEONEKROOSI)

- A. Luun verenkierron häiriöstä johtuva luun infarkti.
- B. Johtuu mm. verisuonten vauriosta (esim. trauma murtumassa, vaskuliitti), lääkkeistä (esim. kortikosteroidit), sirppisoluanemiasta tai sukeltajantaudista.
- C. Oireet riippuvat infarktin sijainnista ja vakavuudesta; yleisin affisioitunut luu on femurin pää.
 1. Ilmenee yleensä aluksi kipuna rasituksen alaisena, mutta voi edetä jopa lepokipuun.
 2. Subkondraaliset infarktit usein johtavat luun tuhoutumisen reisiluun pään romahtamiseen ja sitä kautta nivelen deformaatioon ja lopulta sekundaariseen osteoartriittiin

LUUKASVAIMET

I. PERIAATTEET

- A. Luuston primaariset kasvaimet ovat harvinaisia; varsinkin malignit ovat harvinaisia (alle 1% kaikista kehon maligniteeteista ja yleensä todetaan lapsilla tai nuorilla) ja hyvänlaatuiset ovat n. 100x yleisempiä
 1. Luuhun levinneet metastaasit ovat paljon yleisempiä; tavallisimpia ovat rintasyöpä, eturauhassyöpä, keuhkosyöpä ja munuaissyöpä.

- a. Johtavat useimmiten osteolyyttisiin leesioihin (luuta tuhoavia), mutta ilmeneminen vaihtelee; esim. eturauhassyöpämetastaasit ovat klassisesti osteoblastisia eli luuta muodostavia
- B. Primaariset kasvaimet voidaan luokitella luuta muodostaviin, rustoa muodostaviin ja muihin kasvaimiin.
 1. Luuta muodostavat ovat esimerkiksi osteooma, osteoidi osteooma, osteoblastooma ja osteosarkooma.
 2. Rustoa muodostavat ovat esimerkiksi osteokondrooma, kondrooma ja kondrosarkooma
 3. Muita kasvaimia, jotka eivät muodosta luuta eivätkä rustoa, ovat esimerkiksi jättisolukasvain, Ewingin sarkooma ja aneurysmaattinen luukysta.
- C. Yleisimmät hoidon haun syyt ovat kipu, turvotus ja kyhmy luussa; voi myös ilmentyä patologisena murtumana (paikallinen luun heikentyminen ja sen takia syntynyt murtuma)
 1. Otetaan rtg-kuva herkästi (ensisijainen kuvantaminen) ja sen jälkeen voidaan miettiä tarvitaanko jatkokuvantamista
 - a. Jos muutos vaatii jatkotutkimuksia, tehdään kiireellinen lähete luutumorityöryhmään

II. OSTEOOMA

- A. Benigni luuta muodostava tuumori; klassisesti hidaskasvuinen ja oireeton massa kallossa tai leuassa.
 1. Tavataan useimmiten keski-iässä
- B. Yhteydessä familiaaliseen adenomatoottiseen polypoosiin ja on silloin osa Gardnerin oireyhtymää.

III. OSTEOIDI OSTEOOMA

- A. Benigni luuta muodostava tuumori; koostuu osteoidia tuottavista osteoblasteista, joita ympäröi reaktiivisesti paksuuntunutta luuta.
- B. Tyypillisesti 10-25-vuotiailla; hieman tavallisempi pojilla.
- C. Tyyppilokalisatit ovat tibian ja femurin korteksi.
- D. Tavallisesti oireilee yöpainotteisena luukipuna; NSAIDit helpottavat (klassisesti aspiriini helpottaa -> asetyylisalisyylihappotesti).
- E. Todetaan radiologisesti pienenä (<2cm), pyöreänä massana, jolla on alitiheä (radiolusentti) keskiosa (nidus) ja sitä ympäröivä paksu skleroottinen alue.
 1. Diagnosointi voidaan useimmiten toteuttaa kliinisin ja radiologisin perustein ilman kudoksenäytteitä.
 2. Eroaa osteoblastoomasta, joka on yli 2cm kokoinen ja jonka aiheuttamaan kipuun aspiriini ei auta.
- F. Hoitona radiofrekvenssiablaatio tai uä-kuumennus (HIFU)

IV. OSTEOLASTOOMA

- A. Benigni/Intermediate osteoidin osteooman kaltainen tuumori, paikallisesti aggressiivisempi ja kasvaa suuremmaksi (>2cm)
 1. Ilmenee samoin nuorilla (alle 40v) ja hieman tavallisemmin miespuolisilla
- B. Missä tahansa luussa, mutta yleisimmin rangassa
- C. Radiologisesti todetaan lyyttinen alue, joka on suurempi kuin osteoidissa osteoomassa
 1. Diagnoosi vaatii tyypillisesti histologista varmistusta
- D. Hoitona useimmiten kirurginen resektio ja luuontelon täyttö; uusii harvoin

V. OSTEOSARKOOMA

- A. Maligni luuta muodostava osteoblasteista koostuva kasvain.
- B. Tavallisin maligni luukasvain (10-15 tapausta Suomessa vuosittain); yleensä nuorilla (5-20-vuotiailla) ja hieman tavallisemmin pojilla.
 - 1. Yli 40-vuotiailla hyvin harvinainen ja yleensä sekundaarinen toiselle tilalle (esim. krooninen osteomyeliitti, luuston Pagetin tauti tai sädehoito).
 - 2. Suurin osa sporadisia, mutta pieni osa tapauksista liittyy perinnöllisiin kasvainoireyhtymiin, kuten Li-Fraumenin oireyhtymään tai familiaaliseen retinoblastoomaan
- C. Tyypilokalisaatio on metafyysissä polven seudun alueella eli distaalisessa femurissa tai proksimaalisessa tibiassa; myös olkaluun proksimaaliosa.
- D. Oireilee progressiivisesti suurentuvana ja kivuliaana massana; harvoin patologinen murtuma on ensimmäinen oire.
- E. Radiologisesti todetaan suuri, infiltroiva ja ympäristöä tuhoava massa, joka usein työntyy korteksin läpi, nostaa periosteumia ja johtaa reaktiiviseen subperiosteaaliseen luun muodostukseen (Codmanin kolmio).
 - 1. Keskenmällä leesiota voidaan mahdollisesti havaita myös luukalvon kalkkiutumista säteittäin ("sunburst").
- F. Osteosarkoomaa epäiltäessä tulee ottaa kudoksenäyte; havaitaan atyyppisia kookkaita osteoblastin kaltaisia soluja ja epäkypsää osteoidia.
- G. Leikkaushoito ensisijaisesti; korkean maligniteetin kasvaimissa hoito alkaa solunsalpaajahoidolla, jonka jälkeen leikataan (ja vielä jatketaan solunsalpaajia)
 - 1. Ei reagoi sädehoitoon
 - 2. Osteosarkoomat ovat siis laaja heterogeeninen ryhmä maligniteettiasteeltaan vaihtelevia kasvaimia, ja hoito vaihtelee sen mukaan
- H. 5-vuotiselossaoloennuste n. 70% leviämättömillä ja n. alle 30% metastaattisessa taudissa.
 - 1. Metastasoi herkästi, yleensä keuhkoihin.

VI. OSTEOKONDROOMA (EKSOSTOOSI)

- A. Hyvänlaatuinen rustoa tuottava kasvain; yleisin luutumori.
 - 1. Yksittäiset osteokondroomat yleensä todetaan myöhäisnuoruudessa tai varhaisaikuisuudessa, kun taas multippelit (n. 15% tapauksista) johtuvat periytyvästä oireyhtymästä (MHE) ja ilmenee jo lapsuudessa.
- B. Koostuu useimmiten luusta muodostuneesta varresta (voi myös olla sessiili), jonka ulkoreunalla on rustoinen "hattu".
 - 1. Varsi lähtee kasvulevyn lateraaliosasta (metafyysi) ja on yhteydessä luuytimeen.
 - 2. Kasvu yleensä pysähtyy kasvulevyn umpeuduttua ja ajan myötä rustokudos voi kadota jättäen jälkeen eksostoosin ("luupiikki").
- C. Tyypilokalisaatio on reisiluun distaaliosa sekä sääri- ja olkaluun proksimaaliosa.
- D. Voivat harvoin malignisoitua (1%); rustokomponenttiin muodostuu kondrosarkooma.
- E. Hoitoa ei yleensä tarvita pienissä ja oireettomissa osteokondroomissa
 - 1. Kirurginen poisto kannattaa tehdä, jos kasvain aiheuttaa oireita tai liikerajoitusta tai kun harkitaan ennaltaehkäisevää poistoa, jos kasvain sijaitsee lantion tai raajojen yläosien alueella

VII. KONDROOMA

- A. Hyvänlaatuinen rustoa muodostava kasvain.
- B. Tavataan usein röntgentutkimuksissa sattumalöydöksenä käden ja jalan pienissä luissa.
 - 1. Useimmiten peräisin luiden medullasta ja sijaitsevat kokonaan luun sisäpuolella (enkondrooma).
- C. Harvinaisessa Ollierin taudissa voi muodostua lukuisia enkondroomia (enkondromatoosi); taipumus pahinlaatuistua kondrosarkoomaksi.
 - 1. Maffuccin syndroomassa tavataan enkondromatoosin lisäksi pehmytkudoksen hemangioomia; lisää myös riskiä muille neoplasioille, kuten aivojen gliomille.
- D. Hoitona käden alueella tyypillisesti leikkaus kasvutaipumuksen ja murtuma-alttiuden takia; muualla ei vaadi hoitoa tai seurantaa tyypillisesti

VIII. KONDROBLASTOOMA

- A. Harvinainen, paikallisesti aggressiivinen rustoa muodostava kasvain
 - 1. Kuvattu keuhkometastaaseja kuitenkin harvoin (samanlainen juttu kuin osteoblastooma, joka periaatteessa voi hyvin harvoin metastasoida, vaikka on yleensä luokiteltu benigniksi)
- B. Esiintyy ensisijaisesti lapsilla epifyysialueella
- C. Hoito on aktiivisen kasvun takia muutoksen kauhaus ja täyttö
 - 1. Pienet kasvaimet mahdollisesti termoablaatiolla

IX. KONDROSARKOOMA

- A. Pahanlaatuinen rustoa muodostava kasvain; toiseksi yleisin pahanlaatuinen luukasvain.
 - 1. Ilmaantuu yleensä keski-ikäen jälkeen; yleisemmin miehillä.
- B. Ilmaantuu progressiivisesti kasvavana ja kivuliaana massana tavallisesti aksiaaliseen luurankoon, erityisesti lantioon ja lonkkaan, kylkiluihin tai olkapään seutuun.
 - 1. Tyypillisesti medullassa (sentraalinen kondrosarkooma); harvoin luun pinnalla (perifeerinen), jolloin yleensä lähtöisin eksostoosin rustohatun malignisoitumisesta
- C. Sijainti ja gradus määrittää ennusteen; 5-vuotisennuste vaihtelee 80%:sta (Gradus I; metastasoi harvoin, mutta on paikallisesti aggressiivinen) n. 40%:iin (Gradus III).
 - 1. Gradus 3 -kasvaimista n. 70% metastasoi hematogeenisesti pääasiassa keuhkoihin.

X. JÄTTISOLUKASVAIN (OSTEOKLASTOOMA)

- A. Paikallisesti aggressiivinen luukasvain; histologisesti hyvänlaatuinen, mutta metastasointipotentiaalia (n.4% metastasoi keuhkoihin). Usein luokitellaan intermediate-kasvaimeksi
 - 1. Ilmaantuu lähes ainoastaan aikuisilla kasvulevyn sulkeuduttua, yleensä 20-40-vuotiailla ja hieman useammin naisilla.
- B. Koostuu mononukleaarista tuumorisolukosta ja reaktiivisista monitumaisista osteoklastityypeistä jättisolusta
 - 1. Kasvainsolut ekspressoivat runsaasti RANKL-geeniä ja aktivoivat osteoklasteja; tuumori syövyttää kasvaessaan luun korteksin ja leviää luun pehmytkudoksiin.
- C. Tyypilokalisaatio on pitkien putkiluiden epifyysialueella, erityisesti distaaliossa femurissa ja tibian proksimaaliossa.
- D. Erotusdiagnoosissa tulee huomioida mm. aneurysmaattinen luukysta ja hyperparatyreoosiin liittyvä brown tumor, jonka radiologinen ja histologinen kuva muistuttaa jättisolukasvainta.
 - 1. Diagnoosi vaatii siis aina magneettikuvauksen ja koepalan (tai leikkauksenaikaisen jääleikkeen)

E. Hoidetaan paikallisesti kirurgisesti, mutta n. 25-60% kasvaimista uusiutuu.

XI. EWINGIN SARKOOMA

A. Pahanlaatuinen alkeellisista neuroektodermaalisista soluista peräisin oleva luukasvain; toiseksi yleisin lasten maligni luutumori osteosarkooman jälkeen.

1. Tavataan yleensä 5-20-vuotiailla ja hieman tavallisemmin pojilla.
2. Tyypillistä on kipu, turvotus, kuume ja tulehdusarvojen nousu; natiivikuva voi usein olla petollisen normaali
 - a. Nuoren ihmisen ilman syytä ilmaantuva osteomyeliitti on Ewingin sarkooma, kunnes toisin todistetaan

B. Tyypilokalisatio on pitkien luiden (erityisesti humerus) diafyysissä tai pelviksessä.

1. N. 20% esiintyy pehmytkudostuumorina (ekstrasketaalinen).

C. Histologisesti havaitaan niukkasytoplasmaisia soluja, joilla on pyöreä tummasti värjäytyvä hyperkromaattinen tuma ("pienien pyöreiden sinisten solujen kasvain"); muistuttaa mm. lymfoomia.

1. Diagnostiikan apuna käytetään immunohistokemiaa ja molekyylogeneettisiä tutkimuksia (ei ole lymfoomalle tyypillisiä merkkiaineita).
2. N. 85% kasvaimista havaitaan t(11;22) translokaatio, joka johtaa EWSR1- ja FLI1-geenien fuusioon ja kontrolloimattomaan solunjakautumiseen.

D. Hoitona solunsalpaajahoito + paikallinen poisto (ja vielä perään solunsalpaajahoidot).

E. Ennuste on parantunut merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana ja nykyisin 5-vuotisennuste on 60-70% ja metastasoituneissakin jopa 25-30%.

XII. ANEURYSMAALINEN LUUKYSTÄ (ABC)

A. Hyvänlaatuinen, monilokeroinen verta sisältävä leesio.

1. Ilmenee yleensä elämän ensimmäisenä kahtena vuosikymmenenä.

B. Tyypilokalisatio pitkien luiden (femur ja tibia) metafyyssissä tai nikamien posteriorisissa osissa.

C. Voi olla primaarinen (yleensä USP6-translokaatio) tai sekundaarinen toiselle luukasvaimelle.

D. Hoidetaan kirurgisesti tai nykyään enemmän skleroterapialla (muutoksen sisään ruiskutetaan etoksisklerolia), mutta riski uusiutumiselle on n. 10-50%.

XIII. LUUKASVAIMEN KALTAISET MUUTOKSET

A. Luutumaton (nonossifying) fibrooma

1. Hyvänlaatuinen fibrogeeninen muutos, joka johtuu dysfunktionaalisesta ossifikaatiosta; mahdollisesti epänormaalia osteoklastista resorptiota subperiostealisesti metafyyssin remodeloitumisen aikana
2. Yleisin lasten tuumori (arviolta jopa 30-50% kaikista lapsista).
 - a. Häviää yleensä itsestään aikuisikään mennessä; ei siis vaadi selvityksiä, hoitoa tai jatkoseurantaa.
3. Tyypilokalisatio on metafyyssissä distaalisessa femurissa tai proksimaalisessa tibiassa.
 - a. Radiologisesti kuplamainen lyttinen leesio, jonka ympärillä näkyy skleroosireuna.

B. Fibroottinen dysplasia

1. Hyvänlaatuinen ei-neoplastinen luusairaus; luuta muodostavan mesenkyymien synnyttämä häiriö

- a. Ilmaantuu yleensä alle 20-vuotiaana ja muutosten kasvu päättyy murrosiän jälkeen.
2. Normaalialue luukudosta korvaa intramedullaarisesti fibroottinen sidekudos -> tekee luuta rakenteellisesti heikomman.
3. Voi olla mono- (yleisempi) tai polyostoottinen.
 - a. Polyostoottiseen muotoon voi liittyä endokrinologisia ongelmia (erityisesti varhainen murrosikä) ja maitokahviläiskiä iholla, jolloin sitä kutsutaan McCune-Albrightin syndroomaksi; johtuu GNAS-mutaatioista (koodaa Gs-proteiinien alfa-alayksikköä) aikaisessa embryogeneesissä (ei siis ole perinnöllinen).

NIVELTEN SAIRAUDET

I. PERIAATTEET

- A. Luiden välinen liitos; mahdollistavat liikkeen ja tukevat sekä suojaavat luita.
- B. Jaetaan kiinteisiin ja liikettä salliviin.
 1. Kiinteissä nivelissä ei ole nivelonteloa, vaan luut kiinnittyvät toisiinsa sidekudoksella; tuottavat rakenteellista tukea (esim. kallon luusaumat).
 2. Liikettä sallivilla nivelillä eli synoviaalinelillä on nivelontelo, joka sijaitsee luiden välissä ja sitä ympäröi nivelpussi, nivelsiteet sekä lihakset.
 - a. Nivelpussia verhoaa sisältä nivelkalvo (synovia), joka koostuu ohuesta hyaluronihappoa tuottavasta solukerroksesta.
 - b. Synovian alla on runsaasti veri- ja imusuonia, mutta itse nivelen luita suojaavassa lasirustossa ei ole verisuonitusta, jonka takia ruston paraneminen kestää pitkään.
 - i. Lasirusto koostuu vedestä, tyypin II kollageenista, proteoglykaaneista ja kondrosyyteistä.

II. OSTEOARTROOSI (NIVELRIKKO, OSTEOARTRIITTI)

- A. Nivelruston degeneratiivinen sairaus; nivelten yleisin sairaus ja yleistyy iän myötä (n. 40% yli 70-vuotiaista).
- B. Johtuu yleensä niveleen kohdistuvasta kulumasta ja rasituksesta; riskitekijöitä ovat mm. ikä, ylipaino, naissukupuoli ja raskas fyysinen työ.
 1. Harvinaisesti perinnöllistä nivelrikkoa voi esiintyä esim. tyypin II kollageenin mutaatioista johtuen.
- C. Klassisesti oireilee nivelen jäykkyytenä aamulla ja päivän mittaan jomottavan kivun pahenemisena.
 1. Esiintyy yleensä asymmetrisesti; eniten polvessa, lonkassa, selkärangassa ja käden nivelissä (DIP, PIP ja 1. CMC).
- D. Patogeneesi
 1. Nivelruston pinnan muutokset ja kollageenisäikeistön rikkoutuminen johtaa pienten rustopalasten irtoamiseen.
 2. Halkeamat paljastavat ruston alaista luuta, joka kuluu hangatessaan toiseen luuhun ilman ruston suojaa (kiillottuminen eli eburnaatio).
 3. Lopulta paljastuneesta luusta nousee uudisluun kasvun myötä luunokkia eli osteofyyttejä, jotka voivat aiheuttaa aristusta ja rajoittavat nivelen liikettä.

- a. Klassisesti havaitaan DIP-nivelissä Heberdenin kyhmyinä ja PIP-nivelissä Bouchardin kyhmyinä.

B. Hoidetaan tulehduskipulääkkeillä ja mahdollisesti intra-artikulaarisilla glukokortikoidi-injektioilla.

III. REUMATOIDI ARTRIITTI (NIVELREUMA)

A. Krooninen, autoimmuuniperäinen tulehdussairaus, joka pääosin keskittyy niveliin, mutta voi myös affisioida muita elimiä.

- 1. Suomessa n. 0,8% aikuisista (n. 2/3 naisia); voi alkaa missä tahansa iässä, mutta yleensä alkaa n. 30-70-vuotiaana (mutta voi alkaa minkä tahansa ikäisenä).
- 2. Yhteydessä mm. HLA-DRB1*04 (HLA- DR4) ja -DRB1*01 (HLA-DR1).

B. Ruston tyypin II kollageenin post-translationalinen muokkaantuminen on patogeneesin ytimessä.

- 1. T2 kollageenin arginiini korvautuu sitrulliinilla (sitrullinaatio) monissa tapauksissa normaalistikin, mutta kiihtyy erityisesti tulehduksessa PAD-entsyymien kautta (esim. tupakointi, bakteeri-infektiot) ja geneettisten tekijöiden takia.
- 2. Geneettisesti alttiilla ihmisellä (esim. HLA-DR4 tai HLA-DR1) antigeenia esittelevät solut eivät tunnista sitrullinoitua kollageeni 2:ta omaksi proteiiniksi -> fagosytoivat sen ja kulkevat imusolmukkeisiin esittelemään sitä.
- 3. Auttaja-T-solut stimuloituvat ja sitä kautta myös B-solut stimuloituvat tuottamaan autovasta-aineita syklisiä sitrullinoituja peptidejä vastaan (ACPA, CCPAb).
 - a. Vasta-aineita voidaan todeta jopa 15 vuotta ennen taudin oireita.
 - b. Muodostuu myös muita vasta-aineita, kuten reumatekijä (RF), joka on autovasta-aine IgG:n Fc-osaa vastaan.
 - i. RF ja IgG (tai sitrullinoituneen proteiinit) kompleksoituvat ja depositoituvat niveleen aiheuttaen tulehdusta.
 - ii. Ei ole spesifinen nivelreumalle
- 4. T-solut ja vasta-aineiden stimuloivat fagosyytit erittävät sytokiineja, mikä johtaa osteoklastien aktivaatioon, synoviumin proliferaatioon, angiogeneesiin ja proteaasien/kollagenaasien tuotantoon.
- 5. Johtaa krooniseen synoviittiin ja pannuksen muodostumiseen.
 - a. Pannus on synoviumin ödeeminen massa, joka koostuu pääasiassa fibroblastien ja tulehdussolujen muodostamasta granulaatiokudoksesta.
 - b. Nivelen rustopinta ja jopa luuta tuhoutuu
 - i. Lopulta tapahtuu luinen tai fibroottinen ankyloosi eli nivelpintojen yhdistyminen sidekudoksella/uudisluulla

B. Kliininen kuva

- 1. Oireilee nivelen jäykkyytenä aamulla, joka paranee päivän mittaan liikkuesssa (leposärky ei ole ominaista).
 - a. Esiintyy yleensä symmetrisesti; tyyppipaikat ovat käden PIP- tai MCP-nivelet (ei yleensä DIP-affisioitumista), ranteet, kyynärpäät, nilkat ja polvet.
 - i. Käden nivelten affisioituminen voi johtaa virheasentoihin, kuten joutsenkaula-(swan-neck deformity) tai napinläpivirheasentoihin (boutonnière deformity).
 - ii. Ranteen affisioituminen johtaa radiaalideviaatioon ja tämä vetää sormia ulnaarideviaatioon.

- iii. Voi affisioida myös kaularankaa (ei muuta rankaa), joka johtaa atlantoaksiaalisen nivelen yliikkuvuuteen ja subluksaatioon, joka voi kompressoida kaulaydintä -> mm. raajojen heikkous
 - b. Radiologisesti voidaan nähdä nivelen turvotusta, niveltilan kaventumista, ruston menetystä ja osteopeniaa.
- 2. Voi liittyä yleisoireilua: kuumeilu, väsymys, ruokahaluttomuus, laihtuminen...
- 3. Jopa 40% potilaista havaitaan myös ekstra-artikulaarisia leesioita.
 - a. Reumakyhmyt – pieniä hernemäisiä kyhmyjä; yleensä ihon alla ja joskus myös sisäelimissä.
 - i. Mikroskooppisesti muistuttavat nekrotisoivia granuloomia; keskustassa fibrinoidia nekroosia ja sitä ympäröi palisoivat epiteloidit histiosyytit.
 - b. Bakerin kysta – polvinivelen takainen bursan turpoamisesta johtuva synoviaalikysta
 - c. Keuhkosairaus – krooninen pleuriitti, johon liittyy effuusioita ja interstitiaalista keuhkofibroosia.
 - d. Vaskuliitti – voi affisioida useita elimiä
 - e. Silmät – Kuivat silmät, punoitus yms.
 - f. Feltyn oireyhtymä = nivelreuma + neutropenia + splenomegalia
 - g. Osteopenia/Osteoporoosi on merkittävästi yleisempää nivelreumassa kuin verrokkiväestöllä; johtuu jatkuvasta tulehduksesta, kortikosteroidihoidoista ja fyysisen liikunnan puutteesta
- C. Laboratoriolöydökset ja diagnosointi (seuraavat PTH, mutta epäilyssä aina lähete ESH)
 - 1. Lasko ja CRP voivat olla normaalit tai koholla
 - 2. Todetaan reumatekijä (RF) tai sitrulliivasta-aineita (CCP-va)
 - a. Seropositiivinen nivelreuma; seronegatiivisessa nivelreumassa näitä ei todeta (n. 30%).
 - b. Jos potilaalla on yksikin tulehtunut pikkunivel ja suurentuneet sitrulliiniptidivasta-aine(RF >3x)-pitoisuudet, nivelreuma on todennäköinen.
 - i. RF on epäspesifinen, mutta kuvastaa taudin aktiivisuutta.
 - ii. CCPAb on spesifisin nivelreuman markkeri
 - 3. Nivelneste samean keltaista ja siinä on runsaasti valkosoluja (>2000 x e6/l); negatiivinen bakteeriviljely.
- D. Hoidetaan akuutisti NSAID:eilla ja glukokortikoideilla, mutta pitkäaikaisessa hoidossa DMARD:it auttavat remission saavuttamisessa (perinteinen REKO-lääkeyhdistelmä, johon kuuluvat metotreksaatti, sulfasalatsiini, hydroksiklorokiini ja pieniannoksinen glukokortikoidi).

XIV. (SERONEGATIIVISET) SPONDYLOARTROPATIA/SPONDYLOARTRIITIT

- A. Ryhmä niveltulehdussairauksia, joihin kuuluvat aksiaalinen spondyloartriitti (axSpA), reaktiivinen artriitti (ReA), nivelpsoriaasi (PsA) ja IBD-assosioitunut artriitti (koliittiarttriitti, enteropaattinen artriitti)). Näiden lisäksi on luokittelematon perifeerinen spondyloartriitti.
 - 1. Käsité seronegatiivinen spondyloartriitti/-artropatia viittaa siihen, etteivät tämän ryhmän taudit kytkeydy reumafaktoriin tai sitrulliiniptidivasta-aineisiin eli näitä löydöksiä ei esiinny enempää kuin taustaväestössä

- a. Pienellä osalla potilaista siis saattaa olla RF; ei poissulje spondyloartriittia.
 2. Yhteistä taudeille on aksiaalisten nivelten affisioituminen (jotkut enemmän selkärankaa, jotkut enemmän SI-niveltä; ei tosin aina aksiaalista affisiota) ja assosiaatio HLA-B27-kudoantigeeniposiitivisuuteen.
 - a. Muita yhteisiä mahdollisia piirteitä ovat asymmetrinen niveltulehdus (usein asymmetrisesti alaraajoihin painottuva), entesiitit (jänteiden ja nivelsiteiden kiinnityskohtien tulehdukset), daktyliitit (makkarasormet ja -varpaat) ja ekstra-artikulaariset manifestaatiot (ihomanifestaatiot, suolistotulehdus, uveiitti).
 3. Oireilevat tulehduksellisten nivelsairauksien mukaisesti nivelten jäykkyytenä aamulla ja sen paranemisena liikkumisen myötä.
- B. AxSpA aiheuttaa pahenevaa niveltulehdusta SI-nivelissä ja selkärangassa.
1. Ensisijainen oire on alaselkäkipu; selkärangan affisioituminen voi johtaa nikamien luutumiseen toisiinsa kiinni (ankylosoiva) ja johtaa vaikeaan selän jäykistymiseen.
 - a. (Non-radiografinen) Aksiaalinen spondyloartriitti (AxSpA) ja selkärankareuma (ankylosoiva spondyliitti, AS) ovat saman taudin jatkumoa
 - i. Aksiaalisessa (non-radiografisessa) spondyloartriitissa (nr-axSpA) voidaan todeta sakroiliakaali (SI) -nivelten ja myös selkärangan tulehdusmuutoksia magneettikuvauksella
 - ii. Jos muutoksia todetaan jo röntgenkuvassa, on kyseessä selkärankareuma (AS, r-axSpA).
 - iii. Kaikki spondyloartriitin muodot voivat lopulta edetä ankylosoivaan spondyliittiin.
 2. N. 1/5 potilaista sairastuu myös silmän värikalvon tulehdukseen eli iriittiin (anteriorinen uveiitti) ja harvemmin sydänläppätulehdukseen.
- C. Reaktiivinen artriitti syntyy reaktiona edeltävälle (useimmiten 1-4vk) bakteeritulehdukselle, mutta nivelnesteen bakteeriviljely on negatiivinen.
1. Yleisimpiä aiheuttajia on GI-kanavan bakteeri (mm. Salmonella, Shigella, kampylobakteeri) ja Chlamydia trachomatis.
 2. Tyypillisin taudinkuva on nuoren aikuisen alaraajapainotteinen mono- tai oligoartriitti (useimmiten isojen nivelten tulehdus, mutta yläraajojen ja pienten nivelten tulehdukset eivät myöskään ole harvinaisia).
 - a. Reiterin tauti: iriitti (anteriorinen uveiitti), steriili uretriitti ja artriitti
- D. Nivelpsoriaasia esiintyy n. 5-7% psoriaasipotilaista.
1. Aksiaalisen luuston lisäksi tavataan usein myös sormien ja varpaiden DIP-nivelten tulehdusta (eroaa nivelreumasta, joka ei affisioi DIP-niveliä); havaitaan sormien ja varpainen makkaramaisuutena (daktyliitti) ja kynsimuutoksina.
 - a. Pelkkä aksiaalinen affisio on harvinaista (noin 5 %:lla nivelpsoriaasia sairastavista), sillä yleensä rankaoireisiin liittyy myös perifeerisiä nivel- tai jänneoireita
 - i. Usein ei ole aksiaalista affisioitumista (vain n. 25%-70% potilaista kehittyy aksiaalinen tauti).
 2. Jos PsA affisioi aksiaalisia niveliä (AxPsA), on tila vaikea erottaa AxSpA:sta, jossa psoriaasia

- a. AxSpA:ssa kuitenkin vahvempi HLA-B27-yhteys, vähemmän perifeeristä affisioitumista ja enemmän miehiä potilaina.
- E. Kroonisiin tulehduksellisiin suolisairauksiin (Crohnin tauti ja colitis ulcerosa) liittyy n. 10-20% potilaista selkärankareuma tai perifeerinen niveltulehdus.
 - 1. Tyypillisesti aksiaalisen luuston lisäksi alaraajojen suurissa ja keskisuurissa nivelissä.

IV. SEPTINEN ARTRIITTI

- A. Bakteerien aiheuttama niveltulehdus; yleensä vain yhdessä nivelessä (useimmiten polvinivel).
- B. Leviävät niveleen yleensä veriteitse; yleensä raju- ja yleisoireisia.
 - 1. Stafylokokki tai streptokokki haava- tai ihonfektioista tai endokardiitista
 - 2. Nuorilla aikuisilla gonokokki
- C. Todetaan punktoimalla nivelnestettä ja sen bakteeriviljelyllä.

V. KIIHTI (KIDEARTRIITIT)

- A. Nivelnesteseen ja synoviaan muodostuneiden kiteiden aiheuttama artriitti; tavallisin kideartriitti (n. 2-3% esiintyvyys).
 - 1. Yleisin ilmentymisikä on n. 30-60 vuotta
 - a. Tyypillisempää miehillä (80-90%); estrogeeni suojaa
 - i. Naisilla oireilee tyypillisesti vanhempana kuin miehillä (vaihdevuosien jälkeen)
 - 2. Kiteet koostuvat kristallisoituneesta mononatriumuraatista (MSU).
- B. Syntyy puriini metabolismen häiriön seurauksena, mikä johtaa hyperurikemiaan; voi olla primaarista tai sekundaarista.
 - 1. Uraatti on puriiniaineenvaihdunnan lopputuote ja se poistuu elimistöstä pääosin munuaisten kautta.
 - a. Hyperurikemia voi siis johtua joko virtsahapon tuotannon lisäyksestä tai sen erityksen vähenemisestä.
- C. Primaarisen kihdin etiologia on epäselvä; yleisempi muoto (90%).
- D. Kiihtiä kutsutaan sekundaariseksi, kun sen etiologia tunnetaan.
 - 1. Liikatuotanto – mm. tuumorilyysioireyhtymä, myeloproliferatiiviset häiriöt tai Lesch-Nyhanin oireyhtymä
 - a. Tuumorilyysioireyhtymässä spontaani tai syöpähoidon aiheuttama kasvainsolutuho (usein leukemian) johtaa hyperurikemiaan.
 - b. Myeloproliferatiivisessa häiriöissä solujen vaihtuvuus on kiihtynyttä ja lisää puriini metabolismä.
 - c. Lesch-Nyhanin oireyhtymä johtuu HGPRT-entsyymin perinnöllisestä puutoksesta, puriini metaboliitteja ei voida ottaa talteen puriinien uusiotuotantoa varten, vaan ne metaboloitetaan kaikki uraateiksi.
 - i. Oireilee myös psykomotorisesti: mm. liikehäiriöt, dysatria, älyllinen jälkeenhäiriöisyys ja pakonomainen itsensä vahingoittaminen.
 - 2. Erityksen väheneminen – mm. munuaisten vajaatoiminta, lääkkeet (esim. tiatsidit).
- E. Akuutti kiihtikohtaus syntyy, kun virtsahapon suoloja kiteytyy nivelen sisällä ja aiheuttaa akuutin inflammatorisen reaktion.
 - 1. Tyypillinen lokalisaatio isovarpaan tyvinivelessä (podagra); alkaa usein yöllä ja on hyvin kivulias.

2. Mm. runsas alkoholin juonti runsaslihaisen aterian yhteydessä tai infektiot voivat laukaista kihtikohtauksen.
 - a. Myös uraattitasojen nopea lasku voi laukaista akuutin kihdin.
- F. Kihti voi kroonistua äkillisten kohtausten toistuessa ja kristallien kertyessä jatkuvasti niveleen; nivelet ovat kipeät ja turvoksissa myös kohtausten välisenä aikana.
 1. Kiehtikyhyjä (toofeja) voi muodostua ihon alle; histologisesti koostuvat uraattikristallikertymistä, joita ympäröi jättisolureaktio ja fibroosi.
 2. Nefropatia – kristallit kertyvät tubuluksiin tai interstitiumiin; voi aiheuttaa uraattikiviä ja pyelonefriittiä
- G. Diagnoosi perustuu kipeästä nivelestä otetun nivelnesteen mikroskooppitutkimukseen.
 1. Todetaan neulamaisia kappaleita, jotka ovat polarisoivan valon alla negatiivisesti kahtaistaittavia.
 - a. Keltaisia samansuuntaisen valon alla, sinisiä kohtisuorassa valossa
- H. Valekihti (pseudogout) johtuu CPPD:n (kalsiumpyrofosfaattidihydraatti) kristallien kertymisestä ja havaitaan polarisoivan valon alla hieman positiivisesti kahtaistaittavina vinoina suunnikkaina.
 1. Yleisimmin sairastuu polvi, ranne, olkapää, kyynärpää tai nilkka (yläraaja siis usein affisoitunut, vrt. kihti).
 2. Altistavia tekijöitä ovat erityisesti hyperparatyreoosi ja hemokromatoosi; tulee poissulkea aina
 - a. Myös mm. hypomagnesemia ja hypofosfatemia altistavat

LUUSTOLIAKSEN SAIRAUDET

I. MYOSIITIT

- A. Harvinaisia tulehduksellisia myopatioita, jotka voidaan jakaa pääosin polymyosiittiin, dermatomyosiittiin ja inkluusiokappalemyosiittiin (on muitakin alatyyppejä, kuten antisyntetaasioireyhtymä, nekrotisoiva autoimmuunimyopatia ja ylimuotoinen myosiitti (overlap)).
 1. Yhteistä oirekuvassa on lihaskivut ja -väsymys, erityisesti bilateraalisesti proksimaalisissa lihaksissa.
 - a. Labroissa yhteistä on kohonnut kreatiinikinaasipitoisuus (CK)
 2. Etiologiat tuntemattomia
 3. Esiintymishuippu on 45-65 vuoden iässä, mutta voivat esiintyä myös lapsilla.
- B. Dermatomyosiitti
 1. Oirekuvalle tyypillistä ihomuutokset – silmien ympäristön heliotrooppinen ihottuma (silmäluomien ja -ympäristön sinipunertava ihottuma), Gottronin papulat (sinipunertavia näppylöitä mm. rystysillä, kyynärpäillä ja polvilla) ja Gottronin merkit (sinipunertavat laikut mm. rystysillä, kyynärpäillä ja polvilla).
 2. Laboratoriolöydöksiä
 - a. Seerumin kreatiinikinaasipitoisuus suuri ja ANA-vasta-aineet useimmiten positiivisia
 - i. ANA-tutkimus on kuitenkin liian epäherkkä myosiittivasta-aineiden osoittaja -> ei sovellu seulontatestiksi (käytetäänkin magneettitutkimusta ja ENMG-tutkimusta); diagnostiikan kulmakivi on lihasbiopsia ja luokittelussa/hoidon valinnassa/ennusteen

arvioinnissa käytetään myosiittispesifisiä ja -assosioituvia autovasta-aineita (S-MyosAb)

- b. Lihasbiopsiassa nähdään perifaskikulaarista atrofiaa ja perimysiaalista CD4+-T-solupainotteista inflammaatiota
- 3. N. 10–15 % aikuisten dermatomyosiiteista on paraneoplastisia (syöpäsairauteen liittyvä myosiitti, cancer-associated myositis, CAM)
 - a. Erityisesti rinta-, munasarja-, keuhko- ja eturauhassyövässä
 - b. Anti-TIF-gamma-vasta-ainepositiivisista aikuisista syöpäassosiaatio on 40–80 %:lla
 - i. Myös anti-NXP2-vasta-aineet ovat yhteydessä maligniteetteihin

C. Polymyosiitti

- 1. Kliinisesti muistuttaa dermatomyosiittia, mutta ihomuutokset eivät ole tyypillisiä oirekuvassa.
 - a. Lihasbiopsiassa nähdään endomysiaalista CD8+-T-solupainotteista inflammaatiota ja nekroottisia lihassyitä.
- 2. Nykyään polymyosiittidiagnoosia käytetään vain, jos potilaan myosiitti ei sovi mihinkään muuhun alaluokkaan

D. Inklusiokappalemyosiitti

- 1. Yleisin tulehduksellinen lihassairaus yli 45-vuotiailla.
- 2. Yleensä hyvin tunnistettava kliininen ilmiasu: alussa non-dominanttiin käteen painottuva asymmetrinen sormien kärkinivelten koukistusheikkous, nelipäisen reisilihaksen heikkous ja atrofia, sekä myöhemmässä vaiheessa nielemisvaikeudet
- 3. Lihasbiopsiassa havaitaan lihassoluissa degeneratiivisia reunusvakuoleja ja niistä erillisiä proteiinikertymiä, jotka usein sisältävät samoja proteiineja, kuin neurodegeneratiivisissa taudeissa.
 - a. Tulehdussolukko keskittyy ensisijaisesti lihassyiden ympärille (endomysiaalisesti)
- 4. Olematon vaste immunosuppressiivisille lääkkeille, toisin kuin muilla myosiiteillä.
 - a. Hoito on kuntouttavaa, eikä tällä hetkellä ole käytössä taudinkulkuun vaikuttavia lääkityksiä.

E. Antisyntetaasioireyhtymä (ASS)

- 1. Todetaan vasta-aineita, jotka targetoivat tRNA-syntetaasientsyymejä (yleisin on anti-Jo-1)
- 2. Potilaalla voi olla interstitiaalinen keuhkoparenkymisairaus, niveltulehduksia, Raynaud'n oireyhtymä sekä ns. ”mekaanikon kädet” eli kuivat, halkeilevat sormenpäät; dermatomyosiitti-ihottumat yleisiä

II. POLYMYALGIA RHEUMATICA (LIHASREUMA)

- A. Iän myötä yleistyvä lihasten tulehduksellinen reumasairaus; ei käytännössä esiinny alle 45-vuotiailla
- B. Tyypillisimpiä oireita ovat symmetrinen ylä- ja alaraajojen proksimaalisten suurten lihasten kipu ja jäykkyys, mutta ei heikkous (liikerajoitukset tyypillisiä kyllä)
 - 1. Kipu sekä jäykkyys tuntuvat erityisesti raajojen tyviosissa, kuten niska-hartiaseudulla, olkavarsissa, lantion alueella ja yläreisissä
 - 2. Tavallisesti oireet kehittyvät muutaman päivän kuluessa, mutta joskus sairaus kehittyy hitaammin muutaman viikon tai kuukauden kuluessa

3. Usein myös yleisoireita, kuten lämpöilyä, ruokahaluttomuutta ja jaksamattomuutta
- C. Yhteys jättisoluarteriittiin -> mahdollisuutta tulee tutkia anamneesin ja palpaation avulla
1. Jos jättisoluarteriitti niin viipymätön ESH-konsultaatio
- D. Diagnoosi on kliininen; labroissa mm. La ja CRP koholla (normaali CRP käytännössä poissulkee taudin), mutta P-CK normaali (lihaskivuista huolimatta kreatiniinikinaasin nousu ei kuulu polymyalgia rheumatican oireistoon)
1. Oireiden ja laboratoritutkimusten jälkeen tehdään hoitokoe glukokortikoidilla; hyvä vaste hoitokokeeseen tukee diagnoosia ja oikeuttaa hoidon jatkamisen
 2. Jos tulehdusarvot ovat normaalit, on polymyalgia rheumatica hyvin epätodennäköinen, eikä glukokortikoidihoitoa pidä aloittaa

III. LIHASDYSTROFIAT

- A. Perinnöllisiä eteneviä myopatioita, joissa lihassyty vaurioituvat ja korvautuvat rasva- ja sidekudoksella.
- B. Yleisin perinnöllinen lihasdystrofia on poikalasten dystrofinopatia (x-periytyvä), joka johtuu mutaatioista dystrofiinigeenissä.
1. Dystrofiinia tarvitaan lihaksen sytoskeletonin sitomiseen ekstrasellulaarimatriksiin.
 2. Suuri osa dystrofinopatioista on sporadisia, koska dystrofiini on suurin proteiinia koodaava ihmisgeeni (täten altis spontaaneille mutaatioille)
- C. Duchennen fenotyyppi (DMD) on dystrofinopatian vakavampi muoto (yleisempi); johtuu dystrofiinigeenin lukuraamin rikkovasta deleetiosta ja dystrofiinin lähes täydellisestä puutoksesta.
1. Ilmenee proksimaalisten lihasten heikkoutena jo 2-4 vuoden ikäisillä pojilla ja progressoi lopulta muihinkin lihaksiin.
 - a. Pohkeiden pseudohypertrofia tyypillistä.
 - b. Potilaat joutuvat pyörätuoliin n. 10-12-vuotiaina ja kuolevat hengityslihasten tai sydänlihaksen pettämiseen yleensä 20-30-vuotiaina.
 2. Seerumin kreatiinikinaasipitoisuus (ja ALAT) suurentunut heti syntymästä lähtien.
 3. DMD-related dilated cardiomyopathy (DCM) on yksi dystrofinopatia-alaluokka, jossa pääoire on sydänlihaksen korvautuminen, laajentuminen ja siten vajaatoiminta
- D. Beckerin muoto on paljon lievempi ja johtuu dystrofiinigeenin pistemutaatioista.
1. Ilmenee yleensä 5-15-vuotiailla, mutta voi ilmentyä paljon myöhemminkin; eliniänennuste on parempi, mutta on silti vain n. 50v
- E. Muita proksimaalisia lihasdystrofioita ovat mm. hartia-lantiorengas lihasdystrofia (limb-girdle muscular dystrophy, LGMD) ja kasvojen ja olkavarsihartiaseudun lihasdystrofia (engl. facioscapulohumeral muscular dystrophy, FSHD)
- F. Distaalisista myopatioista tavallisin on tibiaalinen lihasdystrofia (TMD); oireena on säärilihaksien lihasheikkous, joka ilmaantuu yleensä myöhäisessä keski-ikässä. Periytyy autosomissa vallitsevasti
- G. On vielä ns. myotonisia dystrofioita
1. Myotonia = viivästynyt lihasrelaksaatio lihasaktivaation jälkeen, mikä johtaa lihasjäykkyyteen ja vaikeuteen rentouttaa lihas
 - a. Liikkeellelähtö istuma-asennosta ylös on jäykkää, samoin sormien nopea nyrkistäminen. Kätellessä taas puristusote on pitkittynyt lihassupistuksen laukaisu vaikeuden vuoksi.

2. Myotonisissa dystrofioissa taudinkuvaan liittyy myotonian lisäksi lihaksen etenevä heikentyminen ja surkastuminen
3. Jaetaan kahteen tyyppiin: dystrofia myotonica tyyppi 1 ja 2 (DM1 (Steinertin tauti), DM2 (proksimaalinen myotoninen myopatia, PROMM, Rickerin syndrooma)).
 - a. DM-taudit ovat tavallisimpia aikuisiän neurogeneettisiä tauteja. Ne periytyvät autosomissa vallitsevasti.
 - i. Monielintauteja, joissa pelkkien poikkijuovaisten lihasten dystrofian ja myotonian lisäksi ilmenee useiden elinten oireita; esim. rytmihäiriöt, endokriiniset poikkeavuudet, ruoansulatuskanavan oireet, harmaakaihi...
 - b. DM1 diagnoosi yleensä ennen 30. ikävuotta ja DM2 taas 30 ikävuoden jälkeen
4. Kaikki myotoniasairaudet eivät ole dystrofisia; esim. myotonia congenita -taudissa esiintyy myotonia ilman lihasheikkoutta tai etenevään myopatiaan viittaavia poikkeavuuksia lihasbiopsiassa tai EMG-tutkimuksessa
 - a. Potilaat ovat usein varsin lihaksikkaita; elimistö tulkitsee pitkittyneen sähköisen lihasaktivaation harjoitteluksi ja lihas pyrkii mukautumaan lihasmassaa kasvattamalla
 - i. Heillä ei myöskään esiinny lihaskudoksen ulkopuolisia elinmanifestaatioita, päinvastoin kuin DM-taudeissa
 - b. Jäykkyys yleensä vähenee aktiviteetin jatkuessa (warm-up-phenomenon); toistuva liike saa osan natriumkanavista tilaan, jossa ne eivät heti laukea uudelleen -> laskee solukalvon herkkyttä "vääriin" sähköpurkauksiin
 - i. Yleensä kylmä pahentaa myotoniaoiretta
 - c. Myotonia congenitaa voidaan pitää tyypillisenä esimerkkinä ionikanavataudista
 - i. Myotonia congenita -taudin molempien muotojen (lievempi ja paljon harvinaisempi Thomsenin (AD) / yleisempi ja vakavampi Beckerin (AR)) tiedetään aiheutuvan lihassolukalvon kloridikanavan geenivirheistä jotka häiritsevät kloridi-ionien liikkumista kanavan läpi; lihaksen supistumisherkkyys lisääntyy
 - d. Muita lihasten ionikanavasairauksia (channelopathies) ovat mm.
 - i. Paramyotonia congenita (natriumkanavapatia; SCN4A-geeni); todettavissa paradoksaalinen myotonia eli toistuva liike pahentaa jäykkyyttä
 - ii. Hypokaleeminen periodinen paralyysi (kalsiumkanavapatia, joskus harvemmin natriumkanavapatia); lihasheikkous ja paralyysi hypokalemian yhteydessä (laukaisevana tekijänä esim. lihaskuormitus tai runsas hiilihydraattipitoinen ateria; insuliini -> hypokalemia)
 - iii. Hyperkaleeminen periodinen paralyysi (natriumkanavapatia); lihasheikkous ja paralyysi hyperkalemian yhteydessä (laukaisevana tekijänä esim. lepo treenin jälkeen tai kaliumin saanti ulkoisesti -> pieni ekstrasellulaarisen K⁺ lisääntyminen -> lievä

solukalvodepolarisaatio -> Na⁺ avautuvat, mutta sulkeutuminen
hidasta -> kalvon depolarisaation ylläpito Na⁺ virran takia -> paralyysi)

IV. MITOKONDRIOSAIRAUDET

- A. Mitokondriosairaudet ovat laaja ryhmä sairauksia, joille on tyypillistä mitokondrioiden toimintahäiriöt
 - 1. Energiantuotannon vaje -> usein laaja-alaisesti ongelmia runsaasti energiaa kuluttavissa kudoksissa, kuten lihaksissa (mitokondriomyopatia) ja neuroneissa
- B. Voivat olla sekä periytyviä, että aiheutua satunnaisista mutaatioista
 - 1. Eivät periydy ainoastaan äidiltä (suuri osa mitokondrioiden valkuaisista kooditetaan tuman geeneissä)
- C. Yksi yleisimmistä on MELAS-oireyhtymä = Mitochondrial myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis and Stroke
 - 1. Taudin ilmentyminen vaihtelee alle 2 ikävuodesta yli 60 vuoteen, vaikkakin suurin osa potilaista ilmentävät oireita jo 2 ja 20 ikävuoden välillä
 - 2. Tunnusmerkki on repaleiset lihassyvät (engl. ragged-red fibers, RRF); ei spesifinen MELAS:lle, vaan monissa mitokondriaalisissa enkefalopatioissa (esim. myös MERRF eli myoclonic epilepsy with ragged-red fibers)
 - a. RRF:t ovat kudoksen näytteen lihassyviä, jotka näkyvät värjäyksen jälkeen mikroskoopilla ”repaleisina”. Tämä johtuu epänormaalisti mitokondrioiden aggregaatiosta lihassolun sarkolemmaan, joka saa lihassolun muodon muuttumaan epäsäännölliseksi.
- D. Yleisimpänä usein pidetään Leberin perinnöllistä näköhermorappeumaa (LHON); nopeasti kehittyvä bilateraali näköhäiriö, joka etenee usein lähes sokeuteen (suurella osalla näkökyky heikkenee noin 10 prosenttiin normaalista); näkökyky mahdollisesti palautuu, mutta harvoin

HERMO-LIHASLIITOKSEN SAIRAUDET

I. MYASTHENIA GRAVIS

- A. Autoimmuunisairaus, joka johtuu yleensä vasta-aineista postsynaptisia asetyylikoliinireseptoreita vastaan hermo-lihasliitoksessa.
 - 1. Tavallisin hermo-lihasliitoksen tauti; Suomessa n. 1000 potilasta.
 - a. Bimodaalinen ikäjakauma: yleisin sairastumisikä n. 20-30 vuotta (suurin osa naisia); toinen tyypillinen ikä on n. 60-70 vuotta (suurin osa miehiä).
 - 2. AchR-vasta-aineita (S-AchR-Ab) löytyy n. 85% yleistynyttä ja noin 50 %:lta okulaarista MG:tä sairastavista.
 - 3. AChR-vasta-aineet (IgM ja/tai IgG) tuhoavat motorista päätelevyä komplementtijärjestelmän aktivaation kautta, nopeuttavat AChR:n sisäänottoa soluun ja hajottamista sekä inaktivoivat reseptoreita suoraan -> seurauksena hermosolusta vapautuneen ACh:n teho hermo-lihasliitoksessa vähentyy ja lihasaktiopotentiali syntyy hitaasti tai puuttuu.
- B. Kliininen kuva
 - 1. Lihashäikkous, joka lisääntyy käytössä ja paranee levon myötä; refleksit normaalit
 - a. Ensioireena tyypillisesti silmän alueen lihasten oireet (ptoosi ja diplopia).
 - b. Potilaat jaotellaan okulaarista tai yleistynyttä MG:tä sairastaviin.

- i. Yleistyneen MG:n yhteydessä lihasheikkoutta todetaan eniten niskan, hartia- ja lantioseudun proksimaalisissa lihaksissa.
 - ii. Silmäoirein alkanut taudinkuva kehittyy kahden vuoden kuluessa noin 50–60 %:lla yleistyneeksi MG:ksi.
2. Erityisesti aikaisemmin ilmaantuva muoto yhteydessä kateenkorvan hyperplasiaan ja myöhemmin ilmaantuva tymoomaan.
3. Antikolinesteraasit, immunosuppressio ja tymektomia ovat parantaneet ennustetta; yli 95% 5-vuotisennuste.
4. Oireet voivat joskus pahentua nopeasti (myasteeninen kriisi); usein infektion laukaisema
 - a. Hoitona plasmafereesi tai IVIG (tai i.v. metyyliprednisoloni); hengitystä on avustettava lihasheikkouden pahenemisen varalta herkästi

II. LAMBERT-EATONIN MYASTEENINEN OIREYHTYMÄ (LEMS)

- A. Autoimmuunisairaus, joka johtuu vasta-aineista presynaptisia kalsiumkanavia vastaan hermo-lihasliitoksessa.
 1. Estää asetyylikoliinin vapautumista synapsiin.
 2. Alkamisikä yleensä yli 40 vuotta.
 3. Paljon harvinaisempi kuin Myasthenia gravis; Suomessa n. 50 potilasta
- B. Syntyy usein paraneoplastisena oireyhtymänä (yleensä pienisoluinen keuhkokarsinoma).
- C. Kliininen kuva
 1. Proksimaalinen lihasheikkous, joka paranee käytössä; refleksit heikot lepotilassa
 - a. Silmän alueen lihakset yleensä säästyvät.
 2. Usein autonomisia oireita (eroaa myasteniasta)
 3. Ilman syöpää elinajan ennuste on normaali; keskimääräinen ennuste on kuitenkin paljon huonompi kuin MG:llä, sillä usein yhteydessä maligniteettiin.
 4. Antikoliiniesteraasit eivät läheskään yhtä hyviä kuin myastenia graviksessa (voidaan käyttää off-label); hoito perustuu 3, 4-diaminopyridiinifosfaattiin (DAP), immunosuppressioon ja mahdollisen kasvaimen poistoon.

PEHMYTKUDOKSEN KASVAIMET

I. PERIAATTEET

- A. Pehmytkudoksilla tarkoitetaan pääasiassa lihaksia, sidekudosta, hermoja, rasvaa ja verisuonia.
- B. Kasvaimet ovat täten pääasiassa mesenkymaalisia tuumoreita (kasvaimet peräisin erilaistumattomista kantasoluista); histologinen luokitus perustuu kasvainsolujen erilaistumiseen ja muotoon
- C. Pehmytkudoskasvaimet ovat paljon yleisemmin hyvänlaatuisia (n. 99%) kuin pahanlaatuisia ja taudinkulku on yleensä suotuisa.
 1. Pahanlaatuisten pehmytkudoskasvainten yhteisnimitys on sarkooma (sarkoomat jaetaan pehmytkudossarkoomiin ja luusarkoomiin); Suomessa yhteensä n. 200 uutta tapausta vuodessa.

II. LIPOOMA

- A. Normaaleista rasvasoluista koostuva hyvänlaatuinen kasvain; aikuisten yleisin pehmytkudoskasvain.
- B. Sijaitsevat yleensä ihonalaiskudoksessa vartalolla tai raajoissa.

C. Yleensä pieni (<5cm), liikkuva ja aritamaton.

1. Todennäköisyys pahanlaatuisuuteen kasvaa muutoksen koon ylittäessä 5 cm, erityisesti, jos muutos on faskian alla
2. Mikäli pehmytkudoskasvain on mobiili, pehmeä, hitaasti kasvanut, ihonalainen ja alle 5 cm:n läpimittainen, se on hyvin todennäköisesti hyvänlaatuinen -> voi poistaa kokonaisena perusterveydenhuollossa ja lähettää patologille histopatologiseen analyysiin
 - a. Jos kliinisesti poikkeava (ei mobiili, kova tai nopeasti kasvanut) -> kaikkokuvaus
 - b. Jos kliinisesti pahanlaatuinen (>5cm, kasvu nopeaa, ei mobiili, faskian alainen) -> lähete plastiikkakirurgille
 - i. MRI yleensä lisätutkimuksena esh:ssa (sarkooman poissulku)

D. Hibernooma on harvinainen ruskean rasvan suuntaan erilaistunut kasvain

III. LIPOSARKOOMA

A. Rasvakudoksesta koostuva pahanlaatuinen kasvain; aikuisten yleisin pahanlaatuinen pehmytkudoskasvain.

B. Usein pehmytkudossarkoomien epäilyssä MRI otetaan erikoissairaanhoidossa ja tarvittaessa paksuneulabiopsia MRI:n jälkeen.

1. Ohutneulabiopsiaa ei suositella pehmytkudoskasvainten diagnosointiin, koska sen solumäärä harvoin riittää diagnoosiin -> älä ota ultraäänellä tutkimastasi pehmytkudoskasvaimesta neulanäytettä.

C. Ennuste vaihtelee sijainnin ja histologisen alatyypin mukaan

1. Hyvin erilaistunut liposarkooma (atyyppinen lipomatoottinen tuumori) (40-50%) – paras ennuste
 - a. Raajojen kasvaimilla erittäin hyvä ennuste verrattuna vatsaontelon sisäisiin, jotka uusiutuvat ja kehittyvät huonompilaatuiseksi helpommin.
 - b. MDM2-yliekspressio yleistä.
2. Dedifferentioitunut liposarkooma (30%) – yleensä matala maligniteettiaste (20% korkea-asteista); voi kehittyä hyvin erilaistuneesta liposarkoomasta, tavallisimmin vatsaontelossa
 - a. Nähdään hyvin erilaistuneen komponentin lisäksi rasvasoluja sisältämättömiä alueita, jotka voivat muistuttaa fibrosarkoomaa tai erilaistumatonta sarkoomaa
 - b. MDM2-yliekspressio yleistä.
3. Myksoidi (liimautuva) liposarkooma (20-30%) – yleisimmin raajoissa
 - a. t(12;16) yleistä, johtaa FUS-DDIT3 fuusioproteiiniin
 - b. Termi pyörösoluinen liposarkooma viittaa aggressiiviseen myksoidin liposarkooman luokkaan; korkea-asteisilla myksoidilla liposarkoomilla ei kuitenkaan ole aina pyöreä muoto
4. Pleomorfinen liposarkooma (<10%) – aggressiivinen ja metastasoi usein; yleisimmin raajoissa

D. Yleisesti pehmytkudossarkoomien histologinen gradeeraus (I-III) toteutetaan erilaistumisen, mitoosien määrän ja nekroosin perusteella.

1. Stage (I-IV) määritetään graden, koon ja levinneisyyden perusteella.

IV. HYVÄNLAATUISET SIDEKUDOSKASVAIMET

A. Dermatofibrooma (fibroosi histiosytooma)

1. Hyvänlaatuinen, pinnallinen, ihon sidekudoskasvain
 - a. Koostuu proliferatiivisista fibroblasteista ja dermaalisista histiosyyteistä.
2. Tyypillisesti n. 5-15mm kokoisia pigmentoituneita/punaisia ja kiinteitä.
 - a. Yleisiä etenkin naisilla ja yleisimmin 20-50-vuotiailla; yleensä alaraajoissa, joskus yläraajoissa ja selässä.
3. Hyvänlaatuisena kasvaimena dermatofibroomaa ei tarvitse poistaa. Jos diagnoosi on epävarma, voi muutoksen poistaa syövän poissulkemiseksi.
4. Pahanlaatuinen dermatofibrosarcoma protuberans on dermiksestä lähtöisin oleva pehmytkudostuumori; yleisin esiintymisalue on vartalo, erityisesti rinnan ja hartian seutu
 - a. Ilmenee suhteellisen nuorilla, yleisimmin 20-50-vuotiailla

B. Nodulaari faskiitti

1. Hyvänlaatuinen, yleensä subkutikseen kehittyvä kasvain.
 - a. Koostuu fibroblastien ja myofibroblastien proliferaatiosta.
2. Tyypillisesti n. 1-3cm kokoisia, nopeasti kasvavia ja usein regressoituvat itsestään.
 - a. Yleisiä etenkin nuorilla naisilla yläraajoissa.
 - b. Usein traumataustaisia, mutta kuitenkin klonaalisia eivätkä reaktiivisia (t(17;22) johtaa MYH9-USP6-fuusiogeeniin).

C. Desmoidituumorit

1. Syvä, yleensä lihaksensisäinen tai suoliliepeessä sijaitseva fibromatoosi.
 - a. Pinnallisia fibromatooseja ovat mm. palmarinen (Dupuytrenin kontraktuura) ja plantaarinen fibromatoosi ja peniksen fibromatoosi (Pyeronien tauti).
2. Ilmenevät tyypillisesti naisilla myöhäisteini-ikästä n. 30-vuotiaaksi asti.
 - a. Yleensä sporadisia, mutta esiintyvät erityisesti perinnöllisten APC-mutaatioiden yhteydessä: Gardnerin oireyhtymä.
 - i. Sporadisissa beeta-kateniini-mutaatiot yleisimpiä.
3. Paikallisesti aggressiivisia ja vaikeasti poistettavissa.

D. Usein tässä yhteydessä mainitaan keloidi tuumori, mutta keloidi on ihoon muodostuneen arven liikakasvu eikä sinänsä neoplasiaa.

V. POIKKIJUOVAISEN LIHAKSEN KASVAIMET

A. Poiketen muista pehmytkudoskasvaimista, lähes kaikki poikkijuovaisen lihaksen kasvaimet ovat pahanlaatuisia.

B. Rabdomyooma

1. Erittäin harvinainen, hyvänlaatuinen kasvain.
2. Tuberoosiskleroosioireyhtymän yhteydessä voi esiintyä myokardiumissa sydämen rabdomyooma; yleensä lapsilla.

C. Rabdomyosarkooma

1. Maligni, poikkijuovaisen lihaksen suuntaan erilaistunut kasvain; lasten ja nuorten yleisin pahanlaatuinen pehmytkudoskasvain.
 - a. Histologinen tyyppipiirre on rabdomyoblastit, jotka ovat desmiiniposiitivisia.
2. Esiintyy tyypillisesti vähäluustolihaksisilla alueilla, kuten päässä ja niskassa, nenänielussa tai virtsateissa.

3. Sarcoma botryoides -tyypillä paras ennuste, kun taas pleomorfinen muoto esiintyy yleisimmin vanhemmalla aikuisiällä ja on huonoennusteinen.

VI. NEUROFIBROOMA

- A. Neurofibroomat ovat erityisesti iholla tavattavia hyvänlaatuisia kasvaimia; etenkin nuorilla aikuisilla.
 1. Koostuvat Schwannin soluista ja fibroblasteista.
- B. Valtaosa sporadisia, mutta osa liittyy tyypin 1 neurofibromatoosiin (NF1), jossa tavataan iholla runsaiden neurofibroomien lisäksi usein maitokahviläiskiä ja taivealueiden kesakkoja.
 1. N. 1500 suomalaista sairastaa
 2. Johtuu mutaatiosta NF1-geenissä (koodittaa neurofibromiinkasvurajoiteproteiinia, joka säätelee RAS-signaalintietä)
 - a. Johtaa myös alttiuteen mm. pleksiformisiin neurofibroomiin, luumuutoksiin (sfenoidaaliluun puuttuminen, pseudoartroosi, skolioosi), aivokasvaimiin, värikalvon kyhmyihin (Lischin nodulukset) ja ruuansulatuskanavan stroomakasvaimeen (GIST)
 - i. 60% elinikäinen riski syövälle (2x normaali)
 - b. Lapsuusiällä yleisimpiä ongelmia ovat neurologisen kehityksen ongelmat
 3. NF2 eroaa geneettiseltä taustaltaan ja oireiltaan; liittyvät multippelit schwannoomat (aivohermoissa, spinaalisissa hermojuurissa ja ääreishermoissa), meningeoomat (kallon sisällä ja spinaalikanavassa) ja hyvänlaatuiset ependymoomat (selkäytimessä)
 - a. Tyypillinen löydös on molemminpuolinen akustikusneurinooma (<100 henkilöä Suomessa).
 - b. Muita oireita mm. juveniili kaihi
- C. Pleksiformiset neurofibroomat voivat mahdollisesti malignisoitua (maligni hermotuppiuumor, MPNST); yleisin lokaatio on iskiashermo.
 1. Pleksiforminen neurofibrooma = synnynnäinen kasvain, jotka levittäytyy pitkin isompia hermoja kuten iskiashermoja tai kolmoishermoja; n. 30-50%:lla NF1-potilaista
 - a. Voi kasvaa massiiviseksi, jopa usean kilon kokoisiksi.

19 IHOPATOLOGIA

PERIAATTEET

I. IHON RAKENNE

- A. Kostuu kolmesta kerroksesta: epidermis (orvaskesi) ja dermis (verinahka) ja subkutis (ihonalaiskerros, hypodermis)
- B. Epidermis koostuu pääasiassa keratinosyyteistä ja jakautuu neljään (viiteen paksussa ihossa) kerrokseen.
 1. Stratum corneum (sarveiskerros) – keratiinia ja tumattomia soluja
 2. Stratum lucidum (kirkassolukerros) – paksussa ihossa (esim. jalanpohjat) – ohut kirkkaiden, tumattomien keratinosyyttien kerros
 3. Stratum granulosum (jyväissolukerros) – granuloita sisältäviä keratinosyyttejä
 4. Stratum spinosum (okasolukerros) – desmosomeja keratinosyyttien välillä

5. Stratum basale (tyvisolukerros) – tyvikalvoa vasten, koostuu epidermistä regeneroivista kantasoluista
- C. Epidermiksessä todetaan myös Langerhansin soluja, melanosyyttejä ja Merkelin soluja.
1. Langerhansin solut ovat kudoksen makrofageja (aiemmin uskottiin dendriittisiksi soluiksi), jotka kuuluvat immunologiseen järjestelmään; sijaitsevat epidermisen keskivaiheilla.
 2. Melanosyytit tuottavat melaniinipigmenttiä; sijaitsevat tyvisolukerroksessa
 3. Merkelin hermosolut tunnistavat kevyttä kosketusta; sijaitsevat tyvisolukerroksessa ja karvatupen seinämissä
- D. Dermis koostuu pääasiassa sidekudoksesta, hermopääätteistä, veri- ja imusuonista sekä apuelimistä (hikirauhaset, talirauhaset, ihokarvat).
1. Jakaantuu ylempään papillaariseen (nystykerros) ja alempaan retikulaariseen (verkkokerros) dermikseen.
 2. Hikirauhaset voidaan jakaa kahteen tyyppiin.
 - a. Apokriiniset (laskevat karvatupen tyveen) ja ekokriiniset (laskevat suoraan epidermisen läpi)
 - b. Apokriiniset hikirauhaset tuottavat lipidirikasta, viskoottista nestettä, kun taas ekokriiniset hypotonista vetistä nestettä, jolla on hieman hapokas pH.
 - i. Ilmentymisalueet eroavat: apokriinisia pääasiassa genitaalialueella ja kainolla, kun taas ekokriinisiä kaikkialla.

II. LEESION KUVAILEMINEN

- A. Primaarisen morfologian perusteella ihomuutokset voidaan jakaa litteisiin tai koholla oleviin.
- B. Litteiden muutosten muutosalue on tasainen eikä tunnu palpoimalla.
1. Makula (täplä) – alle 5mm, värillinen muutosalue
 2. Läiskä (patch) – yli 5mm, värillinen muutosalue
- C. Koholla olevat muutokset
1. Papula (näppylä) – alle 5mm
 2. Plakki (kholäiskä) – yli 5mm; usein hilseilee
 3. Nodulus (kyhmy) – yli 5mm läpimitta sekä syvyys; solidi
 4. Vesikkeli (rakkula, pieni rakko) – alle 5mm; nestetäyteinen
 5. Bulla (vesikello) – yli 5mm; nestetäyteinen
 6. Pustula (märkärakkula) – märkätäyteinen
- D. Verisuonimuutosten aiheuttamat värimuutokset
1. Eryteema – pinnallisten verisuonten reaktiivinen laajentuminen johtaa punoittavaan värimuutokseen; vaalenee painettaessa
 2. Telangiektasia – pinnallisten verisuonien pysyvä laajentuminen; vaalenee painettaessa
 - a. Esim hämähäkkiluomi tai ruusufinni
- E. Sekundaariset muutokset ovat ihotaudin seurannaisilmiöitä ihossa, usein taudin kroonistumisen ilmenemisiä.
1. Hilse – kiihtyneestä epidermisen sarveistumisesta johtuvaa lisääntyntä kuolleen ihosolukon irtoilemista
 2. Krusta eli rupi – fibriinistä, tulehdussoluista ja punasoluista koostuva kovettunut haavan päälle muodostunut hyyytymä

3. Ragadi eli pykimä – itsestään ihon kuivuessa ja venyttyessä muodostunut ihon halkeama; voi vuotaa verta ja märkiä
- F. Muutoksia voidaan kuvailla myös histologisesti
1. Akantoosi – epidermoksen diffuusi paksuuntuminen eli hyperplasia
 2. Hyperkeratoosi – sarveiskerroksen paksuuntuminen
 3. Papillomatoosi – epidermoksen papillaarinen proliferaatio, dermis papillojen pidentyminen; ihon pinta on epäsäännöllinen ja aaltoileva
 4. Parakeratoosi – tumat jäljellä sarveiskerroksessa; johtuu lisääntyneestä jakautumisnopeudesta
 5. Dyskeratoosi – epidermoksen solujen virheellistä keratinisaatiota granulaarisolukerroksen alapuolella
 6. Spongioosi – epidermoksen turvotus

INFLAMMATORISET DERMATOOSIT

I. URTIKARIA (NOKKOSIHOTTUMA)

- A. Nopeasti ilmaantuvia, punoittavia, kutittavia hentoja ihomuutoksia, jotka häviävät nopeasti (yleensä tunneissa tai päivissä).
- B. Johtuvat tyypin 1 (IgE-välitteinen) yliherkkyyssreaktiosta, jossa syöttösoluista vapautuva histamiini johtaa dermoksen mikroverenkierron hyperpermeabiliteettiin ja vasodilataatioon.
 1. Voi johtua mm. lääkaineesta, ruoasta, paineesta, stressistä, nokkosenpistoksesta...
 2. Aiheuttaa dermoksen edeemaa.

II. EKSEEMADERMATIITTI

- A. Ekseemaa eli ihottumaa kutsutaan usein myös dermatiitiksi tai ekseemadermatiitiksi.
- B. Voidaan jakaa akuuttiin, subakuuttiin ja krooniseen muotoon.
 1. Akuutissa eksemassa havaitaan spongioosia ja pinnalla voidaan nähdä eksudaattia, dermoksen verisuonet ovat laajentuneet ja niiden ympäristössä on valkosoluja.
 - a. Makroskooppisesti ihottuma koholla, pruriittinen, erytematoottista ja usein vuotava vesikkelien/bullien kanssa.
 2. Kroonistuessa spongioosi ja valkosolut vähenevät, mutta akantoosi lisääntyy ja reteharjanteet pidentyvät.
 - a. Alue voi alkaa hilseillä ja jäkälöityä (paksuuntuminen ja karheus).
 3. Subakuutissa molempien piirteitä.
- C. Kliinisesti jakautuu useisiin alatyyppeihin, jotka ovat endogeenisiä (mm. atooppinen tai nummulaarinen) tai eksogeenisiä (allerginen kosketusihottuma, lääkkeisiin liittyvä, aurinkoihottuma tai kuivuusihottuma).
- D. Atooppinen ekseema on yleinen, osin perinnöllinen tyypin 1 yliherkkyyssreaktio; liittyy astmaan ja allergiseen riniittiin.
 1. Keskittyy aikuisilla yleensä pään ja ylävartalon alueelle; nuorilla lapsilla taive-ihottuma.
 2. Oireet usein pahenevat talvikaudella ja paranevat kesällä.
- E. Allerginen kosketusekseema (kontaktidermatiitti) johtuu ihon kosketuksesta ärsyttäviin aineisiin tai allergeeneihin.
 1. Allergeenien aiheuttama ekseema on viivästynyt (24-72h) – johtuu hapteenista, joka aiheuttaa tyypin IV yliherkkyyssreaktion (mm. nikkeli, lääkkeet).

2. Ärsyttävien aineiden aiheuttama ekseema voi syntyä nopeammin – johtuu mm. pesuaineista tai hapoista, jotka suoraan vaurioittavat ihoa mekanisesti.

III. PSORIAASI

- A. Krooninen inflammatorinen dermatosi, joka aiheuttaa vaikeaa hilseilyä; yleinen n. 2% väestöstä.
 1. Yleisin muoto on läiskäpsoriaasi (psoriasis vulgaris), joka oireilee plakkimaisina, lohenvärisinä hilseilevinä muutoksina useimmiten raajojen ojentajapinnoilla ja hiuspohjassa.
 2. Nuorilla ihmisillä pisorapsoriaasi on tyypillinen taudinkuva etenkin streptokokkitonsilliitti laukaisemana; hilseläiskän ovat pienempiä ja hilseilevät hennommin.
 3. Ihomuutosten lisäksi voidaan havaita kynsioireita, kuten pistemäisiä kuoppia tai kynsien irtoamista (onkolyysi); etenkin nivelpsoriaasipotilailla.
- B. Patogeneesi epäselvä, mutta johtunee keratinosyyttien liikaproliferaatiosta, jolla on mahdollinen autoimmuunitausta.
 1. Geneettinen alttius; yhteydessä tiettyihin HLA-C-alleleihin.
 - a. Leesiöt usein syntyvät trauma-alueille, joten myös ympäristötekijöillä on vaikutusta.
- C. Histologia
 1. Epidermoksen säännöllinen akantoosi sekä hyper- ja parakeratoosi
 2. Stratum corneumissa neutrofiilien kertymiä (Munron mikroabskessit) ja dermiksessä lymfosyyttivaltaista tulehdusta
 3. Epidermoksen suprapapillaarinen ohentuminen ja retetappien pidentyminen; johtaa Auspitzin ilmiöön (hilseen raaputus tuo esiin pistemäisiä verenvuotoja).
- D. Valtaosa tapauksista voidaan hoitaa paikallishoidolla (perusvoide, D-vitamiinivoide tai glukokortikoidivoiteet); myös valohoito/PUVA-hoito (psoraleeni+UVA) tai oraaliset lääkkeet (mm. glukokortikoidit, asitretiini, metotreksaatti, siklosporiini) auttavat tarvittaessa.

IV. PUNAJÄKÄLÄ (LICHEN PLANUS)

- A. Krooninen inflammatorinen dermatosi, joka aiheuttaa pruriittisia, sinipunaisia, monimuotoisia plakkeja, joiden pinnalla on usein vaaleita juovia (Wickham striae).
 1. Tyypillilokalisatiot yleensä ranteessa, kynärpäässä ja suun mukoosapinnoilla.
 - a. Erityisesti suun mukoosassa Wickhamin juovat ovat selkeästi nähtävissä.
 2. Myös sukuelinten limakalvoilla voidaan harvinaisesti tavata punajäkälää.
- B. Etiologia on tuntematon, mutta mm. HCV-infektion on todettu liittyvän tautiin.
 1. Leesiöt kestävät yleensä muutaamasta kuukaudesta pariin vuoteen ja voivat jättää jälkeensä hyperpigmentoituneen alueen.
- C. Histologia
 1. Hyperkeratoosi
 2. Dermiksen ja epidermoksen junctionin nauhamainen T-soluiinfiltraatti
 - a. Aiheuttaa basaalikerroksen degeneraatiota; voidaan havaita myös kolloidikappaleita (Civatten kappaleet).
 3. Reteekiellekkeiden sahalaitamainen terävöityminen
- D. Hoidetaan paikallisesti kortisonivoiteilla tai toisinaan takrolimuusivoiteella; laaja-alaisissa auttaa valohoito tai systeemiset lääkkeet.

V. APUELINTULEHDUKSET

A. Acne vulgaris

1. Osin tulehduksellinen ja osin hyperplastien talirauhas-karvafollikkelikompleksin muutos.
 - a. Hormoonimuutoksiin (erit. testosteroni) liittyvä talin ja keratiinin lisääntynyt tuotanto tukkii karvafollikkelin ja johtaa komedon muodostumiseen.
 - i. Aluksi komedo on väritön (sulkeutunut komedo, valkopää).
 - ii. Kasvaessaan komedon pää tummuu sen oksidoituessa hapen vaikutuksesta (sulkeutunut komedo, mustapää).
 - b. Propionibacterium acnes -bakteerien proliferoivat leesiossa ja tuottavat vapaita rasvahappoja sekä follikkelia syövyttäviä entsyymejä, mikä johtaa follikkelin ruptuuraan ja ympäröivän inflammaatioon.
 - i. Ruptuura voi jättää jälkeensä aknearven.
2. Hoitoon kuuluu mm. bentsoyyliperoksidi (estää aknebakteerin kasvua) ja A-vitamiinijohdannaiset (vähentää keratiinin tuotantoa).

B. Follikuliitti

1. Karvatupen pinnallinen tai syvä tulehdus; tavallisin aiheuttaja on S. aureus.
 - a. Esiintyy finnimäisenä punoittavana papulana karvaisilla ihoalueilla.

RAKKULOITA MUODOSTAVAT TAUDIT

I. PEMFIGUS

- A. Ihon ja limakalvojen harvinainen autoimmuunisairaus, jossa keratinosyyttien soluliitoksen (desmosomit) hajoavat ja keratinosyytit irtoavat toisistaan (akantolyysi).
- B. Johtuu IgG-vasta-aineesta desmogleiini 1 ja 3 vastaan; voidaan havaita immunofluoresenssitutkimuksessa keratinosyyttien väleissä ("kalaverkkomainen").
- C. Jakaantuu useaan eri tyyppiin
 1. Pemfigus vulgaris (80%) on vakavin – johtaa laaja-alaisesti rakkuloiden muodostumiseen limakalvoille sekä vartalolle; leesiot ovat helposti repeäviä (Nikolskyn merkki) vesikkeleitä ja bullia, mikä johtaa kuivuneeseen rupeen.
 - a. Nikolskyn II merkissä suun terveän limakalvon alue altistetaan paineelle, jonka vapautuessa alueelle muodostuu rakkula.
 2. Pemfigus foliaceus on lievempi – rakkulat pääasiassa muodostuvat vain iholle, tyypillisesti päähän ja ylävartaloon; rakkulointi on lievempää ja niiden repeileminen ja rupeutuminen on vähäisempää.
- D. Histologia
 1. Akantolyysi –keratinosyyttien desmosomiyhteyksien menettäminen johtaa akantolyyttiseen rakkoon
 - a. Vulgariksessa akantolyysi keskittyy stratum spinosumiin (suprabasaalinen), kun taas foliaceuksessa stratum granulosumiin (subkorneaalinen).
 - i. Vulgariksessa stratum basale pysyy yhteydessä tyvikalvoon hemidesmosomien välityksellä ("hautakivimainen").
- E. Hoitona sisäinen (tai paikallinen) kortisoni ja tarvittaessa muu immunosuppressio; vulgaris oli ennen steroidihoitoja kuolemaan johtava.

II. PEMFIGOIDI (BULLOUS PEMPFIGOID)

- A. Pemfiguksen kaltainen ihon autoimmuunisairaus, jossa stratum basalen ja tyvikalvon väliset hemidesmosomit hajoavat ja kerrokset irtoavat toisistaan.

- B. Johtuu IgG-vasta-aineesta tyvikalvon hemidesmosomien rakenneproteeeineja BP180 ja BP230 vastaan; voidaan havaita immunofluoresenssitutkimuksessa nauhamaisena IgG-kertymänä tyvikalvoa pitkin.
- C. Oireilee ihon (suun mukoosa säästyy) bullina, joiden ensioireensa on usein kutina; varsinkin vanhuksilla.
 - 1. Bullat eivät ole helposti repeäviä ja usein paranevat ilman arpeutumista; tauti on siis kliinisesti lievempi kuin pemfigus.
- D. Histologia
 - 1. Laaja non-akantolyttinen subepidermaalinen rakkula; koko epidermis muodostaa rakkulan katon.
- E. Paranee usein itsestään; tarvittaessa immunosuppressiiviset lääkkeet sisäisesti tai paikallisesti (yleensä kortisoni riittää).

III. DERMATITIS HERPETIFORMIS

- A. Autoimmuuni ihon pienirakkulainen tauti, joka johtuu IgA:n kerääntymisestä dermoksen papilleihin.
 - 1. Papilleissa todetaan histologisesti neutrofiiliabsesseja ja subepidermaalisia rakkuloita.
- B. Taudinkuvalle on tyypillistä voimakkaasti kutisevat pienet rakkulat, jotka ryhmittyvät etenkin raajojen ojentajapinnoille, hiuspohjaan, pakaroihin ja hartioihin.
- C. Vahva yhteys keliakiaan; n. 80% potilaista todetaan keliakia (ihokeliakia).
 - 1. Veressä voidaan havaita gliadiini- ja transglutaminaasi-vasta-aineita.
- D. Lineaarisessa IgA-taudissa IgA-vasta-aineet kohdistuvat samoihin proteiineihin kuin pemfigoidissa eikä suolistovaurioita esiinny; immunofluoresenssissa havaitaan nauhamainen kertyminen pitkin tyvikalvoa.

IV. ERYTHEMA MULTIFORME (MONIMUOTOINEN PUNAVIHOITTUMA)

- A. Yliherkkyyksireaktion (tyypin IV) aiheuttama ihon rakkuloita muodostava tauti, jonka tyypileesio on punoittava läiskä, jonka keskus on vaalea ja ödeeminen (ns. kokardileesio, maalitaulumainen).
 - 1. Kokardileesion keskus on vaalea epidermaalisen nekroosin takia.
 - 2. Voidaan havaita myös makuloita, vesikkeleitä, bulloja tai papuloita.
- B. Yleisin etiologia on HSV-infektio, joskus muu mikrobi (esim. mykoplasma pneumoniae, COVID-19).
 - 1. Myös lääkkeet (mm. penisilliini, sulfonamidit, karbamatsepiini), autoimmuunisairaudet (esim. SLE) ja maligniteetit voivat olla taustalla.
 - 2. Potilaat useimmiten nuoria aikuisia.
- C. Histologisesti havaitaan T-soluvaltaista tulehdusta dermoepidermaalisessa junktiossa ja basaalistien keratinosyyttien tuhoutumista, mikä johtaa epidermoksen irtoamiseen.
- D. Jaetaan lievään ja vaikeaan muotoon
 - 1. Erythema multiforme minorissa leesiot keskittyvät erityisesti raajoihin ja kasvoihin; paranee itsestään 1-3vk ja yleisoireita ei yleensä ole.
 - 2. Erythema multiforme majorissa leesioita on myös limakalvoilla (erityisesti suussa), iho-oireita on laajemmalla alueella raajoissa ja kasvoissa, läiskien rakkuloituminen on kookkaampaa ja yleisoireita (kuume) on yleensä.
 - a. Lääke-etologia vaikeammassa muodossa useammin kuin lievässä.

- E. Histologisesti havaitaan T-soluvälitteistä tulehdusta dermoepidermaaliossa ja basaalisten keratinosyyttien tuhoutumista, mikä johtaa epidermisen irtoamiseen.
- F. Harvoin tauti voi olla hyvin vakava ja aiheutuva nekroosi on koko epidermisen paksuista.
 - 1. Stevens-Johnsonin syndrooma - <10% ihosta vaurioitunut, limakalvojen affisioituminen ja yleisoireilu
 - 2. Toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN, Lyellin oireyhtymä) - >30% ihosta vaurioitunut, limakalvojen affisioituminen ja yleisoireilu
 - a. Ihon kesiminen on hyvin laaja-alaista ja muistuttaa vakavaa palovammaa.
 - 3. Eroavat EMM:sta iholeesioiden laajuuden ja niiden sijoittumisen perusteella (yleensä sentraalisemmin).
 - 4. Yliherkkyys lääkeaineelle on taustalla valtaosassa tapauksista.
 - 5. SJS:n kuolleisuus on 1-5% ja TEN:n taas 25-30%.
 - a. Infektio on yleisin kuolinsyy; prognoosi perustuu affisiotuneeseen pinta-alaan.

DERMIKSEN JA SUBKUTIKSEN TULEHDUKSET

I. PANNIKULIITIT

- A. Subkutaanisen rasvakudoksen tulehduksia.
- B. Yleisin pannikuliitti on erythema nodosum eli kyhmyruusu.
 - 1. Ilmenee aristavina ihonalaisina kyhmyinä; tavallisesti säärien alueella.
 - 2. Liittyy usein edeltävään infektiin (esim. streptokokki), mutta voi johtua myös mm. lääkeainereaktiosta, sarkoidoosista tulehduksellisesta suolistosairaudesta.
 - 3. Histologisesti muutos on epäspesifinen: rasvakudoksen tulehduksellisen infiltratin, joka tyypillisesti paikantuu rasvalohkojen septoihin; kroonistuessa granuloomia.
 - 4. Paranee yleensä itsestään.
- C. Erythema induratum (nodulaarinen vaskuliitti) ilmenee myös kyhmyinä; tavallisesti pohkeiden puolella.
 - 1. Kyhmyt voivat olla nodosomia suurempia ja haavautuvat useammin.
 - 2. Johtuu rasvalobuluksien nekrotisoivasta granulomatoottisesta tulehduksesta, johon usein liittyy fokaalinen pienten tai keskisuurten verisuonten vaskuliitti.
 - 3. Tyypillisesti johtuu yliherkkyysreaktiosta mykobakteerille (tuberkuloosi).

IHON INFEKTIOT

I. IMPETIGO (MÄRKÄRUPI)

- A. Pinnallinen ihotulehdus, jonka yleensä aiheuttaa stafylokokki (80%), A-streptokokki (10%) tai molemmat (10%)
- B. Ilmenee tyypillisesti punoittavina papuloina, jotka etenevät pieniksi pustuloiksi, jotka taas voivat revetä ja aiheuttaa hunajanväristä rupeutumista; tyypillinen lokalisaatio on kasvoissa tai yläraajoissa.
 - 1. Toinen tyyppi on (iso)rakkulainen märkärupi (bullous impetigo), jossa leesiot voivat kehittyä pinnallisista vesikkeleistä, jotka muodostavat nesteen täyttymiä, jopa kahden senttimetrin läpimittaisia tulehdusrakkoja eli bullia, jotka usein puhkeavat ja syntyvät ohut, ruskea rupi.
- C. Erityisesti lapsilla ja huonohygieenisillä; lasten yleisin ihoinfektio.
 - 1. Tarttuu helposti kosketuksesta.

- D. Histologisesti havaitaan epidermiksensisäinen subkorneaalinen rakkula, jossa liuskatumaaisia valkosoluja.

II. ERYSIPELAS (RUUSU) JA SELLULIITTI

- A. Dermiksen ja subkutiksen tulehdus, jonka yleisin aiheuttaja on beetahemolyyttinen streptokokki, joskus *S. aureus*.
1. Ruusu ulottuu pinnallisiin kerroksiin ja imusuoniin, kun taas selluliitissa tulehdus ulottuu syvemmälle; ero on liukuva eikä erotella käytännön työssä.
- B. Oireilee punoittavana, kuumottavana ja kivuliaana ihottumana, johon voi liittyä kuumetta.
- C. Erityisesti vanhuksilla, diabeetikoilla, obeeseilla ja ihorikkoisilla (kirurgia, trauma ja hyönteispistokset tärkeitä riskitekijöitä).
1. Yleisin lokalisaatio on alaraaja.
- D. Komplikaatioita mm. sepsis; voidaan hoitaa kliinisten piirteiden perusteella antibiooteilla.
- E. Tärkeää erottaa nekrotisoivasta faskiitista eli hengenvaarallisesta lihasfaskian ja subkutiksen nekroosista; useimmiten sekainfektion (A-streptokokki myös yksin) aiheuttamaa.
1. CO₂:n tuotanto johtaa ihon krepitaatioon
 2. Vaatii välitöntä kirurgista hoitoa.

III. STAFYLOKOKKIPERÄINEN HILSEILEVÄ IHOTULEHDUS (STAPHYLOCOCCAL SCALDED SKIN SYNDROME (SSSS))

- A. Vakava ihoinfektio, johon liittyy ihon laajaa kuoriutumista, punottavaa ihottumaa ja yleisoireita; johtaa laaja-alaiseen ihonmenetykseen.
- B. Johtuu eksfolioivia A- ja B-toksiineja tuottavasta *S. aureus* -infektiosta; aiheuttavat stratum granulosumin epidermolyysiä.
1. Eroaa TEN:sta ihon eroamisen syvyyden perusteella; TEN:ssä eroaminen tapahtuu dermoepidermaalisessa junktiossa.
- C. Pääosin vastasyntyneiden ja pienten lasten tauti ja mortaliteetti on pieni (n. 5%); aikuisilla kuolleisuus jopa 60%.
1. Vaikein muoto pienten lasten SSSS:stä on nimeltään Ritterin tauti.

IV. FOLLIKULIITTI (KARVATUPEN TULEHDUS)

- A. Pinnallinen tulehdus; havaitaan karvatupen suulla keltaisena 1-3mm:n läpimittaisena pustelina, jota ympäröi punainen kehä.
1. Aiheuttaja useimmiten *S. aureus*, mutta likaisiin porealtaisiin/uima-altaisiin voi liittyä *Pseudomonas aeruginosa* -infektio ("hot-tub folliculitis")
- B. Furunkkeli on follikuliittia syvempi karvatupen infektio.
1. Karbunkkeli on laaja furunkkeleiden ryhmä, jossa märkä purkautuu usean karvafollikkelin aukosta; etenkin diabeetikoilla niskassa.

V. KYNSIVALLIN TULEHDUS (PARONYKIA)

- A. Kynttä ympäröivän ihon tulehdus; voidaan jakaa akuuttiin ja krooniseen
1. Akuutin aiheuttaja tyypillisesti *S. aureus*; myös suun floora voi aiheuttaa kynsien pureskelijoilla
 - a. Sisään kasvaneet kynnenreunat myös tärkeä altistava tekijä
 2. Kroonisen aiheuttaja pitkittynyt altistus ärsyttävälle aineelle tai allergeenille (ei siis infektio tyypillisesti); kynsinauha puuttuu

VI. SILSA

- A. Silsasienten (dermatofyyttien) aiheuttama ihon pinnallinen infektio.

- B. Oireilee useimmiten rengasmaisena, hieman koholla olevana ja hiljalleen laajenevana punoittavana leesionana.
 - 1. Tyypilokalisaatio varvasväleissä (jalkasieni; athlete's foot, tinea pedis)), nivusissa (tinea cruris) ja kynsissä, mutta voi oireilla missä tahansa iholla.
- C. Histologisesti havaitaan pinnallinen, lievä tulehdus; sienirihmat voidaan todeta PAS-värjäyksellä.

VII. SYYLÄ (VERRUCA)

- A. Matalan riskin papilloomaviruksen aiheuttama ihon värinen papula, jolla on usein karhea ja epätasainen pinta.
- B. Yleisin tyyppi on tavallinen syyli eli verruca vulgaris, joka esiintyy erityisesti lapsilla käsissä.
 - 1. HPV-infektioille tyypillisesti histologisesti havaitaan koilosyyttistä muutosta.
 - a. Yleisesti histologia on vahvasti papillomatoottinen; epidermis on hyper- ja parakeratoottinen, poimuilee verrukoottisesti ja retetapit ovat pitkiä.

VIII. ONTELOSYYLÄ (MOLLUSCUM CONTAGIOSUM, MOLLUSKA)

- A. Pox-viruksen infektion aiheuttamia kiinteinä, pinkkejä, varrellisia papuloita, joilla on sileä pinta; esiintyvät erityisesti lapsilla.
- B. Histologisesti epidermis muodostaa kraaterimaisen syvennyksen, jossa havaitaan epidermaalista hyperplasiaa.
 - 1. Keratinosyyttien sytoplasmassa havaitaan kookkaita sytoplasmisia virusinkluusiokappaleita (molluscum bodies).

EPIDERMIKSEN KASVAIMET

I. KYSTAT

- A. Hyvänlaatuisia, epidermisen sisäisiä keratiinin täyttämieä kystisiä onteloita, jonka pinnalla on matala säännöllinen levyepiteeli.
 - 1. Milium (luufinni) - 1-2mm läpimittaiset vaalea, kiiltävä näppy; yleisiä etenkin kasvoissa silmien ympäristössä
 - 2. Epidermaalikysta (aterooma, sarveisontelo) – Miliumia suurempi; ontelon aukko voi näkyä mustana pisteenä
 - 3. Pilaarinen eli trikilemmaalinen kysta on makroskooppisesti epidermaalikystan näköinen, mutta kystan keratinisaatio muistuttaa karvan keratinisoitumista; esiintyy usein päänahassa
- B. Voivat kehittyä itsestään tai pinnallisen ihovaurion seurauksena.

II. SEBORROOINEN KERATOOSI (RASVALUOMI)

- A. Hyvin yleinen ihon hyvänlaatuinen kasvain; esiintyminen lisääntyy iän myötä.
- B. Ilmenee värillisenä (vaihtelee vaaleanruskeista hyvinkin tummiin) papulana tai plakkina useimmiten raajoissa tai kasvoissa; yleensä karheita ja hiljalleen kasvavia ("stuck-on").
- C. Histologisesti havaitaan epidermisen hyperkeratoosia ja akantoosia sekä poimuilevan epidermisen sisään jääviä keratiinin täyttämiä valekystoja; ei dysplasiaa.
- D. GI-kanavan maligniteetti voi harvoin aiheuttaa useiden seborrooisten keratoosien äkillisen muodostumisen (Leser-Trélatin merkki).

III. IHON TYVISOLUSYÖPÄ (BASALIOOMA)

- A. Epidermisen tyvisoluista alkunsa saava pahanlaatuinen kasvain; ihmisen yleisin syöpä.

- B. Tärkein etiologinen tekijä on UV-säteily ja sen aiheuttamat DNA-vauriot; riskiä lisäävät mm. valkoinen iho, albinismi ja xeroderma pigmentosum.
1. Tyypillinen mutaatio on PTHC1-tuumorisuppressorigeenin loss-of-function - mutaatio, mikä johtaa Hedgehog-reitin jatkuvaan aktivaatioon; myös TP53-mutaatiot ovat yleisiä.
 - a. Perinnöllinen PTHC1-mutaatio voi johtaa tyvisolusyövän aikaiseen muodostumiseen (yleensä jo alle 40-vuotiaana); Gorlinin oireyhtymä (varhainen basaliooma, jalkapohjien pistemäisiä koloja ja odontogeenisiä keratiinikystiä).
- B. Diagnostinen tutkimus yleensä stanssibiopsia tuumorin paksuimmalta kohdalta (stanssibiopsia soveltuvien ei-melanoottien ihosyöpien epäilyissä).
- C. Histologisesti jaetaan pienen ja suuren uusiutumisen riskin kasvaimiin.
1. Pienen riskin (low grade) kasvaimista tärkeimmät ovat nodulaarinen (yleisin) ja pinnallinen (ja pigmentoitunut)
 - a. Havaitaan dermikseen työntyviä vaihtelevia tyvisolusaarekkeita, joiden reunoilla on palisadimaisesti reunan suuntautuva solukerros.
 - i. Pinnallisessa kasvainsaarekkeet ovat yhteydessä epidermisen alaosaan, kun taas nodulaarisessa ne yltävät syvemmälle.
 - b. Nodulaarinen ja pinnallinen alaluokka voivat olla pigmentoituneita, jolloin havaitaan tuumorikompleksien kolonisaatiota melanosyyteillä
 2. Suuren riskin (high grade) kasvaimet ovat invasiivisia ja näitä on mm. infiltroiva, sklerosoiden kasvava (morfeiforminen), mikronodulaarinen, metatyyppinen (basaliooman ja okasolusyövän sekoitus)
 - a. Infiltroivassa ja sklerosoivassa saarekkeet ovat kapeita, haaroittuvia ja menettävät usein palisadimaisen reunan. Niihin voi liittyä perineuraalista invaasiota.
 - i. Erona on ympäröivän strooman reaktio, joka sklerosoivassa on tiivistä kollagenoottista ja infiltratiivisessa löyhää
 - b. Pieninodulaarisessa kasvutavassa saarekkeet ovat pieniä ja pallomaisia ja usein strooman reaktio puuttuu täysin
 - c. Infiltroivaa, sklerosoivaa ja pieninodulaarista usein käsitellään yhtenä kokonaisuutena eli infiltratiivisena.
- C. Kliininen kuva (makroskooppinen muoto) vaihtelee kasvutavan perusteella ja ulkonäkö voi vaihdella suuresti; nämä kolme päätyyppiä kannattaa muistaa:
1. Noduloulseratiivinen (80%): helmimäinen pinkki papula, jonka keskusta on voinut painua kuopalle ja ulseroitua kraaterimaisesti (ns. rodent ulcer -basaliooma) ja jota ympäröi dilatoituneet verisuonet (telangiektasia); sijaitsee useimmiten kasvoissa (erityisesti nenässä, poskilla, ylähuulessa) tai korvien takana.
 - a. Pigmentoitunut voi olla vaikeaa erottaa melanoomasta
 2. Pinnallinen (15%): muistuttaa epätarkkarajaista, punoittavaa ja hilseilevää ihottumaa; yleisempi vartalolla kuin kasvoissa ja usein multifokaalinen
 3. Sklerosoiva eli morfeatyyppinen (5%): ihon tasossa oleva epätarkkarajainen, vaalea, arpimainen ja kiiltävä muutos; tyypillisesti kasvoissa
- D. Hoidetaan usein kirurgisesti 3-5mm marginaaleilla poistamalla (pinnalliset kuitenkin ensisijaisesti paikallishoidolla, kuten jäädytyshoidolla); eivät juuri koskaan metastasoi.

1. Riittäväillä marginaaleilla poistettua matalan uusiutumISRISKIN basaliomaa ei tarvitse seurata; jos korkean riskin niin yksilöllinen seuranta
 - a. Jos basalioma on leikkauksessa poistettu epätäydellisesti, pitää uusiutumisen ehkäisemiseksi suorittaa joko arven poistoleikkaus tai tilanteen mukaan ei-kirurginen hoito. Pelkkä seuranta ei ole näissä tapauksissa hyväksyttävää

IV. IHON LEVYEPITEELIKARSINOOMA (OKASOLUSYÖPÄ)

- A. Keratinosyyttien pahanlaatuinen kasvain; n. 2200 uutta tapausta vuodessa Suomessa.
- B. Tärkein etiologinen tekijä on UV-säteily; riskiä lisäävät mm. valkoinen iho, albinismi, xeroderma pigmentosum, immunosuppressio, HPV-infektio, arsenikki ja krooniset tulehdukset (kuten haavoissa, palovammoissa tai inflammatorisissa ihosairauksissa).
 1. Yleisimmät mutaatiot ovat TP53-geenissä; myös RAS ja Notch-mutaatiot ovat yleisiä.
- C. Ilmenee haavautuneena, nodulaarisena massana, jossa usein rupeutumista; useimmiten kasvoilla (erityisesti alahuulessa) tai muilla auringolta suojaamattomilla alueilla.
- D. Hoidetaan kirurgisesti poistamalla (ESH:ssa väh. 5mm marginaali); metastasointi on harvinaista, mutta tyvisolusyöpää yleisempää (n. 2-5%).
- E. Histologisesti havaitaan dermikseen työntyneitä atyyppisten, vaihtelevasti sarveistuneiden keratinosyyttien muodostamia invasiivisia saarekkeita
 1. Jaetaan graduksiin I-III atypian ja keratinisaation perusteella; hyvin erilaistuneessa keratinisaatio on runsasta ja voidaan havaita keratiinihelmiä.
- F. Invasiiviset okasolusyövät kehittyvät useimmiten esiastemuutoksen kautta.
 1. Aktiivinen keratoosi (aurinkokeratoosi) – epidermisen dysplastinen muutos, jossa havaitaan parakeratoosia, kerrostumisen häiriintymistä sekä atypiaa; esiintyy auringonvalolle altistuneilla alueilla hilseilevänä läiskänä
 2. Levyepiteelikarsinoma in situ (Bowenin tauti) - muistuttaa kliinisesti aktiivista keratoosia, mutta voi esiintyä myös vaatteiden peittämällä alueilla.
 3. Esiastemuutosten riski edetä karsinoomaksi on pieni; ei aina tarvitse varmistaa diagnoosia biopsialla, vaan diagnoosi on yleensä kliininen.
 - a. Huulen aktiivinen keiliitti ja in situ -karsinoma tulee aina varmistaa biopsialla.
- G. Keratoakantooma
 1. Histologisesti havaitaan kuppimainen ontelo, jossa atyyppisesti proliferoituva epidermis ja runsaasti keratiinia; voi olla mahdotonta erottaa levyepiteelikarsinoomasta -> nykyään luokitellaankin hyvin erilaistuneeksi okasolusyöväksi, vaikka kliinisesti onkin hyvin benigni
 2. Ilmaantuu nopeasti ja usein regressoituu spontaanisti kuukausien kuluessa.
 3. Ennuste hyvä, mutta pahanlaatuisen toiminnan mahdollisuus on epäselvää, joten poisto on suositeltavaa.

V. MERKELINSOLUKARSINOOMA

- A. Harvinainen (<1% kaikista ihosyövästä) neuroendokriininen ihosyöpä, jonka on ajateltu syntyvän epidermisen Merkelin soluista.
 1. Merkelin hermosolut tunnistavat kevyttä kosketusta; sijaitsevat tyvisolukerroksessa ja karvatupen seinämissä
 2. Esiintyy tyypillisesti iäkkäillä ihmisillä

- B. Tyypillisesti merkelinsolukarsinooma on nopeasti kasvava punainen tai violetti, kiinteä ja kivuton kyhmy, joka voi ulseroitua ja vuotaa verta.
 - 1. Noin 50 % kasvaimista esiintyy pään ja kaulan alueella ja 30–40 % raajoissa
- C. Merkelin polyoomaviruksella (MPV, MCPyV) on merkittävä osuus merkelinsolukarsinooman aiheuttajana (80 % merkelinsolukarsinoomista on MPV-positiivisia); levinnee respiratoristen eritteiden kautta
 - 1. UV-säteily ja immunosuppressio myös tärkeitä riskitekijöitä
- D. Merkelinsolukarsinooma metastasoi usein ja ennuste on huonompi kuin muilla epidermaalisilla syövillä
- E. Diagnoosi perustuu histologiaan; histologisesti kyseessä on huonosti erilaistunut neuroendokriininen karsinooma (tiivis infiltraatti niukkasytoplasmaista, atyyppistä solukkoa, joka voi muistuttaa pienisoluista karsinoomaa tai lymfoomaa)
- F. Kirurginen hoito on ensisijainen

PIGMENTAATIOHÄIRIÖT JA PIGMENTTISOLUKASVAIMET

I. PERIAATTEET

- A. Stratum basaleessa sijaitsevat melanosyytit tuottavat tyrosiinista melaniinia ja välittävät sitä melanosomeina (melaniiniyväsinä) keratinosyyteille.
 - 1. Melanosyytit ovat hermopienasta peräisin.
 - 2. Valko- ja tummaihoisilla on suunnilleen sama määrä melanosyyttejä, mutta melanosomien määrä on runsaampaa tummemmassa ihossa.
- B. UV-säteily stimuloi melanogeneesiä ja melaniinin vapautumista; melaniini absorboi UV-säteilyä ja suojaa ihoa auringonvalon aiheuttamilta vaurioilta, mutta myös vähentää D3-vitamiinisynteesiä.

II. VITILIGO (VALKOPÄLVI)

- A. Ihopigmentaation paikallinen menetys; johtuu melanosyyttien autoimmuunista tuhoutumisesta.
 - 1. Vaaleaihoisilla läiskät havaitaan selkeämmin kesällä ruskettumattomina läiskinä; aurinkosuojaaminen tärkeää palamisen estämiseksi.
- B. N. 0,5-2% väestöstä (alkaa yleensä nuoruudessa/nuorella aikuisiällä), suurella osalla (n.10-15%) myös muita autoimmuunisairauksia (yleisimpänä kilpirauhasen autoimmuunisairaudet)
 - 1. Affisioi yhtäläisesti ihmisiä etnisestä ryhmästä ja sukupuolesta riippumatta
- C. Jaetaan non-segmentaaliseen (NSV, paljon yleisempi) ja segmentaaliseen vitiligoon (SV)
 - 1. Non-segmentaalisessa vitiligossa on yleensä jonkinlaista symmetriaa depigmentaatioläiskien lokaatiossa ja depigmentaatiota voi ilmentyä missä tahansa osassa kehoa
 - 2. SV tyypillisesti kehittyy nopeasti ja affisioi vain toista puolta kehoa; yleensä SV:n laajeneminen pysähtyy n. puolessa vuodessa
- D. Diagnoosi on kliininen, yleensä histopatologista varmistusta ei tarvita (jos otettaisiin niin havaittaisiin melanosyyttien katoaminen epidermiksestä).

III. ALBINISMI

- A. Periytyvä ryhmä melaniinin puutteeseen johtavia sairauksia; aiheutuvat melanogeneesin entsyymihäiriöstä (yleensä tyrosinaasin puute).
 - 1. Chediak-Higashin oireyhtymässä albinismi johtuu häiriintyneestä melanosomien transportaatiosta.

B. Johtaa yleensä ihon, hiusten ja silmien osittaiseen tai täydelliseen pigmentin puutteeseen; voi myös olla vain silmiä affisioiva (okulaarinen muoto).

1. Silmien värikalvon ja retinan pigmentaation menetys johtaa valonarkuuteen (fotofobia); näöntarkkuus on usein myös heikkoa.

C. Lisää riskiä okasolusyövälle, basaliomalle ja melanoomalle.

IV. PISAMA (EPHELIS, TEERENPILKKU)

A. Yleisiä, vaaleanruskeita pigmenttiläiskä (makula), jotka korostuvat auringonotossa; tyypillisesti kasvoissa ja ylävartalolla.

B. Histologisesti havaitaan runsas melaniinipigmentti; itse melanosyytit eivät ole lisääntyneet alueella.

V. KESAKKO (LENTIGO)

A. Tavallinen kesakko eli lentigo simplex on pieni, pyöreä, tasavärinen makula, joka voi esiintyä kaikkialla ihosta (ei liity aurinkoaltistukseen); yleinen kaikenikäisillä.

1. Etenkin iäkkäillä (lentigo senilis) voi esiintyä lentigo solarista eli aurinkokesakkoa auringonvalolle altistuvilla ihoalueilla.

B. Histologisesti havaitaan epidermisen akantoosia, tyvisolukon melanosyyttien määrän lisääntymistä sekä runsas pigmentti.

C. Eivät yleensä malignisoidu, mutta suurilla kasvojen jättikesakoilla on kuitenkin riski pahanlaatuistumiselle.

D. Runsa määrä kesakkoja, etenkin huulissa, voi olla yhteydessä Peutz-Jeghersin polypoosiin.

VI. MELASMA (KLOASMA, MAKSALÄISKÄ)

A. Melasma on kasvoilla (useimmiten poskilla) esiintyvä symmetrinen, läiskäinen hyperpigmentaatio

1. Melasma on yleisempi tummaihoisilla ihmisillä ja naisilla tavallisempi kuin miehillä

B. Pigmentaatio voi ilmestyä raskauden aikana ("Mask of pregnancy") ja myös yhdistelmäehkäisytabletit voivat aiheuttaa; voimistuu UV-valon vaikutuksesta

1. Melanosyyttien määrä tyypillisesti normaali (kuten pisamissakin)

VII. PIGMENTTILUOMI (MELANOSYYTTILUOMET, MELANOSYYTTINEN NEEVUS, NAEVUS PIGMENTOSUS)

A. Melanosyyttien hyvänlaatuinen kasvain; esiintyy lähes kaikilla ihmisillä.

1. Ilmenee ihon tasossa tai koholla olevana tasavärisenä, tyypillisesti alle 6mm halkaisijaltaan olevana jokseenkin selkeärajaisena muutoksena.

B. Voivat olla synnynnäisiä tai kehittyä myöhemmin elämässä.

1. Synnynnäiset (naevus congenitalis) ovat yleensä isompia ja niiden läpi kasvaa usein karvoja; n. 1-2% vastasyntyneistä.

C. Voidaan erotella neevussolujen sijainnin perusteella useaan eri tyyppiin, jotka ovat neevuksen kasvun eri vaiheita.

1. Rajaluomi (junktionaalinen nevus) – melanosyyttien saarekemainen proliferaatio dermoepidermaalisessa junktiossa

- a. Tavataan lapsilla; jalkapohjien ja kämmenten melanosyyttiluomet pysyvät yleensä rajaluomina aikuisillakin

2. Yhdistelmäluomi (compositus-nevus, naevus compositus) – saareke kasvaa dermikseen; neevussoluja sijaitsee sekä dermiksessä että rajavyöhykkeessä

- a. Jos valkoinen halo ilmenee luomen (ei tarvitse olla juuri yhdistelmäluomi) ympärille, sitä kutsutaan haloluomeksi (halo naevus)
- 3. Intradermaalinevus - rajavyöhykkeen neevussolut häviävät ja vain intradermaalinen osuus jää jäljelle; yleisin luomityyppi aikuisilla
 - a. Usein vaalenevat iän myötä
 - b. Yksi erikoistyyppi eli siniluomi on dermiksessä oleva pigmenttiä tuottava luomi, joka kuultaa ihon läpi sinertävänä tai sinimustana.
- D. Dysplasian muodostuessa luomeen sitä kutsutaan dysplastiseksi neevukseksi, joka on premaligni pigmenttisolukasvain.
 - 1. Atyyppinen luomi (ärjyluomi) on kliininen nimitys, joka kuvailee värikästä, epätasaisesti pigmentoitunutta, epätarkkarajaista luomea, jonka läpimitta on yli 6mm (kts. melanooman ABCDE).
 - a. Kaikki atyyppiset luomet eivät ole histologisesti dysplastisia, eivätkä histologisesti kaikki dysplastiset luomet ole kliiniseltä kultaan atyyppisiä.
 - 2. Melanooman riski ei ole merkittävästi kohonnut yksittäisessä dysplastisessa luomessa; useat dysplastiset luomet esimerkiksi atyyppisten luomien oireyhtymässä (AMS tai FAMMM, CDKN2A-mutaatio) taas nostavat melanooman riskiä koko iholla.

VIII. MELANOOMA

- A. Melanosyyttien pahanlaatuinen proliferaatio; Suomessa n. 1800 tapausta vuodessa ja määrä kasvaa (vanhentuminen, auringonotto).
 - 1. 5-vuotiselossaoloennuste on yli 90%; kuitenkin yleisin tappaja ihosyöpätyypeistä.
 - 2. Myös lapsella voi olla melanooma (usein Spitzin luomea vaikea erottaa malignista)
- B. Riskitekijät ovat samat kuin tyvisolusyövässä (auringonvalo ja sen altistusta tehostavat albinismi ja xeroderma pigmentosum) sekä atyyppisten luomien oireyhtymä (myös ihan pelkkä runsasluomisuuskin altistaa).
- C. Atyyppiset melanoomaan mahdollisesti viittaavat luomet voidaan erotella kliinisesti tyypillisistä luomista seuraamalla epäilyttävän pigmenttimuutoksen ABCDE -sääntöä.
 - 1. **A**symmetry – muutos on epäsäännöllinen muodon ja pigmentaation suhteen
 - 2. **B**order – muutos on epätarkkarajainen
 - 3. **C**olor – eri sävyjä epätasaisesti
 - 4. **D**iameter – >6mm
 - 5. **E**volution – luomi kasvaa ja muuttuu
- D. Melanoomaksi epäilty muutos tulee viivytyksettä poistaa näytteeksi.
 - 1. Muutos pyritään aina poistamaan kokonaisuudessaan veneviillolla 1-2 mm:n marginaalein ihonalaiseen rasvaan asti; syvyysuunnassa poisto rasvakudokseen asti. Liian suuren muutoksen tapauksessa voi ottaa stanssibiopsian.
- E. Jaetaan kasvuvaiheen mukaan in situ -melanoomiin (pintamelanooma) ja invasiivisiin melanoomiin.
 - 1. In situ -vaiheessa kasvu tapahtuu radiaalisesti (horisontaalisesti) epidermistä pitkin.
 - 2. Invasiivisessa vaiheessa kasvu tapahtuu vertikaalisesti syvälle dermikseen.
 - a. Kohonnut metastasoinnin riski; tärkein ennustetekijä on melanooman paksuus eli Breslow'n mitta (mitta epidermisen granulaarisolukerroksen pinnasta syvimpiin melanoomasoluihin).
 - i. Clarkin luokat (I-V) kuvaavat myös invaasiosyvyyttä, mutta eivät ole ennusteellisesti yhtä luotettavia kuin Breslow'n mitta.

- b. Breslow'n mitta lasketaan vain invasiiviselle tuumoreille -> in situ-melanoomalle Breslow on 0 (yleensä ei ilmoiteta PAD-lausunnossa)

F. Voidaan jakaa kliinisesti ja histologisesti neljään tyyppiin.

1. Lentigo malignasta alkunsa saanut melanooma (n. 5-10%): in situ -vaihe (Lentigo maligna) kestää pitkään ja invasiivisessakin vaiheessa kasvu on horisontaalista; metastasointi on harvinaista ja ennuste on hyvä
 - a. Lentigo maligna on melanooma in situn alaluokka, jolle on tyypillistä ilmeneminen aurinkoaltistuksesta vaurioituneilla alueilla (yleensä laaja litteä muutos iäkkäiden ihmisten kasvoissa); voi varsinkin alkuvaiheessa muistuttaa solaarikeratoosia
2. Pinnallisesti leviävä (yleisin, n. 70%): myös horisontaalinen kasvutapa, jonka tyyppipiirteenä on epidermisen kaikkiin kerroksiin pagetoidisti leviävät kasvainsolut; hyvä ennuste.
 - a. Eroaa lentigo maligna -melanoomasta makroskooppisesti siten, että ilmenee myös kroonisimpien valoalueiden ulkopuolella (yleensä ns. intermittoivan vahvan altistuksen alueilla kuten vartalossa), on usein enemmän koholla, tummempi ja ilmenee usein nuoremmilla
3. Nodulaarinen (n. 15%): kasvaa aikaisesti vertikaalisesti ja metastasoi herkemmin; huonompi ennuste
 - a. Ei tyyppillisesti seuraa ABCD-sääntöä; parhaiten seuraa vain E-kriteeriä
 - b. Usein amelanootinen -> vaikeuttaa tunnistamista
4. Akraalinen eli raajojen lentigomainen (n. 5%): muistuttaa histologisesti lentigo malignaa, mutta sijaitsee kämmenessä, jalkapohjissa ja jopa kynsien alla; ennuste on huono
 - a. Yleisin melanoomatyyppi tummaihoisilla

G. Melanooman TNM-luokitus


1. T: Breslow'n mitan mukaan T1 (<1mm), T2 (1-2mm), T3 (2-4mm) ja T4 (>4mm).
 - a. Ulseraation (melanooman päällä olevan epidermisen spontaani haavautuminen; on melanooman itsenäinen ennustetekijä ja osoitus sen biologisesta aggressiivisuudesta) mukaan jaetaan a- ja b-luokkiin:
 - i. T1a = melanooma alle 0.8mm eikä ulseraatiota, T1b = melanooma alle 0,8mm ja ulseraatiota / 0.8mm-1mm ± ulseraatiota.
 - ii. T2-T4 myös jaetaan a ja b ryhmiin (a ilman ulseraatiota, b ulseraation kanssa)
 - b. Pinnallinen melanooma = korkeintaan 2mm Breslow
2. N: keskisyvissä ja paksuissa ihomelanoomissa vartijaimusolmukkeen tila on vahvin yksittäinen ennustetekijä
 - a. Niitä imusolmukkeita, jotka vastaanottavat ensimmäisenä suoraan kasvainalueelta tulevan imunesteen ja sen mukana kulkevat mahdolliset kasvainsolut, kutsutaan vartijasolmukkeiksi
 - i. n. 20%:lla potilaista on primaarivaiheessa mikrometastaasi lähialueen imusolmukkeissa
 - b. Usein tehdään vartijaimusolmuketutkimus (poistetaan samassa leikkauksessa emokasvaimen laajemman poiston yhteydessä), kun Breslow

vähintään 1 (0.8-1mm, jos muita aktiivisuuden merkkejä esim. ulseraatiota tai mitooseja tai potilas on keskimääräistä nuorempi (<40-50v))


- i. Jos vartijasolmuke on terve, myöskään muissa imusolmukkeissa ei todennäköisesti ole metastaaseja
 - ii. Jos taas on mikrometastaasi, niin uusiutumiskiriski on korkea ja tarvitaan räätälöity jälkiseuranta; mahdollisesti voidaan tehdä imusolmuke-evakuaatio (poistaa koko paikallinen imusolmukealue kainalosta, nivusalueelta tai kaulalta), jos potilaalla on kliinisesti palpaation tai kaikukuvauksen perusteella todetut ja ohutneulabiopsialla varmistetut imusolmukkeiden makroskooppiset etäpesäkkeet
3. M: Ihon ulkopuolisista rakenteista yleisimpiä metastasointipaikkoja ovat keuhkot, maksa, luut ja aivot
4. Muita ennustetekijöitä, joita ilmoitetaan melanooman PAD-lausunnossa ovat mitoosien määrä, regressio, melanoomaan työntyvät lymfosyytit, mikroskooppiset satelliittileesiot, perineuraalinen invaasio sekä invaasio imu- ja verisuoniin
 - a. Mitoosien määrä on suoraan verrannollinen melanooman kuolleisuuteen (>1/mm² on raja-arvo vaikutukselle eli onko vai eikö mitooseja ole havaittavissa); käytettiin ennen jaottelemaan T1-luokan sisällä melanoomat T1a ja T1b, mutta ei ole nykyisissä suosituksissa tällä hetkellä käytössä (tulevaisuudessa mitoosifrekvenssi taas varmaan takaisin TNM-luokitukseen)
 - b. Regressio = tuumorissa on alue, jossa tuumorikudosta katoaa ja se korvataan progressiivisesti fibroosilla ja vaihtelevalla tulehdussolukolla ja vaskulaarisuudella; vaikutus prognoosiin kiistelty, mutta ainakin osittaisen regression ajatellaan olevan yhteydessä parempaan prognoosiin
 - c. Satelliittileesiot ovat metastaaseja primaarituumorin ulkopuolelle, jotka eivät ole vielä päässeet imusolmukkeisiin.
 - i. Mikrosatelliittimetastaasit = syöpäsolut nähdään primäärituumorin vieressä (eivät koske siihen) mikroskooppilla
 - ii. Satelliittimetastaasit = syöpäsoluja on levinnyt alle 2cm päähän primäärituumorista
 - iii. In-transit metastaasit = syöpäsoluja on levinnyt yli 2cm päähän mutta ei vielä imusolmukkeisiin
5. Voidaan jakaa eri asteisiin (stage)
 - a. Stage 0 = melanoma in situ
 - i. Ei tarvitse seurata
 - b. Stage 1 = T1-T2a, N0, M0
 - i. Stage 1 potilaat seurataan leikkauksen jälkeen tk:ssa (kliininen tutkimus kerran vuodessa viiden vuoden ajan, minkä jälkeen vain erityisiin riskiryhmiin kuuluvien seuranta on tarpeen); seurataan iho- ja imusolmukealueita, ei rutiinimaisia labroja tai kuvantamisia
 - c. Stage 2 = T2b-T4b, N0, M0
 - d. Stage 3 = mikä tahansa T, läheisiä metastaaseja (satelliittituumoreita tai paikallisia imusolmukemetastaaseja), M0

- e. Stage 4 = mikä tahansa T ja N, etäisiä metastaaseja (M1)
- 6. Tärkein hoito on melanooman tai useimmiten sen poistoarven laajempi poisto (tehdään sairaalassa); tavoitteena on paikallisen uusiutuman estäminen
 - a. Poistomarginaalin leveys riippuu Breslow'n mitasta:
 - i. 2,0 mm ja sitä ohuempien melanoomien suositeltava terveen ihon marginaali on 1 cm ja sitä paksumpien 2 cm, syvyyssuunnassa poisto tehdään faskiatasoon saakka.
 - ii. Pintamelanoomassa (melanooma in situ) marginaaliksi riittää yleensä 5 mm (voi poistaa tk:ssakin)
 - b. Melanooma voi uusiutua paikallisesti leikkausarvessa, lähisatelliitteina, imutiealueen intransit-metastaaseina, alueellisina imusolmukemetastaaseina tai systeemisesti etäpesäkkeinä muissa elimissä.
 - i. Uusiutuminen tapahtuu useimmiten ensimmäisten vuosien aikana (>50% uusiutumisista 2 vuoden sisällä), mutta joskus paljon myöhemmin, jopa vuosikymmenien jälkeen.

KUVAT




Kuva 1.1. Vasemman kammion hypertrofia






Kuva 1.2. Barretin esofagus




Kuva 1.3. A-vitamiinin puute - Keratomalasia




Kuva 1.4. Myositis ossificans



Kuva 1.5. Dysplasia (CIN)




Kuva 1.6.1. Munuaisen infarkti (koagulaationekroosi)




Kuva 1.6.2. Munuaisen infarkti (koagulaationekroosi), histologia (oikealla normaalia parenkyymiä)




Kuva 1.7. Kivesten hemorrhaginen infarkti




Kuva 1.8. Nestemäinen nekroosi (aivoinfarkti)



Kuva 1.9. Rasvanekroosi (haima)




Kuva 1.10. Juustonekroosi (Ghon focus)





Kuva 1.11. Fibrinoidi nekroosi




Kuva 1.12. Gangreeni (kuiva)




Kuva 1.13. Lipofuskiini (hepatosyyteissä)



Kuva 1.14. Amyloidikertymiä munuaiskeräsessä ja verisuonen seinämässä (Kongopuna ja polarisoitu valo)



Kuva 2.1.1. Akuutti tulehdus (appendisiitti)



Kuva 2.1.2. Krooninen tulehdus (servisiitti)




Fig. 3.12 Serous inflammation. Low-power view of a cross section of a skin blister showing the epidermis separated from the dermis by a focal collection of serous effusion.

Kuva 2.2. Seroosi tulehdus (ihorakkula)




Fig. 3.13 Fibrinous pericarditis. (A) Deposits of fibrin on the pericardium. (B) A pink meshwork of fibrin exudate (F) overlies the pericardial surface (P).

Kuva 2.3. Fibrinoottinen tulehdus (perikardiitti)




Fig. 3.14 Purulent inflammation. (A) Multiple bacterial abscesses (arrows) in the lung in a case of bronchopneumonia. (B) The abscess contains neutrophils and cellular debris, and is surrounded by congested blood vessels.

Kuva 2.4. (bronkopneumonia)





Fig. 3.15 The morphology of an ulcer. (A) A chronic duodenal ulcer. (B) Low-power cross-section view of a duodenal ulcer crater with an acute inflammatory exudate in the base.

Kuva 2.5. Ulkus (peptinen ulkustauti)




Kuva 2.6. Normaali suoliston histologia



Kuva 2.7. Normaali ihon histologia




Kuva 2.8. Sydäninfarktin jälkeistä arpeutumista




Kuva 2.9. Granulaatiokudos




2.10. Hypertrofinen arpi



Kuva 2.11. Keloidi korvalehdessä



Kuva 2.12. Kaseoiva nekroosi



Kuva 2.13. Ei-kaseoiva granulooma (Crohnin tauti)



Kuva 2.14. SLE:n diskoidi ihottuma ja perhosihottuma

CREST



□ Sclerodactyly



Calcinosis



Telangiectasia




Raynaud


Kuva 2.15. CREST-oireyhtymä



Kuva 4.1. Petekkia, purppura, ekkymoosi




Kuva 4.2. Zahnin linjat



Kuva 5.1. Mikrosyyttinen, hypokrominen anemia (raudanpuuteanemia)



Kuva 5.2. Koilonykia (raudanpuute)




Kuva 5.3. Sideroblasti




Kuva 5.4. Maalitaulusoluja (target-cells)




Kuva 5.5. Betatalassemia major




Kuva 5.6. Hypersegmentoitunut neutrofili




Kuva 5.7. Retikulosyytti




Kuva 5.8. Sferosyytti




Kuva 5.9. Sirppisoluanemia




Kuva 5.10. Howell-Jollyn kappale



Kuva 5.11. Bite-soluja (G6PD-puutos)




Kuva 5.12. Skistosyytti




Kuva 5.13. Pisarasoluja




Kuva 6.1. Mononukleosi




Kuva 6.2. Atyyppisiä (T)-lymfosyyttejä; mononukleosi




Kuva 6.3. Auerin sauva



Kuva 6.4. "Smudge"-solu




Kuva 6.5. Karvasoluleukemia




Kuva 6.6. Dakrosyytti




Kuva 6.7. Birbeck-granula



Kuva 6.8. Imusolmuke




Kuva 6.9. Follikulaarinen lymfooma




FOLLICULAR HYPERPLASIA	FOLLICULAR LYMPHOMA
Follicles are of varying size 1	Uniform sized, back to back follicles 1
Distinct mantle zone 2	Indistinct mantle zone 2
Maintained polarity	Loss of polarity
Has tingible body macrophages	Lack of tingible body macrophages
High Ki67 and negative germinal center Bcl-2	Low Ki67 and positive germinal center Bcl-2


Kuva 6.10. Reaktiivinen hyperplasia vs. follikulaarinen lymfooma




Kuva 6.11. Burkittin lymfooma




Kuva 6.12. Pautrierin mikroabskessi




Kuva 6.13. Sezaryn soluja




Kuva 6.14. Reed-Sternbergin soluja (HL)



Kuva 6.15. Klassinen HL; sidekudoskyhmyinen




Kuva 6.16. Lakunaarisia RS-soluja (CHL; sidekudoskyhmyinen)




Kuva 6.17. NLPHL; popcorn-tuma epäklassisella RS-solulla (LP-solu)




Kuva 6.18. Osteolyysi multippelissa myeloomassa ("punched-out")




Kuva 7.1. Fibromuskulaarinen dysplasia



Kuva 7.2. Ateroskleroosi




Kuva 7.3. Hyaliini arterioloskleroosi



Kuva 7.4. Hyperplastinen arterioloskleroosi



Kuva 7.5. ”Kirpunpuremat” munuaisessa




Kuva 7.6. Mönckebergin skleroosi




Kuva 7.7. A-dilataatio; B-avattu aneurysma, jossa muraalista trombusta



Kuva 7.8. Kaarnamainen aortta tertiäärisessä kupassa



Kuva 7.9. Verisuonen histologia



Kuva 7.10. Jättisoluarteriitti




Kuva 7.11. Hemangiooma




Kuva 7.12. Angiosarkooma




Kuva 7.13. Kaposin sarkooma




Kuva 8.1. Contraction band necrosis



Kuva 8.2. Alle 1pv sydäninfarkti




Kuva 8.3. Noin 3pv sydäninfarkti




Kuva 8.4. Fibrinoidi perikardiitti




Kuva 8.5. Noin 3-10pv, kellertävä infarktialue, jolla punainen reunus





Kuva 8.6. Papillaarilihasruptuura




Kuva 8.7. Vaalea arpi (alla; ylhäällä sitten akuutti infarkti, jossa kellertävä keskus)



Kuva 8.8. Arpeutunut sydäninfarkti



Kuva 8.9. Muraalinen trombus, aneurysma




Kuva 8.10. Sydänvikasolut

- Using the physiological knowledge to explain the causes of jugular vein distention and peripheral (pitting) edema in patients with right heart failure.



Kuva 8.11. Jugularisten pullotus ja pitting-ödeema




Kuva 8.12. Muskottimaksa








Kuva 8.13. Kellonlasikynnet




Kuva 8.14. Kylkiluiden inferioiren loveutuminen




Kuva 8.15. Jonesin kriteerit



Kuva 8.16. Akuutti reumaattinen kuume, mitraaliläppä



Kuva 8.17. Myokardiitti, reumakuume



Kuva 8.18. Mitraaliläpän kalansuu-deformaatio, reumakuume



Kuva 8.19. Aorttastenoosi, krooninen reumakuume




Kuva 8.20. "Splinter" hemorrhagia, endokardiitti



Kuva 8.21. Janewayn leesio/Oslerin kyhmy



Kuva 8.22. Roth spot




Kuva 8.23. Myocardial disarray


Nasal polyps




Kuva 9.1. Nenäpolyppi




Kuva 9.2.1. Nasofaryngeaalikarsinooma, ei-keratinisoiva, erilaistumaton




Kuva 9.2.2. Nasofaryngeaalikarsinooma, keratinisoimaton, erilaistunut




Kuva 9.2.3. Nasofaryngeaalikarsinooma, keratinisoiva




Kuva 9.3. Epiglottiitti




Kuva 9.4. Äänihuulikyhmyt




Kuva 9.5. Laryngeaalipapillomatoosi




Kuva 9.6. Kongestiovaihe



Kuva 9.7. Punainen ja harmaa hepatisaatio




Kuva 9.8. Bronkopneumonia






Kuva 9.9. Interstitiaalinen pneumonia




Kuva 9.10. Ghonin fokus




Kuva 9.11. Ziehl-Neelsen-värjäys




Kuva 9.12. Spirometria




Kuva 9.13. Reidin indeksi



Kuva 9.14. Pinkki puhisija vs sininen turvottaja (Pink puffer vs blue bloater)




Normal Lung - Gross




Emphysematous Lung - Gross


Kuva 9.15. Emfyseema



Kuva 9.16. Emfyseema



Kuva 9.17. Senti- vs. panasinaarinen emfyseema




Kuva 9.18. PASD-värijäys paljastaa hepatosyyttien intrasytoplasmiset kappaleet A1AT-puutoksessa


Seen in patients with **emphysema**

Increased lung compliance

Increased FRC → larger volumes in chest




Kuva 9.19. Tynnyririnta




Kuva 9.20. Curschmannin spiraali (Bronkusimunäyte)




Kuva 9.21. Charcot-Leydenin kristalleja ja eosinofiilejä




Kuva 9.22. Situs inversus



Kuva 9.23. UIP




Kuva 9.24. Hunajakennokeuhkot




Kuva 9.25. Asteroidikappale




Kuva 9.26. Erythema nodosum




Kuva 9.27. Pleuraplakki



Kuva 9.28. Asbestikappaleita (ferruginous bodies)




Kuva 9.29. Silikoosi




Kuva 9.30. Antrakoosi



Kuva 9.31. CWP



Kuva 9.32. Pleksiforminen leesio




Kuva 9.33. ARDS




Kuva 9.34. Vena cava superior -syndrooma; Pemberton sign

Horner's Syndrome


a neurological condition that affects the sympathetic nerve pathway




Kuva 9.35. Hornerin oireyhtymä



Kuva 9.36. SCLC



Kuva 9.37. Keuhkojen adenokarsinooma



Kuva 9.38. Adenokarsinooma in situ






Squamous Cell Carcinoma "Invasive sheets of carcinoma cells with keratinization"	Adenocarcinoma "Gland-related structures of carcinoma cells or carcinoma derived from gland"
	
Two key histologic features: A. Keratin pearl B. Intercellular bridge	A. Glandular, ductal, tubular, acinar, follicular, alveolar B. Cribriform C. Papillary, micropapillary, pseudopapillary D. Solid
Mucin(-), PAS(+), PAS with Diastase(-)	Mucin(+), PAS(+), PAS with Diastase(+)


Figure 1. Simon Harrison et al. *Mac's Textbook of Pathology* (3rd Edition, Page 85, CRC Press, International Standard Book Number-13: 978-1-4441-8495-5).




Kuva 9.39. Levyepiteelikarsinooma



Kuva 9.40. Suurisolainen keuhkokarsinoma



Kuva 9.41. Karsinoidituumori, rosettimainen kasvutapa



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

Kuva 10.1. Huuli-suulakihalkio



Kuva 10.2. Afta

Recurrent oral ulceration	Major, minor or herpetiform, 3 or more episodes in a 12 month period
+ 2 of the following manifestations	
Recurrent genital ulcers	Aphthous ulcerations or scarring observed by the physician
Eye lesions	Anterior uveitis, posterior uveitis, cells in the vitreous slit lamp examination or retinal vasculitis observed by the ophthalmologist
Cutaneous lesions	Erythema nodosum, pustular lesions, acneiform nodules in post-adolescent patients
Positive pathergy test	Read by physician at 24 and 48 hours


Kuva 10.3. Behcetin taudin diagnostiset kriteerit



Kuva 10.4. Gingivostomatiitti



Kuva 10.5. Huuliherpes



Kuva 10.6. Suun SCC



Kuva 10.7. Leukoplakia



Kuva 10.8. Kandidiaasi




Kuva 10.9. Karvainen leukoplakia




Kuva 10.10. Erythroplakia




Kuva 10.11. Kiilteen eroosio




Kuva 10.12. Gingiviitti, periodontiitti



Kuva 10.13.




Kuva 10.14. Sikotauti (mumps) – parotiitti




Kuva 10.15. Pleomorfinen adenooma


Warthin tumour




Kuva 10.16. Warthinin tuumori




Kuva 10.17. Adenokystinen karsinooma



Kuva 10.18. Perineuraali-invaasio (adenokystinen karsinooma)



Kuva 10.19. Mukoepidermoidi karsinooma (pun = epidermoidisolu (levyepiteelisolu), virh = musinoottinen solu, kelt = välimuotoinen solu)



Kuva 1 Esofagusatresia ja trakeo-esofageaalinen fisteli (7).

Kuva 10.20. TEF/EA tyypit

Zenkerin divertikkeli

Videofluorografiassa näkyy ruokatorvesta posteriorisesti pullistuva umpipussi (nuoli).



Kuva 10.21. Zenkerin divertikkeli





Fig. 2. Killian's triangle on the dorsal wall of the hypopharynx (dorsal view, male, 67 years old). The triangle is formed between the oblique- (white arrow heads) and the transversal-(black arrow head) orientated muscle fibers of the inferior pharyngeal constrictor muscle. The white arrows show the scanty irregular muscle fibers within Killian's triangle. E = esophagus. [Color figure can be viewed in the online issue, which is available at www.interscience.wiley.com.]


Kuva 10.22. Killianin kolmio



Kuva 10.23. Mallory-Weissin leesio



Kuva 10.24. Ruokatorvivarix



Kuva 10.25. Linnunnokkailmiö

Type of hiatal hernia

Normal anatomy




Type I

sliding hiatal hernia
most common (95%)



Type II

paraesophageal hernia



Type III

mixed hiatal hernia




Daranceau A. Dis Esophagus 2016;29(4):350-66.


Kuva 10.26. Hiatusherniat





10.27. Schatzkin rengas endoskooppisesti ja bariumvarjokuvauksessa



Kuva 10.28. Refluksiesofagiitti




Kuva 10.29. Keskivaikea refluksiesofagiitti




Kuva 10.30. Barretin ruokatorvi




Kuva 10.31. Barretin ruokatorvi




Kuva 10.32. Ruokatorven adenokarsinooma



Kuva 10.33. Verkkomainen muutos ruokatorvessa; "Esophagel web"



Kuva 10.34. *H. pylori* H&E-värjäyksessä




Kuva 10.35. *H. pylori* Giemsa-värjäyksessä




There are multiple small sessile polyps in the gastric antrum and prepyloric stomach.

The pyloric sphincter is in the center of the image

Kuva 10.36. Polyyppejä mahalaukussa




Kuva 10.37. Intestinaalinen adenokarsinooma



Kuva 10.38. Diffuusi adenokarsinooma

Signet ring cell




Kuva 10.39. Sinettisormussolu



Kuva 10.40. Virchowin imusolmuke




Kuva 10.41. Acanthosis nigricans



Kuva 10.42. Leser-Trelatin merkki



Kuva 10.43. Sisar Mary Josephin kyhmy



Stomach GIST, composed of cells with elongated nuclei and eosinophilic cytoplasm, arranged in fascicles (medium power).
Contributed by Phoenix D. Bell, M.D., M.S. (Case #523)




Kuva 10.44. GIST (spindle-type eli yleisin)



Figure 4. Acute volvulus without necrosis; a knot of narrow elongated mesenterial base in anticlockwise rotation.



Figure 5. One of our patients with coffee-bean necrosis of the sigmoid colon.




Kuva 10.46. Meckelin divertikkeli



Kuva 10.47. Intussusseptio (invaginaatio, suolentuppeuma)

Currant Jelly Stools



- Currant jelly stools have a gelatinous consistency and a reddish appearance
- Often seen in infants with intussusception




Kuva 10.48. Viininmarjauloste



Kuva 10.49. Napakymppiultraääni




Kuva 10.50. Dermatitis herpetiformis



Kuva 10.51. Norm vs Keliakia




Kuva 10.52. Pseudomembranoottinen koliitti



Kuva 10.53. Whipplen tauti ("foamy" makrofageja lamina propriassa)




Kuva 10.54. Neuroendokriininen tuumori ileumissa



Kuva 1. McBurneyn piste ja umpilisäkkeen sijainti. McBurneyn piste ja umpilisäkkeen sijainnin vaihtelu.

Kuva:

Kuva 10.55. McBurneyn piste



Kuva 10.56. Umpilisäkkeen asento



Kuva 10.57. Rovsingin koe


Iliopsoas' sign

- **Elicitation:** patient on left lateral decubitus and examiner extends patients right leg at the hip
- **Positive response:** The patient feels pain in the right lower quadrant



If the patient has appendicitis, the obturator test will be extremely painful

Kuva 10.58. Psoas- ja obturatorikokeet



Kuva 1. Tietokonetomografia periappendikulaaripaiseesta aksiaalileikkeessä (A) ja koronaalileikkeessä (B). Paiseessa (nuoli) näkyy kaasukuplia, jota ei aina paiseen yhteydessä ole nähtävissä. Umpilisäke ei erotu selvästi kuvista. Anatomisen sijainnin ymmärtäminen edellyttää tarkastelua eri leikesuunnista. Aksiaalikuvassa nähdään, että paise sijaitsee umpisuolen (tähti) takana eli retrosekaalisesti. Kuvassa näkyvää suolistovarjoainetta ei nykyään katsota tarpeelliseksi.

Kuva 10.59. Periappendikulaariabsessi

Taulukko 3.

HUSissa kehitetty akuutin appendisiitin diagnostinen Adult Appendicitis Score (7).

Oireet ja löydökset	Kipu oikealla alavatsalla	2
	Kivun siirtyminen	2
	Arkuus oikealla alavatsalla	
	16–49-vuotiaat naiset	1
	muut potilaat	3
	Defence	
	lievä	2
	kohtalainen tai vahva	4
Laboratoriokokeet	Valkosolut	
	$\geq 7,2$ ja $< 10,9$	1
	$\geq 10,9$ ja $< 14,0$	2
	$\geq 14,0$	3
	Neutrofiilien osuus, %	
	≥ 62 ja < 75	2
	≥ 75 ja < 83	3
	≥ 83	4
	CRP ja oireiden kesto < 24 h, mg/	
	≥ 4 ja < 11	2
	≥ 11 ja < 25	3
	≥ 25 ja < 83	5
	≥ 83	1
	CRP ja oireiden kesto > 24 h, mg/	
	≥ 12 ja < 53	2
	≥ 53 ja < 152	2
	≥ 152	1

Pisteet:

0–10 = umpilisäketulehdus on epätodennäköinen. Voidaan kotiuttaa, jos ei herää epäilyä muusta sairaudesta.

11–15 = umpilisäketulehdus on mahdollinen ja suositellaan kuvantamista.

16 tai enemmän = umpilisäketulehdus on todennäköinen ja suositellaan laparoskopiaa.

Sukupuoli: ☐ Mies ☐ Nainen

Oireiden kesto: ☐ Alle 24 h ☐ 24 h tai yli

Potilaalla on oikean alavatsan kipua ☐ Kyllä ☐ Ei

Kipu on siirtynyt ☐ Kyllä ☐ Ei

Oikea alavatsa aristaa tutkittaessa ☐ Kyllä ☐ Ei

Defencen voimakkuus ☐ Ei defencea ☐ Lievä ☐ Kohtalainen tai voimakas

Ikä: vuotta


Leukosyytit $\times 10^9$

Neutrofiilit $\times 10^9$

Huom.! Nykyisin absoluuttinen arvo


CRP mg/l

Kuva 10.60. Adult Appendicitis Score




Development of pseudomyxoma peritonei (PMP). CT scans with coronal view before (a) and after (b) development of PMP. Mucinous cystadenoma of the appendix (asterisk) in a. Typical features of PMP (b): ruptured calcified appendix (short slim arrow), massive mucinous ascites (short thick arrow), central displacement of the small bowel, and visceral scalloping of the liver (double arrow)

Kuva 10.61. Peritoneaalinen pseudomyksooma



Kuva 10.62. Pseudopolyyppettä haavaisessa paksusuolentulehduksessa



The Creeping Fat



- fibrofatty proliferation that "creeps" around the inflamed gut
- results from complex inflammatory response after bacteria transmural translocation
- a hallmark of Crohn's disease


Pupulin L. et al; 2023

Abdominal Radiology
The Official Journal of the American Society of Abdominal Radiology





↳ Cobblestone appearance

Kuva 10.63. Crohnin taudin makroskooppisia muutoksia




Microscopically, the inflammation of ulcerative colitis is confined primarily to the mucosa. Here, the mucosa is eroded by an inflammatory process with ulceration that undermines surrounding mucosa. The resulting **ulceration** often has a flask shape (Erlenmeyer flask...triggering flashbacks to organic chemistry).






One complication of transmural inflammation with Crohn disease is fistula formation. Seen here is a **fissure** extending through mucosa into the submucosa toward the muscular wall, which eventually will form a fistulous tract. Fistulae can form between loops of bowel, bladder, and even skin. With colonic involvement, perirectal fistulae are common.

Crohn's disease



Granuloma

Ulcerative colitis




Crypt abscess



Kuva 10.66. Erythema nodosum (ylä), pyoderma gangrenosum (ala)




Kuva 10.67. Toksinen megakoolon




Kuva 1. a) Lymfositikoliitti: intraepiteelialisten lymfositien ylämäärää ja lamina propriassa lievää kroonisten tulehdussolujen ylämäärää. Tyvikalvo on normaalin paksuinen. b) Kollageenikoliitti: paksuuntunut ja kroonisesti tulehtunut tyvikalvo (Herovici värjäys, tyvikalvo punainen). Pintaepiteeli on osin irronnut tyvikalvosta. Lievää kroonisten tulehdussolujen ylämäärää lamina propriassa. Kuva: Ari Ristimäki.



10.68. Mikroskooppinen koliitti – Histologia



Kuva 10.69 Koolonin divertikkeli (pseudodivertikkeli)



Kuva 10.70 Divertikkeli kolonoskopiassa




Kuva 10.71 Angiodysplasia



Kuva 10.72 Periditaarinen hemorraginen telangiektasia (HHT, Oslerin tauti)



11.1. Ikterus



11.2 Bilirubin metabolism



Table. TNM Pathological Staging Overview

Stage	Tumor	Node	Metastasis
0	Tis	N0	M0
IA	T1a or T1b	N0	M0
IB	T2a	N0	M0
IIA	T2b or T3a	N0	M0
IIB	T3b or T4a	N0	M0
IIC	T4b	N0	M0
IIIA	T1a/b or T2a	N1a or N2a	M0
IIIB	T0 T1a/b or T2a T2b or T3a	N1b or N1c N1b/c or N2b N1a/b/c or N2a/b	M0
IIIC	T0 T1a/b, T2a/b, or T3a T3b or T4a T4b	N2b/c or N3b/c N2c or N3a/b/c Any N $\geq$ N1 N1a/b/c or N2a/b/c	M0
IIID	T4b	N3a/b/c	M0
IV	Any T, Tis	Any N	M1

N, number of tumor-involved regional lymph nodes; M, number of metastases at distant site; T, primary tumor thickness.