
Study
Condition
N
g [95% CI]
Intervention arms: post − pre
Stieger et al., 2021 MBSR 33 0.38 [0.03, 0.73]
Tortella−Feliu et al., 2020 MBI 44 0.73 [0.39, 1.06]
Polsinelli et al., 2020 FAM 27 0.10 [−0.28, 0.48]
Isbel et al., 2020 MBI− 53 0.48 [0.20, 0.77]
Rowland et al., 2019 UBM 60 0.42 [0.16, 0.69]
Levinson et al., 2014 BCT 22 0.62 [0.17, 1.08]
Pooled: 0.46 [0.31, 0.61], p < .001; I² = 19% 0.46 [0.31, 0.61]
Control arms: post − pre
Stieger et al., 2021 waitlist 29 −0.06 [−0.42, 0.31]
Tortella−Feliu et al., 2020 waitlist 24 0.08 [−0.32, 0.48]
Polsinelli et al., 2020 imagery 23 0.00 [−0.41, 0.41]
Isbel et al., 2020 attention 33 −0.15 [−0.49, 0.19]
Rowland et al., 2019 waitlist 60 0.02 [−0.23, 0.27]
Levinson et al., 2014 n−back + none 49 −0.51 [−0.81, −0.21]
Pooled: −0.11 [−0.30, 0.07], p = 0.233; I² = 47% −0.11 [−0.30, 0.07]
Controlled effect: intervention change − control change
Stieger et al., 2021 MBSR vs waitlist 33 / 29 0.44 [−0.07, 0.94]
Tortella−Feliu et al., 2020 MBI vs waitlist 44 / 24 0.64 [0.12, 1.16]
Polsinelli et al., 2020 FAM vs imagery 27 / 23 0.10 [−0.46, 0.65]
Isbel et al., 2020 MBI− vs attention 53 / 33 0.63 [0.19, 1.08]
Rowland et al., 2019 UBM vs waitlist 60 / 60 0.40 [0.04, 0.77]
Levinson et al., 2014 BCT vs n−back + none 22 / 49 1.13 [0.59, 1.68]
Pooled: 0.55 [0.31, 0.79], p < .001; I² = 33% 0.55 [0.31, 0.79]
Intervention vs control arms: Q_M = 20.5, df = 1, p < .001. Assumed pre/post r = 0.5.
−1
0
0.5
1
1.5
2
Hedges' g (pre−test SD units)