

MANUEL DE CULTURE CAFEIER



RÉDIGÉ PAR L'ÉQUIPE DES
INGÉNIEURS DE IFATI



N° AGREMENT : 086/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/SACD
INSTITUT DE FORMATION EN AGRICULTURE ET TECHNOLOGIES INNOVANTES
672 03 53 64 -659 40 89 98- TRAININGCENTER@IFATI.NET SITUÉ À DOUALA - NDOGBONG À
100M DERRIÈRE ANCIEN DÉPOT GUINNESS
Site web : www.ifati.net

TECHNOLOGIE DE CULTURE DU CAFEIER	3
GENERALITES	3
I. LES UTILISATIONS DU CAFEIER.....	3
II. LES EXIGENCES DE LA CULTURE	3
III. CONDUITE DE LA CULTURE	4
III.1- OBTENTION DU MATERIEL VEGETAL	4
III.2- TRANSFERT EN PEPINIERE.....	5
III.3- PREPARATION DU TERRAIN ET PLANTING	6
III.4- ENTRETIENS	6
III.4.1- DESHERBAGE	6
III.4.2- TAILLE	7
III.4.3- FERTILISATION	8
III.4.4- CONTROLE DES MALADIES ET RAVAGEURS	8
IV. RECOLTE ET RENDEMENT.....	9
V. TECHNIQUES POST-RECOLTE	9

TECHNOLOGIE DE CULTURE DU CAFEIER

GENERALITES

C'est un petit arbre originaire d'Afrique qui se plaît mieux dans les zones ombragées. Il présente environ 70 variétés mais ce ne sont que deux variétés qui sont commercialisés pour obtenir les cafés actuels. Il s'agit du caféier arabica et du caféier robusta. Le premier se cultive dans les hautes terres, parce s'adaptant mieux à des faibles températures, tandis que la deuxième se cultive dans les zones chaudes.

I. LES UTILISATIONS DU CAFEIER

- Le café est utilisé pour la confection des boissons chaudes ou froides
- On l'utilise aussi en pâtisserie et en confiserie
- Les sous-produits à savoir la parche sont utilisés comme compost après fermentation

II. LES EXIGENCES DE LA CULTURE


- Le caféier arabica pousse à des altitudes de 1300 et 1800 mètres
- La température optimale de croissance est de 20°C
- Le robusta quant à lui préfère des altitudes moins élevées, c'est la raison pour laquelle il se cultive dans le Mounjo
- Le pH doit être compris entre 4,2 et 6,5
- Les pluies doivent être abondantes et régulières
- Le sol doit être argileux, riche en matière organique et non engorgé
- Les pluies devront être de l'ordre de 1300 à 3000 mm et bien réparties le long de l'année

III. CONDUITE DE LA CULTURE

III.1- OBTENTION DU MATERIEL VEGETAL

Pour réaliser la pépinière, il faut tout d'abord confectionner des germoirs. Les étapes de réalisation du germoir sont les suivantes:

- Etablir une ombrière de palmes à 2,5 m du sol
- Faire des planches d'un mètre de large et de 15 m de long, et 20 cm de haut, en forme de caisses
- Remplir ces caisses avec de la terre humifère du couvert forestier, que l'on peut enrichir au compost (pour trois mesures de terre, prévoir une mesure de compost)
- On peut traiter ce sol avec un nématicide comme le Sésame ou bastion par saupoudrage à raison de 5 g au m².



Exemple de germoir pour caféier

- Obtenir les semences sélectionnées de L'IRAD de Nkolbisson, UCCAO à Bafoussam ou encore à Barombi kang à Kumba. Les graines ainsi mûres seront dépulpées manuellement dans de l'eau et étalées à l'ombre.

Il faut noter que chez le caféier arabica, espèce autogame, les graines peuvent être prélevées en champ, ce qui n'est pas le cas chez le robusta

- Tremper les graines dans un fongicide à base de cuivre comme Hydrox pendant 30 sec

- Semer les graines dans le germoir en lignes de 5 cm dans tous les sens et à 1 cm de profondeur, recouvrir de terre et pailler.
- Arroser le germoir une fois par jour.
- Un mois plus tard, retirer la paille
- Les graines vont germer entre 1,5 et 2 mois après ce semis et seront prêtes pour la pépinière

III.2- TRANSFERT EN PEPINIERE

Pour le transfert en pépinière, il faut:

- Confectionner une ombrière
- Remplir les sachets de polyéthylène de 12 x 20 cm avec de la terre humifère que l'on va désinfecter au nématicide. Si le terreau est compact, on devra le mélanger avec du sable ou de la parche de café à une part de café pour trois parts de terre.
- Classer les sachets dans des casiers en pépinière en bandes de 4
- Repiquer les graines germées dans lesdits sachets en pépinière
- Arroser régulièrement et désherber
- Au moins un mois après le repiquage, appliquer un engrais foliaire comme le FERTIGOFOL. L'urée peut être appliqué après dissolution d'une cuillère à café dans 10 litres d'eau, puis arrosage au collet.



plants en pépinière

- Les plants vont passer 9 mois en pépinière. Au huitième mois, commencer à réduire systématiquement l'ombrage (une palme sur trois).
- Appliquer une solution insecticide-fongicide en cas d'attaque

Les plants de caféier peuvent aussi être obtenus par bouturage, micro-bouturage, par marcottage et même par embryogenèse somatique.

III.3- PREPARATION DU TERRAIN ET PLANTING

En terrain vierge et sous couvert forestier, il faut:

- Réaliser le sous-bois et procéder à l'abattage
- Lors de l'abattage, il faudra laisser quelques arbres environ une vingtaine par hectare, qui serviront d'ombrage
- Procéder à un brulis et si possible au semis de la plante de couverture (*Pueraria javanica*)
- Puis retirer les branches et troncs pour en faire du bois de chauffage ou du bois de menuiserie
- Andainage: ouvrir des pistes tous les 2,5 mètres qui vont servir de lignes de plantation ou alors ranger le reste des débris sur des bandes de 2,5 mètres de large
- Au cas où aucun ombrage n'a été réalisé (étape 2), il faut planter au moins six mois avant la planting des plants de caféier, des espèces agro-forestières comme l'Erythrine, le Glyricidia ou le Leucaena tous les 10 à 12 mètres dans tous les sens et entre deux caféiers de deux lignes consécutives. De plus en plus, ces espèces sont remplacées par des cacaoyers, des manguiers, des safoutiers. Des plants de bananier-plantain peuvent aussi être plantés, mais il faudra les retirer dans les trois ans qui suivent pour ne laisser que les caféiers et les fruitiers.
- Pratiquer ensuite la trouaison et planter les plants de caféier à des écartements de 2,5 m entre les lignes et 2,5 m entre plants de la même ligne. Prendre surtout soin de séparer la terre de surface d'avec la terre de profondeur, qui ira plutôt en surface lors du planting.

III.4- ENTRETIENS

III.4.1- DESHERBAGE

Le semis de la plante de couverture peut fortement limiter l'expansion des mauvaises herbes. L'usage des herbicides est recommandé. On appliquera un herbicide comme le **GRAMOXONE**


ou le **PARAQUAT**. Cet herbicide sera appliqué après chaque repousse. Le **ROUND UP** peut aussi être appliqué.


Un caféier cultivé au soleil produit plus qu'un caféier cultivé à l'ombre. Il peut même produire trop et finalement rapidement s'épuiser et mourir. L'ombrage est donc un moyen d'adapter la production au milieu et d'éviter ainsi la mort de la plante. Si l'on veut cultiver le caféier en pleine lumière, il faut le fertiliser de façon intensive.

III.4.2- TAILLE

Il existe plusieurs tailles parmi lesquelles:

- La taille de formation: elle permet d'avoir un plant à plusieurs tiges. Elle consiste à couper la tige à une hauteur de 25 cm du sol. Ici, trois ou quatre gourmands sont laissés, les plus vigoureux
- La taille d'entretien: elle consiste à supprimer tous les gourmands, les vieilles branches et les branches mortes, après la récolte.
- La taille de régénération ou recépage: elle s'effectue sur des plantations de plus de 10 ans, pour favoriser la croissance de nouveaux rameaux. Ici, on coupe les vieilles tiges à trente cm du sol.
- La méthode d'**écimage**, conseillée par le CNRA (Centre National de Recherche Agricole), peut remplacer le recépage et évite les ruptures de récolte dues au recépage. Elle consiste à étêter régulièrement les jeunes caféiers à 1,70 m de haut. Supprimer régulièrement les rejets de tiges qui apparaissent.





III.4.3- FERTILISATION

Le jeune plant de caféier au en champ a besoin en croissance d'un engrais azoté comme le sulfate d'ammoniaque que l'on applique un mois après le plant à raison d'une cuillère à soupe par plant. Faire trois épandages. En mars, en fin mai et en octobre.

Sur un plant qui produit déjà, apporter une boîte de tomate de 20 10 10 simple par pied et par mois, en avril, juillet et octobre.

III.4.4- CONTROLE DES MALADIES ET RAVAGEURS

Le tableau ci-dessous présente les ennemis de la culture ainsi que les méthodes de lutte

Symptômes ou dégâts	Agent causal	traitement
Maladies		
Flétrissement et noircissement des branches, des feuilles et des fruits. Pourriture humide de la pulpe et des jeunes graines	Anthracnose (<i>Colletotricum coffeanum</i>)	Utiliser des variétés résistantes, appliquer HYDROX , toutes les trois semaines en saison des pluies
Tâches arrondies vertes à jaunes, apparition des tâches orangées sur le verso des feuilles.	Rouille orangée (<i>Hemileia vastatrix</i>)	Supprimer les fruits atteints Appliquer le KOCIDE 500
Insectes		
Les graines sont perforées et les bords des trous sont vert-gris	Scolyte des baies	Récolter les fruits quand ils sont mûrs

		Appliquer un insecticide comme le THIOPLANT , au moment de la floraison, jusqu'à la maturation des fruits
Défoliation	Plusieurs espèces de chenilles défoliatrices	Application du CYPERCAL 200 . Une fois par mois en forte attaque

IV. RECOLTE ET RENDEMENT

La récolte du café arabica se fait de septembre à janvier, quand les premières cerises sont rouges et donc mûres. Faire plusieurs passages de récolte à 9 jours d'intervalle. La récolte se fait manuellement et un hectare peut fournir entre 800 et 1 200 kgs. Récolter les cerises bien mures, c'est à dire rouge vif. Ne pas ramasser les cerises trop mures, les cerises séchées sur l'arbre ou tombées à terre depuis longtemps. Laisser les cerises immatures; une récolte correcte ne doit pas contenir plus de 15 % de cerises vertes.

V. TECHNIQUES POST-RECOLTE

Il existe deux techniques particulières:

- La voie humide: ici, le café (arabica) est récolté mûr c'est-à-dire rouge. On dépulpe les graines à l'aide d'une dépulpeuse puis on les laisse fermenter les baies en 7 jours dans des caisses couvertes, pour que les graines soient débarassées de leur mucilage. On passe aussi au lavage dans de l'eau puis au séchage sur du ciment. Ce séchage au soleil peut durer trois semaine. A l'issue de ce séchage, on obtient du café en coque.
- La voie sèche: ici, les cerises sont directement séchées après la récolte. Cette technique vise à dessécher les enveloppes de la graine (pulpe et parche). Cette opération peut durer 15 mois. Méthode le plus souvent pratiquée avec le robusta.



Le café est sécher en couches mince et remuer fréquemment