




全靜脈營養治療期間注意事項？

1. 滴注為24小時，會使用點滴幫浦控制滴數，如果發現打針的部位有出血、潮濕、管路鬆脫或是皮膚有發紅、灼熱感等情形，請立即告知醫護。
2. 使用期間會監測血糖及營養狀況、血中電解質濃度。
3. 醫師會評估何時可以進食，要記錄輸出入量，醫師會決定何時停止施打靜脈營養劑。



參考文獻：

1. Compher C, Bingham AL, McCall M, et al. Guidelines for the provision of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2022 Jan;46(1):12-41.
2. Appropriate Dosing for Parenteral Nutrition. ASPEN guideline.
3. Seres D. Nutrition support in critically ill patients: Parenteral nutrition. In: UpToDate, Post TW (Ed). UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on May 15, 2023)
4. Thibault R, Abbasoglu O, Ioannou E et al. ESPEN guideline on hospital nutrition: Clin Nutr. 2021 Dec; (12):5684-5709.

義大醫院

地址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號

電話：07-6150011

義大癌治療醫院

地址：高雄市燕巢區角宿里義大路21號

電話：07-6150022

義大大昌醫院

地址：高雄市三民區大昌一路305號

電話：07-5599123

本著作權非經著作權人同意不得轉載翻印或轉售

著作權人：義大醫療財團法人

表單編號：HA-1-0147(2)

義大醫療財團法人 20X29.7cm 2025.03印製 2024.12修訂

認識全靜脈營養輸液



 義大醫療財團法人 編印
E-DA HEALTHCARE GROUP




什麼是全靜脈營養？

全靜脈營養療法，是將身體所需的蛋白質、脂肪、維生素、礦物質經由大血管滴入高營養高濃度的溶液，以維持身體所需。一般所說的營養針只是葡萄糖和少量胺基酸(蛋白質)溶液由靜脈輸入體內，這和全靜脈營養輸入體內的濃度是不一樣的。



全靜脈營養的成分？

1. 醣類:提供能量的來源。
2. 脂肪乳劑:提供能量的來源。
3. 胺基酸:組織的修復。
4. 電解質:鈉、鉀、鎂、鈣、磷酸鹽、醋酸鹽。
5. 維生素:脂溶性及水溶性維生素。
6. 微量元素:鈷、鉻、錳、鋅。



什麼樣的人需要全靜脈營養？

1. 癌症病人受疾病或治療的影響，進食量不足，改善營養狀況。
2. 需要暫時禁食或腸胃道功能不良，經由靜脈營養提供身體所需。
3. 嚴重創傷:例如燒傷、腹部重挫傷。
4. 診斷為中度以上之營養不良者。
5. 新生兒先天性異常:例如短腸症。
6. 早產兒:體重過輕。

