


## 儲存方式

1. 將藥瓶置於陰涼處，不要放置冰箱內，除非特別指示不須冷藏。
2. 放置在小孩無法取得之處。
3. 若藥液變色則不可使用。



# 耳滴劑使用方式



義大醫院

E-DA HOSPITAL / I-SHOU UNIVERSITY

院址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號

本單無法取得所有藥物資訊

有任何疑問時請電

(07)6150011轉2000或2120

藥劑部 關心您



## 使用方法

1. 若耳朵有分泌物流出，先簡單將分泌物清除。
2. 點耳前、後須用肥皂和清水將手徹底洗淨。
3. 用濕毛巾擦拭你耳朵並讓它乾燥。
4. 用手掌觸摸耳用滴瓶數分鐘，使藥物溫度接近體溫。
5. 若是懸浮耳用滴劑則使用前必須搖勻約 10 秒。
6. 側躺或頭傾斜使受感染耳朵向上。(成人可將耳葉拉向上後方，小孩則拉向下後方使耳管變直)
7. 點入耳藥保持耳部朝上約 10 分鐘以便藥液流入。
8. 將患耳傾斜數分鐘或放置棉花至耳中幫助藥物吸收。
9. 滴管不可插入耳中。
10. 不要弄濕滴管或洗滌滴管，只要用衛生紙擦淨瓶口前端藥液。

## 注意事項

1. 點藥水時，請勿讓藥瓶瓶口接觸耳朵，以防藥水遭受細菌污染。
2. 如耳滴劑於冰箱內取出，應先將小瓶置於掌心或腋下數分鐘弄暖，以減少低溫對耳朵內部的刺激。
3. 若病情持續或更糟，給藥後耳道癢或有燒灼

感，請立刻讓醫師知道。

4. 滴管避免碰到受感染的耳朵或任何表面，因此為了避免污染，盡可能由別人幫忙點藥。