



# 人工授精注意事項

1. 預計於\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日晚上\_\_\_\_\_點注射破卵針 HCG  
**(勿擅自更改打針時間，藥品在家須冷藏)**
2. 預計於\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日上午\_\_\_\_\_點或下午\_\_\_\_\_點前帶身分證及健保卡到醫院。取精後2小時內室溫下經將裝精液的無菌容器送至 A 棟5樓生殖醫學中心，等待1~2小時，精子經過處理洗滌後，注射到子宮腔，不需麻醉，無疼痛感，只需靜躺1小時即可起身回家。
3. 人工授精後，於\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日開始三餐飯後吃黃體素，連續使用14天。
4. 於\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日(約人工授精後第十四天)，請回門診驗孕。
5. 人工授精後除避免劇烈運動外，不需改變原有的生活習慣。
6. 少數病人在接受排卵藥物的刺激會有卵巢過度刺激(OHSS)的現象，常造成腹水及體重增加的情形。若發生嚴重腹脹現象或呼吸困難、排尿減少、食慾差等情況，請立即回醫院門診檢查。
7. 如有任何問題請洽義大醫院生殖醫學中心  
地址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號(A 棟5F)  
電話：07-6150011轉2716  
諮詢時間：週一 ~ 週五 09：00-15：30（星期六、日及國定假日休息）

祝您懷孕成功

# 人工授精(AIH)的流程



圖二

參考文獻：Textbook of Assisted Reproductive Techniques: Two Volume Set 6th Edition