

貼片衛教手冊



藥劑部編制 2023/06/25

第三版


貼片品項

1 麻醉性止痛

商品名	Durogesic D-Trans	
中文名	多瑞喜穿皮貼片劑	
成分	Fentanyl 12 mcg/hr/patch	


商品名	Fentanyl	
中文名	吩坦尼穿皮貼片劑	
成分	Fentanyl 25mcg/hr/patch	

商品名	Fentanyl	
中文名	吩坦尼穿皮貼片劑	
成分	Fentanyl 50mcg/hr/patch	

商品名	Painkyl	
中文名	平舒疼口頰溶片	
成分	Fentanyl 200 mcg/buccal soluble films	

貼片品項


2 止吐

商品名	Sancuso	
中文名	貼固守穿皮貼片劑	
成分	Granisetron 3.1 mg/24hr/patch	

3 巴金森氏症

商品名	Neupro	
中文名	紐普洛穿皮貼片劑	
成分	Rotigotine 8mg/24hr	

4 阿滋海默氏病

商品名	Exelon patch 5	
中文名	憶思能穿皮貼片	
成分	Rivastigmine 9 mg/5cm ² /patch, 4.6mg/24hrs	


貼片品項

5 戒菸

商品名	Nicotine II TTS 20	
中文名	克菸貼片	
成分	Nicotine 35mg/patch	

操作步驟- Fentanyl (吩坦尼)

剪



剪開切口打開包裝(切勿剪到貼片)

撕



撕開貼片外包裝後將貼片取出

取




貼片取出後，從S型切口處將背膠撕除

貼




黏貼後輕壓30秒，使黏貼更緊密

洗



使用後以清水洗手，勿用肥皂

注意事項 - Fentanyl (吩坦尼)




黏貼部位

無刺激、乾淨、無毛髮、表面平坦的皮膚


較佳位置為**上背部**、**胸部鎖骨下**或**上臂**。

黏貼之前皮膚必須完全**乾燥**。



黏貼多久

可持續黏貼最多**3天**，請每次貼換不同部位。



貼片完整性

因貼片為**特殊緩釋劑型**，**不可**隨意切割貼片
會破壞藥效
(**特別是貼片邊緣**)



副作用

常見副作用為噁心嘔吐，便秘與皮膚發紅發癢。

如有嗜睡、呼吸次數驟減或呼吸困難，請立即停用並回診。



紀錄表/廢片回收

須確實記錄貼片使用狀況，使用過的貼片應連同紀錄表一併交回藥局。

操作步驟- Painkyl (平舒疼)

剪




剪開切口打開包裝

取



以乾燥手指指尖
取藥片，**粉紅**
面朝上

漱



舌頭濕潤臉頰
或清水漱口

貼



將貼片置放於濕
潤之口腔內壁

壓




手指按壓貼片
約**5秒**後再移
開

注意事項 - Painkyl (平舒疼)



黏貼部位

將貼片置於**濕潤**之**口腔內壁**
取口頰溶片時，**手指**必須完全**乾燥**



黏貼多久

敷上貼片後**15到30分鐘內**會完全溶散，再進食。
使用後應至少**間隔兩小時**才可**再使用**下一片




貼片完整性

因貼片為**特殊緩釋劑型**，**不可**隨意切割貼片會破壞藥效(**特別是貼片邊緣**)



避免與酒精、鎮定劑併服

Painkyl應避免併服酒精、安眠藥、或是鎮定劑，
可能影響用藥者精神或生理能力。




副作用

常見的副作用為嗜睡、噁心、嘔吐、頭昏。

操作步驟- Sancuso (貼固守)

取



剪開切口打開包裝
並取出貼片。

撕



請先取下一半的保護膜，
避免觸摸貼片的黏性部分

貼




將貼片貼至清潔、乾燥、
完整皮膚的上臂，並撕
下另一半保護膜。

壓



手掌按壓貼片約**30秒**，
確保貼片與皮膚緊密貼合。


注意事項- Sancuso (貼固守)



黏貼部位

貼片貼於**上臂或完整皮膚**，


避開傷口、發紅的部位。黏貼之前皮膚必須完全**乾燥**。



黏貼多久

可持續黏貼最多**7天**，請每次貼換不同部位。

化學治療**前**24~48小時貼上，化學治療後24小時移除。



貼片完整性

因貼片為**特殊緩釋劑型**，**不可**隨意切割貼片
會破壞藥效(**特別是貼片邊緣**)



藥物相關副作用

常見副作用為腹痛、拉肚子、便秘與皮膚發紅發癢。


操作步驟- Neupro (紐普洛)

1




拆開包裝

2




往兩側**撕**開

3




將貼片**取**出

4



折下貼片，
使S形切線分開

5



撕下一半保護膜
注意勿碰觸到黏貼面。

6




將貼片**貼**上，再
撕去另一半保護膜

7




掌緊**壓**貼片**30秒**
確認貼片有貼緊皮膚

注意事項 - Neupro (紐普洛)




黏貼部位

黏貼於乾爽、清潔及完好的皮膚。



黏貼多久

貼片提供24小時藥效，需**每天**相同時間更換貼片於不同之部位。



副作用

常見副作用為噁心、嘔吐或皮膚泛紅或發癢。
用藥過量引起的噁心、嘔吐、低血壓、幻覺、不自主運動、精神錯亂及痙攣；應先移除貼片並送醫就診。




檢查時_注意事項

貼片背層含有鋁，需要進行磁振造影**MRI檢查**時，宜先**撕去貼片**，以免於過程中造成灼傷。

操作步驟 - Exelon (憶思能)

剪




剪開切口打開包裝
並取出貼片。

撕



請先撕下一半的保護膜，
避免觸摸貼片的黏性部分

貼




將貼片貼至所選部位，
按壓貼片，並撕下另一
半保護膜。

壓




手掌按壓貼片約**30秒**，
確保貼片與皮膚緊密貼合。

注意事項 - Exelon (憶思能)




黏貼部位

無刺激、乾淨、無毛髮、表面平坦的皮膚
較佳位置為**上/下背部**、**胸部**或**上臂**。
黏貼之前皮膚必須完全**乾燥**。



黏貼多久

每天換貼一片，請每次貼換不同部位。



貼片完整性

不應將貼片剪成小塊或剪成一半。



副作用

常見之不良反應為噁心、嘔吐、腹瀉、厭食、
體重減輕。如有低血壓、呼吸抑制或痙攣，請
立即停用並回診。


操作步驟 - Nicotine (尼古丁)

剪



剪開切口打開包裝
並取出貼片。

撕



撕下覆蓋保護膜，
避免觸摸貼片的黏性部分

貼




將貼片貼至所選部位，
按壓貼片約**10秒**

換



一天換一片，依個
人需要，選擇在晚上洗完
澡或早上貼。

注意事項 - Nicotine (尼古丁)



黏貼部位


無刺激、乾淨、無毛髮、表面平坦的皮膚

較佳位置為**上身軀幹**如胸部、背部、手臂、臀部等部位。黏貼之前皮膚必須完全**乾燥**。



黏貼多久

貼片提供**24**小時藥效，需**每天**相同時間更換貼片於不同之部位。



副作用

戒斷現象可能會導致睡不著、多夢、淺睡，幾周後會逐漸改善。

使用後產生嚴重的頭痛、失眠、心絞痛請立即停止使用。



檢查時_注意事項

貼片背層含有鋁，需要進行磁振造影**MRI**檢查

時，宜先**撕去貼片**，以免於過程中造成灼傷。