


加護病房 衛教手冊



主動自我介紹，並配戴識別證，可由病室外的名牌得知其三班照護的護理師。



會客原則：

為了有效的感染控制，會限制探訪的
時間及**兩位**人數的限定，也需要落實
隔離防護穿著**隔離衣**、**戴口罩**、**洗手**
，避免造成交互感染，如延遲會客，
仍會完成30分鐘的會客時間

確實洗手避免感染



進入加護病房時記得將您的**手機關機**，
因病人身上有許多管路及儀器，易受電
磁波影響，也讓您及您的家屬瞭解術後
放置任何管路的**目的及重要性**，故**勿自
行移動病人**及必要性會給予**保護性約束
措施**。



疼痛照護：

術後傷口及管路的放置易造成疼痛不適，醫護人員進行每小時評估疼痛指數，並適度給予止痛劑使用，可以減輕疼痛及不適感。



針劑、口服止痛

預防跌倒：

臥床時使用床欄，針對加護病房高危險群跌倒病人，加強標示。



預防失禁性皮膚炎及壓傷：

急重症患者及老年人，由於身體病生理情況，易引起失禁性皮膚炎及壓傷，做好失禁性皮膚炎及壓傷預防，可降低失禁性皮膚炎及壓傷的發生。



長效保膚霜



乾洗潔膚液



無痛保護膜



泡棉敷料

尿管護理：

外科加護病房病人多數因手術需要、需密切監測尿液，或是急性尿滯留而放置導尿管使用，若導尿管照護不當易造成感染，故每日應清潔會陰部及導尿管。



1. 將便盆或尿布墊在病人臀部下方，以沖洗壺沖水。



2. 用肥皂水或沐浴乳塗抹於病人尿道口、會陰部及尿管上段處再以清水沖洗乾淨。



3. 將病人尿道口、會陰部及尿管上段以濕紙巾擦乾。




4. 協助更換乾淨尿布或衣褲。



5. 尿袋位置需維持在膀胱以下，尿袋口離地3公分以上，且開口應隨時關閉，尿袋內尿量超過1/2至2/3應倒掉。

手術後管路留置圖：



By Yoppy Chen



義大醫院

醫院院址：高雄市燕巢區義大路1號

醫院總機：(07) 615-0011

義大癌治療醫院

醫院院址：高雄市燕巢區義大路21號

醫院總機：(07) 615-0022

義大大昌醫院

醫院院址：高雄市三民區大昌一路305號

醫院總機：(07) 559-9123

本著作權非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

著作權人：義大醫療財團法人

表單編號：HA10185(2)

2025年01印製

2025.01修訂

E-DA HEALTHCARE GROUP