

Prezado(a) médico(a),

Seu paciente, _____ está interessado em participar de atividades equoterápicas.

Para que possamos oferecer um atendimento seguro e de qualidade, o serviço requisita o preenchimento criterioso da avaliação médica anexa. É importante esclarecer que algumas condições clínicas necessitam de uma análise mais aprofundada, pois podem exigir precauções ou mesmo contra-indicar a prática equoterápica em função do grau de comprometimento do seu paciente.

Portanto, durante o preenchimento da avaliação médica, caso seu paciente apresente alguma das situações abaixo citadas, pedimos por gentileza, especificar com clareza a justificativa da indicação da prática da Equoterapia.

1 – ORTOPÉDICAS

- Artogripose
- Instabilidade Atlantoaxial
- Craniotomia
- Luxação ou deslocamento do quadril
- Osteoporose de moderada a severa
- Osteogênese imperfeita com fraturas freqüentes e escoliose significativa
- Fusão ou fixação cirúrgica da coluna
- Órteses espinhais
- Cifose de lordose se há desencadeamento de dor com atividades físicas
- Escoliose se a curvatura for maior que 30 graus

2 – NEUROLÓGICAS

- Hidrocefalia com shunt e sem controle servical
- Distrofia muscular e neuropatias se o paciente referir fadiga fácil
- Mielodisplasias, mielomeningocele, espinha bífida cística se o paciente tem dificuldade em manter uma postura sentada confortável, sem provocar lordose ou cifose excessiva
- Má formação de Chiari se o paciente não estiver bem controlado
- Epilepsia com crises atônicas sem controle ou com qualquer tipo de crise se as mesmas se repetem muitas vezes no dia
- Aneurisma ou angioma cerebral, não resolvido cirurgicamente
- Distúrbio de hiperatividade com déficit de atenção se o paciente tem tendência a agressividade e maus tratos a animais

3 – PSICOLÓGICAS

- Abuso físico, sexual e emocional
- Confusão mental
- Oscilação do estado mental
- Tendência a delírios
- Auto e heteroagressividade

4 – OUTRAS CAUSAS

- Hipertensão sem controle
- Distúrbio vascular e periférico
- Alergias
- Comprometimentos respiratórios
- Distúrbios cardíacos (congenitos, uso de marca passo, infartos repetidos)
- Diabetes sem controle
- Obesidade