



*Rhinella marina* (Linnaeus, 1758)

**Nome Popular:** sapo cururu

**Classificação taxonômica**

**Reino:** Animalia

**Filo:** Chordata

**Classe:** Amphibia

**Ordem:** Anura

**Família:** Bufonidae

**Gênero:** *Rhinella*

**Descrição:** Possui corpo robusto, pele rugosa com verrugas e grandes glândulas paratóides proeminentes atrás dos olhos, que secretam veneno de defesa - a bofotoxina. Antigamente conhecida por *Bufo marinus*

**Distribuição Geográfica:** América, do vale do Rio Grande nos EUA ao sul do Texas, até o sul da Bacia Amazônica. Foi introduzido na década de 1940 na Austrália.

**Ecologia:** São onívoros, alimentando-se de pequenos vertebrados e invertebrados, além de plantas, restos de alimentos e ração. São capazes de localizar o alimento através do olfato. Possuem o comportamento de inflar os pulmões para parecerem maiores, como estratégia de defesa. São mais ativos à noite e podem viver longe da água, procurando-a apenas na época da reprodução.

**Reprodução:** O ciclo de vida do sapo-cururu é marcado pelo processo de metamorfose pelo qual a espécie passa, tal como acontece com a maioria dos anfíbios. Seu ciclo reprodutivo começa com a postura dos óvulos pela fêmea que serão fertilizados pelo esperma liberado pelo macho. Os machos do sapo-cururu coaxam para atrair a fêmea. Esse chamado é uma vibração longa e ruidosa, parecido com o som de um pequeno motor. Como todos os sapos verdadeiros, o macho abraça a fêmea pela cintura e ela, então, põe os ovos, que o macho recobre com esperma. As fêmeas depositam de 4 a 36 mil ovos por ninhada. Os ovos são postos em longos filamentos ao redor de plantas ou objetos submersos. São de cor preta, rodeados de muco transparente e gelatinoso, e de 4 a 5 milímetros de diâmetro. Os ovos eclodem de 10 a 16 dias após a postura e deles nascem girinos que levam de 30 a 60 dias para se desenvolverem e sofrerem o processo de metamorfose até chegar à fase adulta.

**Curiosidade:** O nome cururu tem origem no tupi, que significa sapo. Outros nomes também são usados no Brasil como xué-açu ou xué-guaçu, aguá, sapo-gigante, sapo-jururu. Na língua inglesa e espanhola é conhecido por *cane toad* (sapo-de-cana) *sapo de canã* (sapo-do-canavial), por ser utilizado para erradicar pragas nos canaviais nas colônias.

**Estado de conservação:** Pouco Preocupante

Mapa de distribuição geográfica



Mapa da distribuição geográfica de *Rhinella marina* (azul, população nativa, vermelho população introduzida)  
(fonte: wikipedia)



Exemplar taxidermizado da coleção MHN-ISERJ R00065