

1 Определённый интеграл

1.1 Определение

Пусть $f(x)$ определена на $[a; b]$, введём:

1. ρ - разбиение $[a; b]$ - последовательность $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n$ такая, что:
 $x_0 = a, x_n = b$
 $x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n$
2. $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i \quad i \in [0; n - 1]$
3. $\lambda\rho = \max\{\Delta x_i\}$ - мелкость разбиения
4. $c_i \in [x_i; x_{i+1}]$ - произвольная точка отрезка разбиения

Тогда определим интегральную сумму: $S(\rho, \bar{c}) = \sum_{i=0}^{n-1} f(c_i) * \Delta x_i$

И если $\exists \lim_{\lambda\rho \rightarrow 0} S(\rho, \bar{c}) = I$, тогда $f(x)$ - интегрируема на $[a; b]$, I - интеграл, и обозначается:

$$\int_a^b f(x) dx$$

Распишем предел из определения по Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall \rho, \bar{c} \quad \lambda\rho < \delta \implies |S(\rho, \bar{c}) - I| < \varepsilon$$

И по Гейне:

$$\forall \{\rho_k\}, \{\bar{c}_k\} \quad \lambda\rho \rightarrow 0 \implies \lim_{k \rightarrow \infty} S(\rho_k, \bar{c}_k) = I$$

1.2 Необходимое условие интегрируемости

Теорема: $f(x)$ интегрируема на $[a; b] \implies f(x)$ - ограничена на $[a; b]$

Док-во(от противного):

Пусть $f(x)$ неограничена на $[a; b]$ тогда $\exists [x_i; x_{i+1}]$, на котором она неограничена.

1.3 Суммы Дарбу

1.3.1 Определение

Пусть $f(x)$ ограничена на $[a; b]$

Введём разбиение ρ и его мелкость $\lambda\rho$ так же, как и в определении интеграла.

Т.к $f(x)$ ограничена на $[a; b]$, то она ограничена на всех её подотрезках(от противного), а значит имеет \sup и \inf на каждом из них.

Обозначим $\sup(f(x)) = M_i$ где $x \in [x_i; x_{i+1}] \quad i \in [0; n - 1]$
 $\inf(f(x)) = m_i$

Тогда $\bar{S} = \sum_{i=0}^{n-1} M_i \Delta x_i$ - верхняя сумма Дарбу
 $\underline{S} = \sum_{i=0}^{n-1} m_i \Delta x_i$ - нижняя сумма Дарбу

1.3.2 Свойства

$$1. \forall \rho, \bar{c} \quad \underline{S}(\rho) \leq S(\rho, \bar{c}) \leq \bar{S}(\rho)$$

Док-во:

Рассмотрим $[x_i; x_{i+1}]$

$x_i \leq c_i \leq x_{i+1}$ воспользуемся непрерывностью $f(x)$

$m_i \leq f(c_i) \leq M_i$ домножим на Δx_i

$m_i \Delta x_i \leq f(c_i) \Delta x_i \leq M_i \Delta x_i$ просуммируем по всем i

$$\underline{S}(\rho) \leq S(\rho, \bar{c}) \leq \bar{S}(\rho)$$

$$2. \text{Добавление точки в } \rho \text{ не увеличивает } \bar{S}, \text{ не уменьшает } \underline{S}$$

$$\underline{S}(\rho) \leq \underline{S}(\rho^*) \leq \bar{S}(\rho^*) \leq \bar{S}(\rho)$$

$$3. \text{Если } \rho^* \text{ получена из } \rho \text{ добавлением конечного числа точек, выполняются те же неравенства.}$$

$$\underline{S}(\rho) \leq \underline{S}(\rho^*) \leq \bar{S}(\rho^*) \leq \bar{S}(\rho)$$

$$4. \forall \rho_1, \rho_2 \quad \underline{S}(\rho_1) \leq \bar{S}(\rho_2)$$

$$5. \text{Пусть } \rho_0 \text{ - фиксированное, тогда}$$

$$\forall \rho \quad \begin{aligned} \underline{S}(\rho) \leq \bar{S}(\rho_0) &\implies \underline{S}(\rho) \text{ ограничена сверху} \implies \exists \sup(\underline{S}(\rho)) = \underline{I} \\ \bar{S}(\rho) \geq \underline{S}(\rho_0) &\implies \bar{S}(\rho) \text{ ограничена снизу} \implies \exists \inf(\bar{S}(\rho)) = \bar{I} \end{aligned}$$

1.4 Критерий интегрируемости

Пусть $f(x)$ - ограничена на $[a; b]$, тогда равносильны следующие утверждения:

$$1. \lim_{\lambda \rho \rightarrow 0} (\bar{S} - \underline{S}) = 0$$

$$2. \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \rho \quad \bar{S} - \underline{S} < \varepsilon$$

$$3. \bar{I} = \underline{I}$$

$$4. f(x) \text{ интегрируема на } [a; b]$$

$$\int_a^b f(x) dx = \bar{I} = \underline{I} = \lim_{\lambda \rho \rightarrow 0} (\bar{S}) = \lim_{\lambda \rho \rightarrow 0} (\underline{S})$$

1.5 Определение площади / геометрический смысл определённого интеграла

$$\text{Определим прямоугольник } Rect(a, b, c, d) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R} \left| \begin{array}{l} x \in [a; b] \\ y \in [c; d] \end{array} \right. \right\}$$

$$\text{И определим его площадь } S(Rect(a, b, c, d)) = (b - a)(d - c)$$

Пусть $\sigma = \bigvee_{i=1}^n Rect_i$ - множество точек, полученное объединением n прямоугольников, пересекающихся не больше, чем по стороне. Тогда $S(\sigma) = \sum_{i=1}^n S(Rect_i)$

Пусть дана фигура (произвольное множество точек) A .

Пусть существует прямоугольник B такой, что $A \subset B$, если нет, то и площади у такой фигуры нет.

Рассмотрим σ^+ - такая σ , что $A \subset \sigma^+$. Она всегда существует (как минимум B)

Заметим, что $S(\sigma^+) \geq 0$ (как и от любой другой σ), значит $\exists \inf(S(\sigma^+)) = S^+(A)$ - определение верхней площади.

Теперь рассмотрим σ^- - такая σ , что $\sigma^- \subset A$. Она может и не существовать (ф-ия Дирихле) тогда считаем, что площади у фигуры нет.

Но если существует, то $S(\sigma^-) \leq S(B)$ т.к $\sigma^- \subset A \subset B$, значит $\exists \sup(S(\sigma^-)) = S^-(A)$ - определение нижней площади.

Если $S^+(A) = S^-(A) = S(A)$, то $S(A)$ - площадь A .