

Die Riemannsche Vermutung: Conclusio

Lukas Geiger

Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

23. Mai 2026

Zusammenfassung

Diese abschließende Arbeit in einer dreiteiligen Serie führt die Ergebnisse der vorangegangenen Arbeiten zu einem einheitlichen Bild zusammen. Wir katalogisieren die bewiesenen strukturellen Ergebnisse (R1–R9), die ausgeschlossenen Wege (K1–K4) und die neuen Beiträge: das Shift-Parity-Lemma, die computergestützte finite-range Gap-Diagnostik für 33 Werte von λ bis zu 1,300,000, den Resolventen-gedämpften $M1''$ -Rahmen, das Leading-Mode-Cancellation-Lemma mit der exakten Konstanten $c = 2 + \sqrt{2}$ und die Euler-Maclaurin-Proposition, die $\rho^{\text{EM}}(L) < 0$ für $L \geq 14$ ($\lambda \geq 1,200,000$) etabliert. Die finite-range Diagnostik bleibt theoremstark bedingt auf eine validierte untere Schranke für den ungeraden Sektor. Teil III berücksichtigt außerdem die in v2.0 eingeführten Nicht-Existenz-Theoreme (NE-A, NE-B in Teil II), welche die vergleichende Analyse der Beweisstrategien neu strukturieren und bestätigen, dass sich gerade Dominanz nicht auf Totalpositivität oder Sturm–Liouville-artige Argumente reduzieren lässt. Wir präsentieren die Beweisarchitektur von Connes’ Theorem 6.1 über die gerade Dominanz bis zur Riemannschen Vermutung als *conditional reduction*, formulieren offene Probleme und diskutieren Verbindungen zur weiteren Landschaft der analytischen Zahlentheorie. In v2.1 wird ein robuster direkter Frontier-Dominanz-Beweis (Teil II, Proposition *prop:direct-frontier*) hinzugefügt; in der v2.3-Lesart beweist er das asymptotische Variationsvorzeichen, aber nicht allein die Eigenwertordnung $\lambda_1^+ < \lambda_1^-$.

v2.4 (23. Mai 2026): Parallelprogramm ergänzt. Ein neuer Unterabschnitt “Parallelprogramm: Connes–vS-Fehlerkollaps und I-1-Normalfamilien-Reframe” (§9.5) präsentiert eine zweite Reduktion der Riemannschen Vermutung, unabhängig von der Asymptotischen Variationsgap-Vermutung (A7), über die Connes–van-Suijlekomerr-Kollaps-Route (Route B) und den I-1-Normalfamilien-Reframe der Begleitarbeit [5], §E.1–E.18. Beide Routen sind bedingt auf dieselbe offene Wand, Connes’ §6.6(b)/MS2-Streifenschranke (ii), die der I-1-Reframe als (ii-a) + (ii-c) zerlegt und (modulo Einfachheit (Z)) auf die einzige offene Schranke (ii-a) absorbiert. Konvergierte Empirie an sieben $\lambda \in \{3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$ ist tabelliert, einschließlich der bit-identischen Zwei-dps-Validierung bei $\lambda = 11, 13, 15$. Die DOI der Even-Dominance-Begleitarbeit wird vom v1.5-Record auf den v1.6-Record aktualisiert (10.5281/zenodo.20291994).

MSC 2020: 11M26, 11M36, 47A75, 65G20

Schlagworte: Riemannsche Vermutung, Li-Koeffizienten, gerade Dominanz, Euler-Maclaurin, Beweisarchitektur, offene Probleme

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Katalog der bewiesenen Ergebnisse	3
2.1	Strukturelle Ergebnisse (R1–R9)	3
2.2	Neue Ergebnisse aus den Teilen I–II	4
3	Katalog der ausgeschlossenen Wege	5
4	Die vollständige Beweisarchitektur	6
4.1	Die Reduktionskette	7
4.2	Der kumulative Schritt (A6) — bedingte Reduktion	7
4.3	Beweisstrategien für A6: Vergleichende Analyse	8
5	Die Lokalisierungstabelle	9
5.1	Li-Koeffizienten-Perspektive	9
5.2	Gerade-Dominanz-Perspektive	9
6	Systematisch geprüfte Alternativen	10
7	Unabhängige Resultate	11
8	Verbleibende offene Probleme	12
9	Verbindungen zur weiteren Landschaft	12
9.1	Connes' Programm	12
9.2	Nyman-Beurling-Baez-Duarte	13
9.3	Das Spurklassen-Hindernis als universelles Muster	13
9.4	Selberg-Zeta und Yang–Mills	13
9.5	Parallelprogramm: Connes–vS-Fehlerkollaps und I-1-Normalfamilien-Reframe	14
10	Einschätzung und Ausblick	15
10.1	Was wir erreicht haben	15
10.2	Der Weg zum Abschluss der Beweislücke	15
10.3	Analytischer Status der Kontroll-Lemmata (v1.1)	16
10.4	Die verbleibende Distanz	16
10.5	Philosophische Reflexion: Genese der Beweisarchitektur	16
11	Zusammenfassung	18

1 Einleitung

Diese Arbeit schließt eine dreiteilige Untersuchung der Riemannschen Vermutung durch Eichtheorie, Spektralanalyse und arithmetische Thermodynamik ab:

Teil I [1]: Grundlagen und Hindernisse — strukturelle Ergebnisse (R1–R9), vier kritische Hindernisse (K1–K4), Neuausrichtung auf das Spektralprogramm von Connes.

Teil II [2]: Gerade Dominanz — Shift-Parity-Lemma, computergestützte finite-range Diagnostik (33 Werte, λ bis zu 1,300,000), Resolventen-gedämpfter $M1''$ -Rahmen, Leading-Mode-Cancellation ($c = 2 + \sqrt{2}$), Euler-Maclaurin-Proposition ($\rho^{\text{EM}} < 0$ für $\lambda \geq 1,200,000$).

Teil III (diese Arbeit): Conclusio — Synthese, Beweisarchitektur, offene Probleme.

Die Kernbotschaft ist, dass die Riemannsche Vermutung, wenn sie über das Li-Kriterium und die quadratische Weil-Form angegangen wird, auf eine gut charakterisierte analytische Bedingung reduziert wird: eine asymptotische Variations-/Gap-Struktur des Kopplungs-differenzials. Die Euler-Maclaurin-Proposition (Teil II, Proposition 4.11) identifiziert das korrekte Variationsvorzeichen für großes λ ; zusammen mit den 33 computergestützten finite-range Diagnostiken (bis $\lambda = 1,300,000$) entsteht eine starke bedingte Brücke. Der noch offene Schritt ist die theoremstarke Übertragung dieser Variationsdiagnostik auf die Eigenwertordnung $\lambda_1^+ < \lambda_1^-$.

2 Katalog der bewiesenen Ergebnisse

2.1 Strukturelle Ergebnisse (R1–R9)

Die folgenden Ergebnisse sind unbedingt (sie setzen RH nicht voraus):

R1 Gibbs-Rahmen. Der Prime-Hub-Graph G_σ mit dem Ruelle-Transferoperator L_σ definiert ein wohldefiniertes Gibbs-Maß μ_σ für alle $\sigma > 1$. Die Partitionsfunktion $P(\sigma) = -\log \zeta(\sigma)^{-1}$ divergiert für $\sigma \rightarrow 1^+$ (Teil I, §2).

R2 Bombieri-Lagarias-Zerlegung. $\lambda_n = \lambda_n^{(\infty)} + \lambda_n^{(\text{fin})}$, wobei der archimedische Teil $\lambda_n^{(\infty)} \sim \frac{n}{2} \log n$ und der endliche Teil $|\lambda_n^{(\text{fin})}| \leq C\sqrt{n} \log n$ un konditioniert erfüllt (Teil I, §3).

R3 Nicht-Identifikation. Die Überschuss-Freie-Energie $I_n = \text{KL}(\mu_\sigma^{(n)} \parallel \mu_\sigma)$ erfüllt $I_n \geq 0$ unbedingt (als KL-Divergenz), aber $I_n \neq \lambda_n$. Die Gibbs-Normierung annulliert den Beitrag des endlichen Teils (Teil I, §5).

R4 Varianz-Schranke. $\text{Var}_{\mu_\sigma}[X_{n,\sigma}] \leq \sum_p (\log p)^{2n} p^{-\sigma}$ für $\sigma > 1$. Dies beschränkt die Fluktuationen der thermodynamischen Li-Koeffizienten-Approximation (Teil I, §5).

R5 Arithmetische Unschärferelation. Für jede kompakt getragene Testfunktion h :

$$\text{Var}[h(t)] \cdot \text{Var}[\hat{h}(\omega)] \geq \frac{1}{4} |\langle h, h' \rangle|^2,$$

dies verbindet die spektralen und räumlichen Unsicherheiten von Funktionen, die gegen die quadratische Weil-Form getestet werden (Teil I, §5).

- R6 Konvexität.** $\frac{d^2}{ds^2} \log \xi(\sigma) > 0$ nahe $\sigma = 1$. Die Funktion $\log \xi$ ist konvex, nicht konkav, was impliziert, dass λ_1 das Minimum (nicht das Maximum) des Ableitungsprofils ist. Dies widerlegt das ursprüngliche Monotonieargument (Teil I, §§5 und 11).
- R7 OS-Reflexionspositivität.** Die Osterwalder-Schrader-Reflexion $\theta : t \mapsto -t$ erfüllt $\langle f, \theta f \rangle_{\mu_\sigma} \geq 0$ für alle Testfunktionen f , die auf $t \geq 0$ getragen werden. Dies liefert eine Positivitätsstruktur im thermodynamischen Formalismus (Teil I, §5).
- R8 Spektrale Bestandsaufnahme.** Der arithmetische Kern K_σ^{sym} auf $\ell^2(\mathcal{P}_N)$ hat den negativen Trägheitsindex 2 für alle berechneten N und $\sigma \in (1, 1.5)$. Genau zwei Eigenwerte sind negativ; die restlichen $N - 2$ sind positiv (Teil I, §5).
- R9 Eich-Äquivalenz.** Für jede zulässige Eichung g erfüllt der Kern $K_\sigma^g = K_\sigma^{\text{sym}} + \Delta K_g$ die Bedingung $\text{sign}(\det K_\sigma^g) = \text{sign}(\det K_\sigma^{\text{sym}})$. Die Eichfreiheit ist tautologisch und kann die Vorzeichenstruktur nicht ändern (Teil I, §6).

2.2 Neue Ergebnisse aus den Teilen I–II

- N1 Shift-Parity-Lemma** (Teil II, §2). Für alle $N \geq 3$ und alle $r \in (0, 2)$:

$$\lambda_1(D_N(r)) < 0,$$

wobei $D_N(r) = S_N^+(r) - S_N^-(r)$ die Differenz zwischen den Shift-Matrizen des geraden und ungeraden Sektors ist. Analytisch bewiesen (Zwei-Fall-det/Spur-Argument für $N = 3$, Monotoniereduktion für $N \geq 4$) und durch Intervallarithmetik zertifiziert (55.000 Teilintervalle, 60-stellige Präzision, Gerschgorin-Kreisschranken).

- N2 Computergestützte finite-range Diagnostik** (Teil II). Für 33 Werte von λ von 100 bis 1,300,000 ist eine starke negative Gap-Diagnostik durch Intervallarithmetik dokumentiert (mpmath.iv, 50-stellige Präzision). Die Lücke wächst monoton als $\sim \sqrt{\lambda}$, von $-2,25$ bei $\lambda = 100$ bis $-475,83$ bei $\lambda = 1,300,000$. Als theoremstarke gerade Dominanz bleibt dies bedingt auf die validierte untere Schranke für den ungeraden Sektor.
- N3 Universelle gerade Präferenz einzelner Primzahlen** (Teil II, Korollar 2.5). Für jede Primzahl p mit $r = \log p / \log \lambda \in (0, 2)$:

$$\lambda_1(W_p^+) \leq \lambda_1(W_p^-) + \lambda_1(D_N(r)) < \lambda_1(W_p^-),$$

nach dem Shift-Parity-Lemma und der Weyl-Ungleichung.

- N4 Frontier-Primzahl-Mechanismus** (Teil II, §2). Die gerade Dominanz wird von Primzahlen $p \sim \lambda$ (normierter Shift $r \approx 1$) getrieben, nicht von kleinen Primzahlen. Mit wachsendem λ steigt die Anzahl der Frontier-Primzahlen als $\pi(\lambda) - \pi(\lambda/e) \sim \lambda / \log \lambda$.
- N5 Hellmann-Feynman-Analyse** (Teil II, §2). Die L -Ableitung $\partial \Delta / \partial L > 0$ für alle $\lambda \geq 80$ bis $\lambda = 500$. Die Vertiefung der Lücke wird durch neue Primzahlen getrieben, die in die Summe eintreten (Primzahl-Zählmechanismus), nicht durch das Wachstum von $L = \log \lambda$. Dies schließt L -Monotonie als Beweisstrategie aus.

N6 Lücken-Asymptotik (Teil II). Die gerade-ungerade Lücke skaliert als $\Delta(\lambda) \sim -c\sqrt{\lambda}$ (exponentiell in $L = \log \lambda$), robust negativ für alle $\lambda \geq 55$, mit $|\Delta| \rightarrow \infty$.

N7 Resolventen-gedämpfter M1"-Rahmen (Teil II). Das Kopplungsdifferenzial wird mittels Störungstheorie zweiter Ordnung zerlegt. Die Resolventen-gedämpfte Energiedifferenz erfüllt $(E_{\sin} - E_{\cos})/D(\lambda) = O(1/L) \rightarrow 0$, wodurch der verbleibende analytische Schritt auf Fourier-Analyse reduziert wird.

N8 Leading-Mode-Cancellation-Lemma (Teil II). Die Überlapp-Differenzen zwischen geradem und ungeradem Sektor heben sich paarweise bei $u = 0$ auf (Fourier-Orthogonalität), wobei die Ableitung die exakte Konstante $c = 2 + \sqrt{2} \approx 3,414$ liefert. Die geschlossenen Profile $S_{\text{sym}}^+(1, 0; u) = \sqrt{2} \sin(\pi u)/\pi$ und $S_{\text{sym}}^+(1, 2; u) = \frac{2}{3\pi}(4 \cos \pi u - 1) \sin \pi u$ werden symbolisch verifiziert.

N9 Euler-Maclaurin-Proposition (Teil II, Proposition 4.11). Die Primsummen, die B_j und g_j definieren, werden durch ihre PNT-asymptotischen Integrale ersetzt, um das Euler-Maclaurin-Verhältnis $\rho^{\text{EM}}(L)$ zu erhalten. Dann ist $\rho^{\text{EM}}(L)$ monoton fallend für $L \geq 7$ und hat eine Nullstelle bei $L \approx 13,5$. Für $L \geq 14$ (d. h. $\lambda \geq e^{14} \approx 1,200,000$):

$$\rho^{\text{EM}}(L) < 0 \quad (\text{d. h. } E_{\sin}^{\text{EM}} < E_{\cos}^{\text{EM}}),$$

so dass $\text{cert_gap}^{\text{EM}}(\lambda) < 0$.

N10 PNT-Transfer-Lemma und M1"-Reduktion (Teil II). Durch Abel-Summation mit der Chebyshev-Funktion $\theta(x) = x + O(x e^{-c\sqrt{\log x}})$ erfüllt das Resolventen-Verhältnis $\rho(\lambda) = \rho^{\text{EM}}(\lambda) + O(L e^{-c\sqrt{L}})$. Da $\rho^{\text{EM}} < 0$ für $L \geq 14$ und der Fehler verschwindet, liefert dies eine asymptotische Variationsreduktion des Resolventen-Subdominanz-Mechanismus. Der theoremstarke Restschritt bleibt die Odd-Sektor-Lower-Bound-Schließung, die das Variationsvorzeichen in die Eigenwertungleichung $\lambda_1^+ < \lambda_1^-$ überführt.

3 Katalog der ausgeschlossenen Wege

Vier unabhängige Hindernisse machen die ursprüngliche eichtheoretische Beweisstrategie zunichte:

K1 Gibbs-Normierungslücke. Die $1/P(\sigma)$ -Normierung annihiliert den Beitrag des endlichen Teils $\lambda_1^{(\text{fin})} = \gamma$. Der thermodynamische Li-Koeffizient $m_n(\sigma)$ konvergiert nicht gegen λ_n (Teil I, §9).

K2 Vorzeichenwechsel von $F(\sigma)$. Das Zielfunktional $F(\sigma) = A(\sigma)B(\sigma) - P(\sigma)[C(\sigma) + D(\sigma)]$ wechselt bei $\sigma_0 \approx 1,14$ das Vorzeichen. Keine zulässige Eichung kann die Positivität über die Randschicht $(1, 1, 14)$ hinaus wiederherstellen (Teil I, §10).

K3 Falsche Monotonierichtung. Die Konvexität von $\log \xi$ nahe $s = 1$ bedeutet, dass λ_1 das Minimum des Ableitungsprofils ist, nicht das Maximum. Das Monotonieargument läuft in die falsche Richtung (Teil I, §11).

K4 Spurklassen-Hindernis. Der Euler-Produkt-Operator $\mathcal{L}_s = \text{diag}(p^{-s})$ ist nur für $\Re(s) > 1$ von der Spurklasse ($\sum_p p^{-1/2} = +\infty$). Die Fredholm-Determinante $\det(I - \mathcal{L}_s)$ existiert nicht auf der kritischen Geraden. Dies ist die fundamentale Dichtelücke zwischen Primzahlen und Geodäten (Teil I, §12).

Bemerkung 3.1 (Die Hindernisse sind unabhängig). Jedes der Hindernisse K1–K4 ist individuell fatal. K1 tötet die Gibbs-Identifikation, K2 tötet den Eich-Ansatz, K3 kehrt das Monotonieargument um, K4 tötet die spektrale Determinantenkonstruktion. Selbst wenn drei behoben würden, genügt das vierte, um die ursprüngliche Strategie zu blockieren.

Zusätzlich wurden die folgenden Wege erkundet und als unzureichend befunden:

- **de-Branges-Positivität:** Conrey und Li (2000) zeigten, dass die Kern-Positivitätsbedingung für die relevanten Hilbert-Räume, die mit ζ assoziiert sind, *nicht* erfüllt ist.
- **Stieltjes-Realisierung:** Die Folge $c_n = \lambda_n/n$ ist streng wachsend, was die vollständige Monotonie verletzt. Das Spektralmaß unter RH lebt auf $|w| = 1$, nicht auf $[0, 1]$.
- **L -Monotonie der Lücke:** Die Hellmann-Feynman-Analyse (N5) zeigt $\partial\Delta/\partial L > 0$ für $\lambda \geq 80$, was einen Beweis der Lückenvertiefung allein über L -Differentiation ausschließt.
- **Absolute totale Positivität (PF_∞) für A_λ (v1.4):** Der Fourier-Multiplikator des Primzahl-Shift-Operators ist $M(\xi) = -2\Re[\zeta'/\zeta(\frac{1}{2} + i\xi)]$, eine Identität aus der expliziten Weil-Formel, gültig ohne RH-Annahme. Da M auf ungefähr 49% seiner Domäne negativ ist (die nicht-trivialen Nullstellen von ζ erzeugen jeweils eine Oszillation), ist der Primzahl-Shift-Operator nicht positiv-semidefinit, und A_λ ist kein PF_∞ . Schwache Variationsverminderung im primzahlgewichteten Mittel gilt und fällt mit dem Frontier-Dominanz-Argument (N4 + N6) zusammen, aber es gibt kein absolutes „Primzahlen glätten alles“-Prinzip.
- **Universeller kommutierender Operator (v1.4):** Eine SVD-Suche nach symmetrischem T mit $[T, D_N(r)] = 0$ simultan auf einem dichten r -Gitter in $(0, 2)$ zeigt für $N \in \{3, 5, 7, 10, 15\}$, dass der Kern eindimensional ist und ausschließlich aus Vielfachen der Identität besteht. Der zweitkleinste Singulärwert bleibt bei $N = 15$ unterhalb von $\sim 0,70$ nach unten beschränkt und nimmt mit N nicht ab. Die Primzahl-Shifts auf verschiedenen Skalen tragen daher keine gemeinsame verborgene Symmetrie. Dies schließt jedes Sturm-Liouville-artige Einfachheits-Argument aus und bestätigt, dass der Beweismechanismus arithmetisch-statistisch ist (primzahlgewichtete Summation der punktwisen Shift-Parity), nicht algebraisch.

4 Die vollständige Beweisarchitektur

Wir präsentieren die logische Kette vom bekannten Wissen zur Riemannschen Vermutung und identifizieren genau, wo jeder Teil passt und wo die Lücke bleibt.

4.1 Die Reduktionskette

Schritt	Aussage	Status	Quelle
A1	Connes' Theorem 6.1: gerade Dominanz $\Rightarrow$ Nullstellen von $\hat{\eta}$ reell	bewiesen	[4, 3]
A2	Hurwitz: gerade Dominanz für $\lambda_n \rightarrow \infty$ genügt	bewiesen	[3]
A3	Gerade Dominanz bei 33 Werten, $\lambda \leq 1,300,000$	numerische Evidenz / bedingte finite Brücke	Teil II
A4	Shift-Parity-Lemma: jede Primzahl bevorzugt gerade	bewiesen	Teil II
A5	Frontier-Primzahl-Mechanismus	bewiesen	Teil II
A5b	Euler-Maclaurin: $\rho^{\text{EM}}(13) < 0$ (intervallarithmetisch zertifiziert)	bewiesen	Teil II
A6	Kumulativer Schritt: $\sum_p W_p$ erhält die gerade Präferenz	variational / bedingt[†]	Teil II
A7	Gerade Dominanz für $\lambda_n \rightarrow \infty$	bedingt auf AVG / Odd-Lower-Bound	Teil II
A8	Alle Nullstellen auf $\Re(s) = 1/2$ (RH)	conditional reduction	A1+A2+A7

[†]**Status von Proposition A6** (Teil II, Proposition A6): In v2.1 wurde ein robuster direkter Frontier-Dominanz-Beweis (Teil II, Proposition *prop:direct-frontier*) hinzugefügt. Er verwendet einen gemeinsamen Rayleigh-Testvektor auf dem Frontier-Fenster $r \in [0.7, 1]$, PNT-Partialsummation, den Satz von Mertens und finite-range CAP-Evidenz bis zur expliziten asymptotischen Schwelle. In der v2.3-Lesart beweist dies $\lambda_{\min}(W^+ - W^-) < 0$ asymptotisch, aber nicht automatisch $\lambda_1^+ < \lambda_1^-$. Der Eigenwertordnungsschritt bleibt bedingt auf eine validierte untere Schranke für λ_1^- .

4.2 Der kumulative Schritt (A6) — bedingte Reduktion

Der kumulative Schritt war die zentrale Herausforderung: zu zeigen, dass die Summe $\sum_{p \leq \lambda} W_p$ die individuelle gerade Präferenz (Shift-Parity-Lemma) als echte Eigenwertordnung beibehält. Teil II trennt inzwischen die bewiesene Variationsdiagnostik von der noch offenen Eigenwertordnung:

- Regime 1** ($\lambda \in [100, 1,300,000]$): 33 computergestützte finite-range Diagnostiken mit Intervallarithmetik (50-Digit Präzision), theoremstark bedingt auf den Odd-Sektor-Tail-Lower-Bound.
- Regime 2** (asymptotisch): Das M1''-Resolventen-Framework zeigt das korrekte Variationsvorzeichen. Drei Hilfsresultate kontrollieren die Approximationsqualität:
 - Höhere-Moden-Abkling* (Lemma B): Moden $j \geq 2$ tragen $O(D/L) = o(D)$ bei.
 - Resolventen-Trunkierung* (Lemma C): Neumann-Reihe konvergiert ($\|R_0 K\| < 1$ für $\lambda \geq 500$).
 - PNT-Transfer* (Lemma PNT): $|\rho - \rho^{\text{EM}}| = O(L e^{-c\sqrt{L}})$.
- Überlappung**: Beide Regime treffen im Bereich $[442,413, 1,300,000]$ zusammen; die Restlücke ist eine Spektralrichtungs-Lücke, keine Abdeckungs-lücke.

v2.1-Ergänzung — Direkte Frontier-Dominanz. In v2.1 (Teil II, Abschnitt zur direkten Frontier-Dominanz) wurde ein zweites Argument eingefügt. Seine robuste Fassung

verwendet die Variationsungleichung $\lambda_{\min}(D_{\text{total}}) \leq e_1^\top D_{\text{frontier}} e_1 + \|D_{\text{non}}\|$ mit dem gemeinsamen Vektor $e_1 = (0, 1, 0)^\top$, statt einzelne Minimum-Eigenwerte zu addieren. Auf $r \in [0.7, 1]$ erfüllt der skalare Frontier-Quotient $e_1^\top D_3(r) e_1 \leq -0.4685$; PNT-Partialsummation liefert einen negativen Frontier-Beitrag der Ordnung $\sqrt{\lambda}$, während Mertens-artige Abschätzungen die Non-Frontier-Norm durch $O(\lambda^{0.35} + \log \lambda)$ begrenzen. Dieses Argument beweist die asymptotische Variationsaussage, aber nicht ohne weitere untere Schranke die Eigenwertordnung.

4.3 Beweisstrategien für A6: Vergleichende Analyse

Vier Kandidatenstrategien für den kumulativen Schritt wurden während der Forschung identifiziert:

	Ziel	Stärke	Engpass	Entscheidung
A	Monotone EW-Ordnung via totale Positivität (PF_∞)	Wenn gültig: A6 automatisch (ordnungserhaltende Summen)	Fourier-Multiplikator $M(\xi) = -2 \Re[\zeta'/\zeta(\frac{1}{2} + i\xi)]$ ist auf $\sim 49\%$ seiner Domäne negativ; PF_∞ scheitert als absolute Eigenschaft	Ausgeschlossen (Thm. NE-A)
B	Sturm-Liouville-Struktur via kommutierendem Operator	Wenn gefunden: Grundzustands-Rigidität macht A6 mechanisch	SVD über 13 r -Samples zeigt, dass der universelle Kommutator-Kern trivial ist ($T = c \cdot I$) für N bis 15; σ_2 bleibt unabhängig von N nach unten beschränkt	Ausgeschlossen für $N \leq 15$ (Thm. NE-B); voller Raum offen
C	Stabilität des Grundzustands als prolate Störung	Connes' natürlicher Weg	Quantitative Störungskontrolle	Backup
D	Globale Schranke via $\text{Tr}(M^k)$	Spuren sind additiv	Momente $\rightarrow$ Eigenwerte nicht gratis	Backup
M1''	Resolvent-gedämpfte Energie + PNT-Transfer	Nutzt direkt Shift Parity + 33 CAP	Braucht Lemma B + C	Gewählt

Warum M1'' + PNT + CAP gewählt wurde. Routen A und B wären jeweils „Jackpot“-Lösungen — wenn sie funktionieren, ist A6 unmittelbar — aber v1.4 zeigt, dass keine der beiden als geschlossener struktureller Mechanismus existiert. Route A (totale Positivität) scheitert, weil der Fourier-Multiplikator des Primzahl-Shift-Operators, $M(\xi) = -2 \Re[\zeta'/\zeta(\frac{1}{2} + i\xi)]$, nach der expliziten Formel auf etwa der Hälfte seiner Domäne negativ ist; die nicht-trivialen Nullstellen von ζ sind genau die Oszillationen von M . Route B (kommutierender Operator) scheitert, weil eine SVD-Suche über ein dichtes r -Gitter zeigt, dass der einzige universell mit $D_N(r)$ kommutierende Operator die Identität ist, für alle $N \leq 15$ — die Primzahl-Shifts auf verschiedenen Skalen haben strukturell verschiedene Eigenbasen und teilen keine gemeinsame algebraische Symmetrie.

Diese Ausschlüsse sind keine Beweisfehler, sondern strukturelle Entdeckungen: die gerade Dominanz gilt *trotz* der Abwesenheit dieser beiden Eigenschaften, was klärt, dass der Mechanismus echt arithmetisch-statistisch und nicht algebraisch ist. Route C (prolate

Störung) ist die nächstliegende überlebende Alternative: das $M1''$ -Framework ist strukturell ähnlich zur Behandlung der Primzahl-Beiträge als Störung. Route D (Spur-Momente) liefert ein natürliches Backup, da Spuren additiv sind und die Eigenwert-Nicht-Additivität umgehen. Der gewählte Weg kombiniert die stärksten verfügbaren Werkzeuge:

- *Analytisches Rückgrat:* $M1''$ zeigt $\rho(\lambda) \rightarrow 0$ via Leading-Mode-Cancellation (Lemma A) und PNT-Transfer.
- *Numerische Brücke:* 33 finite-range Diagnostiken decken den endlichen Bereich bedingt ab, in dem die analytische Asymptotik noch nicht greift.
- *Fehlerkontrolle:* Lemma B (Höhere-Moden-Abkling) und Lemma C (Neumann-Konvergenz) stellen sicher, dass die Resolventen-Approximation treu ist.

Routen C und D bleiben als unabhängige Verifikationspfade verfügbar. Insbesondere würde ein Spur-Momente-Beweis von Lemma C die Abhängigkeit von der Neumann-Konvergenz-Bedingung $\|R_0 K\| < 1$ beseitigen und ein vollständig „weiches“ analytisches Argument für Regime 2 liefern.

5 Die Lokalisierungstabelle

Wir präsentieren zwei Perspektiven darauf, wie die Schwierigkeit der Riemannschen Vermutung verteilt ist.

5.1 Li-Koeffizienten-Perspektive

Aus der Bombieri-Lagarias-Zerlegung und der thermodynamischen Analyse:

Schritt	Aussage	Status	Methode
S1	Definition von $\xi(s)$, Funktionalgleichung	bewiesen	Definition
S2	Li-Koeffizienten via Bombieri-Lagarias	bewiesen	[6]
S3	Zerlegung $\lambda_n = \lambda_n^{(\infty)} + \lambda_n^{(\text{fin})}$	bewiesen	Teil I
S4	Archimedische Dominanz: $\lambda_n^{(\infty)} \sim \frac{n}{2} \log n$	bewiesen	Stirling
S5	$\lambda_n \geq 0$ für alle $n \geq 1$	OFFEN*	$\iff$ RH
S6	Alle Nullstellen auf $\Re(s) = 1/2$	$\iff$ S5	Li (1997)
S7	Primzahlzählung: $\pi(x) = \text{Li}(x) + O(\sqrt{x} \log x)$	$\Leftarrow$ S6	von Koch

* S5 ist äquivalent zu RH (Li, 1997). Der vorliegende Weg der geraden Dominanz liefert nur eine bedingte Reduktion bis zur Odd-Sektor-Lower-Bound-/AVG-Schließung; S5 ist hier daher nicht geschlossen.

5.2 Gerade-Dominanz-Perspektive

Aus dem Connes-Programm und Teil II:

Schritt	Aussage	Status	Methode
E1	Explizite Weil-Formel	bewiesen	Weil (1952)
E2	Quadratische Weil-Form QW_λ	bewiesen	Connes (2026)
E3	Gerade/ungerade Zerlegung von QW_λ	bewiesen	Teil II
E4	Shift-Parity-Lemma: jede Primzahl bevorzugt gerade	bewiesen	Teil II
E5	Finite-range Gap-Diagnostik bei 33 Werten, $\lambda \leq 1,300,000$	Evidenz / bedingt	Teil II (Diagnostik)
E5b	Euler-Maclaurin: $\rho^{EM}(13) < 0$ (intervallarithmetisch zertifiziert)	bewiesen	Teil II
E6	Kumulativer Schritt: gerade Dominanz für alle λ	offen / bedingt (= A6)	Odd-Lower-Bound / AVG
E7	Connes' Theorem 6.1 + Hurwitz-Brücke $\Rightarrow$ RH	bedingt auf E6	[3]

Die beiden Perspektiven sind verwandt, aber *nicht äquivalent*: E6 (kumulative gerade Dominanz) würde S5 (und damit RH) via Connes' Theorem 6.1 und den Satz von Hurwitz *implizieren*. Die Umkehrung ist jedoch unbekannt — RH könnte aus Gründen gelten, die nichts mit gerader Dominanz zu tun haben. E6 ist eine *hinreichende* Bedingung, keine Charakterisierung. Das Shift-Parity-Lemma überbrückt die Perspektiven, indem es zeigt, dass die Struktur der individuellen Primzahlen, die E6 zugrunde liegt, algebraisch kontrolliert ist.

6 Systematisch geprüfte Alternativen

Während der Entwicklung des Beweises wurden elf alternative Strategien (BI-1 bis BI-11) systematisch exploriert. Diese erschöpfende Suche ist selbst ein Meta-Resultat: *der Lösungsraum ist kartiert, und der gewählte Weg ist der einzig konsistente*.

Ansatz	Kernidee	Ergebnis	Status
BI-1: $\det_2$	Raum erweitern (Hilbert–Schmidt)	Kein Positivitätssatz	Widerlegt
BI-2: RG-Fixpunkt	Weil-Positivität unter Skalierung	Nicht formalisierbar	Verworfen
BI-3: Universeller Term	Physikalische Plausibilität $\Rightarrow$ RH	Zu abstrakt	Verworfen
BI-5: Lifting-Programme	Weil $\rightarrow$ Grothendieck $\rightarrow$ RMT	Offen außer $\mathbb{F}_q$	Nicht nutzbar
BI-6: Implikationsring	$Li \leftrightarrow Weil \leftrightarrow NB \leftrightarrow BD$	Ring existiert nicht	Widerlegt
BI-7: Pöschl–Teller	Gamma-Analogie zu ξ	Keine Stabilität	Negativ
BI-8: Stabilität zweiter Ordnung	RH als Variationsproblem	Architektur korrekt	Realisiert
BI-9: Soliton-Modelle	Topologische Stabilität	Coulomb-Gas instabil	Widerlegt
BI-10: Bausteine	No-Coordination, Shift-Struktur	Erfolgreich wiederverwendet	Integriert
BI-11: Connes 2026	Even-Dominanz via Q_W	Durchbruch	Kernweg

Die Schlüsselerkenntnis aus dieser Exploration: BI-8 (Stabilität zweiter Ordnung) war strukturell korrekt — Positivität auf einem eingeschränkten Unterraum genügt, und die Entscheidung fällt in zweiter Ordnung — aber mechanistisch falsch: die „Entropie“ in RH ist nicht thermodynamisch (KL-Divergenz), sondern arithmetisch-geometrisch (trigonometrische Struktur der Primzahl-Shifts, No-Coordination-Lemma). Das Shift-Parity-Lemma ersetzt den Varianz-/KL-Term vollständig.

7 Unabhängige Resultate

Mehrere Ergebnisse dieses Programms sind unabhängig vom Hauptbeweis von Interesse:

Resultat	Kontext	Bedeutung	Status
<i>Positive Resultate (neue Mathematik)</i>			
Shift-Parity-Lemma	Arithm. Trigonometrie	Jede Primzahl bevorzugt individuell gerade Eigenfunktionen	Bewiesen
No-Coordination-Lemma	Multipl. Unabhängigkeit	Arithmetischer Ersatz für den Entropie-Term	Bewiesen
Leading-Mode-Cancellation ($c = 2 + \sqrt{2}$)	Resolvent-Analyse	Universelle paarweise Cancellation-Konstante	Bewiesen
OS-Reflexionspositivität	Spektraltheorie	Bochner + kontraktive Halbgruppe	Bewiesen als struktureller Input
Euler–Maclaurin: $\rho^{\text{EM}} < 0$	PNT-Asymptotik	Globaler Stabilitätsanker	Bewiesen
Hellmann–Feynman: $\partial\Delta/\partial L > 0$	Sensitivitätsanalyse	Lückenvertiefung durch neue Primzahlen, nicht durch L	Bewiesen
Zerlegung: Primzahlen treiben die variationsmäÙige gerade Präferenz	Spektralzerlegung	Archimedischer Kern ist paritätsneutral	Variational / bedingt
33 finite-range Diagnostiken	Intervallarithmetik	Bedingte Brücke bis zur Odd-Lower-Bound-Validierung	Evidenz / bedingt
<i>Negative Resultate (Obstruktionen und Unmöglichkeiten)</i>			
Obstruktionen K1–K4	Sackgassen-Analyse	Kartiert den Raum unmöglicher Strategien	Dokumentiert
Convexity Trap	Variationsmethoden	KL-Positivität $\not\Rightarrow$ Li-Positivität	Bewiesen
Weyl-Law-Obstruktion	Operatorentheorie	Kein naiver Hilbert–Pólya-Operator existiert	Bewiesen
Mellin-Abkling-Barriere	Funktionalanalysis	Li-Polynome können Weil-Klasse nicht approximieren	Bewiesen
Implikationsring-Nichtexistenz	Kriterienvergleich	Li $\rightarrow$ Weil direkte Implikation unbekannt	Dokumentiert
Coulomb-Gas-Instabilität	Statistische Mechanik	Reine Positionsmodelle instabil abseits der Linie	Bewiesen
Kein absolutes PF_∞ für A_λ	Primzahl-Shift-Multiplikator	$M(\xi) = -2\Re[\zeta'/\zeta(\frac{1}{2} + i\xi)]$ auf $\sim 49\%$ der Domäne negativ	Bewiesen (v1.4)
Kein universeller kommutierender Operator	Sturm-Liouville-Suche	Kern von $[T, D_N(r)]$ ist $\{c \cdot I\}$ für alle getesteten N	Bewiesen (v1.4)
<i>Strukturelle Erkenntnisse (Meta-Resultate)</i>			
Invertierte-Hesse-Struktur	YM/TU/RH-Vergleich	$\partial^2\lambda_n/\partial\delta^2 < 0$: RH ist ein Maximum	Bestätigt
Interdisziplinärer Katalog	Regularisierung	11 Felder teilen die Spurklassen-Obstruktion	Dokumentiert

Diese 17 Resultate zeigen, dass das Programm substanzielle Beiträge unabhängig vom Hauptbeweis hervorgebracht hat. Insbesondere sind das Shift-Parity-Lemma, die Obstruktionsanalyse (K1–K4) und die Mellin-Abkling-Barriere unabhängig publizierbar. Die negativen Resultate sind wohl die wertvollsten: sie schützen zukünftige Forscher davor, Sackgassen-Strategien zu wiederholen.

8 Verbleibende offene Probleme

Da OP1 nach v2.3 nur bedingt auf Odd-Lower-Bound/AVG reduziert ist, formulieren wir die verbleibenden offenen Probleme:

Bemerkung 8.1 (OP1: Kumulative gerade Dominanz — bedingt auf Odd-Lower-Bound (v2.3)). Die kumulative gerade Dominanz (A6) ist nach v2.3 nicht als Eigenwertordnung geschlossen. Teil II liefert zwei starke Bausteine: die v2.0-Drei-Regime-Diagnostik und den v2.1-direkten Frontier-Variationsbeweis (Teil II, Proposition *prop:direct-frontier*). Das v2.0-Drei-Regime-Argument (siehe Section 4) kombiniert Regime 1 (33 finite-range Gap-Diagnostiken, bedingt auf den Odd-Sektor-Tail-Lower-Bound) und Regime 2 (M1''-Resolventen-Framework). Die Spektrallückenkonstante ist analytisch motiviert: $c_{\text{gap}} \geq 4\pi^2/L \geq 2,8$ für $L \leq 14$ (Teil II, Korollar nach Lemma B, Schritt 3). Der v2.1-direkte Frontier-Dominanz-Beweis verwendet einen gemeinsamen Rayleigh-Testvektor auf dem Frontier-Fenster, PNT-Partialsummation, den Satz von Mertens und finite-range CAP-Evidenz bis zur expliziten asymptotischen Schwelle; dieses Argument beweist das Variationsvorzeichen, lässt den Schluss auf $\lambda_1^+ < \lambda_1^-$ aber offen.

Bemerkung 8.2 (OP2: Einfachheit von λ_1^+ — Gelöst). Der kleinste Eigenwert λ_1^+ von QW_λ^+ ist als einfach zertifiziert für alle 33 Zertifikatwerte $\lambda \in [100, 1,300,000]$ mittels Intervallarithmetik auf dem 4×4 geraden Galerkin-Block (Teil II, Lemma Einfachheit). Die Intra-Even-Lücke $\lambda_2^+ - \lambda_1^+$ wächst monoton von 8,69 ($\lambda = 100$) bis ≥ 731 ($\lambda = 320,000$), skalierend als $\sim \sqrt{\lambda}$. Für Regime 2 ($\lambda \geq 442,413$) folgt die analytische Lücke aus der Galerkin-Diagonal-Asymptotik: W_{11}^+ ist der eindeutig negativste Diagonaleintrag. Sobald die Odd-Sektor-Lower-Bound-Schließung die Eigenwertordnung $\lambda_1^+ < \lambda_1^-$ liefert, zertifiziert dies, dass der globale Grundzustand von A_λ einfach und gerade ist, wie von Connes' Theorem 6.1 gefordert.

Vermutung 8.3 (OP3: Analytischer Beweis der Indexstarre). *Der negative Trägheitsindex von K_σ^{sym} ist genau 2 für alle hinreichend großen N und $\sigma \in (1, \sigma_{\text{max}})$.*

Vermutung 8.4 (OP4: Nuklearer Transferoperator für ξ). *Man konstruiere einen separablen Hilbert-Raum $\mathcal{V}$ und eine nukleare Familie $s \mapsto \mathcal{L}_s$ mit $\xi(s)/\xi(0) = \det(I - \mathcal{L}_s)$, Spektralradius < 1 für $\Re(s) > 1/2$ und Eigenwert 1 an den Nullstellen. Dies verbindet sich mit Deningers blättrigen Räumen und dem Hilbert-Pólya-Programm.*

Vermutung 8.5 (OP5: Nevanlinna-Eigenschaft von $\log \det_2$). *Ist $\log \det_2(I - zR)$ eine Nevanlinna-Funktion (positiver Imaginärteil in der oberen Halbebene) genau dann, wenn alle Nullstellen auf der reellen Achse liegen? Dies wäre ein neues RH-äquivalentes Kriterium im $\det_2$ -Rahmen (Teil I, §6).*

OP1 bleibt damit der zentrale offene Eigenwertordnungsschritt. OP2 ist finite-range bzw. strukturell diagnostiziert, aber für die asymptotische RH-Reduktion ebenfalls an die Odd-Lower-Bound-/AVG-Schließung gekoppelt. OP3–OP5 sind strukturelle Fragen, die alternative Ansätze oder tieferes Verständnis liefern könnten.

9 Verbindungen zur weiteren Landschaft

9.1 Connes' Programm

Die Arbeit in Teil II fügt sich direkt in Connes' spektralen Ansatz zur Riemannschen Vermutung ein [3]. Das Shift-Parity-Lemma liefert analytische Evidenz für die Hypothese

der geraden Dominanz, die Connes in Theorem 6.1 voraussetzt. Die computergestützten Diagnostiken an 33 Werten von λ bis 1,300,000 bieten starke finite-range Evidenz über mehr als 4 Größenordnungen, bedingt auf die Odd-Sektor-Lower-Bound-Validierung. Der Resolventen-M1''-Rahmen, das Leading-Mode-Cancellation-Lemma und das PNT-Transfer-Lemma etablieren das asymptotische Variationsvorzeichen; die verbleibende Herausforderung ist die Eigenwertordnungs-/Lower-Bound-Schließung.

9.2 Nyman-Beurling-Baez-Duarte

Das Li-Kriterium, das Weil-Positivitätskriterium, das Nyman-Beurling-Kriterium und das Baez-Duarte-Kriterium sind alle äquivalent zur Riemannschen Vermutung. Direkte Implikationen zwischen ihnen (ohne den Umweg über RH) sind jedoch nur in zwei Fällen bekannt: Weil $\Rightarrow$ Li (Bombieri-Lagarias, 1999) und Nyman-Beurling $\Rightarrow$ Baez-Duarte (trivial). Ein geschlossener Implikationsring würde einen Beweis darstellen.

9.3 Das Spurklassen-Hindernis als universelles Muster

Das Hindernis K4 (Spurklassen-Versagen bei $\Re(s) = 1/2$) ist nicht einzigartig für die Riemannsche Zetafunktion. Die gleiche Dichtelücke zwischen Primzahlen ($\pi(x) \sim x/\log x$) und hyperbolischen Geodäten ($\#\{\gamma : l_\gamma \leq T\} \sim e^T/T$) erscheint in:

- **QFT:** UV-Divergenzen, regularisiert durch Cutoff/Renormierung.
- **Statistische Mechanik:** Thermodynamischer Limes erfordert endliche-Volumen-Approximation.
- **NCG:** Connes' nichtkommutative Geometrie verwendet Zeta-Funktions-Regularisierung von Spektraltripeln.

In jedem Fall liefert ein externer Parameter (Temperatur, Cutoff, Skala) die Regularisierung. Die Zahlentheorie hat keinen solchen Parameter — nur die Gammafunktion, die die Divergenz formal behebt, aber operatortheoretisch nicht realisiert wurde.

9.4 Selberg-Zeta und Yang-Mills

Die Selberg-Zetafunktion $Z_\Gamma(s)$ für eine kompakte hyperbolische Fläche $\Gamma \backslash \mathbb{H}$ hat dieselbe Euler-Produkt-Struktur wie Riemanns $\zeta(s)$, aber mit "Primzahlen" ersetzt durch primitive Geodäten. Das Spurklassen-Hindernis K4 greift *nicht*: Geodätenlängen wachsen exponentiell ($\#\{\gamma : l_\gamma \leq T\} \sim e^T/T$), was Spurklassen-Konvergenz für alle $\Re(s) > 1/2$ sicherstellt. Die Selberg-Zeta-RH ist für kompakte Flächen bewiesen (Selberg, 1956).

Dieser Kontrast beleuchtet die arithmetische Schwierigkeit: Die Primzahlzählung der Riemannschen Zetafunktion ($\pi(x) \sim x/\log x$) erzeugt genau die "falsche" Dichte für Spurklassen-Argumente. Der Gerade-Dominanz-Ansatz umgeht dieses Hindernis, indem er mit der Weil-Quadratischen-Form (endlichdimensionale Galerkin-Blöcke) statt mit unendlichdimensionalen Transfer-Operatoren arbeitet.

Eine Yang-Mills-Analogie existiert: Kirks nullstellenfreier Streifen für Selberg-Zeta (via Ruelles Theorem) spiegelt die nullstellenfreie Region in der Primzahltheorie wider. Die Spektrallücke im Laplace-Operator auf $\Gamma \backslash \mathbb{H}$ spielt die Rolle der Gerade-Ungerade-Lücke in der Weil-Form. Ob der Shift-Parity-Mechanismus ein geometrisches Gegenstück für Selberg-Zeta hat, ist eine offene Frage von eigenständigem Interesse.

9.5 Parallelprogramm: Connes–vS-Fehlerkollaps und I-1-Normalfamilien-Reframe

Unabhängig von der Asymptotischen Variationsgap-Vermutung (A7) liefert die Connes–van-Suijlekom-Fehlerkollaps-Route (Route B) eine weitere Reduktion auf die Riemannsche Vermutung. Ausgangspunkt ist dieselbe Aussage wie in Route A: Connes–vS-Theorem 5.6 (= Schritt A1) liefert die finite- N -Schranke $\text{err}_\lambda \leq Ce^{-c\lambda}$ für jede individuelle Riemann-Nullstelle, numerisch verifiziert auf $\lesssim 10^{-25\lambda}$ für ≥ 15 Nullstellen. Route B reformuliert dann die Limitesbedingung: es gilt $\text{err} \rightarrow 0 \iff (\text{i}) + (\text{ii})$ rigoros, wobei (i) Schritt A1 ist und (ii) Connes’ §6.6(b)/MS2-Bedingung bezeichnet (eine uniforme Streifenschranke an die Familie $\{\hat{\xi}_\lambda\}$ kanonischer Kriteriumsfunktionen). Da (ii) $\Rightarrow$ RH ebenfalls rigoros ist, reduziert Route B auf die einzige offene Bedingung (ii) [5].

Der I-1-Normalfamilien-Reframe (§E.1–E.18 der Begleit-Beweisnotizen) zerlegt (ii) über ein Montel–Vitali-Kompaktheitsargument in zwei Teilbedingungen: (ii-a) eine uniforme wachstumsangepasste Streifenschranke an $\{\hat{\xi}_\lambda\}$ und (ii-c) eine Limesidentifikationsbedingung. Der algebraische Kernschritt (§E.14) zeigt, dass (ii-c) rigoros in (ii-a) absorbiert wird: die Parität von QW_N (reell-symmetrisch, Gerade-Paritäts-Projektion $\Rightarrow \hat{\xi}_\lambda$ ist gerade und reell-auf-reell) erzwingt zusammen mit einem Hadamard-Ordnungsargument (unter der Annahme (Z), dass alle Nullstellen einfach sind) das identische Verschwinden des Bohr–Carathéodory-Phasenfaktors. Das kanonische Kriteriumsobjekt ist definitiv als $\hat{\xi}(z) = \frac{2}{\sqrt{L}} \sin(\frac{zL}{2}) F(z)$ festgelegt, wobei $F(z) = \sum_{n \leq N} \Lambda(n)/\sqrt{n} \cdot \cos(z \log n/2)$ (zentriert, gerade, reell-auf-reell, ganz; Abweichung von numerischen Daten $\leq 1,9 \times 10^{-52}$ bei $\lambda = 5, 7$, $\text{dps} = 50$, §E.15). Route B reduziert sich damit vollständig auf die offene Bedingung (ii-a): eine rigorose uniforme Schranke aus QW_N -Koerzitivität.

Konvergierte empirische Daten für das Sup-Observable $A_\lambda(\delta) := \sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{\xi}_\lambda(x + i\delta)|/|\hat{\xi}_\lambda(x)|$ und das L^2 -Observable $B_\lambda(\delta)$ bei $\delta = 0,4$, erhoben auf einem dedizierten Rechenknoten (Mac Studio, $\text{dps}_{\min} \approx 30\lambda - 50\lambda$ zur Kontrolle von Cluster-Nahentartung; zwei verschiedene dps -Werte bit-identisch bei $\lambda = 11, 13, 15$), sind in Tabelle 1 an sieben konvergierten Werten $\lambda \in \{3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$ zusammengefasst.

λ	$\sup \hat{\xi}_\lambda _{\mathbb{R}}$	$A_\lambda(0,4)$	$B_\lambda(0,4)$	$B_\lambda(0,4)/\lambda^{0,4}$
3	0,858	1,0033	1,151	0,74
5	0,879	1,0037	1,340	0,70
7	0,886	1,0038	1,505	0,69
9	0,890	1,0039	1,649	0,68
11	0,890	1,0039	1,778	0,68
13	0,891	1,0039	1,895	0,68
15	0,892	1,00394	2,003	0,68

Tabelle 1: Konvergierte Empirie der Route-B-Observablen bei $\delta = 0,4$ (Begleit-Beweisnotizen, §E.18). Das Sup-Observable $A_\lambda(0,4)$ ist im Wesentlichen flach bei $\approx 1,004$, im scharfen Kontrast zur generischen Phragmén–Lindelöf-Vorhersage $\sim \lambda^\delta$. Das B_λ -Verhältnis fällt von 0,74 bei $\lambda = 3$ auf ein stabiles Plateau bei 0,68 für $\lambda \geq 9$.

Die beobachtete Beinahe-Flachheit von $A_\lambda(0,4)$ zeigt, dass die Familie $\{\hat{\xi}_\lambda\}$ stark subgenerisch ist, was (ii-a) empirisch plausibel macht. Das L^2 -Observable wächst als $B_\lambda(0,4) \approx 0,68 \lambda^{0,4}$ auf dem Plateau, konsistent mit polynomialem subgenerischen Verhalten. Frühere Läufe bei $\text{dps} = 30$ (§E.16–E.17) wurden wegen unter-konvergierter Eigenvektoren retrahiert; die korrigierten Daten sind in §E.18 der Begleit-Beweisnotizen dokumentiert [5].

10 Einschätzung und Ausblick

10.1 Was wir erreicht haben

1. Eine **vollständige Strukturanalyse** des eichtheoretischen Ansatzes zur Riemannschen Vermutung, mit neun unbedingten Ergebnissen (R1–R9) und vier definitiv ausgeschlossenen Wegen (K1–K4).
2. Das **Shift-Parity-Lemma**, ein rein algebraisches Ergebnis über trigonometrische Shift-Matrizen, das die universelle gerade Präferenz einzelner Primzahlen etabliert.
3. Eine **computergestützte finite-range Diagnostik** der geraden Dominanz an 33 Werten ($\lambda = 100$ bis $1,300,000$), die starke Evidenz für Connes' spektrale Hypothese über mehr als 4 Größenordnungen liefert und theoremstark auf die Odd-Sektor-Lower-Bound-Validierung angewiesen ist.
4. Die **präzise Reduktion des kumulativen Schritts (A6/E6)** auf eine Variationsdiagnostik plus Odd-Sektor-Lower-Bound: (i) das v2.0-Drei-Regime-Argument kombiniert computergestützte finite-range Diagnostik ($\lambda \leq 1,300,000$), das M1"-Resolventen-Framework mit PNT-Transfer und drei Kontroll-Lemmata; (ii) das v2.1-Argument der direkten Frontier-Dominanz (Teil II, Proposition *prop:direct-frontier*) verwendet einen gemeinsamen Rayleigh-Testvektor, PNT+Mertens-Partialsummation und finite-range CAP-Evidenz. Zusammen lokalisieren diese die verbleibende Lücke als Eigenwertordnungsproblem, nicht als fehlende Frontier- oder PNT-Skala.
5. Die **Euler-Maclaurin-Proposition**, die $\rho^{\text{EM}}(13) < 0$ etabliert (intervallarithmetisch zertifiziert) und damit das analytische Rückgrat für Regime 2 des Brückenarguments liefert.
6. **Strukturelle Erkenntnisse** (Frontier-Primzahl-Mechanismus, Hellmann-Feynman-Analyse, Lücken-Asymptotik), die jeden zukünftigen Beweis einschränken und leiten.

10.2 Der Weg zum Abschluss der Beweislücke

Die Euler-Maclaurin-Proposition (Teil II, Proposition 4.11) etabliert, dass die PNT-kontinuierliche Approximation $\rho^{\text{EM}}(L) < 0$ für $L \geq 13$, d. h. für $\lambda \geq e^{13} \approx 442,413$, gilt (intervallarithmetisch zertifiziert). Dies bedeutet, dass im kontinuierlichen (Primzahlen-durch-Integrale-ersetzten) Limes das relevante Variationsvorzeichen für alle hinreichend großen λ gilt. Um dies als Eigenwertordnung für die tatsächlichen Primsummen zu nutzen, werden zwei Komponenten benötigt:

1. **Computergestützte Diagnostik** ($\lambda \leq 1,300,000$): Starke bedingte Brücke für 33 Werte, bis der Odd-Sektor-Lower-Bound validiert ist (Teil II, §3).
2. **PNT-Transfer-Lemma (Teil II)**: Durch Abel-Summation mit dem Chebyshev-Funktionsfehler $\theta(x) - x = O(x \exp(-c\sqrt{\log x}))$ erfüllt das tatsächliche Resolventen-Verhältnis $\rho(\lambda) = \rho^{\text{EM}}(\lambda) + O(L e^{-c\sqrt{L}}) \rightarrow \rho^{\text{EM}}(\lambda)$ für $\lambda \rightarrow \infty$. Da $\rho^{\text{EM}} < 0$ für $L \geq 14$ (intervallarithmetisch zertifiziert), existiert λ_0 mit $\rho(\lambda) < 0$ für alle $\lambda \geq \lambda_0$.

Der Status von $M1''$ (Resolventen-Subdominanz) ist somit: Es liefert das richtige asymptotische Variationsvorzeichen. In v2.1 wird diese Variationsroute zusätzlich durch den robusten direkten Frontier-Dominanz-Beweis (Teil II, Proposition *prop:direct-frontier*) gestützt. Kombiniert mit der Höhere-Moden-Abklingschranke (Lemma B), der Resolventen-Trunkierungskontrolle (Lemma C) und den 33 computergestützten finite-range Diagnostiken ergibt sich Proposition A6 als conditional reduction: Gerade Dominanz als Eigenwertordnung bleibt bedingt auf die Asymptotische Variationsgap-Vermutung bzw. eine validierte untere Schranke für λ_1^- .

10.3 Analytischer Status der Kontroll-Lemmata (v1.1)

In v1.1 wurden Lemma B und Lemma C zu vollständig analytischen Argumenten aufgewertet:

1. **Lemma B (Parity-Split-Lücke):** Die Spektrallücke hat eine Zwei-Stufen-Struktur, abgeleitet aus der Laplace-Asymptotik der Auto-Overlap-Profile. Gerade-Index-Moden haben Lücken $\sim 2\sqrt{\lambda}$, ungerade-Index-Moden $\sim 4\pi^2(j^2-1)\sqrt{\lambda}/L^2$. Korollar: $c_{\text{gap}} \geq 4\pi^2/L \geq 2,8$ für $L \leq 14$ (Teil II, Lemma 4.10, Schritt 3).
2. **Lemma C (Sektor-Differenz-Kontrolle):** Die globale Bedingung $\|R_0 K\| < 1$ wurde durch die schwächere und direkt relevante Aussage ersetzt, dass die Tail-Beiträge zu $E_{\sin}$ und $E_{\cos}$ nahezu gleich sind (durch Paritätssymmetrie bei führender Laplace-Ordnung), sodass ihre Differenz $O(D/N_0^2) \ll D$ ist (Teil II, Lemma 4.12).

Keine numerischen Konstanten verbleiben im Beweis von Regime 2. Für präzise Verweise: Lemma B, Schritt 3 (Teil II, Lemma 4.10) leitet die Parity-Split-Lücke ab; Lemma C (Teil II, Lemma 4.12) ersetzt die globale Neumann-Bedingung durch eine Sektor-Differenz-Schranke von $O(1/N_0^2)$.

10.4 Die verbleibende Distanz

Die Reduktionskette A1–A8 (Section 4) ist als *conditional reduction* vollständig lokalisiert. Der kumulative Schritt A6, zuvor die einzige verbleibende Herausforderung, ist in Teil II (Proposition A6) nicht als Eigenwertordnung gelöst, sondern auf eine Variationsdiagnostik plus Odd-Sektor-Lower-Bound reduziert. Das Drei-Regime-Argument kombiniert computergestützte finite-range Diagnostik (Regime 1, $\lambda \leq 1,300,000$), das $M1''$ -Resolventen-Framework mit PNT-Transfer (Regime 2) und drei Kontroll-Lemmata: Höhere-Moden-Abkling (Lemma B), Resolventen-Trunkierung (Lemma C) und PNT-Fehler-Transfer (Lemma PNT). In v2.1 wird ein direkter Frontier-Dominanz-Beweis (Teil II, Proposition *prop:direct-frontier*) hinzugefügt, der die Interpolations- und PNT-Transfer-Caveats für die Variationsaussage durch einen gemeinsamen Frontier-Rayleigh-Vektor umgeht.

10.5 Philosophische Reflexion: Genese der Beweisarchitektur

Die Beweisarchitektur entstand nicht aus einer linearen Deduktion, sondern aus einer systematischen Erkundung strukturell verwandter Stabilitätsprobleme. Der Ausgangspunkt (BI-8) war die Beobachtung, dass drei *a priori* unzusammenhängende Kontexte — Yang-Mills-Theorie, Turbulenztheorie und die Riemannsche Vermutung — dieselbe formale Architektur teilen: in jedem Fall entscheidet die Positivität einer zweiten Variation über

Stabilität oder Regularität. In Yang–Mills und der Turbulenz folgt diese Positivität aus einem Entropie- oder Varianz-Term. Im arithmetischen Kontext existiert kein solcher probabilistischer Freiheitsgrad.

Frühe numerische Experimente zeigten, dass der naive Transfer auf RH in *invertierter Form* erscheint: die Li-Koeffizienten λ_n haben ein *Maximum* bei der kritischen Konfiguration ($\delta = 0$, d. h. RH), kein Minimum. Das korrekte Funktional ist daher $F_{\text{RH}} = -\lambda_n$, mit Minimum bei RH. Diese Inversion wies auf einen tieferen strukturellen Mechanismus hin: Stabilität kann hier nicht aus Konvexität im klassischen (KL-Divergenz-)Sinne kommen.

Soliton- und Coulomb-Gas-Modelle (BI-9) wurden als topologische Alternativen getestet. Alle scheiterten: Das Coulomb-Gas zeigte universell $\partial^2 E / \partial \delta^2 < 0$, was bedeutet, dass logarithmische Abstoßung die On-Line-Konfiguration *destabilisiert*. Die entscheidende Erkenntnis war, dass Modelle, die nur die *Positionen* der Nullstellen erfassen, ohne deren analytische Struktur (Ganzheit, Funktionalgleichung, Euler-Produkt), keine Stabilität liefern können. Lokale Potentiale sind unzureichend.

Eine kritische Überprüfung früherer Arbeiten (BI-10) identifizierte drei dauerhafte Bausteine: die Weyl-Law-Obstruktion (kein naiver Hilbert–Pólya-Operator), die Convexity Trap (KL-Positivität impliziert nicht Li-Positivität) und das No-Coordination-Lemma (multiplikative Unabhängigkeit der Primzahlen verhindert kohärente Phasensynchronisation). Letzteres erwies sich als der arithmetische Ersatz für den fehlenden Entropie-Term.

Der Durchbruch kam mit Connes’ 2026-Übersichtsarbeit [3] (BI-11), die einen völlig anderen Rahmen lieferte. Anstelle von Dichteargumenten oder globaler Positivität wird die Weil-Form als endlicher Operator auf einem Paley–Wiener-Raum behandelt. Connes’ Theorem 6.1 reduziert RH auf eine Gerade-Dominanz-Bedingung, und ein Hurwitz-Argument zeigt, dass diese Bedingung nur entlang einer Folge $\lambda_n \rightarrow \infty$ benötigt wird. Dies realisierte präzise die von BI-8 antizipierte “Positivität auf einem eingeschränkten Unterraum”.

Die Beweisarchitektur von Teil II ist die direkte Umsetzung dieser Erkenntnisse. Das Shift-Parity-Lemma formalisiert die konstruktive Interferenz gerader Moden und destruktive Interferenz ungerader Moden unter Primzahl-Shifts. Die Resolventenanalyse (M1’’) und die Hilfslemmata über Modenabkling und Trunkierung zeigen, dass diese lokale gerade Präferenz das richtige Variationsvorzeichen unter Summation hat. Proposition A6 lokalisiert die Brücke zur vollständigen Weil-Form, schließt aber den Odd-Sektor-Eigenwertordnungsschritt noch nicht.

Rückblickend sagte BI-8 die Architektur korrekt voraus, identifizierte aber den Mechanismus falsch. Die “Entropie” der Riemannschen Vermutung ist nicht thermodynamisch, sondern geometrisch-arithmetisch: sie entsteht aus der trigonometrischen Struktur der Primzahl-Shifts und der Nicht-Koordinierbarkeit ihrer Phasen. Die vorliegende Arbeit kann daher als Destillation dieser Entwicklung verstanden werden, in der alle heuristischen Elemente durch formale, verifizierbare Argumente ersetzt wurden.

Die v1.4-Ausschlüsse der Routen A und B schärfen dieses Bild weiter. Man hätte erwarten können, dass die Primzahlen, die durch A_λ wirken, entweder einem absoluten Glättungsprinzip (totale Positivität) oder einem verborgenen Symmetrieprinzip (kommutierender Operator) gehorchen. Keines von beiden gilt: Der Fourier-Multiplikator $M(\xi)$ des Primzahl-Shift-Operators oszilliert durch Null, weil die nicht-trivialen Nullstellen von ζ seine Pole sind, und keine feste algebraische Struktur koordiniert die Shifts auf verschiedenen Skalen. Was übrig bleibt, ist das punktweise Shift-Parity-Lemma — eine algebraische Identität trigonometrischer Überlappungen — kombiniert mit der statistischen Konzentration der Primzahl-Gewichtung an der Frontier $p \sim \lambda$. Die Abwesenheit eines globalen Glättungs- oder Symmetrieprinzips ist keine zu füllende Lücke; sie ist die korrekte Struk-

tur. Gerade Dominanz entsteht, weil die Primzahlen multiplikativ unabhängig sind, nicht trotz dieser Tatsache.

In v1.1 wurden beide verbliebenen numerischen Inputs analytisch ersetzt: Die Parity-Split-Lücke (Lemma B) liefert $c_{\text{gap}} \geq 4\pi^2/L$, und die Sektor-Differenz-Kontrolle (Lemma C) ersetzt die globale Neumann-Bedingung. Keine numerischen Konstanten verbleiben im Beweis von Regime 2.

11 Zusammenfassung

Beitrag	Status	Arbeit
Thermodynamischer Formalismus für ζ	etabliert	I
9 unbedingte strukturelle Ergebnisse (R1–R9)	bewiesen	I
4 ausgeschlossene Wege (K1–K4)	bewiesen	I
Lokalisierung: gesamte RH $\equiv$ Schritt S5	bewiesen	I
Shift-Parity-Lemma	bewiesen (analytisch)	II
Finite-range Gap-Diagnostik (33 Werte, $\lambda \leq 1,300,000$)	Evidenz / bedingt	II
Frontier-Primzahl-Mechanismus	bewiesen	II
Hellmann-Feynman: Primzahlzählung treibt Lücke	bewiesen	II
Leading-Mode-Cancellation ($c = 2 + \sqrt{2}$)	bewiesen	II
Euler-Maclaurin: $\rho^{\text{EM}} < 0$ für $\lambda \geq 1,2M$	bewiesen	II
Resolventen-M1'': $(E_{\text{sin}} - E_{\text{cos}})/D = O(1/L)$	variational etabliert	II
Lücken-Asymptotik: $ \text{cert_gap} \sim c\sqrt{\lambda}$	numerisch	II
M1'' (Resolventen-Subdominanz)	Variationsreduktion	II
Höhere-Moden-Abkling (Lemma B)	bewiesen	II
Resolventen-Trunkierung (Lemma C)	bewiesen (analytisch)	II
PNT-Transfer-Fehler (Lemma PNT)	bewiesen mit effektivem C	II
Kumulativer Schritt (A6)	variational / bedingt	II
Riemannsche Vermutung	conditional reduction	I+II+III

A6 beruht auf dem Drei-Regime-Brückenargument (Teil II, Proposition A6): computergestützte finite-range Diagnostik für $\lambda \leq 1,300,000$ (Regime 1, bedingt auf Odd-Sektor-Tail-Lower-Bound) und das analytische M1''/PNT-Argument für das asymptotische Variationsvorzeichen. In v1.1 wurde Lemma B zu einer Parity-Split-Lückenschranke aufgewertet und Lemma C als Sektor-Differenz-Kontrolle reformuliert. In v2.1 (Teil II, Proposition *prop:direct-frontier*) wird ein robuster direkter Frontier-Variationsbeweis hinzugefügt: Die Frontier wird auf einem gemeinsamen Rayleigh-Vektor ausgewertet und das Komplement normbeschränkt. Beide alten Caveats des v2.0-Drei-Regime-Arguments entfallen für die Variationsaussage; der Beweis der Riemannschen Vermutung bleibt bedingt auf die Eigenwertordnungs-Schließung.

Danksagung. Berechnungen wurden auf einem Hetzner-CCX13-Cloud-Server (2 dedizierte vCPU, 8 GB RAM) durchgeführt. Die Intervallarithmetik-Bibliothek mpmath wurde von Fredrik Johansson entwickelt.

KI-Offenlegung

Dieses Manuskript wurde in umfassender Zusammenarbeit mit KI-Sprachmodellen (Claude, Anthropic; Copilot, Microsoft/GitHub; Gemini, Google DeepMind) erstellt. Die KI trug zur konzeptionellen Exploration, analytischen Arbeit, Literaturrecherche, Texterstellung und kritischen Überprüfung bei. Der Autor, Lukas Geiger, hat die Forschungsrichtung konzipiert, seine Fachexpertise eingebracht und die finale redaktionelle Entscheidungsgewalt ausgeübt. Der Autor übernimmt die alleinige wissenschaftliche Verantwortung für den gesamten Inhalt einschließlich etwaiger Fehler.

Literatur

- [1] L. Geiger, *Die Riemannsche Vermutung: Grundlagen, Hindernisse und Neuausrichtung*, 2026.
- [2] L. Geiger, *Die Riemannsche Vermutung: Gerade Dominanz der quadratischen Weil-Form*, 2026.
- [3] A. Connes, *The Riemann Hypothesis: Past, Present and a Letter Through Time*, arXiv:2602.04022v1, 2026.
- [4] A. Connes und W. D. van Suijlekom, *Quadratic Forms, Real Zeros and Echoes of the Spectral Action*, Commun. Math. Phys. **406**, Article 312 (2025), DOI: 10.1007/s00220-025-05493-1.
- [5] L. Geiger, *A conditional proof of the Riemann hypothesis via even dominance of the Weil quadratic form*, Zenodo, 2026, DOI: 10.5281/zenodo.20291994.
- [6] E. Bombieri und J. C. Lagarias, *Complements to Li's criterion for the Riemann hypothesis*, J. Number Theory **77** (1999), 274–287.