

Eine bedingte Reduktion der Riemannschen Vermutung auf gerade Dominanz der Weilschen quadratischen Form

Lukas Geiger
Unabhängiger Forscher, Bernau
ORCID: 0009-0005-7296-1534

Entwurf v1.9 – 29. Mai 2026

Zusammenfassung

Dieser Beitrag präsentiert eine bedingte Reduktion der Riemannschen Vermutung, extrahiert aus einer dreiteiligen Landscape-Reihe. Die Landscape-Beiträge dokumentieren den vollständigen Forschungsprozess, einschließlich fehlgeschlagener Routen, Obstruktionstheoreme, rechnergestützter Zertifikate und alternativer Strategien. Der vorliegende Beitrag behält nur die beweisrelevante Kette bei. Im Anschluss an Connes' Reduktion der Riemannschen Vermutung auf eine Bedingung der geraden Dominanz für die Weilsche quadratische Form leisten wir zwei unabhängige Beiträge. Erstens berichtet die Landscape-Rechnung für den endlichen Bereich $100 \leq \lambda \leq 1,300,000$ negative intervall-eingeschlossene Galerkin-Lücken an 33 Gitterpunkten. Ein Audit vom 15. Mai 2026 zeigt jedoch, dass die aktuelle Konstruktion einer unteren Schranke im Sin-Block noch eine heuristische geometrische Tail-Extrapolation enthält; die endlichen Daten werden daher hier als computergestützte numerische Evidenz behandelt, nicht als CAP-Beweis auf Theoremniveau. Zweitens wird für das asymptotische Regime $\lambda \rightarrow \infty$ über ein gemeinsames Rayleigh-Vektor-Argument gezeigt, dass $\lambda_{\min}(W_{\text{prime}}^+ - W_{\text{prime}}^-) = -\Theta(\sqrt{\lambda})$ auf dem relevanten Drei-Modus-Galerkin-Block gilt. Die Lücke zwischen dieser Variations-Aussage und der eigentlichen Eigenwert-Anordnung $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ im asymptotischen Bereich erfordert eine separate quantitative untere Schranke für λ_1^- ; wir formulieren dies als *Asymptotische Variationsgap-Vermutung* und skizzieren in [Abschnitt 8](#) eine Route über entartete Störungstheorie. Der hier analysierte Reduktionsweg zur Riemannschen Vermutung ist daher bedingt auf (i) Connes–van Suijkoms Reell-Nullstellen-Kriterium und die Hurwitz-Brücke aus [1], deren Fact 6.4-Konvergenz dort als Slepian–Pollak-Folge dargestellt wird, sowie (ii) die Asymptotische Variationsgap-Vermutung für den minimalen Eigenwert im ungeraden Sektor. Das Shift-Parity-Lemma bleibt unbedingt; die intervallarithmetischen Zertifikate bleiben numerische Evidenz, bis eine rigorose Schließung über eine untere Schranke vorliegt. Die ausgeschlossenen Eich-, Total-Positivitäts- und universellen Kommutator-Routen werden nicht verwendet; für diese Pfade wird auf die Landscape-Reihe verwiesen.

Schlüsselwörter: Riemannsche Vermutung, Weilsche quadratische Form, gerade Dominanz (even dominance), Connes-Programm, Shift-Parity-Lemma, computergestützte Evidenz.

1 Zweck und Bezug zur Landscape-Reihe

Dieser Beitrag ist kein vierter Teil der Landscape-Reihe. Er ist eine rein auf den Beweis fokussierte Extraktion. Die Landscape-Beiträge [6, 5, 4] behalten den gesamten Prozess bei: den ursprünglichen eichtheoretischen Ansatz, die Obstruktionsanalyse, Nicht-Existenz-Theoreme für zwei attraktive, aber falsche strukturelle Routen, Gutachtenberichte und rechnergestützte Übergeben. Diese Komponenten sind für Audits und die Wissenschaftsgeschichte nützlich, werden aber für die kürzeste Beweiskette nicht benötigt.

Das hier präsentierte Argument verwendet folgende zweiteilige Kette:

$$\begin{aligned} & \text{Shift-Parität} + \text{IA-Diagnostik für } 100 \leq \lambda \leq 1,300,000 \\ \implies & \text{endliche Evidenz; Theoremniveau nur unter [Satz 7.1](#),} \end{aligned}$$

zusammen mit

$$\begin{aligned} & \text{Frontier-Dominanz} + \text{Asymptotische Variationsgap-Vermutung} \\ \implies & \text{gerade Dominanz für } \lambda \geq \Lambda^\dagger \\ \implies & \text{RH via Connes und Hurwitz ([Satz 7.3](#)).} \end{aligned}$$

Die erste Zeile ist diagnostisch: Das Shift-Parity-Lemma bleibt unbedingt, während die aktuellen endlichen Zertifikate erst nach einer rigorosen Schließung über eine untere Schranke im ungeraden Sektor Theoremniveau erreichen. Die zweite Zeile führt zwei bedingte Eingaben ein: das Connes-Programm (extern) und die Asymptotische Variationsgap-Vermutung ([Vermutung 7.2](#), intern zu diesem Ansatz; vgl. [Abschnitt 8](#)).

2 Connes' Reduktion (v1.5-Neuformulierung)

Hinweis zur v1.5-Neuformulierung. Frühere Entwürfe dieses Beitrags (bis einschließlich v1.4) stellten die Weilsche quadratische Form auf $L^2([-L, L])$ mit reeller Cosinus/Sinus-Basis dar und identifizierten die geraden bzw. ungeraden Sektoren mit Parität unter $t \mapsto -t$. Eine Überprüfung der Operatordefinition im Mai 2026 gegen Connes–van Suijlekom [2] zeigte, dass die dort bewiesene Form auf $L^2([0, L])$ mit komplexer Exponentialbasis wirkt und die relevanten Paritätssektoren über die Frequenzreflektion $U_n \leftrightarrow U_{-n}$ auf diesem Raum definiert sind. In der vereinfachten symmetrischen-Shift-Formulierung früherer Entwürfe hätten Cos- und Sin-Sektor identische Spektren (modulo Konstantenmode) gehabt, was den zertifizierten Lücken widerspricht; die Connes–van Suijlekom-Form lässt eine echte Asymmetrie zwischen Cos- und Sin-Sektor zu, erfasst durch die unten eingeführte Größe S_n , und in dieser Form ist gerade Dominanz mathematisch sinnvoll. Der vorliegende Abschnitt formuliert den Aufbau so um, dass er zur bewiesenen Form passt; [Abschnitt 8](#) bewahrt einen Bericht der früheren Formulierung und die diagnostische Kette, die zu dieser Revision führte.

Hilbertraum und Basis. Sei $L = \log \lambda$. Folgend [2, Sektion 4], betrachten wir den Hilbertraum

$$\mathcal{H} = L^2([0, L], dx),$$

mit orthonormierter Fourier-Basis

$$U_n(x) := \frac{1}{\sqrt{L}} \exp\left(\frac{2\pi i n x}{L}\right), \quad x \in [0, L], \quad n \in \mathbb{Z},$$

fortgesetzt durch 0 außerhalb $[0, L]$. Involution und Konvolution:

$$f^*(x) := \overline{f(-x)}, \quad (f * g)(y) := \int_{\mathbb{R}} f(x) g(y - x) dx.$$

Weil-Distribution. Sei D die Weil-Distribution auf $[0, L]$,

$$D = (\log 4\pi + \gamma) \delta_0 + \frac{e^{y/2}}{2 \sinh y} \chi_{(0, L]}(y) dy - \sum_{p, m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} \delta_{m \log p}, \quad (1)$$

wobei δ_a die Dirac-Masse bei a und die Primsumme über (p, m) mit $m \log p \in [0, L]$ (d.h. $p^m \leq \lambda$) läuft.

Quadratische Form. Die Weilsche quadratische Form $Q = Q_\lambda$ auf trigonometrischen Polynomen ist

$$\langle f | g \rangle_Q := \int_0^L [(f^* * g)(y) + (f^* * g)(-y)] dD(y). \quad (2)$$

Per Identität $(f^* * g)(\pm y) = \langle f, T_{\mp y} g \rangle$ (mit $T_u f(t) := f(t - u)$) ist dies $\int_0^L \langle f, (T_y + T_{-y})g \rangle dD(y)$, also eine symmetrische-Shift-Form integriert gegen D . Sei A_λ der nach unten beschränkte selbst-adjungierte Operator auf $\mathcal{H}$, der mit Q via Friedrichs-Erweiterung assoziiert ist.

Matrizelemente. Eine direkte Rechnung ([2, Gleichung 7]) ergibt für $y \in [0, L]$,

$$(U_m^* * U_n)(y) + (U_m^* * U_n)(-y) = \begin{cases} 2(1 - y/L) \cos(2\pi n y/L), & m = n, \\ \frac{\sin(2\pi m y/L) - \sin(2\pi n y/L)}{\pi(n - m)}, & m \neq n. \end{cases} \quad (3)$$

Diagonalen und paar-symmetrische Off-Diagonalen. Definiere

$$D_n := \int_0^L 2(1 - y/L) \cos\left(\frac{2\pi n y}{L}\right) dD(y), \quad S_n := \frac{1}{\pi n} \int_0^L \sin\left(\frac{2\pi n y}{L}\right) dD(y), \quad (4)$$

für $n \neq 0$. Dann

$$\langle U_n | U_n \rangle_Q = D_n, \quad \langle U_n | U_{-n} \rangle_Q = -S_n. \quad (5)$$

Cosinus–Sinus-Sektor-Decomposition. Definiere die reelle orthonormierte Basis

$$\cos_n := \frac{1}{\sqrt{2}}(U_n + U_{-n}), \quad \sin_n := \frac{1}{i\sqrt{2}}(U_n - U_{-n}) \quad (n \geq 1),$$

zusammen mit U_0 für $n = 0$. Daraus

$$\langle \cos_n | \cos_n \rangle_Q = D_n - S_n, \quad \langle \sin_n | \sin_n \rangle_Q = D_n + S_n, \quad (6)$$

sodass die zwei Paritätssektoren denselben Diagonalkoeffizienten D_n teilen, aber sich um $\pm S_n$ unterscheiden. Die Asymmetrie $2S_n$ ist das zentrale Objekt dieses Papers.

Definition 2.1 (Gerade Dominanz, Connes–van Suijlekom-Form). Seien $A_\lambda^{\cos}$ und $A_\lambda^{\sin}$ die Q_λ -induzierten Operatoren auf den Cos- und Sin-Sektoren $\overline{\text{span}}\{U_n + U_{-n} : n \geq 0\}$ bzw. $\overline{\text{span}}\{U_n - U_{-n} : n \geq 1\}$. Wir sagen, QW_λ besitzt gerade Dominanz, wenn

$$\lambda_1^{\cos}(\lambda) < \lambda_1^{\sin}(\lambda) \quad \text{mit einfachem, isoliertem Cos-Minimum,}$$

wobei $\lambda_1^\bullet(\lambda) := \min \sigma(A_\lambda^\bullet)$. Wir behalten die frühere Notation $\lambda_1^\pm = \lambda_1^{\cos/\sin}$ für Kompatibilität mit späteren Sektionen bei.

Bemerkung 2.2 (Numerische Asymmetrie von S_n). Eine direkte Berechnung von D_n und S_n aus (4) für die Weil-Distribution (1) bestätigt, dass S_n nicht-vernachlässigbar ist: für $\lambda = 1000$ und $n = 1$ findet man $D_1 \approx 11,89$ und $S_1 \approx 8,63$, sodass die Cos-Sektor-Diagonale $D_1 - S_1 \approx 3,26$ und die Sin-Sektor-Diagonale $D_1 + S_1 \approx 20,52$ ist (Skript `_proof-notes/verify_connes_vs_form.p` y). Die Asymmetrie $2S_1 \approx 17,27$ ist in der gleichen Größenordnung wie die Diagonale selbst; dies ist der Mechanismus, durch den gerade Dominanz im Connes–van Suijlekom-Rahmen entsteht und der von der vorherigen $L^2([-L, L])$ -Formulierung verfehlt wurde, wo der symmetrische Shift identische Diagonalen in den zwei Sektoren erzwingt.

Folge-Sektionen (v1.5). Die obige Neuformulierung ersetzt die symmetrische-Shift $L^2([-L, L])$ -Form von v1.4. Folge-Sektionen ([Abschnitt 3](#) und folgend) wurden im Legacy-Rahmen geschrieben und benötigen parallele Updates: die 3×3 Paritätsmatrix $D_3(r)$ aus [Abschnitt 3](#) entspricht jetzt der Cos/Sin-Asymmetrie an einem einzelnen Shift, mit $D_3(r)$ -Einträgen verknüpft mit S_n -Beiträgen von einer einzelnen Primzahl; die finiten Zertifikate brauchen rekonstruierte CAP-Matrizen in der $\{U_n\}$ -Basis; das direkte Frontier-Argument trägt sich übertragen, sobald C_f als untere Schranke auf S_n an Frontier-Prime-Beiträgen neu hergeleitet ist. Das Shift-Parity-Lemma ([Satz 3.4](#)) und die Obstruktionstheoreme NE-A, NE-B der Landscape-Reihe bleiben unberührt. Diese Migration ist in der vorliegenden Revision teilweise: der neue Abschnitt 2 oben ist die korrigierte Operator-Definition, während die Fortführung in die nachfolgenden Abschnitte als offene Aufgabe in [Abschnitt 8.5](#) registriert ist.

Guardrail zum Legacy-Material. Die folgenden Legacy-Abschnitte bleiben als diagnostische Lemmata und Routen-Dokumentation erhalten. Sie sind in dieser Fassung kein abgeschlossener Beweis im korrigierten U_n -Rahmen.

Satz 2.3 (Connes–van Suijlekom Reell-Nullstellen-Kriterium). *Sei eine reelle gerade Distribution definiert, die einen nach unten beschränkten selbstadjungierten quadratischen Form-Operator beschreibt, dessen niedrigster Spektralwert einfach und isoliert ist und eine gerade Eigenfunktion η besitzt. Dann hat die Fourier-Transformation $\hat{\eta}$ nur reelle Nullstellen.*

Beweis. Dies ist das Reell-Nullstellen-Kriterium für quadratische Formen, das von Connes und van Suijlekom bewiesen wurde [2]; Connes’ Übersichtsarbeit wendet es auf die Weilsche quadratische Form an und identifiziert die gerade Dominanz als die verbleibende spektrale Bedingung [1]. $\square$

Korollar 2.4 (Hinlänglichkeit einer divergenten Folge). *Wenn gerade Dominanz für eine Folge $\lambda_n \rightarrow \infty$ gilt, dann folgt daraus die Riemannsche Vermutung.*

Beweis. Für jedes λ_n liefert [Satz 2.3](#) reelle Nullstellen für die entsprechende trunkierte Fourier-Transformation $\hat{\eta}_{\lambda_n}$. Die Hurwitz-Brücke des Connes-Programms [1, Fact 6.4 und Abschnitte 6.4–6.6] etabliert:

- (a) Die trunkierten Kerne k_{λ_n} konvergieren lokal gleichmäßig gegen die vollständige Riemannsche Ξ -Funktion auf jeder kompakten Teilmenge von $\mathbb{C}$ mit einer Rate von $O(\lambda_n^{-1/2-\alpha})$ für ein $\alpha > 0$.
- (b) Alle k_{λ_n} und Ξ sind ganze Funktionen der Ordnung eins.
- (c) Nach dem Satz von Hurwitz über Nullstellen von lokal gleichmäßigen Grenzwerten holomorpher Funktionen ist jede Nullstelle von Ξ in einer offenen Menge $U \subset \mathbb{C}$ ein Grenzwert von Nullstellen von k_{λ_n} innerhalb U für große n .

Da jedes k_{λ_n} nur reelle Nullstellen hat ([Satz 2.3](#)), sind auch die Nullstellen von Ξ reell. Die nichttrivialen Nullstellen von $\zeta(s)$ korrespondieren bijektiv zu den Nullstellen von Ξ , folglich liegen sie auf der kritischen Geraden $\Re(s) = 1/2$. $\square$

Bemerkung 2.5 (Analytische Struktur der Hurwitz-Brücke). Zur Transparenz legen wir die analytische Kette hinter Schritt (a) des obigen Beweises dar. Der trunkierte Kern ist

$$k_\lambda(z) = \int_{-L}^L K_\lambda(t) e^{izt} dt, \quad L = \log \lambda,$$

wobei K_λ der auf $[-L, L]$ eingeschränkte gerade Weil-Spektralkern ist. Als endliches Fourier-Integral über ein beschränktes Intervall gehört k_λ zur Paley–Wiener-Klasse PW_L : es setzt sich zu einer ganzen Funktion fort, die $|k_\lambda(z)| \leq C_\lambda e^{L|\Im z|}$ erfüllt.

Ein selbsttragender Beweis der lokal gleichmäßigen Konvergenz $k_\lambda \rightarrow \Xi$ würde drei Bestandteile benötigen:

- (i) *L^2 -Ratenkontrolle:* $\|K_\lambda - K\|_{L^2(\mathbb{R})} = O(\lambda^{-1/2-\alpha})$ für ein $\alpha > 0$, wobei K der vollständige (untrunkierte) Weil-Kern ist. Dies erfordert Schwartz-Klassen-Regularität von $K_\lambda - K$ in der genannten Rate — der nicht-triviale analytische Beitrag.
- (ii) *Lokal gleichmäßige Konvergenz aus L^2 und Paley–Wiener:* Auf jeder kompakten Menge $\mathcal{K} \subset \mathbb{C}$ liefert die PW-Mitgliedschaft von k_λ $|k_\lambda(z)| \leq e^{LR}\|K_\lambda\|_{L^2}$ (mit $R = \max_{z \in \mathcal{K}} |\Im z|$), so dass die Familie lokal beschränkt ist; Normalität (Satz von Montel) und L^2 -Konvergenz liefern dann lokal gleichmäßige Konvergenz auf $\mathcal{K}$.
- (iii) *Ordnung eins:* Sowohl k_λ als auch Ξ haben Ordnung eins, wie es der Satz von Hurwitz zum Transfer aller Nullstellen benötigt.

Schritt (i) wird von Connes mittels der Spektraltheorie seines Hilbertraums in [1, Fact 6.4 und Abschnitte 6.4–6.6] bewiesen; die Schritte (ii) und (iii) sind klassisch. Das vorliegende Paper verwendet Connes’ Ergebnis für Schritt (i) direkt und liefert keine eigenständige Herleitung.

Bemerkung 2.6 (Bedingtheit und Hypothesen). Der vorliegende Beweis beruht auf dem Reell-Nullstellen-Kriterium für quadratische Formen von Connes und van Suijlekom [2] sowie auf Connes’ Identifizierung der geraden Dominanz als der verbleibenden spektralen Bedingung [1]. Beide Ergebnisse sind derzeit als arXiv-Preprints verfügbar. Unsere Argumentation ist daher bedingt durch diese Ergebnisse, bis sie unabhängig verifiziert oder in einem Peer-Review-Journal veröffentlicht wurden. Die Hypothesen von Satz 2.3 erfordern: (i) dass A_λ nach unten beschränkt ist, was gilt, weil der archimedische Kern integrierbar ist und die Primsumme absolut konvergiert; (ii) dass der niedrigste Spektralwert einfach und isoliert ist — dies ist der Inhalt der unten bewiesenen Bedingung der geraden Dominanz; und (iii) lokal gleichmäßige Konvergenz der Fourier-Transformationen der trunkierten Eigenfunktionen, etabliert in [1, Abschnitt 4].

3 Die Paritätsmatrix einer einzelnen Verschiebung

Hinweis zur v1.5-Reformulierung. Dieser Abschnitt, ursprünglich im Legacy- $L^2([-L, L])$ -Rahmen geschrieben, wird in seiner Legacy-Form unten beibehalten und durch die Connes–van-Suijlekom-Variante ergänzt. Im Legacy-Rahmen kodiert die Matrix $D_3(r)$ die Cos–Sin-Paritätsdifferenz an einer einzelnen Verschiebung direkt; im Connes–van-Suijlekom-Rahmen ist das Analog der Beitrag einer einzelnen Verschiebung zum Asymmetriekoeffizienten S_n aus (4).

3.1 Connes–van-Suijlekom Single-Shift-Asymmetrie

Im korrigierten Setup von Abschnitt 2 trägt eine einzelne Dirac-Masse bei $y \in (0, L)$ mit Gewicht w in der Weil-Distribution D zu den Diagonalen bei:

$$\Delta D_n = w \cdot 2(1 - y/L) \cos(2\pi ny/L), \quad \Delta S_n = \frac{w}{\pi n} \sin(2\pi ny/L) \quad (n \geq 1).$$

Die Cos- und Sin-Sektor-Diagonalbeiträge sind daher $\Delta D_n \mp \Delta S_n$, und die Paritätsasymmetrie dieser einzelnen Verschiebung am Mode n ist

$$-2\Delta S_n = -\frac{2w}{\pi n} \sin(2\pi ny/L). \tag{7}$$

Lemma 3.1 (Single-Shift-Asymmetrie). *Sei $r := y/L \in (0, 1]$ die normierte Verschiebung. Für eine einzelne Dirac-Masse δ_y mit dem Weil-Prim-Vorzeichengewicht $w = -(\log p)/p^{m/2}$ (d.h. $w < 0$) ist die Cos-minus-Sin-Asymmetrie am Mode $n \geq 1$:*

$$-2\Delta S_n = \frac{2 \log p}{\pi n \cdot p^{m/2}} \sin(2\pi nr).$$

Dies ist strikt negativ (d.h. begünstigt den Cos-Sektor) genau dann, wenn $\sin(2\pi nr) < 0$, was auf $r \in \bigcup_{k=0}^{n-1} (\frac{k}{n} + \frac{1}{2n}, \frac{k+1}{n})$ gilt. Insbesondere ist für $n = 1$ der günstige Bereich $r \in (\frac{1}{2}, 1)$, d.h. $\sqrt{\lambda} < p^m \leq \lambda$ (Half-Frontier).

3.2 Legacy-Paritätsmatrix (beibehalten für Kontinuität)

Hinweis. Der Rest dieses Abschnitts ist die ursprüngliche $L^2([-L, L])$ -Cos/Sin-Basis-Formulierung, die den technischen Inhalt der Folgesektionen lieferte. Siehe [Abschnitt 3.1](#) für das Connes–van-Suijlekom-Analog.

Der Beweis beginnt mit einem endlichen algebraischen Fakt. Seien

$$\varphi_0(t) = \frac{1}{\sqrt{2L}}, \quad \varphi_n(t) = \frac{\cos(n\pi t/L)}{\sqrt{L}} \quad (n \geq 1), \quad \psi_n(t) = \frac{\sin((n+1)\pi t/L)}{\sqrt{L}}$$

die $L^2([-L, L])$ -normierten geraden und ungeraden Basisfunktionen. Für eine normierte Verschiebung $r = s/L$ definieren wir die $N \times N$ Differenzmatrix

$$D_{nm}(r) = \langle \varphi_n, (S_{rL} + S_{-rL})\varphi_m \rangle - \langle \psi_n, (S_{rL} + S_{-rL})\psi_m \rangle.$$

Lemma 3.2 (L -Unabhängigkeit). $D_N(r)$ hängt nur von r ab, nicht separat von L .

Beweis. Substituiere $x = t/L$ in jedem Überlappungsintegral. Die Normierungsfaktoren kürzen den Skalierungsfaktor von $dt = L dx$ heraus, so dass Integrale über feste Intervalle übrig bleiben, deren Argument nur r ist. $\square$

Proposition 3.3 (Geschlossene Form der Diagonaleinträge). Für $L = 1$ erfüllen die Diagonaleinträge für $n \geq 1$:

$$D_{nn}(r) = (2 - r)[\cos(n\pi r) - \cos((n+1)\pi r)] - \frac{\sin(n\pi r)}{n\pi} - \frac{\sin((n+1)\pi r)}{(n+1)\pi}.$$

Für $n = 0$ liefert eine direkte Überlappungslängen-Berechnung

$$D_{00}(r) = (2 - r)(1 - \cos \pi r) - \frac{\sin \pi r}{\pi}.$$

Satz 3.4 (Shift-Parity-Lemma). Für jedes $N \geq 3$ und jedes $r \in (0, 2)$ gilt:

$$\lambda_{\min}(D_N(r)) < 0.$$

Beweis. Nach dem Cauchy-Interlacing-Theorem gilt $\lambda_{\min}(D_{N+1}) \leq \lambda_{\min}(D_N)$, es reicht also aus, den Fall $N = 3$ zu beweisen. Die Spur teleskopiert via [Proposition 3.3](#):

$$\text{Tr}(D_3(r)) = (2 - r)(1 - \cos 3\pi r) - \frac{2 \sin \pi r}{\pi} - \frac{\sin 2\pi r}{\pi} - \frac{\sin 3\pi r}{3\pi}.$$

Die Determinante $\det(D_3(r))$ ist ein expliziter trigonometrischer Ausdruck in r , der aus den geschlossenen Einträgen von [Proposition 3.3](#) berechnet wird. Wir verwenden ein Zwei-Fall-Argument.

Fall 1 ($\det D_3(r) < 0$, ca. 93.3% von $(0, 2)$): die Eigenwerte haben gemischte Vorzeichen, also ist $\lambda_{\min} < 0$.

Fall 2 ($\det D_3(r) \geq 0$, das Intervall $R_2 \approx [0.597, 0.729]$): in diesem Bereich ist $\text{Tr}(D_3(r)) < 0$ ($\max_{R_2} \text{Tr} \approx -0.007$). Da die Spur gleich der Summe der Eigenwerte ist, können nicht alle drei nicht-negativ sein, also ist $\lambda_{\min} < 0$.

Vollständigkeit. Die Determinante hat genau zwei Nullstellen in $(0, 2)$, eingeschlossen durch Intervallarithmetik (`mpmath`, 50 Stellen Genauigkeit) als

$$r_1^{\det} \in [0.59651, 0.59653], \quad r_2^{\det} \in [0.72928, 0.72930].$$

Die Spur-Nullstellen sind ähnlich eingeschlossen:

$$r_2^{\text{Tr}} \in [0.58760, 0.58762], \quad r_3^{\text{Tr}} \in [0.73023, 0.73025].$$

Die Verschachtelung

$$r_2^{\text{Tr}} < r_1^{\text{det}} < r_2^{\text{det}} < r_3^{\text{Tr}}$$

gilt rigoros (Intervalltrennung > 0.008 bei jedem benachbarten Paar), was sicherstellt, dass $R_2 \subset \{\text{Tr} < 0\}$. Fälle 1 und 2 decken $(0, 2)$ lückenlos ab. Siehe [5] für die Verifikationsskripte. $\square$

Bemerkung 3.5. Das Lemma ist unabhängig von der Zeta-Funktion. Zahlentheorie kommt erst ins Spiel, nachdem die Matrizen $D_3(m \log p / \log \lambda)$ mit $(\log p)p^{-m/2}$ gewichtet und über Primzahlen summiert wurden.

4 Endliche Zertifikate

v1.5-Status. Die 33 unten beschriebenen Zertifikate wurden in der Legacy- $L^2([-L, L])$ -Cosinus/Sinus-Galerkin-Basis mit symmetrischen Shift-Operatoren berechnet. Das v1.5-Audit ([Abschnitt 8.5](#); Begleitnotizen `KO_CAP_AUDIT.md` und `KO_CAP_CONNESVS_RESULTS.md`) zeigt zwei strukturelle Probleme: (1) Im Legacy-Operator-Modus erzwingt die Cosinus-Sinus-Äquivalenz $\sigma(A^+) = \sigma(A^-) \cup \{\mu_0^+\}$ exakt, was den literalen Zertifikat-Anspruch invalidiert (in der Connes-vS-Form aufgelöst). (2) Der Sin-Block-„Lower-Bound ist nicht rigoros — er ist eine heuristische geometrische Extrapolation. Die Zertifikate stehen daher als *computergestützte numerische Evidenz*, nicht als rigoroser CAP-Beweis. Eine v1.5-Neuformulierung des CAP in der $\{U_n\}$ -Basis mit rigoroser Lower-Bound-Technik ist als offene Aufgabe vermerkt.

Guardrail. Die folgenden Zertifikatsdaten dokumentieren die Stabilität der Legacy-Galerkin-Rechnung. Sie werden in v1.5 nicht als theoremstarker endlicher Beweis verwendet, solange die CAP-Matrizen nicht im korrigierten U_n -Rahmen neu berechnet und mit einer rigorosen Odd-Sektor-Lower-Bound-Technik geschlossen sind.

Sei

$$\Delta(\lambda) = \lambda_1^+(\lambda) - \lambda_1^-(\lambda).$$

Die Landscape-Berechnung liefert intervallarithmetische Zertifikate für 33 Werte von λ im Intervall

$$100 \leq \lambda \leq 1,300,000.$$

Die Zertifikate werden mit Pythons `mpmath` Bibliothek im Intervallarithmetik-Modus berechnet (`mpmath.iv`, 50 Stellen Genauigkeit). Der gerade Sektor verwendet eine 4×4 Galerkin-Matrix ($N_{\text{cos}} = 4$); der ungerade Sektor verwendet $N_{\text{sin}} = N_0 \in [40, 90]$ (siehe [Bemerkung 4.1](#) unten). Matriceinträge werden als rigorose Intervalle ausgewertet: Primverschiebungsintegrale haben eine Breite $< 10^{-12}$, und das archimedische Kernintegral wird via zusammengesetzter Gauss-Legendre-Quadratur eingeschlossen (Breite $< 10^{-3}$). Wenn die Sin-Block-Lower-Bound-Konstruktion durch eine rigorose Schranke ersetzt wird, würde eine negative berichtete Lücke gerade Dominanz implizieren; derzeit wird sie als diagnostische numerische Evidenz festgehalten.

Bemerkung 4.1 (Rechtfertigung der Galerkin-Asymmetrie). Die asymmetrische Trunkierung $N_{\text{cos}} = 4$ vs. $N_{\text{sin}} \geq 40$ wird gerechtfertigt durch den strukturellen Unterschied zwischen den beiden Sektoren, der in [5, Abschnitt 2.4 und Bemerkung zur Low-Mode Dominanz] beobachtet wurde: Der gerade Block konvergiert schnell, weil die führende gerade Mode $n = 1$ die Galerkin-Diagonale $(W_{\text{prime}})_{11}^+ \sim -\sqrt{\lambda}$ besitzt (getrieben vom Auto-Überlappungswert $h_1(1) = -1/4$ am Laplace-Endpunkt, siehe [Definition 6.2](#)), wobei der $k \times k$ minimale Eigenwert sich bei $k = 4$ für

jedes getestete λ auf bis zu 10^{-2} stabilisiert. Der ungerade Sektor hat keine vergleichbare strukturelle Verstärkung, daher werden $N_0 = 40\text{--}90$ Moden für einen gleichwertigen Einschluss benötigt. Entscheidend ist, dass der Landscape-Zertifizierer berichtet: $\lambda_{\min}(\text{QW}_{\sin}^{(N)}) > \lambda_{\min}(\text{QW}_{\cos}^{(4)})$ für *alle* $N \leq 90$ bei jedem getesteten λ ; das stützt, beweist aber noch nicht, dass die Lücke echt ist und kein Artefakt der Trunkierung darstellt.

Bemerkung 4.2 (Sicherheitsfaktor der Trunkierung). Der berichtete Galerkin-/Tail-Trunkierungsfehler des Landscape-Zertifizierers bei $\lambda = 100$ ist maximal 0.061 (Frobenius-Intervallradius ≤ 0.0025 im geraden Block, gesamter ungerader Tail ≤ 0.059 via Cauchy-Interlacing plus ein float64-Rundungsspielraum), während $|\text{cert_gap}| = 2.25$ ist – ein diagnostischer Sicherheitsfaktor $\geq 34\times$. Für $\lambda \geq 200$ übersteigt der diagnostische Sicherheitsfaktor $65\times$ und wächst monoton mit λ im gesamten beprobten Bereich [5, Abschnitt 2.9 und Zertifikats-Metadaten].

Proposition 4.3 (Diagnostik der endlichen Zertifikate). *Für jeden beprobten Gitterpunkt λ_k in der Landscape-Tabelle gilt:*

$$\text{cert_gap}(\lambda_k) < 0.$$

Darüber hinaus ist die berichtete spektrale Lücke im geraden Sektor an jedem Gitterpunkt positiv. Diese Daten sind numerische Evidenz; sie werden erst dann zu einer rigorosen endlichen Brücke, wenn die Sin-Block-Lower-Bound-Konstruktion im korrigierten Connes–van-Suijlekom-Rahmen validiert oder ersetzt ist.

Beweis. Dies ist eine computergestützte Diagnoseausgabe aus dem Landscape-Projekt [5]. Die relevanten Zertifikatsdateien sind im Landscape-Repository unter `results/certificates/` gespeichert. Repräsentative Werte sind:

λ	$\#\{p \leq \lambda\}$	λ_1^+ obere Schranke	cert_gap
100	25	−11.07	−2.25
500	95	−34.13	−7.72
10,000	1,229	−216.22	−42.37
320,000	27,608	−1220.97	−241.75
1,300,000	100,021	−2503.78	−475.83

Alle berichteten Intervalle haben eine negative Lücke. Dieselbe Zertifikatsreihe liefert eine positive intra-gerade Lücke und stützt damit die Abwesenheit eines Level-Crossings im geraden Sektor an den beprobten Punkten. $\square$

Bemerkung 4.4 (Struktur der Zertifikate). Jedes diagnostische Zertifikat für ein gegebenes λ_k besteht aus: (a) der $N_{\cos} \times N_{\cos}$ Galerkin-Matrix des geraden Sektors mit Intervallarithmetik-Einträgen; (b) der $N_{\sin} \times N_{\sin}$ Galerkin-Matrix des ungeraden Sektors; (c) einem rigorosen Eigenwerteinschluss $[\lambda_1^+, \bar{\lambda}_1^+]$ für den kleinsten geraden Eigenwert; (d) einer Kandidaten-Untergrenze λ_1^- für den kleinsten ungeraden Eigenwert, die derzeit auf der oben beschriebenen heuristischen Tail-Extrapolation beruht; (e) der berichteten Lücke $\bar{\lambda}_1^+ - \lambda_1^- < 0$. Zum Beispiel bei $\lambda = 100$: die 4×4 gerade Matrix hat ihren kleinsten Eigenwert in $[-11.08, -11.06]$, die diagnostische Untergrenzen-Ausgabe für das ungerade Minimum liegt über -8.82 , was eine berichtete Lücke von < -2.24 ergibt. Alle Zertifikate, einschließlich der Intervallarithmetik-Evaluationsskripte, sind archiviert in [5].

5 Frontier-Dominanz

Der asymptotische Beweis nutzt die Tatsache, dass Primzahlen nahe der sich bewegenden Grenze (Frontier) $p \sim \lambda$ die Paritätssumme dominieren.

Definieren wir die Low-Mode kumulative Differenzmatrix: **v1.5-Zusammenfassung.** In

der Connes–van-Suijlekom-Form von Abschnitt 2 ist das Analog der Frontier-Dominanz die asymptotische Positivität des Cos/Sin-Sektor-Asymmetriekoeffizienten S_n für jeden Mode n . Für $n = 1$ liefert eine Abel-Summation und Laplace-Asymptotik

$$S_1(\lambda) \sim \frac{8\sqrt{\lambda}}{\log \lambda} \quad (\lambda \rightarrow \infty), \quad (8)$$

mit der genaueren finite- L -Form $S_1(\lambda) \approx 8\sqrt{\lambda}/[L(1 + 16\pi^2/L^2)]$, wobei $L = \log \lambda$. Numerisch verifiziert auf 5–10% Genauigkeit für $\lambda \in \{100, 300, 1000\}$ (Skript `_proof-notes/verify_connes_vs_form.py`; Detail in `_proof-notes/KO_FRONTIER_SN_ASYMPTOTIC.md`). In dieser v1.5-Form ist die Cos-minus-Sin-Diagonal-Lücke am Mode $n = 1$:

$$\langle \sin_1 | Q | \sin_1 \rangle - \langle \cos_1 | Q | \cos_1 \rangle = 2S_1(\lambda) \sim \frac{16\sqrt{\lambda}}{\log \lambda},$$

d.h. ein logarithmisch schrumpfender Bruchteil der führenden $\sqrt{\lambda}$ -Skala. Dies ist positive asymptotische Evidenz für gerade Dominanz auf der Skala $O(\sqrt{\lambda}/\log \lambda)$; der Eigenwertordnungs-Schluss benötigt aber weiterhin die Asymptotische Variationsgap-Vermutung oder eine äquivalente Lower-Bound-Schließung. Die Legacy-Direct-Frontier-Konstruktion unten wird für Rückwärtskompatibilität mit dem Rest des Manuskripts beibehalten.

$$D_{\text{tot}}(\lambda) = \sum_{\substack{p, m \geq 1 \\ 0 < m \log p / \log \lambda < 2}} \frac{\log p}{p^{m/2}} D_3\left(\frac{m \log p}{\log \lambda}\right).$$

Wir spalten sie auf in

$$D_{\text{tot}}(\lambda) = D_f(\lambda) + D_n(\lambda),$$

wobei D_f die Verschiebungen erster Ordnung mit $p \in [\lambda^{0.7}, \lambda]$ und D_n die verbleibenden Terme enthält.

Lemma 5.1 (Gemeinsamer Frontier-Rayleigh-Vektor). *Sei $e_1 = (0, 1, 0)^T$. Für alle $r \in [0.7, 1]$ gilt:*

$$e_1^T D_3(r) e_1 \leq -C_f, \quad C_f = 0.4685.$$

Beweis. Nach [Proposition 3.3](#) gilt:

$$e_1^T D_3(r) e_1 = (2 - r)(\cos \pi r - \cos 2\pi r) - \frac{\sin \pi r}{\pi} - \frac{\sin 2\pi r}{2\pi}.$$

Eine Intervallauswertung dieser trigonometrischen Funktion einer Variablen auf $[0.7, 1]$ ergibt ein Maximum < -0.4685 , welches am linken Rand angenommen wird. Somit ist derselbe Vektor e_1 ein gültiger negativer Rayleigh-Vektor für das gesamte Frontier-Fenster. $\square$

Lemma 5.2 (Frontier untere Schranke). *Für den Frontier-Block gilt:*

$$\lambda_{\min}(D_f(\lambda)) \leq -C_f W_f(\lambda), \quad W_f(\lambda) = \sum_{\lambda^{0.7} \leq p \leq \lambda} \frac{\log p}{\sqrt{p}}.$$

Darüber hinaus gilt:

$$W_f(\lambda) = 2\sqrt{\lambda}(1 - \lambda^{-0.15}) + O(1).$$

Beweis. Verwende den festen Rayleigh-Vektor e_1 aus [Lemma 5.1](#):

$$\lambda_{\min}(D_f) \leq e_1^T D_f e_1 \leq -C_f \sum_{\lambda^{0.7} \leq p \leq \lambda} \frac{\log p}{\sqrt{p}}.$$

Die asymptotische Abschätzung folgt durch partielle Summation [\[8\]](#) aus dem Primzahlsatz in der Form $\theta(x) \sim x$. $\square$

Lemma 5.3 (Non-Frontier Normschränke). *Es gibt eine absolute Konstante C_n , sodass*

$$\|D_n(\lambda)\|_{\text{op}} \leq C_n(2\lambda^{0.35} + O(\log \lambda)).$$

Man kann $C_n = 2.2847$ aus der intervall-zertifizierten Schranke $\sup_{0 < r < 2} \|D_3(r)\|_{\text{op}} \leq 2.2847$ entnehmen.

Beweis. Der erste Non-Frontier-Teil, $p < \lambda^{0.7}$ mit $m = 1$, hat das Gesamtgewicht

$$\sum_{p \leq \lambda^{0.7}} \frac{\log p}{\sqrt{p}} = 2\lambda^{0.35} + O(1)$$

durch partielle Summation mit der unbedingten Abschätzung $|\theta(x) - x| \leq 0.006788 x / \log x$ für $x \geq 89,967,803$ [3]; für kleinere x ist die Summe durch direkte Berechnung beschränkt. Die Terme höherer Verschiebungen erfüllen

$$\sum_{p \leq \lambda} \sum_{m \geq 2} \frac{\log p}{p^{m/2}} = O(\log \lambda),$$

wobei der Term $m = 2$ das logarithmische Wachstum liefert und $m \geq 3$ durch konvergente Primsummen beschränkt ist. Multiplikation mit der gleichmäßigen Operatornormschränke für $D_3(r)$ ergibt die Behauptung. $\square$

Proposition 5.4 (Asymptotische Frontier-Dominanz). *Es existiert ein explizites Λ_* , sodass für alle $\lambda \geq \Lambda_*$ gilt:*

$$\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}(\lambda)) < 0.$$

Mit den obigen Konstanten liegt Λ_ unterhalb des zertifizierten Endpunkts 1,300,000, nachdem die expliziten Fehlerterme ausgewertet wurden.*

Beweis. Wir argumentieren über den Rayleigh-Quotienten beim festen gemeinsamen Testvektor $e_1 = (0, 1, 0)^T$ in Verbindung mit der Cauchy–Schwarz Operatornorm-Schranke (es wird keine Additivität der Eigenwerte gefordert). Die Variations-Ungleichung ergibt

$$\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}) \leq e_1^T D_{\text{tot}} e_1 = e_1^T D_f e_1 + e_1^T D_n e_1.$$

Für den Frontier-Block ergeben [Lemmata 5.1](#) and [5.2](#) $e_1^T D_f e_1 \leq -C_f W_f(\lambda) = -2C_f \sqrt{\lambda}(1 - \lambda^{-0.15}) + O(1)$. Für den Non-Frontier-Block liefert Cauchy–Schwarz $|e_1^T D_n e_1| \leq \|e_1\|^2 \|D_n\|_{\text{op}} = \|D_n\|_{\text{op}}$, was durch [Lemma 5.3](#) beschränkt ist. Kombinierend erhalten wir

$$\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}) \leq -2C_f \sqrt{\lambda}(1 - \lambda^{-0.15}) + 2C_n \lambda^{0.35} + O(\log \lambda).$$

Der negative Term ist von der Ordnung $\sqrt{\lambda}$, der positive Non-Frontier-Term von der Ordnung $\lambda^{0.35}$, folglich ist die rechte Seite für alle hinreichend großen λ strikt negativ. Das Auswerten der dargestellten Schranke mit den intervall-zertifizierten Konstanten $C_f = 0.4685$, $C_n = 2.2847$ und den expliziten PNT/Mertens-Resten ergibt einen effektiven Schwellenwert $\Lambda_* \leq 1,300,000$; siehe [5, Proposition A6 (Direct Frontier-Dominance), Bemerkung zu direkten Beweiszutaten]. Das asymptotische Regime $\lambda \geq \Lambda_*$ und der endliche Diagnosebereich $100 \leq \lambda \leq 1,300,000$ aus [Proposition 4.3](#) sind numerisch kompatibel, schließen aber ohne Lower-Bound-Reparatur noch keine theoremstarke Brücke. $\square$

Bemerkung 5.5 (Rechnerische Verbesserung von Λ_*). Die Schranke $\Lambda_* \leq 1,300,000$ oben ist konservativ: sie entspricht dem rechten Endpunkt des zertifizierten Intervalls. Die exakte Rayleigh-Lücke

$$g(\lambda) = -C_f W_f(\lambda) + C_n W_n(\lambda)$$

(mit W_f , W_n den präzisen Frontier- und Non-Frontier-Primsummen-Gewichten durch exakte Primenumeration) wurde wie folgt ausgewertet.

(i) *Erschöpfende Schritt-1-Prüfung* [171,329, 182,000]: Jedes ganzzahlige λ in diesem Bereich wurde geprüft; $g(\lambda) < 0$ durchgängig, mit dem ersten negativen Wert $g(171,329) = -0,0052$.

(ii) *Schritt-1000-Grobscan* [182,000, 300,000]: Alle beobachteten Werte liefern $g \leq -3,5$. In einem 500-Schritt-Fenster können höchstens zwei Prime-Exit-Ereignisse auftreten, die g jeweils um höchstens $(C_f + C_n) \log p / \sqrt{p} \leq 0,35$ erhöhen; die gesamte Aufwärtsperturbation $\leq 0,70$ lässt einen Sicherheitsabstand von $\geq 2,8$ unterhalb Null. Kein nicht beprobtes ganzzahliges λ in [182,000, 300,000] kann positiv sein.

(iii) *Asymptotisches Regime* $\lambda \geq 300,000$: $g \leq -43$ durchgängig (grober Scan, Schritt 10,000), konsistent mit der $-\Theta(\sqrt{\lambda})$ -Dominanz der asymptotischen Formel.

Die Kombination von (i)–(iii) mit dem endlichen Diagnosebereich [100, 1,300,000] stützt numerisch die Schwelle $\Lambda_* \leq 175,000$ im Variationsmodell. Das Verifikationsskript `verify_lambda_star.py` ist im Begleit-Repository [research-line/rh-even-dominance](https://github.com/research-line/rh-even-dominance) archiviert.

6 Tail-Kontrolle und das Hochziehen zur Weil-Form

v1.5-Hinweis. Dieser Abschnitt, geschrieben in der Legacy- $L^2([-L, L])$ -Basis, kontrolliert die Tail-Beiträge höherer Moden in diesem Rahmen. In der Connes–van-Suijlekom-Form von Abschnitt 2 ist die analoge Aufgabe die Kontrolle der Off-Diagonalen $\langle U_m | Q | U_n \rangle$ für $|m|, |n| > N$. Die unten gegebenen Abschätzungen markieren nur die analogen Terme: die relevanten Überlapp-Funktionen wären $\sin(2\pi m y/L) - \sin(2\pi n y/L)$ statt $D_3(r)$, und die Schur-Komplement-Schranke müsste über die Off-Block-Norm der Connes–van-Suijlekom-Matrix laufen. Insbesondere ersetzt die subleading-Asymptotik $S_n \sim 8\sqrt{\lambda}/[L(1 + 16n^2\pi^2/L^2)]$ den führenden $\Theta(\sqrt{\lambda})$ -Beitrag des Legacy-Direct-Frontier-Bound, was eine $O(\sqrt{\lambda}/\log \lambda)$ -Skala für die Cos-Sin-Diagonal-Lücke gibt.

Guardrail. Die untenstehenden Abschätzungen dokumentieren die Stabilität der Legacy-Low-Mode-Rechnung. Sie werden in v1.5 nicht als bereits migrierter U_n -Beweis verwendet; die präzise Schur-Komplement- und Off-Block-Norm-Kontrolle im Connes–van-Suijlekom-Rahmen bleibt offen.

Proposition 5.4 etabliert die Legacy-Variationsaussage $\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}(\lambda)) < 0$ im Drei-Moden-Differenzblock. Der vollständige Weil-Operator A_λ operiert auf unendlich vielen Moden und schließt das archimedische Integral mit ein. Die folgenden Abschätzungen dokumentieren, warum die Legacy-Low-Mode-Rechnung numerisch stabil war; sie beweisen in v1.5 noch nicht, dass der korrigierte Connes–van-Suijlekom- U_n -Operator eine gerade-ungerade Eigenwertlücke bewahrt.

Bemerkung 6.1 (Archimedischer Beitrag). Der archimedische Kern $e^{u/2}/(2 \sinh u)$ in (2) ist auf $(0, \infty)$ integrierbar, und der sektorunabhängige Term $-2e^{-u/2} \|f\|^2$ kürzt sich in der Gerade-ungerade-Differenz heraus. Der verbleibende archimedische Beitrag betrifft Verschiebung-Überlappungsdifferenzen $D_N(u/L)$, die gegen den festen Kern gewichtet werden. Da gleichmäßig $\|D_3(r)\|_{\text{op}} \leq 2.2847$ gilt und das Kernintegral eine von λ unabhängige Konstante ist, erfüllt der archimedische gerade-ungerade Beitrag $|\Delta_{\text{arch}}| \leq C_{\text{arch}}$ für eine absolute Konstante. Da der Primbeitrag nach **Lemma 5.2** $\Theta(\sqrt{\lambda})$ ist, ist der archimedische Teil für große λ vernachlässigbar.

Definition 6.2 (Auto-Überlappungs-Profil). Für die gerade Basisfunktion φ_n und die normierte Verschiebung $u = \delta/L \in [0, 2]$ definieren wir $h_n(u) := \frac{1}{4} \langle \varphi_n, (S_{uL} + S_{-uL}) \varphi_n \rangle$. Das Überlappungsintegral berechnet sich durch die Substitution $x = t/L$ und die Produkt-zu-Summe-

Identität $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$:

$$\begin{aligned}\langle \varphi_n, (S_{uL} + S_{-uL})\varphi_n \rangle &= 2 \int_{u-1}^1 \cos(n\pi x) \cos(n\pi(x-u)) dx \\ &= \cos(n\pi u)(2-u) + \frac{\sin(n\pi(2-u)) - \sin(n\pi(u-2))}{2n\pi} \\ &= (2-u) \cos(n\pi u) - \frac{\sin(n\pi u)}{n\pi},\end{aligned}$$

wobei im letzten Schritt $\sin(n\pi(2-u)) = -\sin(n\pi u)$ für ganze Zahlen n verwendet wurde. Durch Teilen durch 4:

$$h_n(u) = \frac{1}{2}(1 - \frac{u}{2}) \cos(n\pi u) - \frac{\sin(n\pi u)}{4n\pi}, \quad n \geq 1,$$

mit $h_0(u) = (1 - u/2)/2$ (aus $\langle \varphi_0, (S_{uL} + S_{-uL})\varphi_0 \rangle = 2 - u$ durch direkte Überlappungslängen-Berechnung). Am Laplace-Endpunkt $u = 1$: $h_n(1) = (-1)^n/4$ für alle $n \geq 0$. Der Normierungsfaktor $\frac{1}{4}$ ist so gewählt, dass die primgewichtete Diagonale $(W_{\text{prime}})_{nn} = \sum_p (\log p) p^{-1/2} \cdot 4h_n(\log p/L)$ erfüllt, in Einklang mit der Weilschen Form (2).

Lemma 6.3 (Aufhebung der führenden Mode). Definieren wir die symmetrisierten Nichtdiagonalelement-Überlappungsprofile $F_j(u) := S_{\text{sym}}^-(0, j; u)$ (ungerader Sektor) und $G_j(u) := S_{\text{sym}}^+(1, j'; u)$ (gerader Sektor) für die führenden Moden. Deren geschlossene Formen lauten:

$$S_{\text{sym}}^+(1, 0; u) = \frac{\sqrt{2} \sin(\pi u)}{\pi}, \quad (9)$$

$$S_{\text{sym}}^+(1, 2; u) = \frac{2(4 \cos \pi u - 1) \sin \pi u}{3\pi}, \quad (10)$$

$$S_{\text{sym}}^-(0, 1; u) = \frac{2(-2 \sin \pi u + \sin 2\pi u)}{3\pi}, \quad (11)$$

$$S_{\text{sym}}^-(0, 2; u) = \frac{3 \sin \pi u - \sin 3\pi u}{4\pi}. \quad (12)$$

Die Überlappungsdifferenzen $\Delta_j(u) := F_j(u) - G_j(u)$ erfüllen:

- (a) Für die ersten zwei Energie-Slots sind die einzelnen Differenzen $O(1)$, aber ihre Summe erfüllt $\Delta_{\text{slot } 1}(u) + \Delta_{\text{slot } 2}(u) = -(2 + \sqrt{2})u + O(u^2)$.
- (b) Für $j \geq 2$: $\Delta_j(u) = O(u)$ einzeln betrachtet.

Beweis. Die Profile sind bestimmte Integrale glatter Funktionen über $[u-1, 1]$, also glatt in u . Zum Beispiel evaluiert $S_{\text{sym}}^+(1, 0; u) = \langle \varphi_1, \varphi_0(\cdot - uL) + \varphi_0(\cdot + uL) \rangle$ zu $\frac{1}{L\sqrt{2}} \int_{(u-1)L}^L \cos(\pi t/L) dt +$ (symmetrisch) $= \frac{\sqrt{2} \sin \pi u}{\pi}$ durch direkte Integration; die Formeln (10)–(12) erhält man analog. Bei $u = 0$ liefert die Fourier-Orthogonalität $F_j(0) = G_j(0) = 0$. Differenziert man (11)–(12) bei $u = 0$: Beide Sinus-Überlappungen haben die Ableitung null (Taylor-Entwicklungen beginnen bei u^2). Für (11): umschreiben als $-2 \sin \pi u + \sin 2\pi u = 2 \sin \pi u (\cos \pi u - 1)$, was in zweiter Ordnung verschwindet. Für (12): umschreiben als $3 \sin \pi u - \sin 3\pi u = 4 \sin^3 \pi u$, was in dritter Ordnung verschwindet. Die Cosinus-Ableitungen sind $G'_0(0) = \sqrt{2}$ aus (9) und $G'_2(0) = 2$ aus (10). Daher ist $\sum_{\text{slots}} \Delta'_j(0) = (0 - \sqrt{2}) + (0 - 2) = -(2 + \sqrt{2})$. Teil (b) folgt aus dem Mittelwertsatz, angewendet auf $\Delta_j(u) = \Delta_j(u) - \Delta_j(0)$. $\square$

Lemma 6.4 (Abfall höherer Moden). Sei $B_{1j}^\pm$ die Kopplung zwischen der führenden geraden/ungeraden Mode und der Mode $j \geq 2$, die durch die Primverschiebungen induziert wird, und sei g_j die spektrale Lücke zwischen der Mode j und der führenden Mode in der Galerkin-Diagonalen. Dann gilt:

- (i) Kopplungsschranke: $|B_{1j}^\pm| \leq 4\pi\sqrt{\lambda}/L \cdot (1 + O(1/L))$.
- (ii) Lückenschranke: $g_j \geq 4\pi^2(j^2 - 1)\sqrt{\lambda}/L^2$ für alle $j \geq 2$ und $L \geq 5$.
- (iii) Sektor-Differenz: $|\Delta_{\text{high}}|/D(\lambda) = O(1/L) \rightarrow 0$, wobei $D(\lambda) = \Theta(\sqrt{\lambda})$ der Drei-Moden-Frontiervorteil ist.

Beweis. (i) *Kopplungsschranke.* Für $j \neq 1$ liefert die Orthogonalität der Cosinus-Basis auf $[-L, L]$ direkt $\langle \varphi_1, (S_0 + S_0)\varphi_j \rangle = 0$. Der Mittelwertsatz liefert $|\langle \varphi_1, (S_\delta + S_{-\delta})\varphi_j \rangle| \leq \pi\delta/L$. Durch Summation über Primzahlen mit der Abelschen Summation [8] und $\theta(x) = x + O(xe^{-c\sqrt{\log x}})$:

$$|B_{1j}^+| \leq \frac{\pi}{L} \sum_{p \leq \lambda} \frac{(\log p)^2}{\sqrt{p}} = \frac{4\pi\sqrt{\lambda}}{L} (1 + O(1/L)).$$

Die gleiche Schranke gilt für $|B_{0j}^-|$ im ungeraden Sektor.

(ii) *Lückenschranke.* Nach Definition 6.2 gilt $h_n(1) = (-1)^n/4$. Die Primsumme konzentriert sich bei $p \sim \lambda$ (d.h. $u = \log p / \log \lambda \rightarrow 1$); durch Abelsche Summation mit dem Primzahlsatz [8] erfüllt die Diagonale $(W_{\text{prime}})_{nn} \sim 4h_n(1)\sqrt{\lambda} = (-1)^n\sqrt{\lambda}$. Für gerade j : $h_j(1) - h_1(1) = \frac{1}{2}$, was $g_j \geq \sqrt{\lambda}$ ergibt. Für ungerade $j \geq 3$: $h_j(1) - h_1(1) = -\frac{1}{4}$ (führende Terme heben sich auf). Die Entwicklung von $h_j(u) - h_1(u)$ um $u = 1$ zur zweiten Ordnung liefert $h_j''(1) - h_1''(1) = \pi^2(j^2 - 1)/4$, woraus $g_j = 4\pi^2(j^2 - 1)\sqrt{\lambda}/L^2 + O(\sqrt{\lambda}/L^3)$ folgt. Insbesondere gilt $c_{\text{gap}} := 4\pi^2/L \geq 2.8$ für $L \leq 14$ ($\lambda \leq 1,200,000$).

(iii) *Sektor-Differenz.* Seien $E_{\text{cos}} := \sum_{j \geq 2} |B_{1j}^+|^2/g_j^+$ und $E_{\text{sin}} := \sum_{j \geq 2} |B_{0j}^-|^2/g_j^-$ die resolventen-gedämpften Kopplungsenergien im geraden und ungeraden Sektor. Beide sind nach (i)–(ii) jeweils für sich genommen $O(\sqrt{\lambda})$. Die Sektor-Differenz $|E_{\text{sin}} - E_{\text{cos}}|$ wird weiter durch die Aufhebung der führenden Mode (Lemma 6.3) gedämpft: die Taylor-Koeffizienten erster Ordnung der geraden und ungeraden Überlappungsdifferenzen bei $u = 0$ summieren sich zu $-(2 + \sqrt{2})$, sodass sich die führenden Beiträge paarweise aufheben. Die Koeffizienten erfüllen $c_{\text{sin}}(L) - c_{\text{cos}}(L) = O(1/L^2)$, und daher ist $|\Delta_{\text{high}}|/D(\lambda) = O(1/L) \rightarrow 0$. $\square$

Bemerkung 6.5 (Cancellation-Region für die Sektor-Differenz). Die in Teil (iii) von Lemma 6.4 verwendete Cancellation über Lemma 6.3 ist eine Taylor-Identität bei $u = 0$, während die Prime-Summe, die $D(\lambda)$ treibt, von Frontier-Verschiebungen mit $u = \log p / \log \lambda \in [0.7, 1]$ dominiert wird. Am Laplace-Endpunkt $u = 1$ sind die relevanten Auto-Overlap-Werte $h_n(1) = (-1)^n/4$ (vgl. Definition 6.2), also sind gerader und ungerader Sektor *anti-korreliert* statt sich aufzuheben. Die in Teil (iii) behauptete $O(1/L)$ -Unterdrückung beruht daher auf der Mittelung des Taylor-Koeffizienten $c_{\text{cos}}(L) - c_{\text{sin}}(L)$ über die Slot-Struktur aus Lemma 6.3(a), nicht auf einer punktwweisen Cancellation bei Frontier-Verschiebungen. Eine direkte Frontier-Endpunkt-Cancellation-Identität im Stil von Lemma 6.3, aber bei $u = 1$ verankert, würde diese Schätzung stärken; in deren Abwesenheit sollte die Schranke als auf der gemittelten Taylor-Struktur der Slot-Zerlegung beruhend angesehen werden und ist quantitativ konservativ.

Lemma 6.6 (Galerkin-Trunkierungsfehler). *Der gerade Sektor wird von der Frontier-Mode ($n = 1$, Diagonale $\sim -\sqrt{\lambda}$) dominiert; die Moden $n = 0, 2, 3$ tragen zu niedrigerer Ordnung bei, weshalb $N_{\text{cos}} = 4$ ausreicht (Bemerkung 4.1). Dem ungeraden Sektor fehlt diese strukturelle Verstärkung und er wird mit $N_0 = N_{\text{sin}} \in [40, 90]$ eingeschlossen. Nach der Schur-Komplement-Formel [9] ist die Eigenwert-Perturbation der Moden $j > N_0$ beschränkt durch*

$$|\lambda_1^\pm(\text{full}) - \lambda_1^\pm(N_0)| \leq \frac{\|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}}^2}{g_{N_0+1} - \|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}}}.$$

Einsetzen von Lemma 6.4(i)–(ii) liefert $\|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}} \leq 8\pi\sqrt{\lambda}/L$ und $g_{N_0+1} \geq 4\pi^2 N_0^2 \sqrt{\lambda}/L^2$, daher

$$|\lambda_1^\pm(\text{full}) - \lambda_1^\pm(N_0)| \leq \frac{16\sqrt{\lambda}}{N_0^2} (1 + o(1)) \quad \text{als } \lambda \rightarrow \infty.$$

An jedem beprobten Gitterpunkt wird diese analytische Schranke durch den berichteten Landscape-Sicherheitsfaktor aus [Bemerkung 4.2](#) dominiert ($\geq 34\times$ bei $\lambda = 100$, $\geq 65\times$ für $\lambda \geq 200$); das ist ein Konsistenzcheck für die berichtete Lücke, aber kein Lower-Bound-Beweis.

Beweis. Die Schur-Komplement-Schranke ist Standard [9]. [Lemma 6.4\(i\)](#) liefert $\|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}} \leq 8\pi\sqrt{\lambda}/L$. [Lemma 6.4\(ii\)](#) liefert $g_{N_0+1} \geq 4\pi^2 N_0^2 \sqrt{\lambda}/L^2 \gg \|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}}$ für $N_0 \geq 40$, weshalb der Nenner von g_{N_0+1} dominiert wird. Die gezeigte Schranke $16\sqrt{\lambda}/N_0^2$ folgt daraus. Die berichtete Lücke nutzt den schärferen intervallarithmetischen Einschluss aus [5, Abschnitt 2.9] mit der diagnostischen Cauchy-Tail-Schranke, die in [Bemerkung 4.2](#) beschrieben ist. $\square$

7 Haupttheorem und offene Vermutung

v1.5-Status des Haupttheorems. In der Connes-vS-Form von Abschnitt 2 ist das Haupttheorem (RH bedingt auf das Connes-Programm und die Asymptotische Variationsgap-Vermutung) unverändert. Was sich ändert, ist die präzise Formulierung der Conditioning:

- *Externe Preprint-Eingabe aus Connes 2026 §6.5 (Fact 6.4):* Die Fourier-Transformierte der Educated-Guess-Eigenfunktion k_Λ konvergiert gegen Ξ gleichmäßig auf Substreifen $|\Im z| < \delta < 1/2$ mit Rate $O(\Lambda^{-1/2-\delta})$. Dies wird in [1] als Folge der klassischen Slepian–Pollak-Theorie prolater sphäroidaler Wellenfunktionen ([Theorem 1 of reference 47]Connes2026) formuliert, nicht als Conjecture.
- *Externe Preprint-Eingabe aus Connes–van Suijlekom 2025 [2]:* Das fixed- Λ -Quadratform-Reell-Nullstellen-Kriterium, bewiesen innerhalb dieses Preprints.
- *Interne offene Frage:* Einfachheit und Parität des minimalen Eigenwerts von QW_Λ (Connes 2026 §6.6 “remaining steps” item (i)) — das ist Even Dominance wie in Definition 2.1 definiert, adressiert im vorliegenden Paper.
- *Interne offene Frage:* Approximationsqualität $k_\Lambda \approx \xi_\Lambda$ (Connes 2026 §6.6 “remaining steps” item (ii)) — das ist die Massen-Konzentrations-Frage MS2, adressiert im Begleit-Paper Zookeeper [7].

7.1 Zertifizierter Bereich: Endliche gerade Dominanz

Satz 7.1 (Endliche gerade Dominanz unter Lower-Bound-Validierung). *Angenommen, die endlichen Zertifikatsmatrizen werden im korrigierten Connes–van-Suijlekom- U_n -Rahmen neu berechnet und die in [Proposition 4.3](#) als $\lambda_1^-(\lambda)$ berichteten Größen werden an jedem Gitterpunkt als rigorose Lower-Bounds für den ungeraden Sektor validiert. Dann hat QW_λ für jedes λ in diesem Gitter (33 Werte über $100 \leq \lambda \leq 1,300,000$) einen einfachen geraden Grundzustand, d. h. $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ und das gerade Minimum ist isoliert.*

Beweis. Unter der zusätzlichen Lower-Bound-Validierungsannahme liefern die intervallarithmetischen Galerkin-Diagnosen aus [Proposition 4.3](#) an jedem λ des Gitters eine rigorose obere Schranke $\overline{\lambda}_1^+(\lambda)$ und eine rigorose untere Schranke $\underline{\lambda}_1^-(\lambda)$ aus dem geraden bzw. ungeraden Galerkin-Block, zusammen mit validierten Tail-Schranken. Die daraus folgende Lücke $\overline{\lambda}_1^+(\lambda) - \underline{\lambda}_1^-(\lambda) < 0$ an jedem Gitterpunkt liefert direkt $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ auf dem Gitter. Die Einfachheit folgt aus der validierten Intra-Even-Lücke $\lambda_2^+ - \lambda_1^+ > 0$ an jedem Gitterpunkt. $\square$

7.2 Asymptotisches Regime: Variations-Aussage und offene Vermutung

Das asymptotische Argument aus [Proposition 5.4](#) liefert die *Variations-Aussage*

$$\lambda_{\min}(W_{\text{prime}}^+(\lambda) - W_{\text{prime}}^-(\lambda)) = -\Theta(\sqrt{\lambda}) \quad (13)$$

auf dem Drei-Modus-Galerkin-Block, mit expliziter Schwelle $\Lambda_* \leq 175,000$ ([Bemerkung 5.5](#)). Das ist die Aussage, dass die Differenz $W^+ - W^-$ einen negativen minimalen Eigenwert mit quantitativer Wachstumsrate hat.

Die Lücke in der Variationsrichtung. Aussage (13) ist *nicht* dasselbe wie $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$. Die Rayleigh-Ungleichung $\lambda_{\min}(W^+ - W^-) \leq v^T(W^+ - W^-)v$ liefert eine *obere* Schranke für das Minimum der Differenz, äquivalent dazu zeigt sie die Existenz eines Vektors v mit $v^T W^+ v < v^T W^- v$. Für gerade Dominanz benötigt man zusätzlich eine quantitative *untere* Schranke für $\lambda_1^-(\lambda)$, die das ungerade Minimum oberhalb der zertifizierten oberen Schranke für λ_1^+ platziert. Das einfache 2×2 -Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$$

zeigt, dass $\lambda_{\min}(A - B) = -5 < 0$ nicht $\lambda_{\min}(A) < \lambda_{\min}(B)$ impliziert; tatsächlich ist $\lambda_{\min}(A) = 0 > -5 = \lambda_{\min}(B)$. Die endlichen Daten stützen dieses Bild, schließen die Lücke aber erst dann auf Theoremniveau, wenn die Lower-Bound-Konstruktion im ungeraden Sektor validiert ist; asymptotisch ist ein separates Argument erforderlich.

Vermutung 7.2 (Asymptotische Variationsgap-Vermutung). *Es existieren Konstanten $\Lambda^\dagger > 0$, $c_+ > c_- > 0$ und ein Exponent $\beta \in (0, 1)$, sodass für alle $\lambda \geq \Lambda^\dagger$ gilt:*

$$\lambda_1^+(\lambda) \leq -c_+ \sqrt{\lambda}, \quad \lambda_1^-(\lambda) \geq -c_+ \sqrt{\lambda} + c_- \sqrt{\lambda} L^{-\beta},$$

wobei $L = \log \lambda$. Insbesondere gilt $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ für alle $\lambda \geq \Lambda^\dagger$.

[Abschnitt 8](#) diskutiert, was zur Etablierung von [Vermutung 7.2](#) erforderlich wäre, skizziert eine vorgeschlagene Route über entartete Störungstheorie auf der asymmetrischen Drei-Modus-Diagonalstruktur und erklärt, warum das naive Variations-Argument nicht direkt liftbar ist.

7.3 Riemannsche Vermutung: Bedingte Aussage

Satz 7.3 (Die Riemannsche Vermutung, bedingt). *Angenommen, [Vermutung 7.2](#) (Asymptotische Variationsgap) und das Connes-Programm, namentlich das Reell-Nullstellen-Kriterium für quadratische Formen aus [\[2\]](#) zusammen mit der Hurwitz-Brücke aus [\[1, Fact 6.4\]](#) und [Abschnitt 6.4–6.6](#), gelten. Dann liegen alle nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion [\[10\]](#) auf der kritischen Geraden $\Re(s) = 1/2$.*

Beweis. Nach [Vermutung 7.2](#) gilt gerade Dominanz für jedes $\lambda \geq \Lambda^\dagger$, also entlang einer divergenten Folge $\lambda_n \rightarrow \infty$. Wenn die endlichen Zertifikat-Lower-Bounds später validiert werden, ergänzt [Satz 7.1](#) eine endliche Brücke; sie wird für diese divergente Folge aber nicht benötigt. Wendet man [Korollar 2.4](#) auf diese Folge an: Die Fourier-Transformationen der gerade-dominanten Weil-Formen haben nach [Satz 2.3](#) ausschließlich reelle Nullstellen, und die Hurwitz-Brücke überträgt die Reell-Nullstellen-Eigenschaft auf die begrenzende Ξ -Funktion. Daher liegen die nichttrivialen Nullstellen von $\zeta(s)$ auf $\Re(s) = 1/2$. $\square$

Bemerkung zur Konditionierung. [Satz 7.3](#) trägt zwei verschiedene bedingte Eingaben. Das Connes–van-Suijlekom-Kriterium und die Hurwitz-Brücke sind externe Resultate des Connes-Programms [\[1, 2\]](#), derzeit arXiv-Preprints; ihre analytische Struktur wird in [Bemerkung 2.5](#) diskutiert. Die Asymptotische Variationsgap-Vermutung [7.2](#) ist intern zum vorliegenden Ansatz und ist das zentrale offene mathematische Problem zum Schluss der asymptotischen Hälfte der geraden Dominanz unbedingt in diesem Rahmen.

8 Status der asymptotischen unteren Schranke für λ_1^-

Dieser Abschnitt ist nicht Teil des Beweises von [Satz 7.3](#): er erklärt, warum das Common-Rayleigh-Vector-Argument aus [Proposition 5.4](#) nicht direkt zur geraden Dominanz im asymptotischen Regime gehoben werden kann, und skizziert eine vorgeschlagene Route – über entartete Störungstheorie auf der asymmetrischen Drei-Modus-Diagonalstruktur – zur Etablierung von [Vermutung 7.2](#).

8.1 Warum die Variationsschranke nicht gerade Dominanz ist

[Proposition 5.4](#) etabliert $\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}(\lambda)) < 0$ auf dem Drei-Modus-Block, wobei $D_{\text{tot}} = W_{\text{prime}}^+ - W_{\text{prime}}^-$ (eingeschränkt auf den 3×3 -Block). Aus der Rayleigh-Variations-Ungleichung folgt: es existiert ein Vektor v (nämlich $v = e_1$) mit $v^T W^+ v < v^T W^- v$. Es folgt *nicht*, dass der kleinste Eigenwert von W^+ unter dem kleinsten Eigenwert von W^- liegt. Tatsächlich gilt $\lambda_{\min}(W^\pm) \leq v^T W^\pm v$ für jeden Einheitsvektor v , so dass beide Schranken in dieselbe Richtung laufen: $\lambda_{\min}(W^+) \leq e_1^T W^+ e_1$ und $\lambda_{\min}(W^-) \leq e_1^T W^- e_1$. Eine quantitative *untere* Schranke für $\lambda_{\min}(W^-)$ ist erforderlich.

8.2 Asymmetrische Drei-Modus-Diagonalstruktur

Am Laplace-Endpunkt $u = 1$ (das Frontier-Regime $r = \log p / \log \lambda \approx 1$, das die Prime-Summe dominiert) sind die asymptotischen führenden Diagonaleinträge von $W_{\text{prime}}^\pm$ auf dem Drei-Modus-Block:

$$\text{diag}(W_{\text{prime}}^+) \sim \sqrt{\lambda} \cdot (+1, -1, +1), \quad \text{diag}(W_{\text{prime}}^-) \sim \sqrt{\lambda} \cdot (-1, +1, -1).$$

Diese Vorzeichen folgen aus dem Auto-Overlap-Profil bei $u = 1$: $h_n(1) = (-1)^n/4$ für gerade Basisfunktionen und $h_n^{\text{sin}}(1) = (-1)^{n+1}/4$ für ungerade, gewichtet mit der Frontier-Prime-Summe $\sum_{p \in \text{frontier}} \log p / \sqrt{p} \sim 2\sqrt{\lambda}$.

Die strukturelle Asymmetrie ist dann sichtbar:

- In W^+ ist die minimale Diagonale $(-\sqrt{\lambda})$ bei Index 1 und ist *isoliert*: die anderen beiden Diagonalen sind $(+\sqrt{\lambda})$, einen Abstand $O(\sqrt{\lambda})$ entfernt. Off-Diagonal-Kopplungen verschieben λ_1^+ nur um *zweite-Ordnung*-Beträge.
- In W^- sind die minimalen Diagonalen $(-\sqrt{\lambda})$ bei Indizes 0 und 2 und sind *nahezu entartet*, mit der zentralen Diagonale $(+\sqrt{\lambda})$ getrennt um $O(\sqrt{\lambda})$. Off-Diagonal-Kopplungen zwischen dem entarteten Paar spalten dieses in *erster* Ordnung, was λ_1^- potenziell weiter nach unten treibt.

Eine naive Analyse stoppt hier und liefert *anti*-gerade-Dominanz: $\lambda_1^- < \lambda_1^+$, im Widerspruch zu den 33 Zertifikaten des endlichen Bereichs. Die Auflösung muss aus einer subleading Ordnung der relevanten Off-Diagonal-Kopplung $b_{02} := (W_{\text{prime}}^-)_{02}$ am Laplace-Endpunkt kommen.

8.3 Elementare Cancellation in der entarteten ungeraden Kopplung

Die Off-Diagonal-Kopplung b_{02} im ungeraden Sektor bei Verschiebung r enthält das Überlapintegral

$$I_-(r) = \int_0^1 \sin(\pi x) \sin(3\pi(x-r)) dx.$$

Bei $r = 1$ verschwindet dies durch elementare Sinus-Orthogonalität auf $[0, 1]$: $\sin(\theta - 3\pi) = \sin(\theta - \pi) = -\sin(\theta)$, also

$$I_-(1) = - \int_0^1 \sin(\pi x) \sin(3\pi x) dx = 0.$$

Differenzierbarkeit von I_- bei $r = 1$ liefert $I_-(r) = O(1 - r)$ in der Nähe des Endpunkts. Im Frontier-Fenster $r \in [0.7, 1]$ sollte die gewichtete Prime-Summe $\sum_p (\log p / \sqrt{p}) \cdot I_-(r_p)$ mit Mittelwert $\langle 1 - r_p \rangle \sim 1/L$ daher erfüllen

$$|b_{02}(\lambda)| = O(\sqrt{\lambda}/L).$$

Wenn diese Schätzung mit expliziten Konstanten rigoros gemacht werden kann, ist die entartete Aufspaltung in λ_1^- höchstens $O(\sqrt{\lambda}/L)$, was *subleading* ist im Vergleich zu einer möglichen $-c_+ \sqrt{\lambda}$ -Verschiebung von λ_1^+ aus demselben Frontier-Mechanismus.

8.4 Vorgeschlagenes Drei-Schritte-Programm

[Vermutung 7.2](#) würde aus folgendem Programm folgen:

Schritt 1. Diagonal-Buchhaltung. Berechne die expliziten Diagonaleinträge von $W_{\text{prime}}^\pm$ auf dem Drei-Modus-Block, mit Trennung führender Frontier-Beiträge von subleading Tail- und archimedischen Termen. Buchhaltung ohne neue Mathematik, sollte explizite Konstanten $c_{nn}^\pm$ liefern mit $(W_{\text{prime}}^\pm)_{nn} = c_{nn}^\pm \sqrt{\lambda} + o(\sqrt{\lambda})$.

Schritt 2 (Off-Diagonal-Kontrolle). Berechne die trigonometrischen Überlappintegrale $I_{nm}^\pm(r) = \int_0^1 \varphi_n^\pm(x) \varphi_m^\pm(x - r) dx$ für $n, m \in \{0, 1, 2\}$ und $r \in [0.7, 1]$, und aggregiere gegen die Frontier-Prime-Summe. Etabliere die quantitative Schranke $|b_{02}(\lambda)| \leq C\sqrt{\lambda}/L$ mit explizitem C .

Schritt 3 (Entartete Störungstheorie). Wende Bauer–Fike oder ein verfeinertes Störungstheorem für nahezu entartete Eigenwerte mit kontrollierter Kopplung an. Erhalte

$$\lambda_1^-(\lambda) \geq -\sqrt{\lambda}(1 + O(1/L)),$$

kombiniere mit der oberen Schranke $\lambda_1^+(\lambda) \leq -\sqrt{\lambda}(1 + c_+/\text{langsam variierend})$ aus dem Common-Rayleigh-Argument (nach Neuableitung in absoluten Termen, nicht über die Differenz) und folgere $\lambda_1^+ < \lambda_1^-$ asymptotisch.

Schritt 4 (Galerkin-Transfer). Verwende die existierende Schur-Komplement-Maschinerie ([Lemma 6.4](#) und [Lemma 6.6](#)), um die Drei-Modus-Aussage auf den vollen Weil-Operator $A_\lambda^\pm$ zu übertragen. Bereits vorhanden modulo der in [Bemerkung 6.5](#) bemerkten Frage.

Ehrliche Einschätzung. Schritte 1 und 2 sind Routine, aber arbeitsintensiv (mehrere Wochen). Schritt 3 ist genuin schwer: entartete Störungstheorie mit vorzeichenkontrollierten Kopplungen ist eine etablierte Disziplin, aber jede explizite Konstante kann ein Teilproblem werden. Die Beziehung $|\lambda_1^+ - \lambda_1^-| = O(\sqrt{\lambda}/L)$, die dieses Programm nahelegt, ist konsistent mit der numerischen Beobachtung, dass die berichtete Lücke etwa 20% von $|\lambda_1^+|$ beträgt – kein konstanter Bruchteil von $\sqrt{\lambda}$, sondern ein logarithmisch schrumpfender Bruchteil.

8.5 Update (14. Mai 2026): Verschärfte strukturelle Bedenken nach Schritt-1-Buchhaltung

Eine sorgfältige Ausführung von Schritt 1 oben (Trennung der führenden Frontier-Diagonalen via Laplace-Asymptotik mit numerischer Validierung) hat ein stärkeres strukturelles Bedenken erzeugt, das die Original-Reviewer-Skizze nicht vorausgesehen hat. Wir dokumentieren es ehrlich:

Symmetrische-Shift Diagonal-Äquivalenz. In der Basis aus [Abschnitt 3](#) ergeben symmetrische Shifts $S_u + S_{-u}$ angewandt auf die Cosinus-Basis $\varphi_n(t) = \cos(n\pi t/L)/\sqrt{L}$ ($n \geq 1$) und auf die Sinus-Basis $\psi_{n-1}(t) = \sin(n\pi t/L)/\sqrt{L}$ identische Auto-Overlap-Profile:

$$\langle \varphi_n, (S_u + S_{-u})\varphi_n \rangle = \langle \psi_{n-1}, (S_u + S_{-u})\psi_{n-1} \rangle = 2(1 - u/(2L)) \cos(n\pi u/L),$$

für $u \in [0, 2L]$. Die Sinus-Korrektur-Terme in asymmetrischen Shifts kanzellieren unter Symmetrisierung. Numerische Verifikation (Skript `verify_diagonal_fast.py`) bestätigt Übereinstimmung der entsprechenden Prime-summierten Diagonaleinträge bis auf Maschinenpräzision für $\lambda \in \{100, 300, 1000\}$.

Spektrale Konsequenz. Da $\langle \varphi_n, (S_u + S_{-u})\varphi_m \rangle = 0$ für $n \neq m$ durch Fourier-Orthogonalität (Sinus-Kreuztermen kanzellieren unter Symmetrisierung), ist der Weil-Operator A_λ exakt diagonal in dieser Galerkin-Basis, mit Diagonaleinträgen

$$\mu_n^+ = \langle \varphi_n, A_\lambda \varphi_n \rangle, \quad \mu_{n-1}^- = \langle \psi_{n-1}, A_\lambda \psi_{n-1} \rangle.$$

Kombiniert mit der Auto-Overlap-Äquivalenz folgt $\mu_n^+ = \mu_{n-1}^-$ für jedes $n \geq 1$, sowohl im Prime-Beitrag als auch (durch dasselbe symmetrische-Shift-Argument) im Archimedes-Beitrag. Daher gilt in diesem Galerkin-Modell:

$$\sigma(A_\lambda^+) = \sigma(A_\lambda^-) \cup \{\mu_0^+\},$$

wobei μ_0^+ der Konstantenmode-Eigenwert ist. Numerisch ist $\mu_0^+ > 0$ und groß, daher nicht das Minimum von $\sigma(A_\lambda^+)$. Die Schlussfolgerung ist

$$\lambda_1^+(\lambda) = \lambda_1^-(\lambda) \quad \text{exakt}$$

in diesem Galerkin-Modell, d.h. gerade Dominanz ist *nicht* asymptotisch erreichbar.

Spannung mit endlichen Zertifikaten. Die 33 IA-Zertifikate aus [Proposition 4.3](#) berichten $\text{cert_gap} := \lambda_{1\text{CAP}}^+ - \lambda_{1\text{CAP}}^- < 0$, was mit der obigen strukturellen Äquivalenz unverträglich ist – es sei denn, entweder die spektrale Äquivalenz ist falsch, oder $\lambda_{1\text{CAP}}^-$ ist keine rigorose untere Schranke. Ein Audit des Zertifizierer-Codes `certifier_production.py` zeigt, dass $\lambda_{1\text{CAP}}^-$ berechnet wird als $\lambda_1^{\text{Galerkin}}(N_{\text{big}} = 60) - \text{remaining} - \epsilon$, wobei *remaining* eine heuristische geometrische Extrapolation der Spaltennormen ist (keine Lehmann–Mähly-, Kato–Temple- oder rigorose Schur-Komplement-Schranke wird angewandt). Das Galerkin-Variationsprinzip gibt $\lambda_1^{\text{Galerkin}}$ als *obere* Schranke auf λ_1^- , nicht als untere Schranke; das Subtrahieren einer heuristischen Korrektur ergibt keine rigorose untere Schranke ohne weitere Analyse. Die Zertifikate sollten daher als *computergestützte numerische Evidenz* gelesen werden, nicht als rigoroser mathematischer Beweis, bis die Lower-Bound-Konstruktion durch eine Methode ersetzt wird, die von einem quantitativen Störungstheorem gestützt ist.

Ehrlicher aktueller Status. Beide Säulen des gerade-Dominanz-Arguments (asymptotische Frontier-Dominanz und endliche CAP-Zertifikate) stehen ab dieser Revision unter struktureller Spannung. Wir behaupten derzeit nicht gerade Dominanz für QW_λ , weder asymptotisch noch im endlichen Diagnosebereich, sofern nicht eines der folgenden festgelegt werden kann:

- der Galerkin-Operator in [Gleichung \(2\)](#) weicht vom tatsächlichen Connes-Operator in einer Weise ab, die die Cosinus–Sinus-Frequenz-Symmetrie bricht; oder
- die heuristische Tail-Korrektur in $\lambda_{1\text{CAP}}^-$ kann durch eine quantitative störungstheoretische untere Schranke ersetzt werden, und das resultierende rigorose cert_gap bleibt negativ.

Das Shift-Parity-Lemma (Satz 3.4), die expliziten Laplace-Endpunkt-Diagonal-Formeln, die Non-Existence-Theoreme NE-A und NE-B (Landscape Part II) und die numerische Phänomenologie der zertifizierten Lücke sind von dieser Spannung unberührt und bleiben als unabhängige strukturelle Resultate gültig.

Dieses Update entspricht der Behandlung des vorliegenden Manuskripts als kontinuierlich entwickelndem Draft. Die Begleitnotizen `_proof-notes/K0_STEP1_FINDINGS.md` und `_proof-notes/K0_CAP_AUDIT.md` liefern den vollständigen analytischen und numerischen Befund der vorliegenden Spannung.

8.6 Update (15. Mai 2026): Connes-vS-Form löst K0-Spannung; rigorose CAP-Schließung bleibt offen

Eine spätere Vergleichsanalyse der Operatordefinition gegen Connes–van Suijlekom [2] klärte, dass die verschärfte K0-Sorge (die spektrale Äquivalenz $\sigma(A^+) = \sigma(A^-) \cup \{\mu_0^+\}$) ein Artefakt der Legacy-Operator-Realisierung auf $L^2([-L, L])$ mit reeller Cosinus/Sinus-Basis unter $t \mapsto -t$ -Symmetrie war, nicht des tatsächlichen Connes-Operators. Der bewiesene Connes–van-Suijlekom-Operator wirkt auf $L^2([0, L])$ mit der komplexen Exponentialbasis U_n , und die Cosinus/Sinus-Paritätssektoren werden über die Frequenzreflektion $U_n \leftrightarrow U_{-n}$ definiert. In dieser korrigierten Formulierung (Abschnitt 2, v1.5-Reformulierung) unterscheiden sich die Diagonalen $\langle \cos_n |Q| \cos_n \rangle = D_n - S_n$ und $\langle \sin_n |Q| \sin_n \rangle = D_n + S_n$ um die genuin nicht-triviale Asymmetrie $2S_n$. Direkte Berechnung (Skript `verify_connes_vs_form.py`) ergibt $S_n > 0$ für die Weil-Distribution und alle getesteten λ .

Die verbleibende Aufgabe ist eine *rigorose* CAP-Schließung von $\lambda_1^{\cos}(\lambda) < \lambda_1^{\sin}(\lambda)$ in dieser Form. Eine systematische Analyse der verfügbaren rigorosen Lower-Bound-Techniken ist in `_proof-notes/K0_LEHMANN_ANALYSIS.md` dokumentiert: Temple’s Ungleichung, Lehmann–Mähly, Bauer-Fike, Operator-Norm-Bound, Schur-Komplement und Gerschgorin scheitern alle aus einem gemeinsamen strukturellen Grund: Es ist keine a-priori Lower-Bound auf λ_2 verfügbar, die das Galerkin-Variationsprinzip allein nicht liefert. Drei mittelfristige Forschungsrichtungen sind dort skizziert: Mollifikation, Toeplitz-Approximation, Reverse-Engineering aus Connes–vS 2025.

Aktuelle ehrliche Position. Die Connes–van-Suijlekom-Operator-Form ist die korrekte Einstellung und zeigt gerade Dominanz numerisch mit konsistenter Margin über λ und N . Die asymptotische S_1 -Asymptotik gibt eine quantitative Cos-Sin-Diagonal-Lücke der Ordnung $\sqrt{\lambda}/\log \lambda$. Eine rigorose CAP-ähnliche Schließung im Sinne einer zertifizierten unteren Schranke auf $\lambda_1^{\sin}$, die strikt eine zertifizierte obere Schranke auf $\lambda_1^{\cos}$ übertrifft, bleibt offen und erfordert einen nicht-trivialen technischen Fortschritt jenseits einfachem Galerkin + Temple/Lehmann.

8.7 Update (Mai 2026): Parallele Route via Connes-vS Err-Kollaps und I-1 Normalfamilien-Reframe

In den Begleitnotizen (`_proof-notes/K0_NORMAL_FAMILY_REFRAME_2026-05-22.md`) wurde eine parallele bedingte Schließung der Riemannschen Vermutung über einen anderen Umgang mit Wand (ii) entwickelt. Wand (ii) bezeichnet die Approximationsqualitätsbedingung $k_\Lambda \approx \xi_\Lambda$ (MS2-Schranke), die im vorliegenden Beweis an das Begleitpapier (Zookeeper) delegiert ist. Die Parallelroute — bezeichnet als Route B — zeigt, dass dieselbe spektrale Struktur eine zweite bedingte Schließung über ein Normalfamilien-Argument (Montel–Vitali) liefert: Wand (ii) zerfällt rigoros in eine A-priori-Streifenschranke (ii-a) für die Familie $\{\hat{\xi}_\Lambda\}$ (kanonische ganze Funktionen vom Paley–Wiener-Typ $\hat{\xi}(z) = (2/\sqrt{L}) \sin(zL/2) \cdot F(z)$, zentriert, gerade, reell-aufreell) und eine Limesidentifikationsbedingung (ii-c); und (ii-c) wird rigoros in (ii-a) absorbiert via Parität und Hadamard-Ordnung (modulo Nullstellen-Koinzidenz-Annahme (Z), §E.14 der

Notizen). Der verbleibende offene Blocker für Route B ist daher die einzige uniforme A-priori-Streifenschranke (ii-a) aus QW_N -Koerzitivität.

Konvergierte empirische Messungen an den kanonischen Objekten (Mac Studio, dps $\approx 30\text{--}50 \cdot \lambda$, $\lambda \in \{3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$, §E.18 der Notizen; Werte bei $\lambda = 11, 13$ bit-identisch über zwei unabhängige dps-Läufe, und $\lambda = 15$ bit-identisch bei dps = 640 und dps = 800) ergeben $A_\lambda(0,4) \approx 1,003\text{--}1,004$ *flach* über die sieben konvergierten λ -Werte (der SUP-Observable $A_\lambda(\delta) := \sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{\xi}_\lambda(x)|^2 / (1 + |x|^{2\delta})$, normiert) und $B_\lambda(0,4)/\lambda^{0,4} \approx 0,68$ Plateau (L^2 -Observable, sub-generisches Wachstum):

λ	$\sup \hat{\xi} _{\mathbb{R}}$	$A_\lambda(0,4)$	$B_\lambda(0,4)$	$B_\lambda/\lambda^{0,4}$
3	0,858	1,0033	1,151	0,74
5	0,879	1,0037	1,340	0,70
7	0,886	1,0038	1,505	0,69
9	0,890	1,0039	1,649	0,68
11	0,890	1,0039	1,778	0,68
13	0,891	1,0039	1,895	0,68
15	0,892	1,00394	2,003	0,68

Die Flachheit von A_λ zeigt, dass das spektrale Framework gut konditioniert ist und mit einer uniformen Streifenschranke konsistent ist; sie stellt keinen Beweis von (ii-a) dar. Frühere Messungen in §E.16–E.17 der Notizen wurden wegen unzureichender Präzision (dps = 30) bei Cluster-Beinahe-Entartung des minimalen geraden Eigenwerts retrahiert; nur die konvergierten §E.18-Werte sind verlässlich.

Guardrail vom 26. Mai 2026. Zwei spätere Audits schärfen den Status, ohne die Theorembehauptungen zu stärken. Erstens liefert der $\lambda = 20$ -Streifenlauf $\kappa(20) = 1,527 \times 10^{-3}$; ein Sechs-Punkt-Refit setzt die residuale Krümmungssättigung nun konservativ in den Bereich $\kappa_\infty \in [1,6, 1,8] \times 10^{-3}$. Theorem B-1 ist daher mit der Schranke $A_\lambda(\delta) \leq 1,0063$ nur bedingt auf uniforme Log-Krümmungskontrolle zu lesen, nicht als bereits bewiesener Streifensatz. Zweitens ist der GF1-Chebyshev-Leiter-Audit zweiregimig: Für $\lambda = 5, 7$ stützen die konvergierten Daten den Boundary-Moment-Benchmark $sLI \sim (64\pi^2/3)\lambda/(NL)$, während $\lambda = 3$ ein Niedrigband-Ausreißer ist, dessen ältere C_m -Normierung gegen etwa 7 statt gegen das $\lambda = 5, 7$ -Plateau nahe 1,5–2,0 läuft. Der Audit vom 27. Mai ergänzt einen zweiten Guardrail: Der einzelne Punkt $\lambda = 11, N = 200$ ergibt $C_{\text{eff}} \approx 168$, also etwa 20 % unter $64\pi^2/3$; $\lambda = 11$ bleibt daher ein Diskriminator, bis die größeren N -Läufe abgeschlossen sind. GF1 bleibt damit ein konservatives Diagnoseziel, kein uniformer All- λ -Satz und kein DZT2-/MS2-/RH-Abschluss. Beide Diagnostiken sind empfindlich gegenüber der Galerkin-Ordnung: Bei $\xi = NL/\lambda \lesssim 50$ überschreitet die gemessene sLI in den $\lambda = 5, 7$ -Sweeps die asymptotische C^*/ξ -Gesetzmäßigkeit, während der $\lambda = 11$ -Punkt zeigt, dass die Schwelle λ -abhängig sein kann. Die einfache Endpoint-Kern-Faktorisierung wurde ebenfalls falsifiziert; der exakte Collar-Kern lautet $K(t) = e^t \cosh(t)/(2 \sinh^2 t)$, und der fehlende Input ist die Eigenmoden-Asymptotik. Die b1-Krümmungskoeffizienten $\kappa(\lambda)$ verwenden verschiedene N pro λ ohne separate N -Konvergenzverifikation. Konvergierte GF1-Diagnostik erfordert ein validiertes ξ -Fenster, aktuell gestützt für $\lambda \in \{5, 7\}$; der $\lambda = 11$ -Sweep ist ausstehend.

GF1-Kernupdate vom 29. Mai 2026. Der GF1-Audit trennt inzwischen eine geschlossene analytische Identität vom verbleibenden Eigenmodenproblem. Die folgende Proposition dient nur als strukturelle Normierung des Chebyshev-Leiter-Observables; sie ist kein Beweis von DZT2, MS2, gerader Dominanz oder RH.

Proposition 8.1 (GF1-Cauchy-Leiterkern und das C^* -Moment). *Sei*

$$K_\gamma(p) := \frac{2(\gamma^2 + p^2)}{(\gamma^2 - p^2)^2}$$

das gepaarte Cauchy-Gewicht der GF1-Fernleiterdiagnostik. Für die reflektierte Momentvariable

$$s = \min\{(p/\gamma)^2, (\gamma/p)^2\} \in [0, 1)$$

gilt exakt

$$\frac{\gamma^2}{2} K_\gamma(p) = G(s) := \frac{1+s}{(1-s)^2} = \sum_{r \geq 0} (2r+1) s^r.$$

Mit $s = e^{-2t}$ ist dies der exakte Collar-Kern

$$K_{\text{collar}}(t) = \frac{e^t \cosh t}{2 \sinh^2 t} = \frac{1}{2} \coth^2 t + \frac{1}{2} \coth t = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{csch}^2 t \right) + \frac{1}{2} \coth t.$$

Der gerade singuläre Anteil ist also $\frac{1}{2} \operatorname{csch}^2 t$, der ungerade singuläre Anteil $\frac{1}{2} \coth t$, und

$$K_{\text{collar}}(t) = \frac{1}{2t^2} + \frac{1}{2t} + \frac{1}{3} + \frac{t}{6} + \frac{t^2}{30} + O(t^3).$$

Mit $u = 2t$ ist der phänomenologische GF1-Benchmark-Kern genau der $2u^2$ -gewichtete Pullback der gerade singulären Komponente:

$$\varphi(u) := \frac{u^2}{\sinh^2(u/2)} = 2u^2 \left(\frac{1}{2} \operatorname{csch}^2(u/2) \right).$$

Folglich

$$C^* := 16 \int_0^\infty \varphi(u) du = \frac{64\pi^2}{3}.$$

Beweis. Die erste Identität ist algebraisch:

$$\frac{\gamma^2}{2} K_\gamma(p) = \frac{1 + (p/\gamma)^2}{(1 - (p/\gamma)^2)^2}$$

auf der inneren Seite, und derselbe Ausdruck mit p/γ ersetzt durch γ/p nach äußerer Reflektion. Die Taylor-Reihe folgt aus $(1+s)/(1-s)^2 = \sum_{r \geq 0} (2r+1) s^r$. Einsetzen von $s = e^{-2t}$ ergibt

$$G(e^{-2t}) = \frac{e^t \cosh t}{2 \sinh^2 t}.$$

Die angezeigte Zerlegung folgt aus $e^t = \cosh t + \sinh t$ und $\coth^2 t = 1 + \operatorname{csch}^2 t$; die Laurent-Entwicklung ist die Standardentwicklung von $\coth$ und csch^2 am Ursprung. Schließlich gilt für $u > 0$

$$\frac{1}{\sinh^2(u/2)} = 4 \sum_{n \geq 1} n e^{-nu},$$

also

$$\int_0^\infty \frac{u^2}{\sinh^2(u/2)} du = 4 \sum_{n \geq 1} n \int_0^\infty u^2 e^{-nu} du = 8 \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{4\pi^2}{3}.$$

Multiplikation mit dem GF1-Normierungsfaktor 16 liefert $C^* = 64\pi^2/3$. □

Lemma 8.2 (GF1-Collar-Kanal-Aufhebung unter q -Orthogonalität). *Sei I eine endliche Indexmenge, seien $t_i \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (mit zugelassenem Grenzwert $t_i = +\infty$) und $c_i \in \mathbb{R}$. Setze*

$$E_{\text{sing}}(t) := \frac{1}{2} \operatorname{csch}^2 t, \quad E_{\text{const}} := \frac{1}{2}, \quad O(t) := \frac{1}{2} \coth t.$$

Dann gilt $K_{\text{collar}} = E_{\text{const}} + E_{\text{sing}} + O$. Wenn der Koeffizientenvektor orthogonal zum konstanten und zum ungeraden Collar-Kanal ist,

$$\sum_{i \in I} c_i = 0, \quad \sum_{i \in I} c_i \coth t_i = 0,$$

dann enthält die signierte Collar-Summe nur den gerade singulären Kanal:

$$\sum_{i \in I} c_i K_{\text{collar}}(t_i) = \frac{1}{2} \sum_{i \in I} c_i \operatorname{csch}^2 t_i.$$

Außerdem gilt für $u_i = 2t_i$

$$\varphi(u_i) = \frac{u_i^2}{\sinh^2(u_i/2)} = 2u_i^2 E_{\text{sing}}(t_i),$$

also ist das φ -Observable genau die u^2 -regularisierte Version des überlebenden gerade singulären Kanals.

Beweis. Die Zerlegung von K_{collar} lautet nach [Proposition 8.1](#)

$$K_{\text{collar}}(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{csch}^2 t + \frac{1}{2} \coth t.$$

Daher ist

$$\sum_{i \in I} c_i K_{\text{collar}}(t_i) = \frac{1}{2} \sum_{i \in I} c_i + \frac{1}{2} \sum_{i \in I} c_i \operatorname{csch}^2 t_i + \frac{1}{2} \sum_{i \in I} c_i \coth t_i.$$

Der erste und dritte Term verschwinden aufgrund der beiden angegebenen Orthogonalitätsrelationen. Aus $u_i = 2t_i$ folgt schließlich $\sinh^2(u_i/2) = \sinh^2 t_i$, also $\varphi(u_i) = u_i^2 \operatorname{csch}^2 t_i = 2u_i^2 E_{\text{sing}}(t_i)$. $\square$

Proposition 8.3 (Production-Splitting-Moden und q_a -Orthogonalitätstest). *In den GF1-ECL-Auditskripten `_proof_notes/gf1_ecl_odd_consts_annihilation_audit.py` und `_proof_notes/gf1_ecl_phi_norm_audit.py` sind die Koeffizienten $q_a(k)$ keine abstrakten Testkoeffizienten. Für feste (λ, N) konstruieren die Skripte*

$$M_{\text{even}}, U_{\text{even}} = \text{project_to_parity}(\text{build_QW_mp}(N, \lambda, \dots), N, \text{even}),$$

diagonalisieren M_{even} und setzen für $a = 1, 2$

$$q_a(k) = \text{half_vector}(\text{embed}(Q, U_{\text{even}}, a, 2N+1, N+1), N)[k], \quad 0 \leq k \leq N,$$

mit der in `half_vector` implementierten Vorzeichenkonvention. Für eine Nullstelle γ_j sei $p_k = 2\pi k/L$, und

$$\mathcal{F}_j := \{0\} \cup \{1 \leq k \leq N : |p_k/\gamma_j - 1| > \eta\}, \quad \eta = 0.12,$$

sei die von den Audits verwendete Fern-Indexmenge. Für $k \geq 1$ schreibe $t_k = \log(\gamma_j/p_k)$; für $k = 0$ verwenden wir die Grenzkonvention $\coth t_0 = 1$, $\operatorname{csch}^2 t_0 = 0$, $K_{\text{collar}}(t_0) = 1$.

Die Anwendung von [Lemma 8.2](#) auf den Production-Mode mit $c_k = -q_a(k)$ ist daher äquivalent zu den zwei konkreten endlichen Identitäten

$$\mathcal{E}_{a,j}^{(0)} := \sum_{k \in \mathcal{F}_j} q_a(k) = 0, \quad \mathcal{E}_{a,j}^{(1)} := \sum_{k \in \mathcal{F}_j} q_a(k) \coth t_k = 0.$$

Das Skript berechnet diese Defekte exakt als die zwei glatten Collar-Kanäle:

$$S_{\text{const}} = -\frac{1}{2} \mathcal{E}_{a,j}^{(0)}, \quad S_{\text{odd}} = -\frac{1}{2} \mathcal{E}_{a,j}^{(1)}.$$

Das Lemma liefert also eine saubere production-seitige Aufhebung des konstanten und des ungeraden Kanals genau dann, wenn diese beiden angezeigten Defekte verschwinden, oder in der normalisierten Grenze des Audit-Observables verschwinden.

Die aktuellen Smoke-Daten beweisen diese beiden Relationen für die rohen Production-Moden nicht. Im Gegenteil: Die in `proof-notes/KO_DZT2_QA_GF1_ECL_FAR_ANNIHILATION_FINDING_2026-05-29.md` dokumentierten Läufe für $\lambda = 3, N = 40$ und $\lambda = 5, N = 55$ zeigen, dass die glatten Kanäle S_{const} und S_{odd} überleben, während der rohe S_{csch} -Kanal für höhere Nullstellen gegen null gedrückt wird und der u^2 -gewichtete Kanal S_φ überlebt. Die stärkste derzeitige Aussage für die rohen q_a ist daher eine exakte Obstruktion samt Testkriterium: Die beiden Größen $\mathcal{E}_{a,j}^{(0)}$ und $\mathcal{E}_{a,j}^{(1)}$ sind genau das, was klein gezeigt werden muss, bevor [Lemma 8.2](#) als production-seitiger Beweis verwendet werden kann.

Beweis. Die angezeigte Definition von $q_a(k)$ ist die wörtliche Konstruktion in den Auditskripten: `embed` bildet den a -ten Eigenvektor der Even-Parity-Galerkin-Matrix zurück in den vollständigen $(-N, \dots, N)$ -Koordinatenvektor, und `half_vector` behält die nicht-negativen Frequenzen mit fester Vorzeichenkonvention. Die Zerlegungsroutine setzt anschließend $c_k = -q_a(k)$ und akkumuliert

$$\begin{aligned} S_{\text{total}} &= \sum_{k \in \mathcal{F}_j} c_k K_{\text{collar}}(t_k), \\ S_{\text{csch}} &= \frac{1}{2} \sum_{k \in \mathcal{F}_j} c_k \text{csch}^2 t_k, \\ S_{\text{const}} &= \frac{1}{2} \sum_{k \in \mathcal{F}_j} c_k, \\ S_{\text{odd}} &= \frac{1}{2} \sum_{k \in \mathcal{F}_j} c_k \coth t_k. \end{aligned}$$

Einsetzen von $c_k = -q_a(k)$ liefert die beiden Defektidentitäten oben. Die bedingte Implikation ist genau [Lemma 8.2](#); die letzte Aussage ist der dokumentierte Befund der zitierten Smoke-Tests und kein Grenzsatz auf Theoremniveau. $\square$

Bemerkung 8.4 (Was nach der Kernidentität offen bleibt). Die Identität in [Proposition 8.1](#) fixiert den exakten Kern und den Normierungsbenchmark. [Lemma 8.2](#) notiert die abstrakte algebraische Auslöschung, während [Proposition 8.3](#) die konkreten Production- q_a und die exakten endlichen Defekte identifiziert, die eine direkte Anwendung blockieren. Der Phi-Norm-Smoke vom 29. Mai 2026 zeigt, dass der rohe Quotient aus

$$S_\varphi = \sum_k (-q_a(k)) \frac{u_k^2}{\sinh^2(u_k/2)}$$

nach der naiven mode-2/mode-1-Normierung C^* nicht reproduziert: bei $\lambda = 3, N = 40$ liefert er $C_{\text{eff}}^\varphi \approx 1.022$, weit unter $64\pi^2/3$. Damit bleibt S_φ der strukturell richtige u^2 -gewichtete Träger des gerade singulären Kanals; der offene Slot ist jedoch das production-gematchte

`GF1_PHI_CHEBYSHEV_LADDER_MATCH.`

Er muss die echten Chebyshev-Leiter-Koeffizienten

$$P_a(d) = \sum_{n \leq d} (b_n^{\text{in}} M_{a,n}^{\text{in}} + b_n^{\text{out}} M_{a,n}^{\text{out}})$$

und dieselbe Leiter-Imbalance-Normierung wie der production-Audit verwenden, nicht den nackten S_φ -über- L^1 -Quotienten. Bis dieser Match bewiesen oder falsifiziert ist, ist C^* ein scharfer struktureller Benchmark für GF1, aber keine Vorwärtsherleitung von DZT2, MS2, gerader Dominanz oder RH.

8.8 Update (31. Mai 2026): Cross-Route-Diagnostikphase — unbedingte Strukturresultate, die $\Lambda = 0$ -Linse, und warum die Route lebt

Eine Cross-Route-Diagnostikphase 2026 (konsolidiert in der Landscape-Mutter, Teil IV) brachte drei Befunde mit Bezug zur Even-Dominance-Route hervor. Keiner schließt die Route, keiner ändert ihren Status der bedingten Reduktion.

Zwei unbedingte Strukturresultate (routen-stärkend).

- *Konzentrations-Lemma.* Für ein festes Modenfenster kontrolliert keine feste endliche Menge von K Prim-Atomen einen positiven Anteil der absoluten Primmasse ($\text{Top-}K/A_\lambda(W) \rightarrow 0$). Rigoros: die Even-Dominance-Route hat *keinen* Wenig-Prim-/lokalen Schlüssel — der Mechanismus ist genuin das volle Prim-Ensemble. Unbedingt; kein RH.
- *Endliche Sylvester-Inertia* $\nu_- = 0$. Intervallararithmetische $\text{LDL}^\top$ -Inertia ($\lambda = 100$, $N \leq 40$) zertifiziert die endliche Even-Dominance-Positivität direkt — stärker als das Lemma verlangte, ohne Symbol, ohne $\|E\|$, ohne Temple-Schranke. Das hebt die endliche Stufe von A3 von heuristischer Tail-Extrapolation auf rigorose Finite-Section-Positivität.

Eine genuin geschlossene Sub-Methode, eine re-typisierte. Die *Toeplitz-Symbol*-Untergrenze-Sub-Methode ist geschlossen: A_{sin} ist nicht Toeplitz (m -abhängige oszillierende Diagonalen, also kein wohldefiniertes Symbol $f(\theta)$); der Nachfolger ist die endliche Sylvester-Inertia-Schranke oben plus GLT-/Outlier-Kontrolle. Die *Monotonie-Fortsetzungs*-Brücke (endlich $\rightarrow$ asymptotisch) ist kein struktureller Defekt, sondern A7-äquivalent (sie re-encodiert das offene Problem) — re-typisiert, nicht geschlossen.

Bemerkung 8.5 (Die $\Lambda = 0$ -Linse ist heuristisch, kein Unmöglichkeitssatz — die Route lebt). Da $\text{RH} \Leftrightarrow \Lambda = 0$ (de Bruijn–Newman; Rodgers–Tao $\Lambda \geq 0$), sitzt RH — falls wahr — exakt bei Kritikalität ohne Marge. Das *legt nahe*, dass eine Marge-suchende Schließung (der asymptotische Variationsgap $\lambda_1^+ < \lambda_1^-$ des vorigen Abschnitts) der weniger aussichtsreiche *Typ* Mechanismus ist und dass exakt-strukturelle Routen (Bost–Connes $\leftrightarrow$ Meyer; die globale adelische Trace-Route) zusätzliches strategisches Gewicht verdienen. **Das ist eine strategische Linse, kein Theorem:** die Even-Dominance-Marge ist *nicht* als de Bruijn–Newman-Aussage gezeigt („eine Marge würde $\Lambda < 0$ erzwingen“ ist eine Analogie). Folglich ist die Route *nicht* widerlegt — der asymptotische Variationsgap bleibt ein wohlgestelltes offenes Problem, der exakte Kern (Shift-Parität, die geschlossene Weil-/Hankel-Form) bleibt ein wertvolles Asset, und die Route *lebt*. Sie ist strategisch deprioritisiert gegenüber den exakt-strukturellen Routen, *nicht* geschlossen. Wir haben *nicht* gezeigt, dass Even Dominance nicht zu einem Beweis führen kann.

9 Was nicht verwendet wird

Dieser Beweis verwendet folgendes Material der Landscape-Reihe ausdrücklich nicht:

- die ursprüngliche eich-thermodynamische Route und deren Obstruktionen;
- einen absoluten PF_∞ - oder totalen Positivitätsanspruch für den vollständigen Primoperator;
- einen universell kommutierenden Sturm–Liouville-Operator;
- Hellmann–Feynman-Monotonie zwischen Zertifikatspunkten;
- die narrative Dungeon/Memorial-Darstellung der ausgeschlossenen Routen.

Diese Ergebnisse bleiben wertvoll zur Routenklassifikation und zur Dokumentation (Audit History), sind jedoch nicht Teil der obigen Beweiskette.

A Audit-Tabelle der Konstanten

Alle expliziten numerischen Konstanten, die im Beweis verwendet wurden, mit ihrer Quelle, Rolle und dem Verifikationsmechanismus. Konstanten mit der Kennzeichnung “IA” sind intervallarithmetisch zertifiziert (`mpmath.iv`, 50-Stellen-Genauigkeit); “CAP” sind die 33 rechnergestützten Landscape-Zertifikate; “PNT/Mertens” sind explizite asymptotische Restglieder.

Konstante	Wert	Rolle / Quelle	Verifikation
C_f	0.4685	Gemeinsamer Frontier-Rayleigh-Quotient $-d_{11}(r) \geq C_f$ auf $r \in [0.7, 1]$ (Lemma 5.1)	IA auf $[0.7, 1]$ (1D)
C_n	2.2847	Operator-Norm-Schranke $\sup_{r \in (0,2)} \ D_3(r)\ _{\text{op}} \leq C_n$ (Lemma 5.3)	IA auf $(0, 2)$ (3D)
c_{gap}	$\geq 4\pi^2/L \geq 2.8$	Spectral-Gap-Konstante für $L \leq 14$ (Lemma 6.4(ii))	Laplace Asymptotik
C^*	$64\pi^2/3$	GF1-Cauchy-Leiter-Momentbenchmark aus der u^2 -gewichteten gerade singulären Collar-Komponente (Proposition 8.1); nur diagnostische Normierung	Geschlossene Identität
N_{cos}	4	Even-Block Galerkin-Trunkierung (Bemerkung 4.1)	Stabilitätscheck $k = 3, 4, 5$
N_{sin}	40–90	Odd-Block Galerkin-Trunkierung (Bemerkung 4.1)	Cauchy Tail-Schranke
Λ_*	$\leq 175,000$	Asymptotische Schwelle; Primsummen-Berechnung (Bemerkung 5.5); konservative Schranke $\leq 1,300,000$ (Proposition 5.4)	Exakte Primenumeration
$\theta(x) - x$	$\leq 0.006788 \frac{x}{\log x}$	Effektive Tschebyscheff-Schranke für $x \geq 89,967,803$ (Dusart 2010, [3])	Unbedingt
$ \text{cert_gap} $ bei $\lambda=100$	≥ 2.25	Erstes CAP (Proposition 4.3)	CAP
$ \text{cert_gap} $ bei $\lambda=1.3 \cdot 10^6$	≥ 475.83	Letztes CAP	CAP
Sicherheitsfaktor bei $\lambda=100$	$\geq 34\times$	$ \text{cert_gap} $ im Vergleich zum Galerkin-/Tail-Fehler (Bemerkung 4.2)	IA + Cauchy-Tail
Sicherheitsfaktor bei $\lambda \geq 200$	$\geq 65\times$	Dasselbe, monoton in λ	IA + Cauchy-Tail
c (Slot-Aufhebung)	$2 + \sqrt{2}$	Geschlossene Form der Konstante (Lemma 6.3(a))	Symbolisch (sympy)

Das Begleit-Repository zur Landscape-Reihe archiviert die Verifikationsskripte. Die relevantesten Einträge sind:

- `shift_parity_cert_v3_targeted.py` – Shift-Parity-Lemma;
- `certifier_production.py` – die 33 CAP-Zertifikate;
- `partA_proof_sketch.py` – Frontier-Dominanz-Prüfung;
- `euler_maclaurin_certifier.py` – Asymptotische Schwelle;

siehe [5, scripts/]. Ein spezielles Begleit-Repository für die vorliegende Extraktion ist gespiegelt auf [research-line/rh-even-dominance](https://research-line.github.io/rh-even-dominance).

Hinweis zur Nutzung von KI-Werkzeugen

Erklärung zur Nutzung von KI-Sprachmodellen

Dieses Manuskript wurde mit moderater Unterstützung durch KI-basierte Sprachmodelle (Claude, Anthropic; Gemini, Google; ChatGPT, OpenAI) erstellt. Die Nutzung umfasste folgende Bereiche:

- *Recherche*: Unterstützung bei systematischer Literatursuche, Identifikation und Zusammenfassung von relevanter Forschungsliteratur.
- *Strukturierung*: Unterstützung bei der Skizzierung und logischen Organisation des Manuskripts, insbesondere der auf den Beweis fokussierten Extraktion aus der Landscape-Reihe.
- *Entwurf*: Unterstützung bei der Formulierung einzelner Abschnitte und Paragraphen basierend auf zentralen, vom Autor vorgegebenen Argumenten und Thesen.
- *Sprache*: Grammatik- und Rechtschreibprüfung, sprachliche Überarbeitung.
- *Formatierung*: Vorbereitung und Überprüfung von Zitaten und Bibliografien; L^AT_EX-Satz-Unterstützung.
- *Internes Review*: Ein 7-Phasen-Reviewprozess unter Verwendung von Sprachmodellen (konstruktiv, Expertenprüfung, adversariell) wurde verwendet, um strukturelle Probleme und Zitationsfehler vor der Einreichung zu identifizieren und zu beheben.

Der gesamte Forschungsprozess – einschließlich der Fragestellung, der methodischen Entscheidungen, der substanziellen Argumentation, der kritischen Quellenbewertung und der Schlussfolgerungen – wurde vom Autor erdacht, gelenkt und verantwortet. Alle computergestützten Zertifikate wurden von deterministischen numerischen Skripten unabhängig von der KI berechnet. Alle KI-generierten Vorschläge wurden kritisch geprüft, überarbeitet und gegebenenfalls verworfen. Der Autor hat alle Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen geprüft, kann jedoch nicht für die vollständige unabhängige Überprüfung sämtlicher Faktendarstellungen und Referenzen garantieren.

Die volle wissenschaftliche und inhaltliche Verantwortung für diesen Artikel liegt beim Autor, Lukas Geiger.

Literatur

- [1] Alain Connes. The Riemann hypothesis: Past, present and a letter through time. *arXiv preprint*, 2026.
- [2] Alain Connes and Walter D. van Suijlekom. Quadratic forms, real zeros and echoes of the spectral action. *arXiv preprint*, 2025.
- [3] Pierre Dusart. Estimates of some functions over primes without R.H. *arXiv preprint*, 2010.
- [4] Lukas Geiger. The riemann hypothesis: Conclusio. Zenodo, 2026. Part III of the consolidated Landscape series.
- [5] Lukas Geiger. The riemann hypothesis: Even dominance of the weil quadratic form. Zenodo, 2026. Part II of the consolidated Landscape series; contains all verification scripts and certificates.
- [6] Lukas Geiger. The riemann hypothesis: Foundations, obstructions, and reorientation. Zenodo, 2026. Part I of the consolidated Landscape series (six documents in one record).
- [7] Lukas Geiger. The spectral zookeeper: the riemann hypothesis via spectral microcluster closure in the connes-consani-moscovici framework. Zenodo, 2026. Companion CCM-route paper; concept DOI, latest live version v1.2 is record 10.5281/zenodo.20193039.
- [8] Henryk Iwaniec and Emmanuel Kowalski. *Analytic Number Theory*, volume 53 of *American Mathematical Society Colloquium Publications*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2004.

- [9] Tosio Kato. *Perturbation Theory for Linear Operators*. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, Berlin and Heidelberg, 1966.
- [10] Bernhard Riemann. Über die anzahl der primzahlen unter einer gegebenen größe. *Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, pages 671–680, 1859. Reprinted in Riemann’s collected works.