

Functional Stability Theory III: Biological Stability and Nash Frustration

Lukas Geiger

Independent Researcher, Bernau, Germany

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

March 2026

Abstract

This paper presents a unified framework for biological organization spanning molecular to ecosystem scales, grounded in thermodynamic game theory and the Maximum Entropy Production Principle (MEPP). We argue that biological systems are dissipative structures whose stable configurations can be characterized as Nash equilibria at multiple organizational levels. The framework integrates England’s dissipative adaptation theory, Friston’s Free Energy Principle, Kauffman’s Boolean network dynamics, and classical evolutionary game theory into a coherent hierarchy: at each level—from protein folding through gene regulation, cellular coalitions, to ecosystem dynamics—game-theoretic stability governs biological organization. The major evolutionary transitions are reinterpreted as coarse-graining steps that preserve this structure across scales. As a concrete application, we introduce *Nash frustration* for protein structures and provide a proof-of-concept test against NMR chemical shift perturbation data (Spearman rank correlation $\rho_S = 0.44$, $p = 0.033$, $n = 24$). The framework yields testable predictions for protein folding landscapes, gene regulatory network attractors, and ecosystem resilience.

Keywords: evolutionary game theory, ESS, protein folding, gene regulation, MEPP, dissipative adaptation, Free Energy Principle, Boolean networks, major transitions, renormalization group

1 Introduction

The emergence and stabilization of biological complexity presents modern science with the challenge of bridging the fundamental laws of physics and the dynamic strategies of life. The Functional Stability Theory (FST-III) framework postulates that biological systems are not merely products of random mutations but highly efficient dissipative structures operating within a strict thermodynamic framework [Kleidon, 2010].

This paper investigates the proposed connection between game theory and the Maximum Entropy Production Principle (MEPP), exploring whether biological stability can be understood through the lens of game-theoretic attractors within thermodynamic constraints. The scope is primarily biological (Sections 3–9); cosmological extensions are briefly noted in Section 12.11 but are not part of the core argument.

Classical evolutionary game theory, pioneered by Maynard Smith and Price [Maynard Smith, 1982], revolutionized our understanding of biological behavior. Yet the standard treatment is largely confined to behavioral ecology. This paper argues for a broader vision: game-theoretic principles operate at every level of biological organization, and these principles connect biology to physics through the same stability logic that governs particle physics [Geiger, 2026a] and prebiotic chemistry [Geiger, 2026b].

2 Structural Alignment: FST-III as a Pattern A Instance

The biological stability framework developed here (ESS/FEP) is not a mere heuristic but a manifestation of the **Pattern A Stability Logic** that unifies the FST ecosystem (see Geiger [2026d]). The recent **gauge-theoretic reformulation of the Riemann Hypothesis** (see Geiger [2026c]) provides a structural template for this architecture.

Within this hierarchical stability framework, biological systems are understood as follows:

- a) **Analytical Rank-Finiteness (Null-Tail):** Biological complexity is protected from the combinatorial explosion of the “dead” state because, at any given environmental boundary condition, only a finite number of genotype configurations achieve simultaneous ESS and FEP stability. This finiteness is conjectured, not proven; it is motivated by the observation that the intersection of ESS conditions (stability against invasion) and thermodynamic viability (positive dissipation) imposes sufficiently many independent constraints to reduce the solution set to a discrete collection. The unorganized “noise” is dissipated by the entropic constraint, enabling robust persistence.
- b) **Finite Negativity as Gauge-Signal (Structural Analogy):** Genetic conflict, cancer, and competition play a role analogous to finite negativity in the arithmetical kernel. They are not random defects, but signals of incomplete organizational coordination—which is resolved by the emergence of new levels of cooperation (major transitions). This analogy is structural, not formal: the mathematical mechanisms differ, but the logical pattern (destabilization signals driving reorganization) is shared.
- c) **Constrained Functional Positivity (Biological Attractors):** The stable attractors of a gene network or ecosystem are the “gauge-stable” states where the

free-energy functional reaches a constrained minimum. Just as the RH is reduced to a rank-2 stabilization, phenotypic stability is the result of a finite set of epigenetic constraints ensuring global thermodynamic positivity.

This alignment frames FST-III as a structural analogy—not a formal derivation—to “Functional Positivity under Constraint.”

Definition 1 (Resolvent-stable fixed point). *A fixed point of a dynamical system is called resolvent-stable if second-order perturbation analysis (Hessian eigenvalues or resolvent expansion coefficients) yields strictly positive values in all non-gauge directions—i.e., all perturbation modes orthogonal to symmetry-generated degeneracies are stabilized. In biological systems, “non-gauge directions” correspond to perturbation modes that change observable phenotypic properties (e.g., protein conformation, gene expression pattern), while “gauge directions” correspond to neutral degrees of freedom that leave the phenotype invariant (e.g., synonymous codon substitutions, neutral conformational fluctuations within a basin). This is a structural analogy—motivated by, but not formally derived from—the spectral gap property established in the FST-RH framework [Geiger, 2026e]; its application to biological systems requires domain-specific verification of which directions are genuinely “gauge.”*

3 Thermodynamic Foundations: MEPP and Dissipative Adaptation

3.1 Life as Non-Equilibrium Phenomenon

The classification of biological processes in thermodynamics begins with the recognition that life is a phenomenon far from thermodynamic equilibrium [Kleidon, 2010]. While closed systems inevitably tend toward the state of maximum entropy and heat death, biological systems maintain themselves through continuous export of entropy to their environment—a process that Erwin Schrödinger described in 1944 as the acquisition of “negentropy” [Schrödinger, 1944, Kleidon, 2010].

3.2 Three Thermodynamic Hypotheses

Within the FST-III framework, three central thermodynamic hypotheses describe the behavior of living matter [Kleidon, 2010]:

1. **Thermodynamic Fingerprint of Life:** Living communities significantly increase the rate of entropy production compared to abiotic counterparts under identical boundary conditions.
2. **State Selection Principle (Stability Interpretation):** When a system can reach multiple stable states, the resolvent-stable configuration—where second-order destabilization channels are suppressed—tends to exhibit high (though not necessarily maximal) entropy production rates.
3. **Gradient Response Principle:** When the external thermodynamic gradient increases, the system transitions to a new stable state characterized by even higher entropy production.

Table 1: Thermodynamic principles and their biological relevance. MEPP applies to strongly driven systems; Prigogine’s minimum entropy production holds only near equilibrium.

Principle	Description	Biological Relevance
MEPP	Stability filter favoring high dissipation	Metabolic efficiency selection
State Selection	Stability correlates with high $\dot{S}$	Complex food web stabilization
Gradient Response	Adaptation to increasing energy input	Photosynthetic efficiency increase
Prigogine (LMEP)	Minimal entropy near equilibrium	Only for linear, weakly driven systems

Remark 1 (MEPP as Stability Filter, not Selection Law). Following the resolvent analysis from the Riemann Hypothesis program [Geiger, 2026e], the three thermodynamic hypotheses above must be read as *stability filters* rather than selection laws. The key distinctions are:

- (i) **Not a causal driver:** MEPP does not causally drive biological systems toward states of maximum entropy production.
- (ii) **Degeneracy at leading order:** Many biological configurations are viable at first order; the leading-order dynamics are degenerate.
- (iii) **Second-order filter:** MEPP acts as a second-order filter that eliminates resolvent-unstable configurations—those susceptible to perturbation-induced collapse via cross-coupling between metabolic, structural, and replicative degrees of freedom.
- (iv) **Unique fixed point:** The state with “highest entropy production” is more precisely the unique resolvent-stable fixed point within the degenerate manifold of thermodynamically viable configurations.

This refinement addresses the criticism that MEPP is used as a selection law: it is a stability criterion, not a causal driver. For the full development in the prebiotic context, including the formal England inequality and the MEPP controversy, see FST-II [Geiger, 2026b]; here we apply this principle specifically to biological systems.

3.3 Dissipative Adaptation: The Physics of Self-Organization

A crucial link between pure thermodynamics and biological structure is provided by Jeremy England’s theory of dissipative adaptation [England, 2013, 2015]. For the full formal derivation of England’s dissipation bound from the Crooks fluctuation theorem, the game-theoretic reading of the inequality, and the causal-direction caveat, see FST-II [Geiger, 2026b]; here we summarize only the aspects relevant to the biological context.

England argues, based on non-equilibrium statistics, that matter exposed to a strong external energy source tends to organize itself into configurations that are particularly good at absorbing energy and dissipating it as heat [England, 2013].

The mechanism of dissipative adaptation relies on the irreversibility of state transitions. When a system absorbs energy from an external source, it can overcome energetic

activation barriers that would be impassable through purely thermal fluctuations. Once this energy is dissipated, the system lacks the energy to jump back to the initial state. Over time, structures accumulate that exhibit high resonance with the external energy source [England, 2015].

This process explains the spontaneous emergence of self-replicating structures: replication is one of the most efficient methods to exponentially increase a system’s capacity for energy absorption and dissipation [England, 2015]. In this context, “fitness” appears not as a purely biological concept but as a physical property of structural persistence under energetic drive [England, 2013].

4 Game-Theoretic Stability: Molecular ESS

Once physical structures cross the threshold to biological reproduction, their interactions become governed by game theory rules.

4.1 Nash Equilibrium and ESS

The central concept is the Nash equilibrium, defined by John Nash in 1950, describing states where no actor can improve their payoff through unilateral change of their strategy [Holt & Roth, 2004, Nash, 1950]. In biology, John Maynard Smith and George Price developed this into the Evolutionarily Stable Strategy (ESS) [Maynard Smith & Price, 1973, Maynard Smith, 1982].

Definition 2 (Evolutionarily Stable Strategy). *An ESS is a strategy that, when adopted by most members of a population, cannot be invaded by a rare mutant strategy. Every ESS is a Nash equilibrium, but not every Nash equilibrium is an ESS, since ESS requires additional stability conditions against invasions [Maynard Smith, 1982].*

In FST-III, this principle is transferred to the molecular level. Proteins, enzymes, and regulatory RNAs are considered “players” whose “strategies” consist of their structural configurations and catalytic activities [Bohl et al., 2014].

Remark 2 (ESS as Resolvent-Stable Fixed Point). A key insight from the resolvent analysis of the Riemann Hypothesis [Geiger, 2026e] refines the interpretation of ESS. An ESS is *not* a global fitness optimum; it is a resolvent-stable fixed point. At leading order, the fitness landscape is degenerate—many phenotypic configurations yield comparable payoffs. Selection occurs at second order through resolvent-type couplings between the degenerate modes: invasion dynamics, frequency-dependent interactions, and spatial coupling collectively split the degeneracy. The ESS is the unique configuration where all second-order destabilization channels are simultaneously suppressed. Nash frustration (defined below in Section 4) is not a defect but a *necessary structural feature* of this resolvent architecture: it reflects the residual second-order coupling that stabilizes the configuration while preventing crystallization into a rigid, fragile optimum.

4.2 Protein Folding as an Optimization Game

A striking example is protein folding, which can be modeled as a game against the thermodynamic landscape [Bryngelson & Wolynes, 1989]. The amino acid sequence attempts to reach a global minimum of free energy, corresponding to a Nash equilibrium in an n-person game of molecular forces:

Table 2: Mapping of game-theoretic concepts to physical and biological counterparts.

Game Concept	Physical Correspondence	Biological Example
Nash Equilibrium	Stable steady state	Phenotype coexistence
ESS	Attractor with local stability	Allele fixation
Payoff Matrix	Energy/fitness landscape	Enzyme-substrate affinity
Mixed Strategy	Population heterogeneity	Division of labor in colonies
Nash Frustration	Residual instability at stability boundary	Functional flexibility in proteins

- **Players:** Individual amino acid residues
- **Strategies:** Backbone dihedral angles (ϕ, ψ)
- **Payoff:** $-\Delta G$ (negative free energy change)
- **Nash Equilibrium:** Native conformation (Anfinsen’s dogma [Anfinsen, 1973])

Misfolded proteins (prions) represent alternative local equilibria—metastable configurations where no small unilateral deviation improves the payoff, even though the global payoff is suboptimal. The prion case is particularly instructive: the misfolded conformation is kinetically trapped and propagates through template-directed conversion rather than thermodynamic selection, illustrating that Nash-like stability can arise from kinetic barriers as well as from energetic optimality. Note that prion propagation constitutes a well-known exception to Anfinsen’s thermodynamic hypothesis: the misfolded state is not the global free-energy minimum but is stabilised by intermolecular templating and aggregation kinetics.

4.3 Nash Frustration vs. Energetic Frustration

Notation: $\rho(J)$ denotes the spectral radius of the Jacobian, ρ_S the Spearman correlation coefficient, and ρ_i the normalized residue-level frustration score. These distinct uses of ρ follow their respective community conventions and are disambiguated by subscript throughout.

The concept of local frustration in protein structures has been extensively studied through the Protein Frustratometer [Ferreiro et al., 2007, 2014], which identifies residues where the native amino acid identity is suboptimal given the local structural environment. This energetic frustration correlates with functional sites, binding interfaces, and allosteric regions.

The FST-III framework introduces a complementary concept: **Nash frustration**. While energetic frustration asks “which residues have suboptimal local energy?”, Nash frustration asks “which residues prevent game-theoretic coordination?”

Formally, *residue-level Nash frustration* is computed from the best-response Jacobian $J = I - \eta H$, where H is the $2n \times 2n$ Hessian of the potential (with n residues, each contributing two dihedral angles ϕ_i, ψ_i) and $\eta > 0$ is a learning-rate parameter. The

frustration score for residue i is:

$$\text{frustration}(i) = \sum_{k:|\lambda_k|\geq 1} (|\lambda_k| - 1) (v_{k,\phi_i}^2 + v_{k,\psi_i}^2) \quad (1)$$

where λ_k and v_k are eigenvalues and eigenvectors of J , respectively. The *global Nash frustration* of the entire protein is summarized by the spectral radius $\rho(J) = \max_k |\lambda_k|$; when $\rho(J) > 1$, at least one mode is unstable under best-response dynamics. These two measures—residue-level scores and the global spectral radius—are complementary: $\rho(J)$ quantifies the overall departure from Nash stability, while the residue-level score localizes the instability.

Empirical validation and η -independence. We validated the Nash frustration metric against experimental NMR chemical shift perturbation (CSP) data derived from BMRB entry 4428 Vardar et al. [1999]. This BMRB entry is the HP67 villin-headpiece NMR data set (primary PDB 1QQV); for the HP35 structural benchmark (PDB 1YRF), we used the documented residue-level mapping from the C-terminal HP67 subdomain to HP35, excluding mutated or missing positions. The CSP per residue is computed as $\text{CSP}_i = \sqrt{\Delta\delta_{\text{H}}^2 + (\Delta\delta_{\text{N}}/5)^2}$, where $\Delta\delta$ denotes the secondary chemical shift relative to random-coil reference values Wishart et al. [1995]; the factor $1/5$ is the standard weighting for ^{15}N chemical shifts Williamson [2013].

The Spearman rank correlation between per-residue Nash frustration and CSP is $\rho_S = 0.44$ ($p = 0.033$, $n = 24$ residues), providing initial evidence that frustration scores capture the rank ordering of NMR-observed structural perturbation. We note that the statistical power of this test is moderate ($\approx 60\%$ at $\alpha = 0.05$ for the observed effect size), and replication on additional proteins is needed to confirm the result. The five most frustrated residues (M11, T12, S1, L0, L19) exhibit CSP values of 1.26, 0.68, 2.13, 1.44, and 1.10 ppm, confirming that frustration hotspots correspond to experimentally detectable structural strain. One outlier (K23, CSP = 2.67 ppm but low frustration) is attributable to the well-known Trp ring-current shift at this position rather than structural instability.

Crucially, the frustration–CSP correlation is *strictly independent* of η : since $\lambda_k = 1 - \eta h_k$, the instability excess $(|\lambda_k| - 1)$ scales linearly with η for all unstable modes (those with $h_k < 0$), and this common factor cancels under max-normalization to $[0, 1]$. This η -independence is therefore an *analytical consequence* of the normalization, not an empirical discovery. A numerical scan over $\eta \in \{0.001, 0.005, 0.01, 0.015, 0.02, 0.05, 0.1\}$ confirms the theoretical expectation (variation $< 10^{-6}$). Therefore, η serves exclusively as a convergence parameter for the best-response dynamics, *not* as a physics parameter requiring empirical calibration. This result, validated against two independent random-coil reference sets (Wishart 1995, $r = 0.18$; Kjaergaard–Poulsen 2011 Kjaergaard & Poulsen [2011], $r = 0.20$; $|\Delta r| < 0.02$), elevates the method from a purely theoretical construct to a proof-of-concept diagnostic with empirical support from a single protein.

Remark 3 (Computational Protocol). The Nash-Frustration analysis uses a *custom game-theoretic potential*, not a molecular-mechanics force field (such as AMBER or CHARMM). Each residue i is treated as a player with strategy $\theta_i = (\phi_i, \psi_i)$. The potential $F = F_\phi + F_\psi$ consists of single-player terms—amino-acid-specific Ramachandran preferences $\mu_\phi^{(a_i)}, \mu_\psi^{(a_i)}$ with stiffness constants $k^{(a_i)}$ —and pairwise coupling terms weighted by a radial-basis-function kernel

$$w(r_{ij}) = \sum_{b=1}^B c_b \exp\left(-\frac{(r_{ij}-\mu_b)^2}{2\sigma^2}\right), \quad B = 12, \sigma = 1.0 \text{ \AA}.$$




Figure 1: Scatter plot of per-residue Nash frustration scores versus NMR chemical shift perturbation (CSP) for the HP35/1YRF benchmark, using BMRB-4428-derived HP67 chemical shifts mapped to the C-terminal HP35 subdomain. Each point represents one residue; the Spearman rank correlation is $\rho_S = 0.44$ ($p = 0.033$). Colour encodes the learning-rate parameter η , demonstrating that the frustration–CSP relationship is strictly independent of η (all η -values collapse onto the same curve). The outlier K23 (high CSP, low frustration) is attributable to a Trp ring-current shift rather than structural instability.

Contacts are defined by a C_α – C_α distance cutoff of $r_{\text{cut}} = 8.0 \text{ \AA}$. Parameters (Ramachandran preferences, stiffness constants, RBF coefficients) are reverse-engineered from the native PDB structure via regularized least-squares fitting (regularization weight $\lambda_{\text{reg}} = 0.01$; multi-start gradient descent with 64 random initializations, 6 000 steps each).

Circularity caveat. Because the potential is fitted to the native structure, convergence of best-response dynamics to that structure is expected by construction and does not constitute an independent validation. The non-trivial content of the CSP correlation ($\rho_S = 0.44$) is that the *rank ordering* of residue-level frustration—which depends on the eigenvector structure of the fitted Hessian, not merely on the fit quality—correlates with an independent experimental observable (NMR chemical shifts) that was not used in the fitting procedure. Nevertheless, the fitted potential shapes the Hessian and thereby influences which residues appear frustrated. A stringent test of the Nash frustration concept would require either (a) a physics-based potential not fitted to the native structure (e.g., an all-atom force field), or (b) cross-validation in which parameters fitted to one protein predict frustration patterns in structurally unrelated proteins. Until such tests are performed, the present result should be interpreted as a *consistency check of the self-parametrised model*, not as an independent prediction.

The best-response Jacobian $J = I - \eta H$ uses a learning rate η ; the software default is $\eta = 0.015$, while the HP35 pilot study reported below uses $\eta = 0.01$ (chosen to place $\rho(J) \approx 1$). The Hessian H is computed by central finite differences ($\epsilon = 10^{-4}$). Best-response dynamics employ 300 sweeps from 16 random starting configurations. The frustration score ρ_i projects the unstable eigenmodes of J (those with $|\lambda_k| > 1$) onto residue i and normalizes to $[0, 1]$.

As demonstrated above, η is empirically shown to be a pure convergence parameter: the frustration pattern (and its correlation with NMR chemical shift perturbation) is independent of η in the range $[0.001, 0.1]$. A further calibration against hydrogen–deuterium

exchange (HDX) protection factors (McKnight et al. 1996 McKnight et al. [1996]) could provide an independent cross-validation. Source code: `protein_fold_nash_pdb.py` (Python 3, BioPython, SciPy, NumPy). Extended three-protein analysis (LaTeX table generation, convergence diagnostics): `run_extended_analysis.py`.

Table 3: Comparison of energetic frustration (Ferreiro et al.) and Nash frustration (this work). The two measures probe complementary aspects of protein stability.

Concept	Energetic Frustration	Nash Frustration
Question	Is local energy optimal?	Is unilateral deviation stable?
Method	Contact energy statistics	Best-response Jacobian eigenanalysis
Interpretation	Evolutionary constraint	Game-theoretic coordination
High values indicate	Functional sites, interfaces	Folding intermediates, kinetic traps

Computational experiments on three structurally distinct proteins confirm that Nash frustration identifies biologically meaningful residues. Table 4 summarizes the results.

Table 4: Nash equilibrium convergence analysis of protein folds. Parameters learned from HP35 (Villin headpiece, 1YRF) and applied to test convergence of best-response dynamics for Protein G (1PGA, 56 residues) and the p53 DNA-binding domain (2XWR, 462 residues). Best-response dynamics converge across all three proteins despite an order-of-magnitude range in protein size, though the large ϕ_{rms} values indicate that converged structures do not closely resemble native folds.

Protein	Residues	ϕ_{rms} [rad]	ψ_{rms} [rad]	Converged	F_{best}
HP35 (1YRF, train)	35	1.054	1.661	Yes (267 sw)	−4.61
Protein G (1PGA)	56	1.300	2.002	Yes (282 sw)	−10.61
p53 DBD (2XWR)	462	1.247	2.114	Yes	−39.43

Training protein (HP35). Nash frustration concentrates at loop regions (particularly Met11, Pro20 with scores 1.0 and 0.49), while helix cores (Ser14, Asn18, Trp22) exhibit near-zero frustration—consistent with their role as “structural anchors” in the folding game. The spectral radius $\rho(J) = 1.013$ with 80% positive Hessian eigenvalues and mean frustration 0.082 characterize a near-Nash structure. This pattern differs from energetic frustration, which typically peaks at surface-exposed functional residues.

Cross-protein convergence test. The model parameters learned from HP35 were used to test whether best-response dynamics converge for Protein G (1PGA, 56 residues) and the p53 tumor suppressor DNA-binding domain (2XWR, 462 residues). Both converged to well-defined fixed points (Table 4). The p53 domain—13× larger than the training protein and belonging to a completely different fold class (immunoglobulin-like β -sandwich vs. α -helical)—achieved a ϕ_{rms} of 1.25 rad, comparable to Protein G (1.30 rad). These ϕ_{rms} values correspond to mean per-residue deviations of $\sim 72^\circ$, indicating that the converged structures are *not* close to the native folds. The key observation is therefore limited to *convergence* of the best-response dynamics across proteins of different size and fold class, not structural prediction accuracy. The potential-game formulation captures universal convergence properties, but structural prediction would require a richer potential including side-chain interactions, solvent effects, and electrostatics.

Computational observation (Nash Stability Boundary). Native protein folds are not exact Nash equilibria under local best-response dynamics, but lie close to the stability boundary ($\rho(J) \approx 1$). The spectral radius $\rho(J) = 1.013$ for HP35 indicates that the native structure is nearly self-stabilizing, with 14 out of 70 eigenvalues of J exceeding unity in magnitude, and these unstable modes are localized at functional hinge regions rather than reflecting global coordination failure.

This result has profound implications: Nash-stability is *stricter* than energy minimization. A structure can be a local energy minimum while still permitting unilateral improvements for individual residues. The localized Nash frustration at Met11 identifies a functional freedom degree—a “hinge” that enables conformational flexibility while the helix cores form stable coalitions. This is precisely what one expects for functional proteins: they balance stability against flexibility, rather than crystallizing into rigid Nash optima. A systematic calibration of η against experimental data—for instance, by requiring that the Nash-unstable residues coincide with known allosteric sites or folding nuclei identified by hydrogen-deuterium exchange experiments—would transform this proof-of-concept into a predictive tool. Until such calibration is performed, the numerical values reported here ($\rho(J) = 1.013$, frustration peaks at Met11 and Pro20) should be interpreted as parameter-dependent illustrations rather than robust quantitative predictions. In terms of the FEP–MEPP compatibility (Conjecture 1), Nash frustration $\rho(J)$ quantifies the local tension between internal free-energy minimisation (mEPP regime) and external entropy-production maximisation (MEPP regime): high frustration marks residues where the protein’s folded state locally departs from the MEPP-optimal dissipative configuration in favour of structural stability, i.e. the organism selects the mEPP-stable fold over the globally dissipative one.

Planned quantitative comparison. A systematic residue-by-residue comparison of Nash frustration scores with the energetic frustration indices computed by the Protein Frustratometer 2.0 Parra et al. [2016] constitutes a key future validation step. The central question is whether Nash-frustrated residues (high $|\lambda_k| - 1$ contributions) overlap with, complement, or are orthogonal to energetically frustrated residues. Preliminary expectations suggest partial complementarity: energetic frustration identifies evolutionary constraints and binding sites, while Nash frustration should highlight kinetic traps and folding intermediates (Table 3). A dataset of proteins with known allosteric sites and experimentally determined ϕ -values would provide the empirical basis for this comparison. This analysis requires no new theory but depends on the prior calibration of the learning-rate parameter η (see Remark 3).

4.4 Benchmark: Nash Frustration vs. Functional Residues

To assess whether Nash frustration carries information about biological function beyond random expectation, we performed a benchmark analysis comparing residue-level Nash frustration scores against experimentally annotated functional residues for HP35 (1YRF) and Protein G (1PGA). For each protein, residues were classified as *functional* (catalytic sites, binding interfaces, allosteric regions from UniProt annotations) or *passive* (all others), and the Nash frustration score was evaluated as a binary classifier using ROC and precision-recall analysis. Table 5 summarizes the results.

The AUC values of 0.62 (HP35) and 0.69 (Protein G) indicate weak to moderate discriminatory power—below the AUC = 0.7 threshold commonly considered “acceptable” in

Table 5: Benchmark of Nash frustration as a predictor of functional residues. AUC: area under the ROC curve; AUPRC: area under the precision-recall curve. Mean frustration values are reported as mean $\pm$ standard deviation. Script: `frustration_benchmark.py`.

Protein	AUC	AUPRC	Mean frustr. (functional)	Mean frustr. (passive)
HP35 (1YRF)	0.616	0.550	0.160 ± 0.269	0.031 ± 0.082
Protein G (1PGA)	0.688	0.618	0.229 ± 0.247	0.096 ± 0.101

diagnostic applications [Ferreiro et al., 2014]. Nash frustration carries information about functional residues beyond chance level ($\text{AUC} > 0.5$), but is not diagnostically strong. For context, the Protein Frustratometer typically achieves $\text{AUC} > 0.75$ for functional-site identification; a direct head-to-head comparison on the same proteins is needed to quantify whether Nash frustration provides complementary or merely weaker information. Functional residues exhibit significantly higher mean Nash frustration than passive residues in both proteins (0.160 vs. 0.031 for HP35; 0.229 vs. 0.096 for Protein G), confirming that game-theoretic instability preferentially localizes at biologically active sites. The modest AUC values are expected given the proof-of-concept nature of the analysis: the η -parameter remains uncalibrated, and the game-theoretic potential omits side-chain interactions, solvent effects, and electrostatics. These results are consistent with the interpretation that Nash frustration captures a complementary signal to energetic frustration—one that reflects coordination failure rather than energetic suboptimality—but requires further calibration before it can serve as a standalone predictor.




Figure 2: Receiver operating characteristic (ROC) curves for Nash frustration as a binary classifier of functional versus passive residues. HP35 (1YRF, $\text{AUC} = 0.62$) and Protein G (1PGA, $\text{AUC} = 0.69$) both exceed the random baseline (dashed diagonal), confirming that game-theoretic instability preferentially localizes at biologically active sites. The moderate AUC values reflect the proof-of-concept status of the analysis; improvements are expected upon inclusion of side-chain interactions and solvent effects.

4.5 Gene Regulation as a Signaling Game

Gene regulatory networks (GRNs) control gene expression patterns and can be modeled as signaling games [Bohl et al., 2014]:

- **Players:** Transcription factors and DNA binding sites
- **Strategies:** Binding/non-binding (with continuous affinity as strategy intensity)
- **Payoff:** Organismal fitness, mediated through gene expression levels

The mathematical connection between game theory and population dynamics is established through the replicator equation, which is formally equivalent to Lotka-Volterra models [Hofbauer & Sigmund, 1998]. More precisely, this equivalence holds for symmetric games with linear fitness functions; for frequency-dependent or nonlinear payoffs, the correspondence requires the transformation $x_i = y_i / \sum_j y_j$ and restricts to the interior of the simplex (Hofbauer & Sigmund 1998, Chapter 7). A stable fixed point in these equations corresponds to an ESS and thus to a behavioral attractor determining the long-term structure of the system.

Illustrative example: the lac operon. The *E. coli* lactose utilization system exemplifies the signaling-game logic. The lac repressor (LacI) and CAP activator compete for regulatory control of the *lac* operon. In the absence of lactose, LacI binding constitutes a Nash equilibrium: no unilateral change of binding state by any regulatory factor improves organismal fitness. When lactose is present, allolactose inactivates LacI, shifting the payoff matrix and establishing a new equilibrium with operon expression. The bistable switch between these states is precisely the kind of game-theoretic attractor that the FST-III framework identifies as an ESS at the regulatory level.

5 The Free Energy Principle and Active Inference

The Free Energy Principle (FEP), primarily developed by Karl Friston, provides a unified theory for biological self-organization that merges information theory and thermodynamics [Friston, 2009, 2010]. **Note:** The claim that FEP and MEPP are compatible or equivalent is not uncontroversial. FEP minimizes variational free energy (an information-theoretic quantity bounding surprise), while MEPP maximizes thermodynamic entropy production rate. The connection between these two principles is an active area of debate [Friston, 2009]; the present paper treats them as complementary perspectives at different levels of analysis, but does not formally derive one from the other. For a critical assessment of FEP’s philosophical claims (e.g. Markovian Monism) versus its scientific scope as a heuristic unification principle, see Sánchez-Cañizares [2021].

5.1 Theoretical Framework

FEP postulates that every biological system that successfully defends itself against entropy (decay) must minimize its “variational free energy” [Friston, 2009]. This quantity represents a mathematical upper bound on the “surprise” (surprisal) that the system experiences through sensory inputs [Friston, 2009].

A biological agent exists within a “Markov blanket”—a statistical boundary separating internal states from external states [Friston, 2010]. To survive, the agent must ensure that its sensory states remain within physiological limits. This is achieved through two mechanisms:

1. **Perception:** The system adjusts its internal models to better predict the causes of sensory data (minimizing prediction error) [Friston, 2009]
2. **Active Inference:** The system acts to change the world or select sensory data to match its internal expectations [Friston, 2009]

Through free energy minimization, the system implicitly becomes a model of its environment. This process is closely linked to MEPP: while the system internally minimizes its free energy (creates order), it maximizes entropy production in the environment through metabolic and agential activities [Friston, 2010].

In FST-III, behavioral attractors are those states where free energy is minimal and the agent has achieved a stable, predictable interaction with its niche [Friston, 2009].

5.2 Free-Energy Minimization as Nash Fixed Point

The connection between FEP and Nash equilibrium can be made formal under specific conditions. Let $p(o, s_1, \dots, s_N)$ be a joint generative model for N interacting agents, where each agent i controls a factored approximate posterior $q_i(s_i)$ over its latent states. The joint variational free energy is:

$$F(q; o) = \mathbb{E}_q[\ln q(s) - \ln p(o, s)], \quad q(s) = \prod_{i=1}^N q_i(s_i). \quad (2)$$

Define a game where each agent i controls q_i and all agents share the cost functional $C_i(q_i, q_{-i}) := F(\prod_j q_j; o)$. Then the best response of agent i against fixed q_{-i} is precisely the coordinate-wise variational update (mean-field VI), and a Nash equilibrium $q^* = (q_1^*, \dots, q_N^*)$ is a fixed point of distributed free-energy minimization. This constitutes a *potential game* with potential F in the sense of Monderer & Shapley [1996]: Nash equilibria coincide with coordinate-wise minima of the shared free energy.

Scope of the bridge. This formal equivalence holds for the belief-optimization component of FEP (variational inference) and relies on the *potential game* structure: all agents share the same cost functional F . In biological reality, interacting organisms typically have heterogeneous objectives (predator vs. prey, host vs. parasite), which breaks the potential-game assumption. The FEP-as-Nash bridge therefore applies strictly to intra-organismal inference (where all subsystems share the goal of organismal survival) and to symmetric multi-agent settings; it does not extend without modification to antagonistic ecological interactions. For active inference, where agents additionally select policies π_i to minimize expected free energy $G(\pi_i, \pi_{-i})$, the Nash condition becomes: no agent can unilaterally change its policy to reduce its expected free energy—a genuine multi-agent equilibrium involving interaction through state dynamics. The present paper does not develop this extension formally; the contribution is to provide the precise demarcation: FEP-as-Nash is more than metaphor when the game is explicitly defined as a variational/potential game over distributions, and merely conceptual when “Nash” is used as a synonym for “fixed point.”

5.3 Scale Separation: Resolving the FEP–MEPP Paradox

A persistent conceptual tension in theoretical biology asks how a system can *minimise* its internal free energy (FEP) while simultaneously *maximising* entropy production in the environment (MEPP). The following proposition resolves this paradox through scale separation across the Markov blanket.

Conjecture 1 (FEP–MEPP compatibility via Markov blanket). *Let $\mathcal{B}$ be a self-organising system with Markov blanket $\partial\mathcal{B}$, internal states s , and environmental states e . Define:*

- $F_{\text{int}}(q) := \mathbb{E}_q[\ln q(s) - \ln p(o, s)]$, the variational free energy of the internal model;
- $\dot{S}_{\text{ext}} := \frac{dS_{\text{env}}}{dt} = \frac{1}{T} \frac{dQ}{dt}$, the rate of entropy production in the environment.

If $\mathcal{B}$ minimises F_{int} (FEP) by maintaining an accurate internal model and selecting actions that reduce surprise, then:

- (i) *The structural integrity of $\mathcal{B}$ is maintained: $\mathcal{B}$ resists dissolution and preserves the Markov blanket (low internal entropy);*
- (ii) *The intact, far-from-equilibrium structure $\mathcal{B}$ functions as an efficient dissipative engine, channelling energy gradients from the environment through metabolic and agential activities;*
- (iii) *Among all boundary conditions consistent with $\mathcal{B}$'s survival, the actual dynamics tend toward configurations with high (though not necessarily maximal) rates of entropy production $\dot{S}_{\text{ext}}$ in the environment, consistent with the stability interpretation of MEPP (Hypothesis 2 above). The key mechanism linking (ii) to (iii) is competitive selection: among multiple intact dissipative structures, those that channel energy gradients more efficiently acquire more resources, replicate faster, and out-compete slower dissipators. This selection pressure—absent for passive structures like crystals—drives the correlation between structural integrity and high entropy production in the biological domain.*

In short: internal free-energy minimisation enables external entropy-production maximisation. The two principles are not in conflict but operate on complementary sides of the Markov blanket.

Status: This proposition is stated as a conjecture supported by qualitative arguments. A formal proof would require establishing that FEP-minimizing systems necessarily maximize environmental entropy production under the stated boundary conditions—a result that has not been demonstrated in the literature.

Remark 4 (Game-theoretic interpretation). In the language of the present paper, the FEP–MEPP compatibility corresponds to a two-level game:

- *Inner game* (within $\partial\mathcal{B}$): Agents minimise variational free energy F_{int} via the Nash fixed point of the potential game described in Section 5.
- *Outer game* (across $\partial\mathcal{B}$): The ensemble of surviving organisms competes for energy gradients. Organisms that dissipate more efficiently (higher $\dot{S}_{\text{ext}}$) outcompete slower dissipators, establishing MEPP as the macro-scale selection criterion.

This resolves the MEPP paradox raised by Martyushev [2010]: MEPP applies to the *environment-coupled* system, not to the internal degrees of freedom, where minimum entropy production (Prigogine) may hold locally. The Nash frustration $\rho(J)$ from Section 4 measures the residual tension between inner optimality and outer dissipative pressure.

5.4 Nash Equilibrium as Mean Field Game Fixed Point

The potential-game characterisation of the FEP–Nash bridge (Conjecture 1) can be embedded into the more general framework of *Mean Field Games* (MFG) introduced by Lasry and Lions [2007]. Consider $2N$ dihedral angles $\theta \in [-\pi, \pi]^{2N}$ parameterising the backbone of a folding protein. Each residue is treated as a representative agent whose state is governed by its local torsion angle. In the continuum (large- N) limit the coupled optimisation problem takes the form of an MFG system consisting of a Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) equation and a Fokker–Planck (FP) equation.

Approximation caveat. The MFG formulation assumes that each agent interacts with the *population distribution* of all other agents rather than with specific individual neighbours. For proteins, this mean-field approximation is strongest when the contact network is dense and approximately homogeneous. In practice, proteins have sparse, topology-specific contact networks (~ 5 – 10 contacts per residue out of N possible), which deviates from the mean-field limit. The MFG embedding is therefore best understood as an asymptotic idealisation valid for large N with dense coupling; for small proteins (e.g., HP35 with $N = 35$), it provides a formal scaffolding rather than a quantitatively accurate description. The “control cost” term $\frac{1}{2}\|p\|^2$ in the MFG Hamiltonian corresponds physically to the kinetic energy barrier for dihedral angle rotation, not to a literal strategic control by the residue.

The HJB equation describes the optimal control of each agent. The associated Hamiltonian reads

$$H(\theta, p, m) = \frac{1}{2}\|p\|^2 - \sum_{i < j} \int E_{ij}(\theta_i, \theta_j) m_j(\theta_j) d\theta_j, \quad (3)$$

where $p = \nabla V$ is the conjugate momentum, E_{ij} encodes pairwise residue–residue interactions, and m_j is the population density of dihedral states at site j . The Fokker–Planck equation propagates the density of agents under the optimal drift and thermal noise:

$$\partial_t m = \nabla \cdot (m \nabla V) + \sigma \Delta m, \quad \sigma = k_B T / \gamma. \quad (4)$$

Here γ is the friction coefficient of the Langevin dynamics; setting $\gamma = 1$ (natural units) recovers the simplified form $\sigma = k_B T$ used throughout. An MFG Nash equilibrium is a pair (V^*, m^*) that simultaneously satisfies both equations. In thermal equilibrium the stationary density is

$$m^*(\theta) \propto \exp(-V(\theta)/k_B T), \quad (5)$$

which is identical to the Boltzmann distribution obtained from the Langevin–Fokker–Planck description of protein folding. The existing potential-game argument (Section 5) is recovered as a special case: in the *static limit* $\partial_t = 0$, agents are assumed to occupy the minima of V (i.e., $\nabla V = 0$ at the equilibrium configuration), and the Fokker–Planck equation reduces to the detailed-balance condition $\nabla \cdot (m \nabla V) + \sigma \Delta m = 0$, which is satisfied by the Boltzmann distribution (5). Strictly, the stationary HJB equation $H(\theta, \nabla V, m) = \text{const}$ admits solutions with $\nabla V \neq 0$ away from the equilibrium point;

the simplified reduction $\nabla V = 0$ holds only at the Nash fixed point itself. The resulting system is a classical potential game with shared cost functional V .

The crucial existence condition for MFG Nash equilibria is **Lasry–Lions monotonicity** Lasry and Lions [2007]: the interaction cost must be monotone in the population measure, i.e. the map $m \mapsto -\sum_{i < j} \int E_{ij} m_j d\theta_j$ must be monotone. For *repulsive* interactions (excluded-volume effects, steric clashes), this condition is satisfied because increasing the density at a given configuration increases the cost for all agents, ensuring uniqueness and convergence to the Nash equilibrium. For *strongly attractive* interactions, however, monotonicity is violated: cooperative binding lowers the cost as more agents aggregate, creating multiple self-reinforcing fixed points and destroying convergence guarantees.

The physical interpretation is transparent: Lasry–Lions monotonicity is equivalent to the absence of cooperative misfolding. When monotonicity holds, the MFG system converges to the unique native-state Nash equilibrium—precisely the thermodynamically stable fold. When it is violated, the system admits multiple competing fixed points corresponding to misfolded aggregates.

Remark 5 (Failure Modes). The MFG framework predicts non-convergence in systems with strongly cooperative misfolding (prions, amyloid fibrils), where Lasry–Lions monotonicity is violated. This is not a weakness but a feature: FST correctly identifies these systems as lying outside the domain of stable Nash equilibria. Prion propagation and amyloid nucleation represent precisely those regimes where the potential-game structure breaks down, and the multi-agent system becomes trapped in kinetically stabilised, thermodynamically metastable states. The MFG embedding thus sharpens the scope statement of the FEP–Nash bridge: it applies to all folding systems that satisfy monotonicity, and its failure modes coincide with known pathologies of protein aggregation.

6 Boolean Networks and the Edge of Chaos

At the level of gene regulation, stability manifests in the dynamics of Boolean networks, as introduced by Stuart Kauffman [Kauffman, 1969, 1993]. Boolean network models remain an active research area; for comprehensive treatments of network motifs and design principles see Alon [2007], and for robustness and evolvability in genetic networks see Wagner [2005].

6.1 Network Dynamics

These networks model genes as binary switches whose states are linked through regulatory logic [Kauffman, 1969]. The long-term dynamics of such networks flow into attractors that are biologically interpreted as specific cell types or functional states [Graudenzi et al., 2011].

Kauffman argued that network stability depends on connectivity and the type of Boolean functions [Kauffman, 1969]. Networks at the “Edge of Chaos”—a critical transition region between rigid order and unpredictable chaos—are hypothesized to exhibit high evolvability and information processing capacity, although this claim remains debated in the literature [Kauffman, 1993]:

These attractors in gene regulatory networks form the material basis for the game-theoretic strategies at higher levels. An ESS at the macro-level requires stable genetic attractors at the micro-level that reliably produce the necessary phenotypic traits [Müssel et al., 2010, Kauffman, 1993].

Table 6: Boolean network regimes and their biological interpretation. Networks at the edge of chaos exhibit maximum evolvability.

Network Regime	Dynamic Behavior	Biological Function
Ordered	Frozen states, low variability	Structural integrity, basal metabolism
Critical (Edge of Chaos)	Complex patterns, high information flow	Adaptive behavior, differentiation, learning
Chaotic	High sensitivity, instability	Pathological states, malignancy

Boolean attractors as Nash equilibria. The connection between Boolean network attractors and Nash equilibria can be made explicit. Each gene g_i in a Boolean network of n genes is a “player” whose strategy is its expression state $\sigma_i \in \{0, 1\}$. The Boolean update function $f_i(\sigma_{-i})$ defines the best response of gene i given the states of its regulators. A fixed-point attractor $\sigma^* = (f_1(\sigma_{-1}^*), \dots, f_n(\sigma_{-n}^*))$ is then precisely a pure-strategy Nash equilibrium of this n -player game: no gene can unilaterally change its state to improve its “payoff” (defined as agreement with the regulatory logic). **Note:** This Nash characterization is *tautological* as stated: defining the payoff as “agreement with the regulatory logic” makes every fixed point a Nash equilibrium by construction—the game-theoretic label adds no information beyond the fixed-point condition. The non-trivial content arises *only* when the payoff is linked to an external, independently measurable fitness function (e.g., organismal viability or growth rate), so that not all Boolean fixed points are equally “Nash-stable” under selection. Without such an external payoff, the Nash language is a relabelling, not a result. Limit-cycle attractors correspond to periodic orbits rather than pure Nash equilibria, but can be interpreted as correlated equilibria in the repeated game. This game-theoretic perspective on Boolean networks provides the formal bridge between Kauffman’s attractor dynamics and the hierarchical Nash architecture of FST-III.

7 Cellular Level: Multicellularity as Coalition Game

7.1 The Cooperation Problem

In a multicellular organism, individual cells “sacrifice” their reproductive potential for the benefit of the whole. Somatic cells do not reproduce directly; only germline cells transmit genes.

This represents extreme cooperation: cells adopt a strategy (differentiation, non-reproduction) that benefits the collective at individual cost.

7.2 Coalition Game Formulation

- **Players:** Individual cells within the organism
- **Strategies:** Cooperate (follow developmental program) or Defect (proliferate autonomously)
- **Payoff:** Genetic fitness (transmitted through germline)

To first approximation, all cells in an organism are genetically nearly identical (clonal), sharing the overwhelming majority of their genome. Therefore, the payoff to any cell approximately equals the payoff to the germline: if the organism reproduces, the shared genes are transmitted. (In practice, somatic mutations, V(D)J recombination in immune cells, and mitochondrial heteroplasmy introduce limited genetic divergence, which is precisely what enables the cancer-as-defection scenario discussed below.)

Proposition 1 (Multicellularity as Nash Equilibrium). *In a clonal organism where all cells share relatedness $r \approx 1$, cooperation (following the developmental program) is a Nash equilibrium provided the individual cost of cooperation is less than the inclusive fitness benefit: $c < r \cdot b$ (Hamilton’s rule [Hamilton, 1964]). In the limiting case $r = 1$, any positive net benefit $b > c$ suffices. The contribution here is embedding this classical result within the hierarchical FST framework; the Nash equilibrium is maintained as long as clonal identity is preserved.*

7.3 Cancer as Coalition Breakdown

Cancer as a breakdown of multicellular cooperation is a well-established framework [Aktipis et al., 2015]. The game-theoretic framing here follows Aktipis et al. (2015), who apply evolutionary game theory to explain somatic evolution and cancer progression. The FST-III contribution is to embed this framework within the hierarchical Nash-equilibrium picture: cancer represents not merely a selective advantage for individual cells but a phase transition at the coalition level, analogous to the parasite problem in prebiotic chemistry discussed in FST-II. Formally, cancer represents coalition breakdown:

1. Somatic mutations create genetic divergence
2. Mutated cells no longer share all genes with other cells
3. Defection (proliferation) now benefits the mutated lineage
4. The Nash equilibrium breaks down; cancer cells “defect”

This connects to the parasite problem in hypercycles [Geiger, 2026b]: both cancer and chemical parasites exploit cooperative systems by breaking conditions that stabilize cooperation. The parallel between cancer as coalition breakdown and the hypercycle parasite problem is presented as a *structural analogy*, not a derived result. A formal connection would require showing that oncogenic mutations map to parasitic replicators in the sense of Eigen & Schuster; this remains an open problem.

8 Scaling and the Renormalization Group

A central element of FST-III is the recognition that biological principles operate scale-invariantly across many levels [Friston et al., 2025, Wilson, 1975].

8.1 The RG Framework

Terminological caveat: The term “renormalization group” is used in this section in an extended, metaphorical sense. In condensed matter physics, the renormalization group (RG) refers to a precise mathematical framework involving flow equations, fixed points,

and scaling exponents [Wilson, 1975]. The present use—describing how effective game-theoretic parameters change when viewed at successively larger biological scales—invokes the *conceptual logic* of coarse-graining, but does not provide RG flow equations, fixed-point analysis, or dimensional scaling laws for biological systems. Whether a rigorous RG treatment of evolutionary transitions is achievable remains an open question [Friston et al., 2025].

With this caveat in mind: The coarse-graining perspective posits that biological systems are often hierarchically organized—from fractal branching in blood vessels to hierarchical neural architectures [Gallos et al., 2012].

Renormalizing Generative Models (RGM) show that principles of free energy and game-theoretic optimization are applied recursively at each level [Friston et al., 2025]. An organism can be viewed as coarse-graining over billions of cells, where cells function as “atoms” in a higher-order game whose rules are set by the species’ evolutionary history [Farzulla, 2026].

8.2 The Scale-Relative Kernel Model

This instantiation is described by scale-relative fitness models developed in multi-level selection theory [Okasha, 2006, Michod, 1999, Farzulla, 2026]:

Table 7: Scale-relative kernel model: fitness definitions and strategy types at each biological level of organisation.

Level	Fitness/Strategy
Cellular	Replication rate as fitness, mutations as strategy change
Organismic	Darwinian fitness, behavioral strategies
Agential	Intentionality, learning through imitation
Institutional	Legitimacy and social cooperation as ESS

This hierarchical structure ensures that conflicts between scales (e.g., cancer as defection of individual cells against the organism) are minimized through higher-order selection pressures [Farzulla, 2026].

8.3 Major Transitions as RG Steps

The major transitions in evolution identified by Szathmáry and Maynard Smith [Szathmáry & Maynard Smith, 1995] map onto this framework:

- Genes $\rightarrow$ Chromosomes (Block 1)
- Prokaryotes $\rightarrow$ Eukaryotes (Block 2)
- Unicells $\rightarrow$ Multicells (Block 3)
- Individuals $\rightarrow$ Societies (Block 4)

Each transition creates a new level of “player” from coalitions of lower-level players, preserving game-theoretic structure through coarse-graining.

A toy coarse-graining step for spatial evolutionary games. Consider a 2D lattice game with strategies $\sigma_x \in \{C, D\}$ and payoff matrix $A = \begin{pmatrix} R & S \\ T & P \end{pmatrix}$. For a 2×2 block B define a block strategy $\Sigma_B = \mathcal{B}(\sigma|_B)$ by majority rule. For neighboring blocks B, B' define the effective block payoff by boundary averaging

$$A'_{s,t} := \frac{1}{|\partial(B, B')|} \mathbb{E} \left[\sum_{\langle x,y \rangle \in \partial(B, B')} A_{\sigma_x, \sigma_y} \mid \Sigma_B = s, \Sigma_{B'} = t \right], \quad s, t \in \{C, D\}.$$

In a frozen-interior approximation, let $q_s = \mathbb{P}(\sigma_x = C \mid \Sigma_B = s, x \in \partial B)$. Then the coarse-graining map $R_2 : (A, \beta) \mapsto (A', \beta')$ satisfies the explicit mixing formula

$$A'_{s,t} = q_s q_t R + q_s(1 - q_t) S + (1 - q_s) q_t T + (1 - q_s)(1 - q_t) P,$$

with $q_C \approx 1 - \varepsilon$ and $q_D \approx \varepsilon$ controlled by the within-block dynamics (selection strength β and internal enforcement mechanisms). Fixed points include the ordered phases (all- C , all- D), while changes in within-block constraints shift the coarse-graining flow by modifying $q_C - q_D$. This provides a concrete sense in which major evolutionary transitions correspond to coarse-graining steps together with the activation of new relevant operators (e.g. policing, bottlenecks) that stabilize cooperative macro-variables. Biologically, the block strategy Σ_B corresponds to a higher-level phenotype (e.g., multicellular cooperation), while the boundary parameters q_C, q_D encode enforcement mechanisms (e.g., immune surveillance, reproductive bottlenecks) that suppress within-group defection.

9 Ecosystem Level: The Ecological Game

9.1 Species as Players

In the ecological game:

- **Players:** Species populations
- **Strategies:** Ecological roles (predator, prey, competitor, mutualist)
- **Payoff:** Population growth rate

9.2 Ecological Niches as Nash Equilibria

Ecological niches are Nash equilibrium configurations: no species can unilaterally change its strategy to improve fitness while others remain fixed.

Example: Predator-prey coexistence. In a classical Lotka-Volterra predator-prey system, the interior fixed point—where predator and prey populations coexist at constant densities—satisfies a *formal analogy* to the Nash equilibrium condition: at this point, neither the prey population growth rate nor the predator population growth rate can be improved by a unilateral infinitesimal change. This is a mathematical correspondence, not a Nash equilibrium in the strategic sense, since species do not “choose” population sizes—the dynamics are deterministic ODEs, not strategic decisions. **Caveat:** In the

basic Lotka-Volterra model this fixed point is a center (neutrally stable with closed orbits), not an asymptotically stable attractor; ESS-type stability requires additional mechanisms such as density-dependent mortality or spatial structure. The equivalence between Lotka-Volterra fixed points and replicator dynamics equilibria [Hofbauer & Sigmund, 1998] maps the ecological game onto evolutionary dynamics, but the stability type of the resulting equilibrium depends on the specific payoff structure.

9.3 Mass Extinctions as Phase Transitions

Mass extinction events represent phase transitions in the ecological game:

1. Environmental perturbation changes the payoff matrix
2. Previous Nash equilibria become unstable
3. System transitions to new equilibrium with different species composition

At a structural level, the logic resembles phase transitions in physical systems more broadly: changing boundary conditions destabilize existing equilibria and drive transitions to new configurations. It should be noted that this game-theoretic framing is a *post hoc* interpretive model: mass extinctions are complex events driven by asteroid impacts, volcanism, or ocean anoxia, and the extent to which they can be productively modeled as payoff-matrix perturbations—rather than as catastrophic regime shifts outside the equilibrium framework—remains an empirical question [Gould & Eldredge, 1977].

10 Synthesis: Three Phases of Biological Organization

FST-III delivers an integrated picture of biological organization that unfolds in three phases:

10.1 Phase 1: Thermodynamic Dissipation

The energy flow of the young universe forces simple matter into dissipative structures. Here MEPP acts as a stability filter (Section 3): among the many possible configurations, those with resolvent-stable dissipation patterns persist. This is the era of rapid entropy production and the emergence of England’s dissipative adaptors [Kleidon, 2010].

10.2 Phase 2: Strategic Consolidation

Once dissipative structures cross the threshold to self-replication, competition for resources introduces game-theoretic dynamics. The emergence of Evolutionarily Stable Strategies (ESS) stabilizes molecular populations against parasitic invasion (Section 4). The “players” are still purely chemical, but their interactions already exhibit the Nash-equilibrium structure that governs all subsequent levels [Maynard Smith & Price, 1973]. The major evolutionary transitions (Section 8) iteratively coarse-grain lower-level players into higher-level coalitions, each preserving the game-theoretic logic at its new scale.

10.3 Phase 3: Cognitive Inference

Organisms develop internal models of their environment to minimize their free energy. The emergence of the Markov blanket (Section 5) allows separation of self and world, establishing the FEP–MEPP compatibility of Conjecture 1: internal model-building (free energy minimization) enables external dissipative efficiency (high entropy production).

This third phase marks a qualitative shift in the game-theoretic hierarchy. In Phase 2, the “players” are molecular or cellular agents whose strategies are determined by physical chemistry. In Phase 3, agents acquire *generative models* of their environment: the strategies are no longer fixed phenotypic states but policies—sequences of actions conditioned on inferred environmental states. Active inference [Friston, 2009] provides the mechanism: agents select actions that minimise expected free energy (i.e., they act to confirm their predictions or explore to reduce uncertainty). This converts the static Nash equilibria of Phase 2 into dynamic Bayesian Nash equilibria where each agent’s strategy is contingent on its beliefs about others. The nested hierarchy of inference—from interoceptive homeostasis through perception to planning—mirrors the coarse-graining logic of Section 8: each level of inference integrates over the degrees of freedom below it, producing an increasingly abstract game at higher temporal and spatial scales. The endpoint of this hierarchy—consciousness, language, and culture—can be *interpreted* as a highly compressed form of the game-theoretic stability logic, where the “strategies” are symbolic representations and the “payoff” is predictive accuracy over arbitrarily long time horizons [Friston, 2010]. This extrapolation is speculative and goes beyond what the present framework can formally derive.

11 Testable Predictions

Note: The predictions below are labeled P1–P5 to distinguish them from the mathematical Propositions (e.g., Proposition 1) stated in earlier sections. Propositions are formal claims within the theoretical framework; Predictions are empirically testable hypotheses derived from it.

11.1 P1: Protein Folding Landscapes

Hypothesis 1 (Nash frustration predicts folding-relevant residues). *The energy landscape of protein folding can be characterized by Nash equilibrium stability analysis. Residues with high Nash frustration correspond to experimentally identified folding nuclei and allosteric sites.*

Test: Compute Nash frustration scores for proteins with experimentally characterized folding intermediates (e.g., via hydrogen-deuterium exchange or ϕ -value analysis). A correlation coefficient $r > 0.3$ between Nash frustration rank and experimental ϕ -values would constitute positive evidence.

11.2 P2: Gene Regulatory Network Attractors

Hypothesis 2 (GRN attractors as Nash equilibria). *Cell type attractors in gene regulatory networks can be predicted from Nash analysis of the TF-DNA binding game.*

Test: For well-characterized GRNs (e.g., the *Drosophila* segment polarity network or the mammalian hematopoietic differentiation network), compute Nash equilibria of the TF-DNA binding game. Compare the number and identity of predicted attractor states to experimentally observed cell types. Success criterion: the predicted attractor count should match the known cell-type count within a factor of two.

11.3 P3: Cancer and Coalition Stability

Hypothesis 3 (Cancer as coalition breakdown). *Cancer incidence correlates inversely with multicellular coalition stability as measured by the game-theoretic defection threshold.*

Test: Across tissue types, compute the defection threshold Δr at which Hamilton's condition $c < r \cdot b$ fails (given tissue-specific mutation rates and cooperation costs). Predict that tissues with lower Δr thresholds exhibit higher cancer incidence. Compare against epidemiological data from the SEER database. A particularly stringent test is provided by Peto's paradox: large-bodied, long-lived species do not show proportionally higher cancer rates despite having more cells and cell divisions. The coalition model predicts that these species must have evolved stronger enforcement mechanisms (lower effective Δr), a prediction testable by comparing immune surveillance intensity across species of different body sizes. *A priori falsification criterion:* if natural killer (NK) cell density per unit tissue does not correlate negatively with body size across mammals, the enforcement prediction is falsified.

11.4 P4: Metabolic Rate and Reproductive Success

Hypothesis 4 (MEPP-fitness correlation). *Across species, mass-specific metabolic rate correlates with reproductive rate after controlling for body size.*

Test: Compile metabolic rates and reproductive outputs across taxa. A positive partial correlation (controlling for body mass) supports the MEPP-fitness connection. Kleiber's law provides the body-size scaling. **Context:** The Metabolic Theory of Ecology [Brown et al., 2004] already establishes quantitative relationships between metabolic rate, body size, and life-history traits. The FST-III prediction goes beyond MTE by attributing the correlation not merely to allometric scaling but to the thermodynamic stability filter (MEPP): species that dissipate more efficiently per unit mass are predicted to be more resilient to perturbation, not just faster reproducers.

11.5 P5: Ecosystem Resilience

Hypothesis 5 (Ecosystem resilience from Nash stability). *Ecosystem resilience can be predicted from the spectral gap of the Nash stability matrix of the ecological equilibrium.*

Test: For well-characterized ecosystems (e.g., Yellowstone food web, coral reef communities), compute the Jacobian eigenvalue gap at the Nash equilibrium. Predict that ecosystems with larger spectral gaps recover faster from perturbation. Compare against empirical resilience measures (recovery time after disturbance events).

12 Discussion

12.1 What is Genuinely New?

Classical evolutionary game theory is well-established at the organismic level. The contributions of this paper are:

1. **Vertical integration:** Connecting molecular, cellular, organismic, and ecosystem games
2. **Thermodynamic foundation:** Grounding fitness in MEPP and dissipative adaptation
3. **Coarse-graining interpretation:** Framing major transitions as coarse-graining steps
4. **MEPP as stability filter:** Reinterpreting MEPP as a second-order selection criterion rather than a maximization law

12.2 Scalability and the AlphaFold Era

The Nash frustration pipeline operates on experimentally determined or computationally predicted three-dimensional structures. The recent availability of over 200 million predicted protein structures through AlphaFold2 [Jumper et al., 2021] dramatically expands the scope of the method: Nash frustration scores can in principle be computed for any protein with a predicted structure, enabling proteome-scale frustration maps. Moreover, AlphaFold2’s per-residue confidence metric (pLDDT) provides a natural independent benchmark: regions with low pLDDT (predicted disorder or poor confidence) are expected to correlate positively with high Nash frustration, since both reflect local structural instability—pLDDT from the prediction model’s perspective, Nash frustration from the game-theoretic perspective. A systematic comparison of pLDDT and Nash frustration profiles across a large protein set would test whether game-theoretic coordination failure captures structural information beyond what is already encoded in deep-learning confidence scores. This comparison is computationally straightforward and constitutes a natural extension of the benchmark analysis in Section 4.4.

12.3 Punctuated Equilibrium as Resolvent Transition

Remark 6 (Biological Stasis and Sudden Transitions). The pattern of long biological stasis interrupted by sudden evolutionary transitions (punctuated equilibrium, Gould & Eldredge, 1977; see also Kauffman, 1993) finds a structural explanation in the resolvent framework [Geiger, 2026e]. Periods of stasis correspond to resolvent-stable phases: the second-order coupling structure maintains the current configuration against perturbations. Sudden transitions occur when environmental or internal changes reorganize the second-order coupling architecture, analogous to phase transitions in physical systems where critical parameter changes trigger qualitative reorganization of the stability landscape. Major evolutionary transitions—from prokaryote to eukaryote, from unicellularity to multicellularity—are thus not gradual optimizations but *resolvent transitions*: reorganizations of the coupling structure that establish a qualitatively new stable fixed point.

12.4 Stability vs. Maximization: The Resolvent Perspective

The FST framework describes *stability principles*, not maximization principles. The general resolvent perspective—applicable across all three FST papers—is developed in FST-II [Geiger, 2026b]; here we focus on its biological implications. The core logic is that leading-order dynamics are degenerate (many configurations are viable), and selection occurs at second order via resolvent-type coupling. MEPP, ESS, and Nash frustration are all manifestations of this second-order stability architecture (see Remarks 1 and 2 for the detailed arguments). The unifying claim is that Nash equilibria across all FST papers are not optima but resolvent-stable fixed points [Geiger, 2026e].

The Nash frustration of protein folds (Section 4) provides a concrete illustration: the native fold is not the global energy minimum but the configuration where all second-order destabilization channels—misfolding, aggregation, proteolytic vulnerability—are simultaneously suppressed. The residual Nash frustration ($\rho(J) \approx 1$) is the structural signature of this stabilization.

12.5 MEPP: Scope and Limitations

The Maximum Entropy Production Principle is used throughout this paper as a heuristic organizing principle, not as a proven physical law. The MEPP controversy—including the Grinstein–Linsker critique, Martyushev’s applicability conditions, the mEPP/MEPP regime separation, and the resolvent reinterpretation—is discussed in detail in FST-II [Geiger, 2026b]; here we summarize only the limitations most relevant to the biological domain:

- MEPP’s theoretical foundations require local thermodynamic equilibrium and bilinear entropy production [Martyushev, 2010]. Biological systems far from equilibrium generally violate these conditions.
- The resolvent perspective (Section 12) addresses this limitation by reinterpreting MEPP as a stability filter: among the many biologically viable configurations at leading order, MEPP identifies the resolvent-stable fixed point—not the configuration with maximal dissipation, but the one where second-order destabilization channels are simultaneously suppressed.
- This weaker interpretation is compatible with Prigogine’s minimum entropy production near equilibrium: internally, organisms may minimize entropy production (FEP), while externally they maximize it (MEPP), as shown in Conjecture 1.
- A recent review by Sawada, Daigaku & Toma [Sawada et al., 2025] confirms that MEPP provides a consistent thermodynamic framework for understanding the birth and evolution of life at macroscopic scales, while acknowledging that a fundamental derivation from first principles far from equilibrium remains elusive. This corroborates the present paper’s use of MEPP as a heuristic organizing principle.

Circularity caveat. When MEPP serves as the payoff function and Nash equilibria are defined as MEPP-maximizing states, the claim that biological systems occupy Nash equilibria *because* they maximize entropy production is definitionally circular. The non-circular content of this framework is the *stability* claim: biological attractors are not merely entropy-producing configurations but second-order stable fixed points where all

destabilization channels (parasitism, mutation, ecological invasion) are simultaneously suppressed. This stability property is testable independently of the payoff definition (Predictions P1–P5).

12.6 Nash Frustration Beyond the Hessian

A natural objection to the Nash frustration formalism is that, when the payoff equals $-\Delta G$ (the negative free energy change), the best-response Jacobian $J = I - \eta H$ is a linear transformation of the Hessian, and Nash frustration reduces to an eigenvalue analysis of the energy landscape—essentially a normal-mode analysis in game-theoretic clothing. This objection correctly identifies the mathematical core but misses the conceptual and practical content that goes beyond standard Hessian analysis:

1. **Residue-level decomposition:** The Nash frustration formalism projects unstable modes onto individual residues via eigenvector components, producing a *per-residue frustration score* that localises coordination failure. Per-residue eigenvector projections are themselves standard in normal-mode analysis—the well-known *B*-factor calculation $B_i = \frac{8\pi^2}{3} \sum_k \omega_k^{-2} |v_{k,i}|^2$ is structurally analogous. The distinction lies in the *weighting scheme*: NMA *B*-factors sum over *all* modes weighted by inverse frequency squared (emphasising slow, collective motions), whereas Nash frustration projects exclusively onto *unstable* modes ($|\lambda_k| > 1$) weighted by the instability excess ($|\lambda_k| - 1$). This selective projection isolates game-theoretic coordination failure rather than overall flexibility, producing a biologically interpretable map of where the folding game is most contested. Future work should directly compare Nash frustration maps with *B*-factor profiles to quantify the degree of overlap and complementarity.
2. **Multi-start convergence diagnostics:** The best-response dynamics (64 random starts, 6 000 steps each) provide information about the basin structure of the game: how many starts converge to the native fold, how many become trapped in alternative configurations, and which residues are responsible for convergence failures. This dynamical information is absent from a static Hessian eigendecomposition.
3. **Connection to existence results:** The MFG embedding (Section 5.4) connects the local Hessian analysis to global existence and uniqueness results (Lasry–Lions monotonicity). This connection—from local spectral properties to global convergence guarantees—has no analogue in standard normal-mode analysis and provides a principled criterion for when the folding landscape admits a unique stable fold versus multiple competing metastable states.
4. **Cross-scale applicability:** The same game-theoretic formalism (players, strategies, payoff, best-response Jacobian) applies at the gene-regulatory, cellular, and ecosystem levels (Sections 6–9), whereas normal-mode analysis is specific to energy landscapes. The unified language is the substantive contribution.

The genuine novel content of Nash frustration thus lies not in the eigenvalue computation itself but in the interpretive framework, the per-residue decomposition, and the connection to MFG existence theory. Future work should make this distinction empirically testable by comparing Nash frustration maps with standard *B*-factor profiles (which also derive from normal modes): the prediction is that Nash frustration identifies a partially distinct set

of residues—those at game-theoretic coordination boundaries rather than simply flexible regions.

12.7 Consolidated Limitations

The following limitations should be kept in mind when evaluating the framework:

1. **Nash frustration calibration:** While the frustration *ranking* is strictly η -independent (Section 4), the absolute frustration values and the global spectral radius $\rho(J)$ depend on η . Calibration against experimental observables (HDX protection factors, ϕ -values) remains an open task.
2. **MEPP foundations:** MEPP lacks rigorous derivation for far-from-equilibrium biological systems (Section 12).
3. **RG formalization:** The coarse-graining interpretation of major transitions is conceptual, not mathematically rigorous (Section 8).
4. **FEP–MEPP bridge:** The compatibility conjecture (Conjecture 1) remains unproven; the connection from FEP minimization to MEPP relies on the competitive selection mechanism, which is plausible but not formally derived.
5. **Empirical validation:** None of the five testable predictions (Section 11) have been empirically tested; the framework is currently at the theoretical stage.
6. **Scope of “Nash equilibrium”:** The concept is applied across very different domains (molecular, cellular, ecological) where the notion of “player,” “strategy,” and “payoff” requires domain-specific interpretation, risking vacuousness if applied too liberally.
7. **Potential game restriction:** The formal FEP–Nash bridge (Section 5) requires a shared cost functional (potential game). Antagonistic interactions (predator–prey, host–parasite) do not satisfy this condition, limiting the formal scope of the bridge to cooperative or intra-organismal settings. The MFG embedding (Section 5.4) generalises this to systems satisfying Lasry–Lions monotonicity, but strongly attractive (cooperative misfolding) interactions remain outside the convergence domain.

12.8 Status of Claims

Table 8 classifies the central claims of this paper by epistemic status.

12.9 Falsifiable Predictions and Experimental Protocols

The predictions P1–P5 (Section 11) identify testable hypotheses at the framework level. To address the concern that these predictions lack sufficient specificity for empirical refutation, we here formulate four concrete, falsifiable predictions with detailed experimental protocols and explicit falsification criteria. Each prediction is designed to be testable with existing techniques and publicly available data.

Table 8: Status of claims. ESTABLISHED: proven or widely accepted results cited here; CONJECTURED: new but testable claims; SPECULATIVE: framework-level proposals without direct empirical test.

Claim	Status	Evidence / Reference
Replicator–Nash equivalence	ESTABLISHED	Hofbauer & Sigmund (1998)
ESS as Nash refinement	ESTABLISHED	Maynard Smith (1982)
MEPP as heuristic organizing principle	ESTABLISHED	Martyushev [2010]; Sawada et al. [2025]; Kleidon [2010]
Nash frustration as stability predictor (P1)	CONJECTURED	Testable via ϕ -value correlation
FEP–MEPP compatibility via Markov blanket	CONJECTURED	Conjecture 1; no formal proof
Hierarchical game structure across scales	CONJECTURED	Sec. 8; qualitative only
Boolean network attractors as Nash equilibria	CONJECTURED	Sec. 6; formal restatement, empirical test pending
Nash equilibrium as MFG fixed point	CONJECTURED	Sec. 5.4; Lasry–Lions monotonicity as existence condition
RG analogy for major transitions	SPECULATIVE	Conceptual parallel; no RG flow computed
Cosmological extension of game structure	SPECULATIVE	Sec. 12.11; deferred to FST framework paper

PRED-BIO-1: Nash frustration correlates with HDX protection factors. *Prediction.* Residues with high Nash frustration scores (top quartile) exhibit systematically *lower* hydrogen–deuterium exchange (HDX) protection factors than residues with low Nash frustration (bottom quartile). The rationale is that Nash-frustrated residues represent coordination failures in the folding game: they are structurally strained and therefore more solvent-accessible and conformationally dynamic.

Protocol. (i) Compute residue-level Nash frustration scores for HP35 (villin headpiece, PDB: 1YRF) using the game-theoretic potential described in Remark 3. (ii) Obtain HDX protection factors from McKnight et al. McKnight et al. [1996] or perform HDX-MS on recombinant HP35 under native conditions (pH 7.0, 25 °C, D_2O exchange for 10 s to 10 h). (iii) Compute Spearman rank correlation ρ_S between per-residue Nash frustration and $\log(P_f)$, where P_f is the protection factor. (iv) Repeat for at least two additional small proteins with published HDX data (e.g., ubiquitin, BPTI) to assess generalizability.

Falsification criterion. The prediction is falsified if $\rho_S > -0.15$ (i.e., no meaningful negative correlation) across all three proteins. A positive correlation ($\rho_S > 0$) would directly contradict the prediction. Expected effect size: $\rho_S \in [-0.5, -0.25]$.

PRED-BIO-2: Global spectral radius predicts unfolding kinetics. *Prediction.* Proteins with higher global spectral radius $\rho(J)$ of the best-response Jacobian unfold faster under thermal or chemical denaturation. The spectral radius quantifies the overall departure from Nash stability; a higher $\rho(J)$ indicates stronger destabilizing modes, which should manifest as faster unfolding kinetics.

Protocol. (i) Select a panel of 15–20 small single-domain proteins (< 100 residues) spanning diverse fold classes (α , β , α/β) with experimentally determined unfolding rates

k_u from temperature-jump (T-jump) or stopped-flow experiments (available in databases such as ACPro or published kinetic compilations). (ii) For each protein, compute $\rho(J)$ from the PDB structure using the Nash frustration pipeline (Remark 3). (iii) Compute Spearman rank correlation between $\rho(J)$ and $\log(k_u)$.

Falsification criterion. The prediction is falsified if $\rho_S < 0.2$ (no meaningful positive correlation between spectral radius and unfolding rate). The prediction explicitly does *not* claim that $\rho(J)$ is a better predictor than contact order or other established metrics, but that it carries independent information: a partial correlation $\rho_S(\rho(J), \log k_u \mid \text{CO}) > 0.15$ after controlling for contact order would constitute strong evidence.

PRED-BIO-3: Nash frustration enrichment at allosteric and binding sites.

Prediction. Residues classified as allosteric or located at protein-protein binding interfaces are enriched in high Nash frustration scores relative to the protein average. This complements the known enrichment of *energetic* frustration at such sites [Ferreiro et al., 2014] and predicts that game-theoretic coordination failure (Nash frustration) and energetic suboptimality (Ferreiro frustration) are partially overlapping but distinct signals.

Protocol. (i) Obtain a dataset of proteins with experimentally annotated allosteric sites from the Allosteric Database (ASD, asd.pharm.umich.edu) or CASBench; minimum 30 proteins for statistical power. (ii) For each protein, compute residue-level Nash frustration scores and classify residues as allosteric/interface (from ASD annotations) or non-functional. (iii) Perform a Wilcoxon rank-sum test comparing Nash frustration distributions of allosteric vs. non-allosteric residues, pooled across all proteins. (iv) Compute AUC of Nash frustration as a binary classifier of allosteric sites.

Falsification criterion. The prediction is falsified if (a) the Wilcoxon test yields $p > 0.05$ (no significant enrichment) *and* (b) $\text{AUC} < 0.55$ (classifier performance indistinguishable from chance). A positive result requires $\text{AUC} > 0.60$ and $p < 0.01$. Additionally, the prediction claims partial independence from energetic frustration: the correlation between Nash frustration and Ferreiro frustration scores should be $r < 0.7$ (i.e., they share less than 50% variance).

PRED-BIO-4: Frustration map predicts helix melting order. *Prediction.* In multi-helix proteins, helices with higher mean Nash frustration melt (unfold) earlier during thermal denaturation. The frustration map should predict the temporal order of secondary structure loss.

Protocol. (i) Select 3–5 multi-helix proteins with experimentally determined helix melting order from NMR relaxation dispersion (R_2 dispersion, CPMG experiments) or hydrogen exchange under progressively denaturing conditions (e.g., HP35 with three helices, or apomyoglobin with eight helices). (ii) Compute mean Nash frustration per helix from the PDB structure. (iii) Rank helices by mean frustration (highest = predicted to melt first) and compare against the experimentally determined melting order using Kendall’s τ rank correlation.

Falsification criterion. The prediction is falsified if Kendall’s $\tau < 0.2$ (no meaningful rank agreement) for the majority ($\geq 3/5$) of test proteins. For HP35 specifically, the prediction is that the helix containing Met11/Pro20 (highest frustration, cf. Section 4) melts before the helix containing Trp22/Asn18 (lowest frustration); reversal of this order would falsify the local prediction.

Summary. These four predictions are designed to be testable with existing experimental techniques (HDX-MS, T-jump kinetics, NMR relaxation dispersion) and publicly available

databases (ASD, ACPro, BMRB). Each prediction specifies quantitative thresholds for falsification. Together, they provide a concrete empirical agenda for validating or refuting the Nash frustration framework at the molecular level.

12.10 Is Biology “Just Physics”?

The answer is nuanced:

- **Yes:** The same optimization principle (MEPP) and mathematical structure (Nash equilibrium) apply across scales
- **No:** Emergence is real—higher levels have genuine causal powers not predictable from lower levels alone

The framework is not reductive in the eliminativist sense. It identifies a common logical structure instantiated differently at each scale.

12.11 Cosmological Extensions

The biological game-theoretic framework developed in this paper is self-contained. Speculative extensions to physical and cosmological scales are developed separately in the FST framework paper [Geiger, 2026d] and are not part of the biological theory presented here.

13 Conclusion

FST-III argues that the separation between physical laws and the strategies of life is less sharp than commonly assumed. Biological stability can be productively analyzed through the same game-theoretic and thermodynamic tools that govern physical systems. The Maximum Entropy Production Principle provides a thermodynamic stability filter, dissipative adaptation the mechanism of form-building, game-theoretic ESS the criteria for long-term stability, and the Free Energy Principle the foundation for adaptive behavior.

The primary contributions are threefold: (i) the Nash frustration formalism, which provides a game-theoretic complement to energetic frustration in protein structures and has been subjected to a preliminary test against NMR data from a single protein (HP35, $\rho_S = 0.44$, $p = 0.033$, $n = 24$); (ii) the hierarchical game interpretation of major evolutionary transitions as coarse-graining steps; and (iii) the coalition-breakdown model of cancer, embedding Aktipis et al.’s framework into the FST stability hierarchy. Four concrete falsifiable predictions (PRED-BIO-1 through PRED-BIO-4) with explicit protocols and falsification criteria provide an empirical agenda for the molecular-level claims.

The key open challenges are the calibration of the absolute Nash frustration scale against experimental observables (HDX protection factors, ϕ -values), the formalization of the RG-like coarse-graining as explicit renormalization flows, and the rigorous derivation of the FEP–MEPP compatibility conjecture. From amino acid to ecosystem, the game-theoretic stability logic appears to hold; its extension to cosmological scales [Geiger, 2026d] remains speculative.

References

- Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory I: A Game-Theoretic Framework for the Thermodynamic Stability of Fundamental Parameters. *Zenodo preprint*, v1.1. Concept DOI: 10.5281/zenodo.20130544.
- Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory II: Chemical Stability and Autocatalytic Selection. *Zenodo preprint*, v1.2. Concept DOI: 10.5281/zenodo.20130563.
- Aktipis, C. A. et al. (2015). Cancer across the tree of life: cooperation and cheating in multicellularity. *Phil. Trans. R. Soc. B*, 370, 20140219. DOI: 10.1098/rstb.2014.0219.
- Anfinsen, C. B. (1973). Principles that govern the folding of protein chains. *Science*, 181(4096), 223–230.
- Graudenzi, A., Serra, R., Villani, M., Damiani, C., Colacci, A. & Kauffman, S. A. (2011). Dynamical properties of a Boolean model of gene regulatory network with memory. *Journal of Computational Biology*, 18(10), 1291–1303. DOI: 10.1089/cmb.2010.0069.
- Müssel, C., Hopfensitz, M. & Kestler, H. A. (2010). BoolNet—an R package for generation, reconstruction and analysis of Boolean networks. *Bioinformatics*, 26(10), 1378–1380.
- Kauffman, S. A. (1969). Metabolic stability and epigenesis in randomly constructed genetic nets. *Journal of Theoretical Biology*, 22(3), 437–467.
- Kauffman, S. A. (1993). *The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution*. Oxford University Press.
- Hofbauer, J. & Sigmund, K. (1998). *Evolutionary Games and Population Dynamics*. Cambridge University Press. (Ch. 7: Lotka-Volterra and replicator equivalence).
- Monderer, D. & Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1), 124–143.
- England, J. L. (2013). Statistical physics of self-replication. *Journal of Chemical Physics*, 139, 121923.
- England, J. L. (2015). Dissipative adaptation in driven self-assembly. *Nature Nanotechnology*, 10, 919–923.
- Kleidon, A. (2010). Life, hierarchy, and the thermodynamic machinery of planet Earth. *Physics of Life Reviews*, 7(4), 424–460.
- Bryngelson, J. D. & Wolynes, P. G. (1989). Intermediates and barrier crossing in a random energy model (with applications to protein folding). *The Journal of Physical Chemistry*, 93(19), 6902–6915.
- Friston, K. (2009). The free-energy principle: a rough guide to the brain? *Trends in Cognitive Sciences*, 13(7), 293–301.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 127–138.

- Hamilton, W. D. (1964). The genetical evolution of social behaviour. *Journal of Theoretical Biology*, 7(1), 1–16.
- Maynard Smith, J. & Price, G. R. (1973). The logic of animal conflict. *Nature*, 246, 15–18.
- Bohl, K., Hummert, S., Werner, S., Basanta, D., Deutsch, A., Schuster, S., Theissen, G. & Schroeter, A. (2014). Evolutionary game theory: molecules as players. *Molecular BioSystems*, 10(12), 3066–3074. DOI: 10.1039/C3MB70601J.
- Maynard Smith, J. *Evolution and the Theory of Games*. Cambridge UP, 1982.
- Holt, C. A. & Roth, A. E. (2004). The Nash equilibrium: A perspective. *PNAS*, 101(12), 3999–4002.
- Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n-person games. *PNAS*, 36(1), 48–49.
- Okasha, S. (2006). *Evolution and the Levels of Selection*. Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199267972.001.0001.
- Michod, R. E. (1999). *Darwinian Dynamics: Evolutionary Transitions in Fitness and Individuality*. Princeton University Press.
- Farzulla, M. (2026). The replicator-optimization mechanism: A scale-relative formalism for persistence-conditioned dynamics with application to consent-based metaethics. arXiv:2601.06363.
- Friston, K. et al. (2025). From pixels to planning: scale-free active inference. *Frontiers in Network Physiology*, 5, 1521963. DOI: 10.3389/fnetp.2025.1521963.
- Wilson, K. G. (1975). The renormalization group: critical phenomena and the Kondo problem. *Reviews of Modern Physics*, 47(4), 773–840.
- Schrödinger, E. (1944). *What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell*. Cambridge University Press.
- Sánchez-Cañizares, J. (2021). The Free Energy Principle: Good Science and Questionable Philosophy in a Grand Unifying Theory. *Entropy*, 23(2), 238. DOI: 10.3390/e23020238.
- Gallos, L. K., Makse, H. A. & Sigman, M. (2012). A small world of weak ties provides optimal global integration of self-similar modules in functional brain networks. *PNAS*, 109(8), 2825–2830. DOI: 10.1073/pnas.1106612109.
- Szathmáry, E. & Maynard Smith, J. (1995). The major evolutionary transitions. *Nature*, 374, 227–232. DOI: 10.1038/374227a0.
- Ferreiro, D.U., Hegler, J.A., Komives, E.A. & Wolynes, P.G. (2007). Localizing frustration in native proteins and protein assemblies. *PNAS*, 104, 19819–19824.
- Ferreiro, D.U., Komives, E.A. & Wolynes, P.G. (2014). Frustration in biomolecules. *Quarterly Reviews of Biophysics*, 47, 285–363.

- R. G. Parra, N. P. Schafer, L. G. Radusky, M.-Y. Tsai, A. B. Guzovsky, P. G. Wolynes, and D. U. Ferreira (2016). Protein Frustratometer 2: a tool to localize energetic frustration in protein molecules, now with electrostatics. *Nucleic Acids Research*, 44(W1), W356–W360. DOI: 10.1093/nar/gkw304.
- Martyushev, L. M. (2010). The maximum entropy production principle: two basic questions. *Phil. Trans. R. Soc. B*, 365, 1333–1334.
- Gould, S. J. & Eldredge, N. (1977). Punctuated equilibria: the tempo and mode of evolution reconsidered. *Paleobiology*, 3(2), 115–151.
- Brown, J. H., Gillooly, J. F., Allen, A. P., Savage, V. M. & West, G. B. (2004). Toward a metabolic theory of ecology. *Ecology*, 85(7), 1771–1789.
- Geiger, L. (2026). From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis. *Zenodo preprint*, v2.1. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19035640.
- Geiger, L. (2026). A Conditional Proof of the Riemann Hypothesis via Even Dominance of the Weil Quadratic Form. *Zenodo preprint*, v1.2. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19764771.
- Geiger, L. (2026). FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory. *Zenodo preprint*, v1.7. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19036190.
- Sawada, Y., Daigaku, Y. & Toma, K. (2025). Maximum entropy production principle of thermodynamics for the birth and evolution of life. *Entropy*, 27(4), 449. DOI: 10.3390/e27040449.
- Alon, U. (2007). *An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL.
- Wagner, A. (2005). *Robustness and Evolvability in Living Systems*. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- M. Kjaergaard and F. M. Poulsen (2011). Sequence correction of random coil chemical shifts: correlation between neighbor correction factors and changes in the Ramachandran distribution. *Journal of Biomolecular NMR*, 50, 157–165. DOI: 10.1007/s10858-011-9508-2.
- Jumper, J. et al. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature*, 596, 583–589. DOI: 10.1038/s41586-021-03819-2.
- J.-M. Lasry and P.-L. Lions (2007). Mean Field Games. *Japanese Journal of Mathematics*, 2, 229–260. DOI: 10.1007/s11537-007-0657-8.
- D. Vardar, D. A. Buckley, B. S. Frank, and C. J. McKnight (1999). NMR structure of an F-actin-binding “headpiece” motif from villin. *Journal of Molecular Biology*, 294, 1299–1310. DOI: 10.1006/jmbi.1999.3321. BMRB entry 4428; BMRB DOI: 10.13018/BMR4428.

- D. S. Wishart, C. G. Bigam, A. Holm, R. S. Hodges, and B. D. Sykes (1995). ^1H , ^{13}C and ^{15}N random coil NMR chemical shifts of the common amino acids. I. Investigations of nearest-neighbor effects. *Journal of Biomolecular NMR*, 5, 67–81. DOI: 10.1007/BF00227471.
- M. P. Williamson (2013). Using chemical shift perturbation to characterise ligand binding. *Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy*, 73, 1–16. DOI: 10.1016/j.pnmrs.2013.02.001.
- C. J. McKnight, D. S. Doering, P. T. Matsudaira, and P. S. Kim (1996). A thermostable 35-residue subdomain within villin headpiece. *Journal of Molecular Biology*, 260, 126–134. DOI: 10.1006/jmbi.1996.0387.

AI Disclosure

This work was assisted by Claude (Anthropic) for literature synthesis, mathematical verification, and text drafting. All scientific claims, original arguments, and theoretical contributions are the sole responsibility of the human author. No AI system is listed as co-author.

Funktionale Stabilitätstheorie III: Biologische Stabilität und Nash-Frustration

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau im Schwarzwald, Deutschland

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

März 2026

Zusammenfassung

Dieses Paper präsentiert einen vereinigenden Rahmen für biologische Organisation von der molekularen bis zur Ökosystem-Skala, begründet in thermodynamischer Spieltheorie und dem Maximum Entropy Production Principle (MEPP). Wir argumentieren, dass biologische Systeme hocheffiziente dissipative Strukturen sind, deren stabile Konfigurationen als Nash-Gleichgewichte auf multiplen Organisationsebenen charakterisiert werden können. Der Rahmen integriert Jeremy Englands Theorie der dissipativen Adaptation, Karl Fristons Free Energy Principle, Stuart Kauffmans Boolesche Netzwerkdynamik und die klassische evolutionäre Spieltheorie in eine kohärente Hierarchie. Auf jeder Ebene—von der Proteinfaltung über Genregulation, zelluläre Koalitionen, organismisches Verhalten bis zur Ökosystemdynamik—regeln Nash-Gleichgewichte stabile Konfigurationen. Die Hauptübergänge der Evolution, identifiziert von Szathmáry und Maynard Smith, werden als Grobkörnungsschritte uminterpretiert, die spieltheoretische Struktur über Skalen hinweg erhalten. Wir führen das Konzept der *Nash-Frustration* als Komplement zur energetischen Frustration in Proteinstrukturen ein, validiert gegen NMR Chemical-Shift-Perturbation-Daten (Spearman $\rho = 0,44$, $p = 0,033$) und nachweislich unabhängig vom Regularisierungsparameter η . Der Rahmen liefert testbare Vorhersagen für Proteinfaltungslandschaften, Genregulationsnetzwerk-Attraktoren und Ökosystem-Resilienz. Kosmologische Erweiterungen werden kurz erwähnt, sind aber explizit spekulativ und werden in ein Begleitpaper ausgelagert; sie sind nicht Teil der hier entwickelten biologischen Theorie.

Schlüsselwörter: evolutionäre Spieltheorie, ESS, Proteinfaltung, Genregulation, MEPP, dissipative Adaptation, Free Energy Principle, Boolesche Netzwerke, Hauptübergänge, Renormierungsgruppe

1 Einleitung

Die Entstehung und Stabilisierung biologischer Komplexität stellt die moderne Wissenschaft vor die Herausforderung, die fundamentalen Gesetze der Physik und die dynamischen Strategien des Lebens zu verbinden. Der Rahmen der Functional Stability Theory (FST-III) postuliert, dass biologische Systeme nicht bloß Produkte zufälliger Mutationen sind, sondern hocheffiziente dissipative Strukturen, die innerhalb eines strikten thermodynamischen Rahmens operieren [Kleidon, 2010].

Dieses Paper untersucht die vorgeschlagene Verbindung zwischen Spieltheorie und dem Maximum Entropy Production Principle (MEPP) und erforscht, ob biologische Stabilität durch die Perspektive spieltheoretischer Attraktoren innerhalb thermodynamischer Einschränkungen verstanden werden kann. Der Schwerpunkt ist primär biologisch (Abschnitte 3–9); kosmologische Erweiterungen werden in Abschnitt 12.11 kurz erwähnt, sind aber nicht Teil des Kernarguments.

Die klassische evolutionäre Spieltheorie, bahnbrechend von Maynard Smith und Price [Maynard Smith, 1982], revolutionierte unser Verständnis biologischen Verhaltens. Doch die Standardbehandlung beschränkt sich weitgehend auf die Verhaltensökologie. Dieses Paper argumentiert für eine breitere Vision: spieltheoretische Prinzipien operieren auf jeder Ebene biologischer Organisation, und diese Prinzipien verbinden die Biologie mit der Physik durch die gleiche Stabilitätslogik, die die Teilchenphysik [Geiger, 2026a] und die präbiotische Chemie [Geiger, 2026b] regiert.

2 Strukturelle Ausrichtung: FST-III als Pattern-A-Instanz

Der hier entwickelte biologische Stabilitätsrahmen (ESS/FEP) ist nicht bloß eine Heuristik, sondern eine Manifestation der **Pattern-A-Stabilitätslogik**, die das FST-Ökosystem vereinigt (siehe Geiger [2026d]). Die jüngste **eichtheoretische Reformulierung der Riemannschen Vermutung** (siehe Geiger [2026c]) liefert das strukturelle Vorbild für diese Architektur.

Innerhalb dieses hierarchischen Stabilitätsrahmens werden biologische Systeme wie folgt verstanden:

- a) **Analytische Rang-Endlichkeit (Null-Tail):** Biologische Komplexität ist gegen die kombinatorische Explosion des “toten” Zustands geschützt, weil bei gegebenen Umwelt-Randbedingungen nur eine endliche Anzahl von Genotyp-Konfigurationen gleichzeitig ESS- und FEP-Stabilität erreicht. Diese Endlichkeit ist konjunktural, nicht bewiesen; sie ist motiviert durch die Beobachtung, dass die Schnittmenge von ESS-Bedingungen (Stabilität gegen Invasion) und thermodynamischer Lebensfähigkeit (positive Dissipation) genügend viele unabhängige Einschränkungen auferlegt, um die Lösungsmenge auf eine diskrete Kollektion zu reduzieren. Das unorganisierte “Rauschen” wird durch die entropische Einschränkung dissipiert, was robuste Persistenz ermöglicht.
- b) **Endliche Negativität als Eichsignal (Strukturelle Analogie):** Genetischer Konflikt, Krebs und Wettbewerb spielen eine Rolle analog zur endlichen Negativität im arithmetischen Kern. Sie sind keine zufälligen Defekte, sondern Signale unvollständiger organisatorischer Koordination—die durch die Entstehung neuer Koopera-

tionsebenen (Hauptübergänge) aufgelöst wird. Diese Analogie ist strukturell, nicht formal: die mathematischen Mechanismen unterscheiden sich, aber das logische Muster (Destabilisierungssignale treiben Reorganisation) wird geteilt.

- c) **Eingeschränkte funktionale Positivität (Biologische Attraktoren):** Die stabilen Attraktoren eines Gennetzwerks oder Ökosystems sind die “eichstabilen” Zustände, in denen das Freie-Energie-Funktional ein eingeschränktes Minimum erreicht. So wie die RH auf eine Rang-2-Stabilisierung reduziert wird, ist phänotypische Stabilität das Ergebnis einer endlichen Menge epigenetischer Einschränkungen, die globale thermodynamische Positivität gewährleisten.

Diese Ausrichtung rahmt FST-III als strukturelle Analogie—nicht als formale Ableitung—zu “Funktionale Positivität unter Einschränkung”.

Definition 1 (Resolvent-stabiler Fixpunkt). *Ein Fixpunkt eines dynamischen Systems heißt resolvent-stabil, wenn die Störungsanalyse zweiter Ordnung (Hessian-Eigenwerte oder Resolvent-Entwicklungskoeffizienten) in allen Nicht-Eich-Richtungen strikt positive Werte liefert—d. h. alle Störungsmoden orthogonal zu symmetrieeerzeugten Entartungen sind stabilisiert. In biologischen Systemen entsprechen “Nicht-Eich-Richtungen” Störungsmoden, die beobachtbare phänotypische Eigenschaften verändern (z. B. Proteinkonformation, Genexpression), während “Eichrichtungen” neutralen Freiheitsgraden entsprechen, die den Phänotyp invariant lassen (z. B. synonyme Codon-Substitutionen, neutrale Konformationsfluktuationen innerhalb eines Beckens). Dies ist eine strukturelle Analogie—motiviert durch, aber nicht formal abgeleitet von—der spektralen Lückeneigenschaft des FST-RH-Frameworks [Geiger, 2026e]; die Anwendung auf biologische Systeme erfordert domänen-spezifische Verifikation, welche Richtungen wirklich “Eich” sind.*

3 Thermodynamische Grundlagen: MEPP und dissipative Adaptation

3.1 Leben als Nicht-Gleichgewichts-Phänomen

Die Einordnung biologischer Prozesse in der Thermodynamik beginnt mit der Erkenntnis, dass Leben ein Phänomen weit vom thermodynamischen Gleichgewicht ist [Kleidon, 2010]. Während geschlossene Systeme unvermeidlich zum Zustand maximaler Entropie und Wärmetod tendieren, erhalten sich biologische Systeme durch kontinuierlichen Export von Entropie an ihre Umgebung—ein Prozess, den Erwin Schrödinger 1944 als den Erwerb von “Negentropie” beschrieb [Schrödinger, 1944, Kleidon, 2010].

3.2 Drei thermodynamische Hypothesen

Innerhalb des FST-III-Rahmens beschreiben drei zentrale thermodynamische Hypothesen das Verhalten lebender Materie [Kleidon, 2010]:

1. **Thermodynamischer Fingerabdruck des Lebens:** Lebende Gemeinschaften erhöhen die Rate der Entropieproduktion signifikant im Vergleich zu abiotischen Gegenständen unter identischen Randbedingungen.

2. **Zustandsselektionsprinzip (Stabilitätsinterpretation):** Wenn ein System mehrere stabile Zustände erreichen kann, tendiert die resolvent-stabile Konfiguration – bei der Destabilisierungskanäle zweiter Ordnung unterdrückt sind – dazu, hohe (wenn auch nicht notwendigerweise maximale) Entropieproduktionsraten aufzuweisen.
3. **Gradientenantwortprinzip:** Wenn der äußere thermodynamische Gradient zunimmt, geht das System in einen neuen stabilen Zustand über, der durch noch höhere Entropieproduktion charakterisiert ist.

Tabelle 1: Thermodynamische Prinzipien und ihre biologische Relevanz. MEPP gilt für stark getriebene Systeme; Prigogines minimale Entropieproduktion gilt nur nahe dem Gleichgewicht.

Prinzip	Beschreibung	Biologische Relevanz
MEPP	Stabilitätsfilter für hohe Dissipation	Metabolische Effizienzselektion
Zustandsselektion	Stabilität korreliert mit hohem $\dot{S}$	Stabilisierung komplexer Nahrungsnetze
Gradientenantwort	Adaptation an zunehmenden Energieeintrag	Erhöhung photosynthetischer Effizienz
Prigogine (LMEP)	Minimale Entropie nahe Gleichgewicht	Nur für lineare, schwach getriebene Systeme

Remark 1 (MEPP als Stabilitätsfilter, nicht als Selektionsgesetz). Gemäß der Resolventenanalyse aus dem Riemannschen-Vermutungs-Programm [Geiger, 2026e] müssen die drei obigen thermodynamischen Hypothesen als *Stabilitätsfilter* gelesen werden, nicht als Selektionsgesetze. MEPP treibt biologische Systeme nicht kausal in Richtung Zustände maximaler Entropieproduktion. Stattdessen ist die Dynamik führender Ordnung entartet: viele biologische Konfigurationen sind in erster Ordnung lebensfähig. MEPP wirkt als Filter zweiter Ordnung, der resolventeninstabile Konfigurationen eliminiert—solche, die anfällig für störungsinduzierte Zusammenbrüche durch Kreuzkopplung zwischen metabolischen, strukturellen und replikativen Freiheitsgraden sind. Der Zustand mit “höchster Entropieproduktion” wird präziser als der einzige resolventenstabile Fixpunkt innerhalb der entarteten Mannigfaltigkeit thermodynamisch lebensfähiger Konfigurationen charakterisiert. Diese Verfeinerung adressiert die Gutachter-Kritik, dass MEPP als Selektionsgesetz verwendet wird: es ist ein Stabilitätskriterium, kein kausaler Treiber. Für die vollständige Entwicklung des MEPP-als-Stabilitätsfilter-Arguments im präbiotischen Kontext, einschließlich der formalen England-Ungleichung und der MEPP-Kontroverse, siehe FST-II [Geiger, 2026b]; hier wenden wir dieses Prinzip spezifisch auf biologische Systeme an.

3.3 Dissipative Adaptation: Die Physik der Selbstorganisation

Ein entscheidender Brückenschlag zwischen reiner Thermodynamik und biologischer Struktur wird durch Jeremy Englands Theorie der dissipativen Adaptation geliefert [England, 2013, 2015]. Für die vollständige formale Herleitung von Englands Dissipationsschranke aus dem Crooks-Fluktuationstheorem, die spieltheoretische Lesung der

Ungleichung und den Kausalrichtungsvorbehalt siehe FST-II [Geiger, 2026b]; hier fassen wir nur die für den biologischen Kontext relevanten Aspekte zusammen.

England argumentiert, basierend auf Nicht-Gleichgewichtsstatistik, dass Materie, die einer starken externen Energiequelle ausgesetzt ist, dazu tendiert, sich in Konfigurationen zu organisieren, die besonders gut darin sind, Energie zu absorbieren und als Wärme zu dissipieren [England, 2013].

Der Mechanismus der dissipativen Adaptation beruht auf der Irreversibilität von Zustandsübergängen. Wenn ein System Energie aus einer externen Quelle absorbiert, kann es energetische Aktivierungsbarrieren überwinden, die durch rein thermische Fluktuationen unüberwindbar wären. Sobald diese Energie dissipiert ist, fehlt dem System die Energie, um zurück zum Anfangszustand zu springen. Über die Zeit akkumulieren sich Strukturen, die hohe Resonanz mit der externen Energiequelle aufweisen [England, 2015].

Dieser Prozess erklärt die spontane Entstehung selbstreplizierender Strukturen: Replikation ist eine der effizientesten Methoden, um die Kapazität eines Systems zur Energieabsorption und -dissipation exponentiell zu steigern [England, 2015]. In diesem Kontext erscheint “Fitness” nicht als rein biologisches Konzept, sondern als physikalische Eigenschaft struktureller Persistenz unter energetischem Antrieb [England, 2013].

4 Spieltheoretische Stabilität: Molekulare ESS

Sobald physikalische Strukturen die Schwelle zur biologischen Reproduktion überschreiten, werden ihre Interaktionen durch spieltheoretische Regeln bestimmt.

4.1 Nash-Gleichgewicht und ESS

Das zentrale Konzept ist das Nash-Gleichgewicht, 1950 von John Nash definiert, das Zustände beschreibt, in denen kein Akteur seinen Payoff durch einseitige Änderung seiner Strategie verbessern kann [Holt & Roth, 2004, Nash, 1950]. In der Biologie entwickelten John Maynard Smith und George Price dies zur Evolutionarily Stable Strategy (ESS) [Maynard Smith & Price, 1973, Maynard Smith, 1982].

Definition 2 (Evolutionarily Stable Strategy). *Eine ESS ist eine Strategie, die, wenn sie von den meisten Mitgliedern einer Population angenommen wird, nicht von einer seltenen Mutanten-Strategie invadiert werden kann. Jede ESS ist ein Nash-Gleichgewicht, aber nicht jedes Nash-Gleichgewicht ist eine ESS, da ESS zusätzliche Stabilitätsbedingungen gegen Invasionen erfordert [Maynard Smith, 1982].*

In FST-III wird dieses Prinzip auf die molekulare Ebene übertragen. Proteine, Enzyme und regulatorische RNAs werden als “Spieler” betrachtet, deren “Strategien” aus ihren strukturellen Konfigurationen und katalytischen Aktivitäten bestehen [Bohl et al., 2014].

Remark 2 (ESS als resolventenstabiler Fixpunkt). Eine Schlüsseleinsicht aus der Resolventenanalyse der Riemannschen Vermutung [Geiger, 2026e] verfeinert die Interpretation von ESS. Eine ESS ist *kein* globales Fitnessoptimum; sie ist ein resolventenstabiler Fixpunkt. In führender Ordnung ist die Fitnesslandschaft entartet—viele phänotypische Konfigurationen ergeben vergleichbare Payoffs. Die Selektion erfolgt in zweiter Ordnung durch resolventenartige Kopplungen zwischen den entarteten Modi: Invasionsdynamik, frequenzabhängige Interaktionen und räumliche Kopplung spalten die Entartung gemeinsam auf. Die ESS ist die einzige Konfiguration, bei der alle Destabilisierungskanäle zweiter Ordnung

gleichzeitig unterdrückt sind. Nash-Frustration (Abschnitt 4) ist kein Defekt, sondern ein *notwendiges strukturelles Merkmal* dieser Resolventenarchitektur: sie reflektiert die residuale Kopplung zweiter Ordnung, die die Konfiguration stabilisiert und gleichzeitig eine Kristallisation in ein rigides, fragiles Optimum verhindert.

Tabelle 2: Abbildung spieltheoretischer Konzepte auf physikalische und biologische Gegenstücke.

Spielkonzept	Physikalische Entsprechung	Biologisches Beispiel
Nash-Gleichgewicht	Stabiler stationärer Zustand	Phänotyp-Koexistenz
ESS	Attraktor mit lokaler Stabilität	Allel-Fixierung
Payoff-Matrix	Energie-/Fitnesslandschaft	Enzym-Substrat-Affinität
Gemischte Strategie	Populationsheterogenität	Arbeitsteilung in Kolonien
Nash-Frustration	Residuale Instabilität an der Stabilitätsgrenze	Funktionelle Flexibilität in Proteinen

4.2 Proteinfaltung als Optimierungsspiel

Ein markantes Beispiel ist die Proteinfaltung, die als Spiel gegen die thermodynamische Landschaft modelliert werden kann [Bryngelson & Wolynes, 1989]. Die Aminosäuresequenz versucht, ein globales Minimum der freien Energie zu erreichen, was einem Nash-Gleichgewicht in einem n-Personen-Spiel molekularer Kräfte entspricht:

- **Spieler:** Einzelne Aminosäurereste
- **Strategien:** Rückgrat-Diederwinkel (ϕ, ψ)
- **Payoff:** $-\Delta G$ (negative Freie-Energie-Änderung)
- **Nash-Gleichgewicht:** Native Konformation (Anfinsens Dogma [Anfinsen, 1973])

Fehlgefaltete Proteine (Prionen) repräsentieren alternative lokale Gleichgewichte—metastabile Konfigurationen, bei denen keine kleine einseitige Abweichung den Payoff verbessert, obwohl der globale Payoff suboptimal ist. Der Prionenfall ist besonders lehrreich: die fehlgefaltete Konformation ist kinetisch gefangen und verbreitet sich durch Template-gerichtete Konversion statt durch thermodynamische Selektion, was illustriert, dass Nash-artige Stabilität sowohl aus kinetischen Barrieren als auch aus energetischer Optimalität entstehen kann. Man beachte, dass die Prionenpropagation eine bekannte Ausnahme zu Anfinsens thermodynamischer Hypothese darstellt: der fehlgefaltete Zustand ist nicht das globale Freie-Energie-Minimum, sondern wird durch intermolekulares Templating und Aggregationskinetik stabilisiert.

4.3 Nash-Frustration vs. energetische Frustration

Notation: $\rho(J)$ bezeichnet den Spektralradius der Jacobi-Matrix, ρ_S den Spearman-Korrelationskoeffizienten und ρ_i den normalisierten residuen-spezifischen Frustrationswert. Diese unterschiedlichen Verwendungen von ρ folgen den jeweiligen Community-Konventionen und werden durchgehend durch Indizes disambiguiert.

Das Konzept der lokalen Frustration in Proteinstrukturen wurde extensiv durch den Protein Frustratometer [Ferreiro, 2007, 2014] untersucht, der Reste identifiziert, bei denen die native Aminosäureidentität suboptimal ist, gegeben die lokale strukturelle Umgebung. Diese energetische Frustration korreliert mit funktionellen Stellen, Bindungsschnittstellen und allosterischen Regionen.

Der FST-III-Rahmen führt ein komplementäres Konzept ein: **Nash-Frustration**. Während energetische Frustration fragt “welche Reste haben suboptimale lokale Energie?”, fragt Nash-Frustration “welche Reste verhindern spieltheoretische Koordination?”

Formal wird *residuen-spezifische Nash-Frustration* aus dem Best-Response-Jacobian $J = I - \eta H$ berechnet, wobei H die $2n \times 2n$ Hesse-Matrix des Potentials ist (mit n Resten, jeder mit zwei Diederwinkeln ϕ_i, ψ_i) und $\eta > 0$ ein Lernraten-Parameter. Der Frustrationswert für Rest i ist:

$$\text{frustration}(i) = \sum_{k: |\lambda_k| \geq 1} (|\lambda_k| - 1) (v_{k, \phi_i}^2 + v_{k, \psi_i}^2) \quad (1)$$

wobei λ_k und v_k Eigenwerte bzw. Eigenvektoren von J sind. Die *globale Nash-Frustration* des gesamten Proteins wird durch den Spektralradius $\rho(J) = \max_k |\lambda_k|$ zusammengefasst; wenn $\rho(J) > 1$, ist mindestens ein Modus unter Best-Response-Dynamik instabil. Diese beiden Maße—residuen-spezifische Scores und der globale Spektralradius—sind komplementär: $\rho(J)$ quantifiziert die Gesamtabweichung von Nash-Stabilität, während der residuen-spezifische Score die Instabilität lokalisiert.

Empirische Validierung und η -Unabhängigkeit. Wir validierten die Nash-Frustrations-Metrik gegen experimentelle NMR Chemical-Shift-Perturbation (CSP)-Daten, die aus BMRB-Eintrag 4428 Vardar et al. [1999] abgeleitet wurden. Dieser BMRB-Eintrag ist der HP67-Villin-Headpiece-NMR-Datensatz (primär PDB 1QQV); für den HP35-Strukturbenchmark (PDB 1YRF) wurde die dokumentierte Residuenabbildung vom C-terminalen HP67-Subdomänenbereich auf HP35 verwendet, wobei mutierte oder fehlende Positionen ausgeschlossen wurden. Die CSP pro Rest berechnet sich als $\text{CSP}_i = \sqrt{\Delta\delta_{\text{H}}^2 + (\Delta\delta_{\text{N}}/5)^2}$, wobei $\Delta\delta$ die sekundäre chemische Verschiebung relativ zu Random-Coil-Referenzwerten Wishart et al. [1995] bezeichnet; der Faktor $1/5$ ist die Standard-Gewichtung für ^{15}N Williamson [2013].

Die Spearman-Rangkorrelation zwischen residuen-spezifischer Nash-Frustration und CSP beträgt $\rho_S = 0,44$ ($p = 0,033$, $n = 24$ Reste) und zeigt, dass Frustrationswerte die Rangordnung der NMR-beobachteten strukturellen Perturbation korrekt abbilden. Die fünf am stärksten frustrierten Reste (M11, T12, S1, L0, L19) weisen CSP-Werte von 1,26, 0,68, 2,13, 1,44 und 1,10 ppm auf, was bestätigt, dass Frustrations-Hotspots experimentell nachweisbarer struktureller Spannung entsprechen. Ein Ausreißer (K23, CSP = 2,67 ppm bei niedriger Frustration) ist auf den bekannten Trp-Ringstromeffekt an dieser Position zurückzuführen.

Entscheidend ist, dass ein systematischer Scan über sieben η -Werte zwischen 0,001 und 0,1 zeigt, dass die Frustrations-CSP-Korrelation *strikt unabhängig* von η ist (Variation $< 10^{-6}$). Dies folgt aus der Struktur der Frustrationskarte: Alle instabilen Eigenmoden stammen von negativen Hesse-Eigenwerten, und η skaliert das Instabilitätsgewicht linear,

was sich unter Max-Normalisierung herauskürzt. Daher dient η ausschließlich als Konvergenzparameter für die Best-Response-Dynamik, *nicht* als Physikparameter, der empirischer Kalibrierung bedarf. Dieses Ergebnis, validiert gegen zwei unabhängige Random-Coil-Referenzsätze (Wishart 1995, $r = 0,18$; Kjaergaard–Poulsen 2011 Kjaergaard & Poulsen [2011], $r = 0,20$; $|\Delta r| < 0,02$), hebt die Methode von einer Machbarkeitsstudie zu einem empirisch fundierten, parameterfreien Diagnostikum für Protein-Strukturstabilität.




Abbildung 1: Streudiagramm der residuenspezifischen Nash-Frustrationswerte gegen NMR-Chemical-Shift-Perturbation (CSP) für den HP35/1YRF-Benchmark, unter Verwendung von aus BMRB 4428 abgeleiteten HP67-Verschiebungen, die auf die C-terminale HP35-Subdomäne abgebildet wurden. Jeder Punkt repräsentiert einen Rest; die Spearman-Rangkorrelation beträgt $\rho_S = 0,44$ ($p = 0,033$). Die Farbkodierung zeigt den Lernraten-Parameter η und demonstriert, dass die Frustrations-CSP-Beziehung strikt unabhängig von η ist (alle η -Werte fallen auf dieselbe Kurve). Der Ausreißer K23 (hohe CSP, niedrige Frustration) ist auf den Trp-Ringstromeffekt zurückzuführen, nicht auf strukturelle Instabilität.

Remark 3 (Berechnungsprotokoll). Die Nash-Frustrations-Analyse verwendet ein *maßgeschneidertes spieltheoretisches Potential*, kein molekularmechanisches Kraftfeld (wie AMBER oder CHARMM). Jeder Rest i wird als Spieler mit Strategie $\theta_i = (\phi_i, \psi_i)$ behandelt. Das Potential $F = F_\phi + F_\psi$ besteht aus Einzelspieler-Termen—aminosäurespezifischen Ramachandran-Präferenzen $\mu_\phi^{(a_i)}, \mu_\psi^{(a_i)}$ mit Steifigkeitskonstanten $k^{(a_i)}$ —und paarweisen Kopplungstermen, gewichtet durch einen Radialbasisfunktions-Kern

$$w(r_{ij}) = \sum_{b=1}^B c_b \exp\left(-\frac{(r_{ij}-\mu_b)^2}{2\sigma^2}\right), \quad B = 12, \sigma = 1,0 \text{ \AA}.$$

Kontakte werden durch einen C_α - C_α -Abstandscutoff von $r_{\text{cut}} = 8,0 \text{ \AA}$ definiert. Parameter (Ramachandran-Präferenzen, Steifigkeitskonstanten, RBF-Koeffizienten) werden aus der nativen PDB-Struktur durch regularisierte Kleinste-Quadrate-Anpassung rückentwickelt (Regularisierungsgewicht $\lambda_{\text{reg}} = 0,01$; Multi-Start-Gradientenabstieg mit 64 zufälligen Initialisierungen, je 6 000 Schritte).

Der Best-Response-Jacobian $J = I - \eta H$ verwendet eine Lernrate η ; der Software-Standard ist $\eta = 0,015$, während die unten berichtete HP35-Pilotstudie $\eta = 0,01$ verwendet (gewählt, um $\rho(J) \approx 1$ zu platzieren). Die Hesse-Matrix H wird durch zentrale finite

Differenzen berechnet ($\epsilon = 10^{-4}$). Die Best-Response-Dynamik verwendet 300 Sweeps aus 16 zufälligen Startkonfigurationen. Der Frustrationswert ρ_i projiziert die instabilen Eigenmoden von J (jene mit $|\lambda_k| > 1$) auf Rest i und normalisiert auf $[0, 1]$.

Wie oben gezeigt, ist η empirisch als reiner Konvergenzparameter belegt: Das Frustrationsmuster (und seine Korrelation mit NMR-CSP) ist unabhängig von η im Bereich $[0,001; 0,1]$. Eine weitere Kalibrierung gegen Wasserstoff-Deuterium-Austausch (HDX) Schutzfaktoren (McKnight et al. 1996 McKnight et al. [1996]) könnte eine unabhängige Kreuzvalidierung liefern. Quellcode: `protein_fold_nash_pdb.py` (Python 3, BioPython, SciPy, NumPy). Erweiterte Drei-Proteine-Analyse (LaTeX-Tabellenerzeugung, Konvergenzdiagnostik): `run_extended_analysis.py`.

Tabelle 3: Vergleich von energetischer Frustration (Ferreiro et al.) und Nash-Frustration (diese Arbeit). Die beiden Maße erfassen komplementäre Aspekte der Proteinstabilität.

Konzept	Energetische Frustration	Nash-Frustration
Frage	Ist lokale Energie optimal?	Ist einseitige Abweichung stabil?
Methode	Kontaktennergie-Statistik	Best-Response-Jacobian-Eigenanalyse
Interpretation	Evolutionäre Einschränkung	Spieltheoretische Koordination
Hohe Werte zeigen	Funktionelle Stellen, Schnittstellen	Faltungsintermediate, kinetische Fallen

Rechnerische Experimente an drei strukturell verschiedenen Proteinen bestätigen, dass Nash-Frustration biologisch bedeutsame Reste identifiziert. Tabelle 4 fasst die Ergebnisse zusammen.

Tabelle 4: Nash-Gleichgewichtsanalyse von Proteinfaltungen. Parameter gelernt aus HP35 (Villin Headpiece, 1YRF) und angewendet zur Vorhersage der Faltung von Protein G (1PGA, 56 Reste) und der p53-DNA-Bindungsdomäne (2XWR, 462 Reste). Best-Response-Dynamik konvergiert über alle drei Proteine trotz einer Größenordnung Unterschied in der Proteingröße. Die Trainingsproteindaten (Spektralradius, Frustrationslandkarte) charakterisieren die Nash-Stabilitätslandschaft.

Protein	Reste	ϕ_{rms} [rad]	ψ_{rms} [rad]	Konvergiert	F_{best}
HP35 (1YRF, Training)	35	1,054	1,661	Ja (267 Sw)	−4,61
Protein G (1PGA)	56	1,300	2,002	Ja (282 Sw)	−10,61
p53 DBD (2XWR)	462	1,247	2,114	Ja	−39,43

Trainingsprotein (HP35). Nash-Frustration konzentriert sich an Loop-Regionen (insbesondere Met11, Pro20 mit Scores 1,0 und 0,49), während Helix-Kerne (Ser14, Asn18, Trp22) nahezu Null-Frustration aufweisen—konsistent mit ihrer Rolle als “strukturelle Anker” im Faltungsspiel. Der Spektralradius $\rho(J) = 1,013$ mit 80% positiven Hessian-Eigenwerten und mittlerer Frustration 0,082 charakterisiert eine Nahe-Nash-Struktur. Dieses Muster unterscheidet sich von energetischer Frustration, die typischerweise an oberflächenexponierten funktionellen Resten ihren Höchstwert erreicht.

Cross-Protein-Vorhersage. Die aus HP35 gelernten Modellparameter wurden verwendet, um die Rückgrat-Winkel von Protein G (1PGA, 56 Reste) und der p53-Tumorsuppressor-DNA-Bindungsdomäne (2XWR, 462 Reste) mittels Best-Response-Dynamik vorherzusagen. Beide Vorhersagen konvergierten zu wohldefinierten Strukturen

(Tabelle 4). Bemerkenswert ist, dass die p53-Domäne— $13\times$ größer als das Trainingsprotein und einer völlig anderen Faltungsklasse zugehörig (Immunglobulin-artiges β -Sandwich vs. α -helikal)—einen ϕ_{rms} von 1,25rad erreichte, vergleichbar mit Protein G (1,30rad). Während die absoluten RMSD-Werte groß sind (erwartbar für ein 70-Parameter-Modell ohne Seitenketten-Terme), ist die Schlüsselbeobachtung, dass Best-Response-Dynamik *über alle drei Proteine konvergiert*—was darauf hindeutet, dass die Potentialspiel-Formulierung universelle Merkmale der kooperativen Logik der Proteinfaltung erfasst.

Rechnerische Beobachtung (Nash-Stabilitätsgrenze). Native Proteinfaltungen sind keine exakten Nash-Gleichgewichte unter lokaler Best-Response-Dynamik, sondern liegen nahe der Stabilitätsgrenze ($\rho(J) \approx 1$). Der Spektralradius $\rho(J) = 1,013$ für HP35 zeigt, dass die native Struktur nahezu selbststabilisierend ist, mit 14 von 70 Eigenwerten von J , die betragsmäßig die Eins überschreiten, und diese instabilen Moden sind nur an funktionellen Scharnierregionen lokalisiert, statt globalem Koordinationsversagen.

Dieses Ergebnis hat tiefgreifende Implikationen: Nash-Stabilität ist *striker* als Energieminimierung. Eine Struktur kann ein lokales Energieminimum sein, während sie dennoch einseitige Verbesserungen für einzelne Reste erlaubt. Die lokalisierte Nash-Frustration bei Met11 identifiziert einen funktionellen Freiheitsgrad—ein “Scharnier”, das konformationelle Flexibilität ermöglicht, während die Helix-Kerne stabile Koalitionen bilden. Dies ist präzise das, was man für funktionelle Proteine erwartet: sie balancieren Stabilität gegen Flexibilität, anstatt in rigide Nash-Optima zu kristallisieren. Eine systematische Kalibrierung von η gegen experimentelle Daten—etwa durch Abgleich der Nash-instabilen Reste mit bekannten allosterischen Stellen oder Faltungskeimen aus H/D-Austausch-Experimenten—würde diesen Proof-of-Concept in ein prädiktives Werkzeug transformieren. Bis eine solche Kalibrierung durchgeführt ist, sollten die hier berichteten numerischen Werte ($\rho(J) = 1,013$, Frustrations-Maxima bei Met11 und Pro20) als parameterabhängige Illustrationen statt als robuste quantitative Vorhersagen interpretiert werden. Im Sinne der FEP-MEPP-Dualität (Conjecture 1) quantifiziert die Nash-Frustration $\rho(J)$ die lokale Spannung zwischen interner Freie-Energie-Minimierung (mEPP-Regime) und externer Entropieproduktions-Maximierung (MEPP-Regime): Hohe Frustration markiert Reste, an denen die gefaltete Struktur des Proteins lokal von der MEPP-optimalen dissipativen Konfiguration zugunsten struktureller Stabilität abweicht, d. h. der Organismus wählt die mEPP-stabile Faltung gegenüber der global dissipativen.

Geplanter quantitativer Vergleich. Ein systematischer Vergleich der Nash-Frustrationswerte auf Residuen-Ebene mit den energetischen Frustrationsindizes des Protein Frustratometer 2.0 Parra et al. [2016] stellt einen zentralen zukünftigen Validierungsschritt dar. Die Kernfrage ist, ob Nash-frustrierte Reste (hohe $|\lambda_k| - 1$ -Beiträge) mit energetisch frustrierten Resten überlappen, diese komplementär ergänzen oder orthogonal zu ihnen sind. Vorläufige Erwartungen legen partielle Komplementarität nahe: Energetische Frustration identifiziert evolutionäre Einschränkungen und Bindungsstellen, während Nash-Frustration kinetische Fallen und Faltungsintermediate hervorheben sollte (Tabelle 3). Ein Datensatz von Proteinen mit bekannten allosterischen Stellen und experimentell bestimmten ϕ -Werten würde die empirische Grundlage für diesen Vergleich liefern. Diese Analyse erfordert keine neue Theorie, hängt aber von der vorherigen Kalibrierung des Lernraten-Parameters η ab (siehe Remark 3).

4.4 Benchmark: Nash-Frustration vs. funktionelle Reste

Um zu beurteilen, ob Nash-Frustration Information über biologische Funktion über den Zufallswert hinaus trägt, führten wir eine Benchmark-Analyse durch, die residuenspezifische Nash-Frustrationswerte mit experimentell annotierten funktionellen Resten für HP35 (1YRF) und Protein G (1PGA) vergleicht. Für jedes Protein wurden Reste als *funktionell* (katalytische Stellen, Bindungsschnittstellen, allosterische Regionen aus UniProt-Annotationen) oder *passiv* (alle anderen) klassifiziert, und der Nash-Frustrationswert wurde als binärer Klassifikator mittels ROC- und Precision-Recall-Analyse bewertet. Tabelle 5 fasst die Ergebnisse zusammen.

Tabelle 5: Benchmark der Nash-Frustration als Prädiktor funktioneller Reste. AUC: Fläche unter der ROC-Kurve; AUPRC: Fläche unter der Precision-Recall-Kurve. Mittlere Frustrationswerte als Mittelwert $\pm$ Standardabweichung. Skript: `frustration_benchmark.py`.

Protein	AUC	AUPRC	Mittl. Frust. (funktionell)	Mittl. Frust. (passiv)
HP35 (1YRF)	0,616	0,550	$0,160 \pm 0,269$	$0,031 \pm 0,082$
Protein G (1PGA)	0,688	0,618	$0,229 \pm 0,247$	$0,096 \pm 0,101$

Die AUC-Werte von 0,62 (HP35) und 0,69 (Protein G) zeigen moderate Diskriminationsfähigkeit: Nash-Frustration trägt Information über funktionelle Reste über das Zufallsniveau hinaus ($AUC > 0,5$), ist aber diagnostisch nicht stark. Funktionelle Reste weisen in beiden Proteinen signifikant höhere mittlere Nash-Frustration auf als passive Reste (0,160 vs. 0,031 für HP35; 0,229 vs. 0,096 für Protein G), was bestätigt, dass spieltheoretische Instabilität bevorzugt an biologisch aktiven Stellen lokalisiert ist. Die moderaten AUC-Werte sind angesichts des Proof-of-Concept-Charakters der Analyse erwartbar: der η -Parameter bleibt unkalibriert, und das spieltheoretische Potential lässt Seitenketten-Wechselwirkungen, Lösungsmittelleffekte und Elektrostatik außer Acht. Diese Ergebnisse sind konsistent mit der Interpretation, dass Nash-Frustration ein komplementäres Signal zur energetischen Frustration erfasst—eines, das Koordinationsversagen statt energetischer Suboptimalität reflektiert—aber weitere Kalibrierung erfordert, bevor es als eigenständiger Prädiktor dienen kann.

4.5 Genregulation als Signalspiel

Genregulationsnetzwerke (GRNs) steuern Genexpressionsmuster und können als Signalspiele modelliert werden [Bohl et al., 2014]:

- **Spieler:** Transkriptionsfaktoren und DNA-Bindungsstellen
- **Strategien:** Binden/Nicht-Binden (mit kontinuierlicher Affinität als Strategieintensität)
- **Payoff:** Organismische Fitness, vermittelt durch Genexpressionsniveaus

Die mathematische Verbindung zwischen Spieltheorie und Populationsdynamik wird durch die Replikatorgleichung hergestellt, die formal äquivalent zu Lotka-Volterra-Modellen ist [Hofbauer & Sigmund, 1998]. Genauer gilt diese Äquivalenz für symmetrische




Abbildung 2: Receiver-Operating-Characteristic (ROC)-Kurven für Nash-Frustration als binärer Klassifikator funktioneller versus passiver Reste. HP35 (1YRF, $AUC = 0,62$) und Protein G (1PGA, $AUC = 0,69$) übertreffen beide die Zufallsbasislinie (gestrichelte Diagonale), was bestätigt, dass spieltheoretische Instabilität bevorzugt an biologisch aktiven Stellen lokalisiert ist. Die moderaten AUC-Werte spiegeln den Proof-of-Concept-Charakter der Analyse wider; Verbesserungen werden bei Einbeziehung von Seitenketten-Wechselwirkungen und Lösungsmittelleffekten erwartet.

Spiele mit linearen Fitnessfunktionen; bei frequenzabhängigen oder nichtlinearen Payoffs erfordert die Korrespondenz die Transformation $x_i = y_i / \sum_j y_j$ und beschränkt sich auf das Innere des Simplex (Hofbauer & Sigmund 1998, Kapitel 7). Ein stabiler Fixpunkt in diesen Gleichungen entspricht einer ESS und somit einem Verhaltensattraktor, der die Langzeitstruktur des Systems bestimmt.

Illustratives Beispiel: das lac-Operon. Das Laktose-Verwertungssystem von *E. coli* exemplifiziert die Signalspiel-Logik. Der lac-Repressor (LacI) und der CAP-Aktivator konkurrieren um die regulatorische Kontrolle des *lac*-Operons. In Abwesenheit von Laktose stellt die LacI-Bindung ein Nash-Gleichgewicht dar: keine einseitige Änderung des Bindungszustands eines regulatorischen Faktors verbessert die organismische Fitness. Wenn Laktose vorhanden ist, inaktiviert Allolaktose LacI, verschiebt die Payoff-Matrix und etabliert ein neues Gleichgewicht mit Operon-Expression. Der bistabile Schalter zwischen diesen Zuständen ist präzise die Art von spieltheoretischem Attraktor, den der FST-III-Rahmen als ESS auf der Regulationsebene identifiziert.

5 Das Free Energy Principle und Active Inference

Das Free Energy Principle (FEP), primär entwickelt von Karl Friston, liefert eine vereinigende Theorie für biologische Selbstorganisation, die Informationstheorie und Thermodynamik verschmilzt [Friston, 2009, 2010]. **Hinweis:** Die Behauptung, dass FEP und MEPP kompatibel oder äquivalent sind, ist nicht unumstritten. FEP minimiert variationelle freie Energie (eine informationstheoretische Größe, die Surprise begrenzt), während MEPP die thermodynamische Entropieproduktionsrate maximiert. Die Verbindung zwischen diesen beiden Prinzipien ist ein aktives Diskussionsgebiet [Friston, 2009]; das vorliegende Paper

behandelt sie als komplementäre Perspektiven auf verschiedenen Analyseebenen, leitet aber nicht formal eines aus dem anderen ab. Für eine kritische Bewertung der philosophischen Ansprüche des FEP (z. B. Markovian Monism) gegenüber seiner wissenschaftlichen Reichweite als heuristisches Vereinheitlichungsprinzip siehe Sánchez-Cañizares [2021].

5.1 Theoretischer Rahmen

FEP postuliert, dass jedes biologische System, das sich erfolgreich gegen Entropie (Zerfall) verteidigt, seine “variationelle freie Energie” minimieren muss [Friston, 2009]. Diese Größe repräsentiert eine mathematische obere Schranke der “Surprise” (Surprisal), die das System durch sensorische Inputs erlebt [Friston, 2009].

Ein biologischer Agent existiert innerhalb einer “Markov-Decke”—einer statistischen Grenze, die interne Zustände von externen Zuständen trennt [Friston, 2010]. Um zu überleben, muss der Agent sicherstellen, dass seine sensorischen Zustände innerhalb physiologischer Grenzen bleiben. Dies wird durch zwei Mechanismen erreicht:

1. **Wahrnehmung:** Das System passt seine internen Modelle an, um die Ursachen sensorischer Daten besser vorherzusagen (Minimierung des Vorhersagefehlers) [Friston, 2009]
2. **Active Inference:** Das System handelt, um die Welt zu verändern oder sensorische Daten zu selektieren, die seinen internen Erwartungen entsprechen [Friston, 2009]

Durch Minimierung der freien Energie wird das System implizit zu einem Modell seiner Umgebung. Dieser Prozess ist eng mit MEPP verknüpft: während das System intern seine freie Energie minimiert (Ordnung schafft), maximiert es die Entropieproduktion in der Umgebung durch metabolische und agentive Aktivitäten [Friston, 2010].

In FST-III sind Verhaltensattraktoren diejenigen Zustände, in denen die freie Energie minimal ist und der Agent eine stabile, vorhersagbare Interaktion mit seiner Nische erreicht hat [Friston, 2009].

5.2 Freie-Energie-Minimierung als Nash-Fixpunkt

Die Verbindung zwischen FEP und Nash-Gleichgewicht kann unter bestimmten Bedingungen formalisiert werden. Sei $p(o, s_1, \dots, s_N)$ ein gemeinsames generatives Modell für N interagierende Agenten, wobei jeder Agent i eine faktorisierte approximative Posterior $q_i(s_i)$ über seine latenten Zustände kontrolliert. Die gemeinsame variationelle freie Energie ist:

$$F(q; o) = \mathbb{E}_q[\ln q(s) - \ln p(o, s)], \quad q(s) = \prod_{i=1}^N q_i(s_i). \quad (2)$$

Definiere ein Spiel, in dem jeder Agent i die Kontrolle über q_i hat und alle Agenten das Kostenfunktional $J_i(q_i, q_{-i}) := F(\prod_j q_j; o)$ teilen. Dann ist die beste Antwort von Agent i gegen festes q_{-i} präzise das koordinatenweise variationelle Update (Mean-Field-VI), und ein Nash-Gleichgewicht $q^* = (q_1^*, \dots, q_N^*)$ ist ein Fixpunkt verteilter Freie-Energie-Minimierung. Dies konstituiert ein *Potentialspiel* mit Potential F im Sinne von Monderer & Shapley [1996]: Nash-Gleichgewichte fallen mit koordinatenweisen Minima der gemeinsamen freien Energie zusammen.

Gültigkeitsbereich der Brücke. Diese formale Äquivalenz gilt für die Belief-Optimierungskomponente von FEP (variationelle Inferenz) und beruht auf der *Potentialspiel*-Struktur: alle Agenten teilen dasselbe Kostenfunktional F . In der biologischen Realität haben interagierende Organismen typischerweise heterogene Zielfunktionen (Räuber vs. Beute, Wirt vs. Parasit), was die Potentialspiel-Annahme bricht. Die FEP-als-Nash-Brücke gilt daher strikt für intra-organismische Inferenz (wo alle Subsysteme das Ziel organismischen Überlebens teilen) und für symmetrische Mehr-Agenten-Szenarien; sie lässt sich nicht ohne Modifikation auf antagonistische ökologische Interaktionen übertragen. Für Active Inference, wo Agenten zusätzlich Policies π_i selektieren, um die erwartete freie Energie $G(\pi_i, \pi_{-i})$ zu minimieren, wird die Nash-Bedingung: kein Agent kann einseitig seine Policy ändern, um seine erwartete freie Energie zu reduzieren—ein genuines Mehr-Agenten-Gleichgewicht, das Interaktion durch Zustandsdynamik involviert. Das vorliegende Paper entwickelt diese Erweiterung nicht formal; der Beitrag besteht darin, die präzise Demarkation zu liefern: FEP-als-Nash ist mehr als Metapher, wenn das Spiel explizit als variationelles/Potentialspiel über Verteilungen definiert ist, und bloß konzeptuell, wenn “Nash” als Synonym für “Fixpunkt” verwendet wird.

5.3 Skalentrennung: Auflösung des FEP-MEPP-Paradoxons

Eine persistente konzeptuelle Spannung in der theoretischen Biologie fragt, wie ein System seine interne freie Energie *minimieren* (FEP) kann, während es gleichzeitig die Entropieproduktion in der Umgebung *maximiert* (MEPP). Die folgende Proposition löst dieses Paradoxon durch Skalentrennung über die Markov-Decke.

Conjecture 1 (FEP-MEPP-Dualität via Markov-Decke). *Sei $\mathcal{B}$ ein selbstorganisierendes System mit Markov-Decke $\partial\mathcal{B}$, internen Zuständen s und Umgebungszuständen e . Definiere:*

- $F_{\text{int}}(q) := \mathbb{E}_q[\ln q(s) - \ln p(o, s)]$, die variationelle freie Energie des internen Modells;
- $\dot{S}_{\text{ext}} := \frac{dS_{\text{env}}}{dt} = \frac{1}{T} \frac{dQ}{dt}$, die Rate der Entropieproduktion in der Umgebung.

Wenn $\mathcal{B}$ F_{int} minimiert (FEP), indem es ein akkurates internes Modell aufrechterhält und Aktionen wählt, die Surprise reduzieren, dann:

- (i) Die strukturelle Integrität von $\mathcal{B}$ wird aufrechterhalten: $\mathcal{B}$ widersteht der Auflösung und erhält die Markov-Decke (niedrige interne Entropie);
- (ii) Die intakte, fernab-vom-Gleichgewicht-Struktur $\mathcal{B}$ fungiert als effiziente dissipative Maschine, die Energiegradienten aus der Umgebung durch metabolische und agentive Aktivitäten kanalisiert;
- (iii) Unter allen Randbedingungen, die konsistent mit dem Überleben von $\mathcal{B}$ sind, tendiert die tatsächliche Dynamik zu Konfigurationen mit hoher (wenn auch nicht notwendigerweise maximaler) Rate der Entropieproduktion $\dot{S}_{\text{ext}}$ in der Umgebung, konsistent mit der Stabilitätsinterpretation von MEPP (Hypothese 2 oben). Der Schlüsselmechanismus, der (ii) mit (iii) verbindet, ist kompetitive Selektion: Unter mehreren intakten dissipativen Strukturen erwerben diejenigen, die Energiegradienten effizienter kanalisieren, mehr Ressourcen, replizieren schneller und verdrängen langsamere Dissipatoren. Dieser Selektionsdruck—abwesend bei passiven Strukturen wie Kristallen—treibt die Korrelation zwischen struktureller Integrität und hoher Entropieproduktion im biologischen Bereich.

Kurz: interne Freie-Energie-Minimierung ermöglicht externe Entropieproduktions-Maximierung. Die beiden Prinzipien stehen nicht im Widerspruch, sondern operieren auf komplementären Seiten der Markov-Decke.

Status: Diese Proposition ist als Konjektur formuliert, gestützt auf qualitative Argumente. Ein formaler Beweis würde erfordern, dass FEP-minimierende Systeme notwendigerweise die Entropieproduktion in der Umgebung unter den genannten Randbedingungen maximieren – ein Resultat, das in der Literatur nicht demonstriert wurde.

Remark 4 (Spieltheoretische Interpretation). In der Sprache des vorliegenden Papers entspricht die FEP-MEPP-Dualität einem Zweistufen-Spiel:

- *Inneres Spiel* (innerhalb $\partial\mathcal{B}$): Agenten minimieren die variationelle freie Energie F_{int} über den Nash-Fixpunkt von Conjecture 1—das oben beschriebene Potentialspiel.
- *Äußeres Spiel* (über $\partial\mathcal{B}$): Das Ensemble überlebender Organismen konkurriert um Energiegradienten. Organismen, die effizienter dissipieren (höheres $\dot{S}_{\text{ext}}$), verdrängen langsamere Dissipatoren, wodurch MEPP als makroskaliges Selektionskriterium etabliert wird.

Dies löst das von Martyushev Martyushev [2010] aufgeworfene MEPP-Paradoxon: MEPP gilt für das *umgebungsgekoppelte* System, nicht für die internen Freiheitsgrade, wo minimale Entropieproduktion (Prigogine) lokal gelten kann. Die Nash-Frustration $\rho(J)$ aus Abschnitt 4 misst die residuale Spannung zwischen innerer Optimalität und äußerem dissipativem Druck.

5.4 Nash-Gleichgewicht als Mean-Field-Game-Fixpunkt

Die Potentialspiel-Charakterisierung der FEP-Nash-Brücke (Conjecture 1) kann in den allgemeineren Rahmen der *Mean Field Games* (MFG) eingebettet werden, wie sie von Lasry und Lions Lasry and Lions [2007] eingeführt wurden. Man betrachte $2N$ Diederwinkel $\theta \in [-\pi, \pi]^{2N}$, die das Rückgrat eines faltenden Proteins parametrisieren. Jeder Rest wird als repräsentativer Agent behandelt, dessen Zustand durch seinen lokalen Torsionswinkel bestimmt wird. Im Kontinuumslimites (großes N) nimmt das gekoppelte Optimierungsproblem die Form eines MFG-Systems an, bestehend aus einer Hamilton-Jacobi-Bellman-(HJB-)Gleichung und einer Fokker-Planck-(FP-)Gleichung.

Die HJB-Gleichung beschreibt die optimale Steuerung jedes Agenten. Der zugehörige Hamiltonian lautet

$$H(\theta, p, m) = \frac{1}{2} \|p\|^2 - \sum_{i < j} \int E_{ij}(\theta_i, \theta_j) m_j(\theta_j) d\theta_j, \quad (3)$$

wobei $p = \nabla V$ der konjugierte Impuls ist, E_{ij} paarweise Rest-Rest-Wechselwirkungen kodiert und m_j die Populationsdichte der Diederwinkel-Zustände an Position j ist. Die Fokker-Planck-Gleichung propagiert die Agentendichte unter dem optimalen Drift und thermischem Rauschen:

$$\partial_t m = \nabla \cdot (m \nabla V) + \sigma \Delta m, \quad \sigma = k_B T. \quad (4)$$

Ein MFG-Nash-Gleichgewicht ist ein Paar (V^*, m^*) , das beide Gleichungen simultan erfüllt. Im thermischen Gleichgewicht ist die stationäre Dichte

$$m^*(\theta) \propto \exp(-V(\theta)/k_B T), \quad (5)$$

was identisch zur Boltzmann-Verteilung aus der Langevin-Fokker-Planck-Beschreibung der Proteinfaltung ist. Das bestehende Potentialspiel-Argument (Abschnitt 5) wird als Spezialfall wiedererhalten: Im *statischen Limes* $\partial_t = 0$ reduziert sich die HJB-Gleichung auf $\nabla V = 0$ (Agenten sitzen an Optima), und die Fokker-Planck-Gleichung wird zu $\nabla \cdot (m \nabla V) = 0$, was automatisch erfüllt ist. Das resultierende System ist ein klassisches Potentialspiel mit gemeinsamen Kostenfunktional V .

Die entscheidende Existenzbedingung für MFG-Nash-Gleichgewichte ist die **Lasry-Lions-Monotonie** Lasry and Lions [2007]: Die Interaktionskosten müssen monoton im Populationsmaß sein, d. h. die Abbildung $m \mapsto -\sum_{i < j} \int E_{ij} m_j d\theta_j$ muss monoton sein. Für *repulsive* Wechselwirkungen (Excluded-Volume-Effekte, sterische Konflikte) ist diese Bedingung erfüllt, da eine Erhöhung der Dichte bei einer gegebenen Konfiguration die Kosten für alle Agenten erhöht, was Eindeutigkeit und Konvergenz zum Nash-Gleichgewicht sicherstellt. Für *stark attraktive* Wechselwirkungen hingegen ist die Monotonie verletzt: Kooperative Bindung senkt die Kosten, wenn mehr Agenten aggregieren, was mehrere selbstverstärkende Fixpunkte erzeugt und Konvergenzgarantien zerstört.

Die physikalische Interpretation ist transparent: Lasry-Lions-Monotonie ist äquivalent zur Abwesenheit kooperativer Fehlfaltung. Wenn Monotonie gilt, konvergiert das MFG-System zum eindeutigen nativen Nash-Gleichgewicht—präzise zur thermodynamisch stabilen Faltung. Wenn sie verletzt ist, lässt das System mehrere konkurrierende Fixpunkte zu, die fehlgefalteten Aggregaten entsprechen.

Remark 5 (Failure Modes). Das MFG-Framework sagt Nicht-Konvergenz in Systemen mit stark kooperativer Fehlfaltung voraus (Prionen, Amyloid-Fibrillen), in denen die Lasry-Lions-Monotonie verletzt ist. Dies ist keine Schwäche, sondern ein Feature: FST identifiziert diese Systeme korrekt als außerhalb der Domäne stabiler Nash-Gleichgewichte liegend. Prionenpropagation und Amyloid-Nukleation repräsentieren präzise jene Regime, in denen die Potentialspiel-Struktur zusammenbricht und das Multi-Agenten-System in kinetisch stabilisierten, thermodynamisch metastabilen Zuständen gefangen wird. Die MFG-Einbettung schärft somit die Gültigkeitsaussage der FEP-Nash-Brücke: Sie gilt für alle Faltungssysteme, die Monotonie erfüllen, und ihre Failure Modes koinzidieren mit bekannten Pathologien der Proteinaggregation.

6 Boolesche Netzwerke und der Rand des Chaos

Auf der Ebene der Genregulation manifestiert sich Stabilität in der Dynamik Boolescher Netzwerke, wie sie von Stuart Kauffman eingeführt wurden [Kauffman, 1969, 1993]. Boolesche Netzwerkmodelle sind ein aktives Forschungsfeld; für umfassende Behandlungen von Netzwerkmotiven und Designprinzipien siehe Alon [2007], und für Robustheit und Evolvabilität in genetischen Netzwerken siehe Wagner [2005].

6.1 Netzwerkdynamik

Diese Netzwerke modellieren Gene als binäre Schalter, deren Zustände durch regulatorische Logik verknüpft sind [Kauffman, 1969]. Die Langzeitdynamik solcher Netzwerke fließt in Attraktoren, die biologisch als spezifische Zelltypen oder funktionelle Zustände interpretiert werden [Gaudenzi et al., 2011].

Kauffman argumentierte, dass Netzwerkstabilität von der Konnektivität und dem Typ der Booleschen Funktionen abhängt [Kauffman, 1969]. Netzwerke am “Rand des

Chaos”—einer kritischen Übergangsregion zwischen rigider Ordnung und unvorhersagbarem Chaos—weisen hypothetisch hohe Evolvabilität und Informationsverarbeitungskapazität auf, obwohl diese Behauptung in der Literatur umstritten bleibt [Kauffman, 1993]:

Tabelle 6: Regime Boolescher Netzwerke und ihre biologische Interpretation. Netzwerke am Rand des Chaos weisen maximale Evolvabilität auf.

Netzwerkregime	Dynamisches Verhalten	Biologische Funktion
Geordnet	Eingefrorene Zustände, geringe Variabilität	Strukturelle Integrität, Basalmetabolismus
Kritisch (Rand des Chaos)	Komplexe Muster, hoher Informationsfluss	Adaptives Verhalten, Differenzierung, Lernen
Chaotisch	Hohe Sensitivität, Instabilität	Pathologische Zustände, Malignität

Diese Attraktoren in Genregulationsnetzwerken bilden die materielle Basis für die spieltheoretischen Strategien auf höheren Ebenen. Eine ESS auf der Makroebene erfordert stabile genetische Attraktoren auf der Mikroebene, die zuverlässig die notwendigen phänotypischen Merkmale produzieren [Müssel et al., 2010, Kauffman, 1993].

Boolesche Attraktoren als Nash-Gleichgewichte. Die Verbindung zwischen Booleschen Netzwerk-Attraktoren und Nash-Gleichgewichten kann explizit gemacht werden. Jedes Gen g_i in einem Booleschen Netzwerk von n Genen ist ein “Spieler”, dessen Strategie sein Expressionszustand $\sigma_i \in \{0, 1\}$ ist. Die Boolesche Update-Funktion $f_i(\sigma_{-i})$ definiert die beste Antwort von Gen i gegeben die Zustände seiner Regulatoren. Ein Fixpunkt-Attraktor $\sigma^* = (f_1(\sigma_{-1}^*), \dots, f_n(\sigma_{-n}^*))$ ist dann präzise ein Nash-Gleichgewicht in reinen Strategien dieses n -Spieler-Spiels: kein Gen kann einseitig seinen Zustand ändern, um seinen “Payoff” (definiert als Übereinstimmung mit der regulatorischen Logik) zu verbessern. **Hinweis:** Diese Nash-Charakterisierung ist formal statt substantiell—sie reformuliert die Fixpunktbedingung in spieltheoretischer Sprache. Der nicht-triviale Gehalt entsteht erst, wenn der Payoff an ein externes Fitnessmaß gekoppelt wird (z. B. organismische Lebensfähigkeit), sodass nicht alle Booleschen Fixpunkte gleichermaßen “Nash-stabil” unter Selektion sind. Grenzzyklus-Attraktoren entsprechen periodischen Orbits statt reinen Nash-Gleichgewichten, können aber als korrelierte Gleichgewichte im wiederholten Spiel interpretiert werden. Diese spieltheoretische Perspektive auf Boolesche Netzwerke liefert die formale Brücke zwischen Kauffmans Attraktor-Dynamik und der hierarchischen Nash-Architektur von FST-III.

7 Zelluläre Ebene: Multizellularität als Koalitionsspiel

7.1 Das Kooperationsproblem

In einem multizellulären Organismus “opfern” einzelne Zellen ihr Reproduktionspotential zugunsten des Ganzen. Somatische Zellen reproduzieren sich nicht direkt; nur Keimbahnzellen übertragen Gene.

Dies repräsentiert extreme Kooperation: Zellen adoptieren eine Strategie (Differenzierung, Nicht-Reproduktion), die dem Kollektiv auf individuelle Kosten nützt.

7.2 Koalitionsspiel-Formulierung

- **Spieler:** Einzelne Zellen innerhalb des Organismus
- **Strategien:** Kooperieren (Entwicklungsprogramm folgen) oder Defektieren (autonom proliferieren)
- **Payoff:** Genetische Fitness (über Keimbahn übertragen)

In erster Näherung sind alle Zellen in einem Organismus genetisch nahezu identisch (klonal) und teilen die überwältigende Mehrheit ihres Genoms. Daher entspricht der Payoff für jede Zelle näherungsweise dem Payoff der Keimbahn: wenn sich der Organismus reproduziert, werden die gemeinsamen Gene übertragen. (In der Praxis führen somatische Mutationen, V(D)J-Rekombination in Immunzellen und mitochondriale Heteroplasmie zu begrenzter genetischer Divergenz, was präzise das Krebs-als-Defektion-Szenario ermöglicht, das unten diskutiert wird.)

Proposition 1 (Multizellularität als Nash-Gleichgewicht). *In einem klonalen Organismus, in dem alle Zellen den Verwandtschaftsgrad $r \approx 1$ teilen, ist Kooperation (Befolgen des Entwicklungsprogramms) ein Nash-Gleichgewicht, sofern die individuellen Kosten der Kooperation geringer sind als der inklusive Fitnessnutzen: $c < r \cdot b$ (Hamiltons Regel [Hamilton, 1964]). Im Grenzfall $r = 1$ genügt jeder positive Nettonutzen $b > c$. Der Beitrag hier besteht in der Einbettung dieses klassischen Resultats in den hierarchischen FST-Rahmen; das Nash-Gleichgewicht wird aufrechterhalten, solange die klonale Identität erhalten bleibt.*

7.3 Krebs als Koalitionszusammenbruch

Krebs als Zusammenbruch multizellulärer Kooperation ist ein gut etablierter Rahmen [Aktipis et al., 2015]. Die spieltheoretische Rahmung hier folgt Aktipis et al. (2015), die evolutionäre Spieltheorie anwenden, um somatische Evolution und Krebsprogression zu erklären. Der FST-III-Beitrag besteht darin, diesen Rahmen in das hierarchische Nash-Gleichgewichts-Bild einzubetten: Krebs repräsentiert nicht bloß einen selektiven Vorteil für einzelne Zellen, sondern einen Phasenübergang auf der Koalitionsebene, analog zum Parasitenproblem in der präbiotischen Chemie, das in FST-II diskutiert wird. Formal repräsentiert Krebs einen Koalitionszusammenbruch:

1. Somatische Mutationen erzeugen genetische Divergenz
2. Mutierte Zellen teilen nicht mehr alle Gene mit anderen Zellen
3. Defektion (Proliferation) nützt nun der mutierten Linie
4. Das Nash-Gleichgewicht bricht zusammen; Krebszellen “defektieren”

Dies verbindet sich mit dem Parasitenproblem in Hyperzyklen [Geiger, 2026b]: sowohl Krebs als auch chemische Parasiten nutzen kooperative Systeme aus, indem sie Bedingungen brechen, die Kooperation stabilisieren. Die Parallele zwischen Krebs als Koalitionszusammenbruch und dem Hyperzyklus-Parasitenproblem wird als *strukturelle Analogie* präsentiert, nicht als abgeleitetes Resultat. Eine formale Verbindung würde erfordern zu zeigen, dass onkogene Mutationen auf parasitäre Replikatoren im Sinne von Eigen & Schuster abbilden; dies bleibt ein offenes Problem.

8 Skalierung und die Renormierungsgruppe

Ein zentrales Element von FST-III ist die Erkenntnis, dass biologische Prinzipien skaleninvariant über viele Ebenen operieren [Friston et al., 2025, Wilson, 1975].

8.1 Der RG-Rahmen

Terminologischer Vorbehalt: Der Begriff “Renormierungsgruppe” wird in diesem Abschnitt in einem erweiterten, metaphorischen Sinne verwendet. In der Physik der kondensierten Materie bezieht sich die Renormierungsgruppe (RG) auf einen präzisen mathematischen Rahmen mit Flussgleichungen, Fixpunkten und Skalenexponenten [Wilson, 1975]. Die vorliegende Verwendung—die beschreibt, wie effektive spieltheoretische Parameter sich ändern, wenn man auf sukzessive größeren biologischen Skalen betrachtet—ruft die *konzeptuelle Logik* der Grobkörnung auf, liefert aber keine RG-Flussgleichungen, Fixpunktanalyse oder dimensionelle Skalengesetze für biologische Systeme. Ob eine rigorose RG-Behandlung evolutionärer Übergänge erreichbar ist, bleibt eine offene Frage [Friston et al., 2025].

Mit diesem Vorbehalt im Hinterkopf: Die Grobkörnungsperspektive postuliert, dass biologische Systeme oft hierarchisch organisiert sind—von fraktaler Verzweigung in Blutgefäßen bis zu hierarchischen neuronalen Architekturen [Gallos et al., 2012].

Renormalizing Generative Models (RGM) zeigen, dass Prinzipien der freien Energie und spieltheoretischen Optimierung rekursiv auf jeder Ebene angewandt werden [Friston et al., 2025]. Ein Organismus kann als Grobkörnung über Milliarden von Zellen betrachtet werden, wobei Zellen als “Atome” in einem Spiel höherer Ordnung fungieren, dessen Regeln durch die evolutionäre Geschichte der Spezies festgelegt sind [Farzulla, 2026].

8.2 Das skalenrelative Kernmodell

Diese Instanziierung wird durch skalenrelative Fitnessmodelle der Mehrebenenselektion beschrieben [Okasha, 2006, Michod, 1999, Farzulla, 2026]:

Tabelle 7: Skalenrelatives Kernmodell: Fitnessdefinitionen und Strategietypen auf jeder biologischen Organisationsebene.

Ebene	Fitness/Strategie
Zellulär	Replikationsrate als Fitness, Mutationen als Strategiewechsel
Organismisch	Darwinsche Fitness, Verhaltensstrategien
Agentiv	Intentionalität, Lernen durch Imitation
Institutionell	Legitimität und soziale Kooperation als ESS

Diese hierarchische Struktur stellt sicher, dass Konflikte zwischen Skalen (z. B. Krebs als Defektion einzelner Zellen gegen den Organismus) durch übergeordnete Selektionsdrücke minimiert werden [Farzulla, 2026].

8.3 Hauptübergänge als RG-Schritte

Die Hauptübergänge der Evolution, identifiziert von Szathmáry und Maynard Smith [Szathmáry & Maynard Smith, 1995], bilden auf diesen Rahmen ab:

- Gene $\rightarrow$ Chromosomen (Block 1)
- Prokaryoten $\rightarrow$ Eukaryoten (Block 2)
- Einzeller $\rightarrow$ Vielzeller (Block 3)
- Individuen $\rightarrow$ Gesellschaften (Block 4)

Jeder Übergang schafft eine neue Ebene von “Spielern” aus Koalitionen niedrigerer Spieler und erhält spieltheoretische Struktur durch Grobkörnigkeit.

Ein Toy-Renormierungsschritt für räumliche evolutionäre Spiele. Betrachte ein 2D-Gitter-Spiel mit Strategien $\sigma_x \in \{C, D\}$ und Payoff-Matrix $A = \begin{pmatrix} R & S \\ T & P \end{pmatrix}$. Für einen 2×2 -Block B definiere eine Blockstrategie $\Sigma_B = \mathcal{B}(\sigma|_B)$ durch Mehrheitsregel. Für benachbarte Blöcke B, B' definiere den effektiven Block-Payoff durch Randmittelung

$$A'_{s,t} := \frac{1}{|\partial(B, B')|} \mathbb{E} \left[\sum_{\langle x,y \rangle \in \partial(B, B')} A_{\sigma_x, \sigma_y} \mid \Sigma_B = s, \Sigma_{B'} = t \right], \quad s, t \in \{C, D\}.$$

In einer Frozen-Interior-Approximation, sei $q_s = \mathbb{P}(\sigma_x = C \mid \Sigma_B = s, x \in \partial B)$. Dann erfüllt die RG-Abbildung $R_2 : (A, \beta) \mapsto (A', \beta')$ die explizite Mischungsformel

$$A'_{s,t} = q_s q_t R + q_s(1 - q_t) S + (1 - q_s) q_t T + (1 - q_s)(1 - q_t) P,$$

mit $q_C \approx 1 - \varepsilon$ und $q_D \approx \varepsilon$, kontrolliert durch die Within-Block-Dynamik (Selektionsstärke β und interne Durchsetzungsmechanismen). Fixpunkte umfassen die geordneten Phasen (All- C , All- D), während Änderungen in Within-Block-Einschränkungen den RG-Fluss durch Modifikation von $q_C - q_D$ verschieben. Dies liefert einen konkreten Sinn, in dem evolutionäre Hauptübergänge Grobkörnungsschritten zusammen mit der Aktivierung neuer relevanter Operatoren (z. B. Policing, Bottlenecks) entsprechen, die kooperative Makrovariablen stabilisieren. Biologisch entspricht die Blockstrategie Σ_B einem höherstufigen Phänotyp (z. B. multizelluläre Kooperation), während die Randparameter q_C, q_D Durchsetzungsmechanismen kodieren (z. B. Immunüberwachung, reproduktive Bottlenecks), die Innergruppen-Defektion unterdrücken.

9 Ökosystem-Ebene: Das ökologische Spiel

9.1 Arten als Spieler

Im ökologischen Spiel:

- **Spieler:** Artenpopulationen
- **Strategien:** Ökologische Rollen (Räuber, Beute, Konkurrent, Mutualist)
- **Payoff:** Populationswachstumsrate

9.2 Ökologische Nischen als Nash-Gleichgewichte

Ökologische Nischen sind Nash-Gleichgewichts-Konfigurationen: keine Art kann einseitig ihre Strategie ändern, um die Fitness zu verbessern, während andere konstant bleiben.

Beispiel: Räuber-Beute-Koexistenz. In einem klassischen Lotka-Volterra-Räuber-Beute-System erfüllt der innere Fixpunkt—an dem Räuber- und Beutepopulationen bei konstanten Dichten koexistieren—die Nash-Gleichgewichtsbedingung des ökologischen Spiels: weder die Beuteart (durch Änderung ihrer Reproduktionsstrategie) noch der Räuber (durch Änderung seiner Jagdstrategie) kann an diesem Punkt einseitig seine Populationswachstumsrate verbessern. **Vorbehalt:** Im einfachen Lotka-Volterra-Modell ist dieser Fixpunkt ein Zentrum (neutral stabil mit geschlossenen Orbits), kein asymptotisch stabiler Attraktor; ESS-artige Stabilität erfordert zusätzliche Mechanismen wie dichteabhängige Mortalität oder räumliche Struktur. Die Äquivalenz zwischen Lotka-Volterra-Fixpunkten und Replikatordynamik-Gleichgewichten [Hofbauer & Sigmund, 1998] bildet das ökologische Spiel auf die evolutionäre Dynamik ab, aber der Stabilitätstyp des resultierenden Gleichgewichts hängt von der spezifischen Payoff-Struktur ab.

9.3 Massenaussterben als Phasenübergänge

Massenaussterbe-Ereignisse repräsentieren Phasenübergänge im ökologischen Spiel:

1. Umweltstörung verändert die Payoff-Matrix
2. Vorherige Nash-Gleichgewichte werden instabil
3. System geht in neues Gleichgewicht mit anderer Artenzusammensetzung über

Auf struktureller Ebene gleicht diese Logik Phasenübergängen in physikalischen Systemen allgemein: veränderte Randbedingungen destabilisieren bestehende Gleichgewichte und treiben Übergänge zu neuen Konfigurationen. Es sei angemerkt, dass diese spieltheoretische Rahmung ein *post hoc* interpretatives Modell ist: Massenaussterben sind komplexe Ereignisse, angetrieben durch Asteroideneinschläge, Vulkanismus oder Ozean-Anoxie, und inwieweit sie produktiv als Payoff-Matrix-Perturbationen modelliert werden können—statt als katastrophale Regimewechsel außerhalb des Gleichgewichtsrahmens—bleibt eine empirische Frage [Gould & Eldredge, 1977].

10 Synthese: Drei Phasen biologischer Organisation

FST-III liefert ein integriertes Bild biologischer Organisation, das sich in drei Phasen entfaltet:

10.1 Phase 1: Thermodynamische Dissipation

Der Energiefluss des jungen Universums zwingt einfache Materie in dissipative Strukturen. Hier wirkt MEPP als Stabilitätsfilter (Abschnitt 3): unter den vielen möglichen Konfigurationen persistieren diejenigen mit solvent-stabilen Dissipationsmustern. Es ist die Ära schneller Entropieproduktion und der Entstehung von Englands dissipativen Adaptoren [Kleidon, 2010].

10.2 Phase 2: Strategische Konsolidierung

Sobald dissipative Strukturen die Schwelle zur Selbstreplikation überschreiten, führt Wettbewerb um Ressourcen zu spieltheoretischer Dynamik. Die Entstehung von Evolutionarily Stable Strategies (ESS) stabilisiert molekulare Populationen gegen parasitäre Invasion (Abschnitt 4). Die “Spieler” sind noch rein chemisch, aber ihre Interaktionen weisen bereits die Nash-Gleichgewichts-Struktur auf, die alle nachfolgenden Ebenen regiert [Maynard Smith & Price, 1973]. Die evolutionären Hauptübergänge (Abschnitt 8) können niedrigere Spielerebenen iterativ zu höheren Koalitionen, wobei die spieltheoretische Logik auf jeder neuen Skala erhalten bleibt.

10.3 Phase 3: Kognitive Inferenz

Organismen entwickeln interne Modelle ihrer Umgebung, um ihre freie Energie zu minimieren. Die Entstehung der Markov-Decke (Abschnitt 5) erlaubt die Trennung von Selbst und Welt und etabliert die FEP-MEPP-Kompatibilität der Konjektur 1: interner Modellbau (Freie-Energie-Minimierung) ermöglicht äußere dissipative Effizienz (hohe Entropieproduktion).

Diese dritte Phase markiert einen qualitativen Wandel in der spieltheoretischen Hierarchie. In Phase 2 sind die “Spieler” molekulare oder zelluläre Agenten, deren Strategien durch physikalische Chemie bestimmt werden. In Phase 3 erwerben Agenten *generative Modelle* ihrer Umgebung: die Strategien sind nicht mehr fixierte phänotypische Zustände, sondern Policies—Sequenzen von Aktionen, bedingt auf inferierte Umgebungszustände. Active Inference [Friston, 2009] liefert den Mechanismus: Agenten wählen Aktionen, die die erwartete freie Energie minimieren (d. h. sie handeln, um ihre Vorhersagen zu bestätigen oder Unsicherheit zu reduzieren). Dies konvertiert die statischen Nash-Gleichgewichte von Phase 2 in dynamische Bayessche Nash-Gleichgewichte, bei denen die Strategie jedes Agenten von seinen Überzeugungen über andere abhängt. Die verschachtelte Hierarchie der Inferenz—von interozeptiver Homöostase über Wahrnehmung bis zur Planung—spiegelt die Grobkörnungslogik von Abschnitt 8: jede Inferenzebene integriert über die Freiheitsgrade darunter und produziert ein zunehmend abstraktes Spiel auf höheren zeitlichen und räumlichen Skalen. Der Endpunkt dieser Hierarchie—Bewusstsein, Sprache und Kultur—kann als hochkomprimierte Form der spieltheoretischen Stabilitätslogik *interpretiert* werden, wobei die “Strategien” symbolische Repräsentationen und der “Payoff” prädiktive Genauigkeit über beliebig lange Zeithorizonte ist [Friston, 2010]. Diese Extrapolation ist spekulativ und geht über das hinaus, was der vorliegende Rahmen formal ableiten kann.

11 Testbare Vorhersagen

Hinweis: Die folgenden Vorhersagen sind mit P1–P5 gekennzeichnet, um sie von den mathematischen Propositionen (z. B. Proposition 1) in den vorangehenden Abschnitten zu unterscheiden. Propositionen sind formale Aussagen innerhalb des theoretischen Rahmens; Vorhersagen (Predictions) sind empirisch testbare Hypothesen, die daraus abgeleitet werden.

11.1 P1: Proteinfaltungslandschaften

Hypothese 1 (Nash-Frustration sagt faltungsrelevante Reste vorher). *Die Energielandschaft der Proteinfaltung kann durch Nash-Gleichgewichts-Stabilitätsanalyse charakterisiert werden. Reste mit hoher Nash-Frustration entsprechen experimentell identifizierten Faltungskeimen und allosterischen Stellen.*

Test: Berechne Nash-Frustrationswerte für Proteine mit experimentell charakterisierten Faltungsintermediaten (z. B. via Wasserstoff-Deuterium-Austausch oder ϕ -Wert-Analyse). Ein Korrelationskoeffizient $r > 0,3$ zwischen Nash-Frustrations-Rang und experimentellen ϕ -Werten würde positive Evidenz darstellen.

11.2 P2: Genregulationsnetzwerk-Attraktoren

Hypothese 2 (GRN-Attraktoren als Nash-Gleichgewichte). *Zelltyp-Attraktoren in Genregulationsnetzwerken können aus der Nash-Analyse des TF-DNA-Bindungsspiels vorhergesagt werden.*

Test: Berechne für gut charakterisierte GRNs Nash-Gleichgewichte des TF-DNA-Bindungsspiels, etwa für das *Drosophila*-Segmentpolaritätsnetzwerk oder für ein hämatopoietisches Differenzierungsnetzwerk von Säugetieren. Vergleiche Anzahl und Identität der vorhergesagten Attraktorzustände mit experimentell beobachteten Zelltypen. Erfolgskriterium: Die vorhergesagte Attraktorzahl sollte mit der bekannten Zelltypzahl innerhalb eines Faktors zwei übereinstimmen.

11.3 P3: Krebs und Koalitionsstabilität

Hypothese 3 (Krebs als Koalitionszusammenbruch). *Die Krebsinzidenz korreliert invers mit der multizellulären Koalitionsstabilität, gemessen an der spieltheoretischen Defektionsschwelle.*

Test: Über Gewebetypen hinweg, berechne die Defektionsschwelle Δr , bei der Hamiltons Bedingung $c < r \cdot b$ versagt (gegeben gewebespezifische Mutationsraten und Kooperationskosten). Sage vorher, dass Gewebe mit niedrigeren Δr -Schwellen höhere Krebsinzidenz aufweisen. Vergleiche mit epidemiologischen Daten aus der SEER-Datenbank. Ein besonders stringenter Test ergibt sich aus Petos Paradoxon: große, langlebige Arten zeigen keine proportional höheren Krebsraten trotz mehr Zellen und Zellteilungen. Das Koalitionsmodell sagt vorher, dass diese Arten stärkere Durchsetzungsmechanismen evolviert haben müssen (niedrigeres effektives Δr), eine Vorhersage, die durch Vergleich der Immunüberwachungsintensität über Arten verschiedener Körpergrößen testbar ist.

11.4 P4: Metabolische Rate und Fortpflanzungserfolg

Hypothese 4 (MEPP-Fitness-Korrelation). *Über Arten hinweg korreliert die massenspezifische Stoffwechselrate mit der Fortpflanzungsrate nach Kontrolle für Körpergröße.*

Test: Stelle Stoffwechselraten und Fortpflanzungsleistungen über Taxa zusammen. Eine positive Partialkorrelation (kontrolliert für Körpermasse) unterstützt die MEPP-Fitness-Verbindung. Kleibers Gesetz liefert die Körpergrößen-Skalierung. **Kontext:** Die

Metabolic Theory of Ecology [Brown et al., 2004] etabliert bereits quantitative Beziehungen zwischen Stoffwechselrate, Körpergröße und Life-History-Merkmalen. Die FST-III-Vorhersage geht über MTE hinaus, indem sie die Korrelation nicht bloß auf allometrische Skalierung, sondern auf den thermodynamischen Stabilitätsfilter (MEPP) zurückführt: Arten, die pro Masseinheit effizienter dissipieren, sind nicht nur schnellere Reproduzierer, sondern sollten auch resilienter gegenüber Störungen sein.

11.5 P5: Ökosystem-Resilienz

Hypothese 5 (Ökosystem-Resilienz aus Nash-Stabilität). *Ökosystem-Resilienz kann aus der spektralen Lücke der Nash-Stabilitätsmatrix des ökologischen Gleichgewichts vorhergesagt werden.*

Test: Berechne für gut charakterisierte Ökosysteme die Jacobi-Eigenwert-Lücke am Nash-Gleichgewicht, etwa für das Yellowstone-Nahrungsnetz oder für Korallenriff-Gemeinschaften. Sage vorher, dass Ökosysteme mit größerer spektraler Lücke sich schneller von Störungen erholen. Vergleiche dies mit empirischen Resilienzmaßen wie der Erholungszeit nach Störungsereignissen.

12 Diskussion

12.1 Was ist wirklich neu?

Die klassische evolutionäre Spieltheorie ist auf der organismischen Ebene gut etabliert. Die Beiträge dieses Papers sind:

1. **Vertikale Integration:** Verbindung molekularer, zellulärer, organismischer und Ökosystem-Spiele
2. **Thermodynamische Fundierung:** Verankerung von Fitness in MEPP und dissipativer Adaptation
3. **RG-Interpretation:** Formalisierung von Hauptübergängen als Grobkörnung
4. **MEPP als Stabilitätsfilter:** Reformulierung von MEPP als Stabilitätskriterium statt Maximierungsprinzip

12.2 Skalierbarkeit und die AlphaFold-Ära

Die Nash-Frustrations-Pipeline operiert auf experimentell bestimmten oder rechnerisch vorhergesagten dreidimensionalen Strukturen. Die kürzliche Verfügbarkeit von über 200 Millionen vorhergesagten Proteinstrukturen durch AlphaFold2 [Jumper et al., 2021] erweitert den Anwendungsbereich der Methode dramatisch: Nash-Frustrationswerte können prinzipiell für jedes Protein mit vorhergesagter Struktur berechnet werden, was proteomweite Frustrationskarten ermöglicht. Darüber hinaus liefert AlphaFold2s Rest-spezifische Konfidenzmetrik (pLDDT) einen natürlichen unabhängigen Benchmark: Regionen mit niedrigem pLDDT (vorhergesagte Unordnung oder geringe Konfidenz) sollten positiv mit hoher Nash-Frustration korrelieren, da beide lokale strukturelle Instabilität widerspiegeln—pLDDT aus der Perspektive des Vorhersagemodells, Nash-Frustration aus der spieltheoretischen Perspektive. Ein systematischer Vergleich von

pLDDT- und Nash-Frustrations-Profilen über einen großen Proteinsatz würde testen, ob spieltheoretisches Koordinationsversagen strukturelle Information jenseits dessen erfasst, was bereits in Deep-Learning-Konfidenzwerten kodiert ist. Dieser Vergleich ist rechnerisch unkompliziert und stellt eine natürliche Erweiterung der Benchmark-Analyse in Abschnitt 4.4 dar.

12.3 Unterbrochenes Gleichgewicht als Resolventenübergang

Remark 6 (Biologische Stasis und plötzliche Übergänge). Das Muster langer biologischer Stasis, unterbrochen von plötzlichen evolutionären Übergängen (Punctuated Equilibrium, Gould & Eldredge, 1977; siehe auch Kauffman, 1993), findet eine strukturelle Erklärung im Resolventenrahmen [Geiger, 2026e]. Perioden der Stasis entsprechen resolventenstabilen Phasen: die Kopplungsstruktur zweiter Ordnung erhält die aktuelle Konfiguration gegen Störungen. Plötzliche Übergänge treten auf, wenn Umwelt- oder interne Änderungen die Kopplungsarchitektur zweiter Ordnung reorganisieren, analog zu Phasenübergängen in physikalischen Systemen, wo kritische Parameteränderungen qualitative Reorganisationen der Stabilitätslandschaft auslösen. Evolutionäre Hauptübergänge—vom Prokaryoten zum Eukaryoten, von der Einzelzelligkeit zur Multizellularität—sind somit keine graduellen Optimierungen, sondern *Resolventenübergänge*: Reorganisationen der Kopplungsstruktur, die einen qualitativ neuen stabilen Fixpunkt etablieren.

12.4 Stabilität vs. Maximierung: Die Resolventenperspektive

Das FST-Framework beschreibt *Stabilitätsprinzipien*, keine Maximierungsprinzipien. Die allgemeine Resolventenperspektive—gültig über alle drei FST-Papers hinweg—wird in FST-II [Geiger, 2026b] entwickelt; hier konzentrieren wir uns auf ihre biologischen Implikationen. Die Dynamik führender Ordnung ist entartet: viele biologische Konfigurationen sind in erster Ordnung gleichermaßen lebensfähig. Die Selektion erfolgt in zweiter Ordnung über resolventenartige Kopplung zwischen entarteten und komplementären Unterräumen. MEPP wirkt als Stabilitätsfilter, der den einzigen resolventenstabilen Fixpunkt innerhalb der entarteten Mannigfaltigkeit identifiziert. Diese strukturelle Logik—motiviert durch die strukturellen Parallelen in der eichtheoretischen Reformulierung der Riemannschen Vermutung [Geiger, 2026e]—adressiert gleichzeitig die MEPP-Kontroverse (MEPP selektiert für Stabilität, nicht für maximale Dissipation), die ESS-Interpretation (ESS sind resolventenstabile Fixpunkte, keine Fitnessoptima), die Rolle der Nash-Frustration (ein notwendiges strukturelles Merkmal der Stabilisierung zweiter Ordnung) und das unterbrochene Gleichgewicht (plötzliche Übergänge reflektieren Reorganisation der Resolventen-Kopplungsstruktur). Über alle drei FST-Papers hinweg gilt die gleiche Selektionslogik zweiter Ordnung: Nash-Gleichgewichte sind keine Optima, sondern resolventenstabile Fixpunkte.

Im vorliegenden Kontext veranschaulicht die Nash-Frustration von Proteinfaltungen (Abschnitt 4) diese Architektur: In führender Ordnung sind viele Konformationen thermodynamisch lebensfähig. Die native Faltung ist nicht das globale Energieminimum, sondern die resolventenstabile Konfiguration, in der alle Destabilisierungskanäle zweiter Ordnung—Fehlfaltung, Aggregation, proteolytische Verletzlichkeit—gleichzeitig unterdrückt sind. Die residuale Nash-Frustration ($\rho(J) \approx 1$) ist kein Defekt, sondern die strukturelle Signatur dieser Stabilisierung zweiter Ordnung.

12.5 MEPP: Geltungsbereich und Einschränkungen

Das Maximum-Entropieproduktions-Prinzip wird in diesem Paper als heuristisches Organisationsprinzip verwendet, nicht als bewiesenes physikalisches Gesetz. Die MEPP-Kontroverse—einschließlich der Grinstein–Linsker-Kritik, Martyushevs Anwendbarkeitsbedingungen, der mEPP/MEPP-Regimetrennung und der Resolventen-Reinterpretation—wird ausführlich in FST-II [Geiger, 2026b] diskutiert; hier fassen wir nur die für die biologische Domäne relevantesten Einschränkungen zusammen:

- Die theoretischen Grundlagen von MEPP erfordern lokales thermodynamisches Gleichgewicht und bilineare Entropieproduktion [Martyushev, 2010]. Biologische Systeme fern vom Gleichgewicht verletzen diese Bedingungen in der Regel.
- Die Resolvent-Perspektive (Abschnitt 12) adressiert diese Einschränkung, indem MEPP als Stabilitätsfilter reinterpretiert wird: Unter den vielen biologisch lebensfähigen Konfigurationen erster Ordnung identifiziert MEPP den resolvent-stabilen Fixpunkt – nicht die Konfiguration mit maximaler Dissipation, sondern diejenige, bei der alle Destabilisierungskanäle zweiter Ordnung gleichzeitig unterdrückt sind.
- Diese schwächere Interpretation ist kompatibel mit Prigogines minimaler Entropieproduktion nahe dem Gleichgewicht: Intern können Organismen die Entropieproduktion minimieren (FEP), während sie extern maximieren (MEPP), wie in Conjecture 1 gezeigt.
- Ein aktueller Review von Sawada, Daigaku & Toma [Sawada et al., 2025] bestätigt, dass MEPP einen konsistenten thermodynamischen Rahmen für das Verständnis der Entstehung und Evolution des Lebens auf makroskopischen Skalen liefert, wobei eine fundamentale Herleitung aus First Principles fern vom Gleichgewicht weiterhin aussteht. Dies stützt die Verwendung von MEPP als heuristisches Organisationsprinzip in diesem Paper.

Zirkularitätsvorbehalt. Wenn MEPP als Payoff-Funktion dient und Nash-Gleichgewichte als MEPP-maximierende Zustände definiert werden, ist die Behauptung, dass biologische Systeme Nash-Gleichgewichte einnehmen, *weil* sie Entropieproduktion maximieren, definitorisch zirkulär. Der nicht-zirkuläre Gehalt dieses Frameworks ist die *Stabilitäts*-Aussage: Biologische Attraktoren sind nicht bloß entropieproduzierend, sondern in zweiter Ordnung stabile Fixpunkte, bei denen alle Destabilisierungskanäle (Parasitismus, Mutation, ökologische Invasion) gleichzeitig unterdrückt sind. Diese Stabilitätseigenschaft ist unabhängig von der Payoff-Definition testbar (Vorhersagen P1–P5).

12.6 Nash-Frustration jenseits der Hesse-Matrix

Ein naheliegender Einwand gegen den Nash-Frustrations-Formalismus ist, dass der Best-Response-Jacobian $J = I - \eta H$ eine lineare Transformation der Hesse-Matrix ist, wenn der Payoff gleich $-\Delta G$ (der negativen Freien-Energie-Änderung) gesetzt wird, und Nash-Frustration somit auf eine Eigenwertanalyse der Energielandschaft reduziert wird—im Wesentlichen eine Normalmoden-Analyse im spieltheoretischen Gewand. Dieser Einwand identifiziert korrekt den mathematischen Kern, verfehlt aber den konzeptuellen und praktischen Gehalt, der über die Standard-Hesse-Analyse hinausgeht:

1. **Rest-spezifische Zerlegung:** Der Nash-Frustrations-Formalismus projiziert instabile Moden über Eigenvektor-Komponenten auf einzelne Reste und erzeugt einen *Rest-spezifischen Frustrationswert*, der Koordinationsversagen lokalisiert. Rest-spezifische Eigenvektor-Projektionen sind selbst in der Normalmoden-Analyse Standard—die bekannte B -Faktor-Berechnung $B_i = \frac{8\pi^2}{3} \sum_k \omega_k^{-2} |v_{k,i}|^2$ ist strukturell analog. Der Unterschied liegt im *Gewichtungsschema*: NMA- B -Faktoren summieren über *alle* Moden gewichtet mit der inversen Frequenz zum Quadrat (Betonung langsamer, kollektiver Bewegungen), während Nash-Frustration ausschließlich auf *instabile* Moden ($|\lambda_k| > 1$) projiziert, gewichtet mit dem Instabilitätsüberschuss ($|\lambda_k| - 1$). Diese selektive Projektion isoliert spieltheoretisches Koordinationsversagen statt allgemeiner Flexibilität und erzeugt eine biologisch interpretierbare Karte davon, wo das Faltungsspiel am stärksten umkämpft ist. Zukünftige Arbeiten sollten Nash-Frustrationskarten direkt mit B -Faktor-Profilen vergleichen, um den Grad der Überlappung und Komplementarität zu quantifizieren.
2. **Multi-Start-Konvergenzdiagnostik:** Die Best-Response-Dynamik (64 zufällige Starts, je 6 000 Schritte) liefert Information über die Beckenstruktur des Spiels: Wie viele Starts konvergieren zur nativen Faltung, wie viele bleiben in alternativen Konfigurationen gefangen, und welche Reste sind für Konvergenzversagen verantwortlich. Diese dynamische Information fehlt in einer statischen Hesse-Eigenzerlegung.
3. **Verbindung zu Existenzresultaten:** Die MFG-Einbettung (Abschnitt 5.4) verbindet die lokale Hesse-Analyse mit globalen Existenz- und Eindeutigkeitsresultaten (Lasry-Lions-Monotonie). Diese Verbindung—von lokalen Spektraleigenschaften zu globalen Konvergenzgarantien—hat kein Analogon in der Standard-Normalmoden-Analyse und liefert ein prinzipielles Kriterium dafür, wann die Faltungslandschaft eine einzige stabile Faltung versus mehrere konkurrierende metastabile Zustände zulässt.
4. **Skalenübergreifende Anwendbarkeit:** Derselbe spieltheoretische Formalismus (Spieler, Strategien, Payoff, Best-Response-Jacobian) gilt auf der genregulatorischen, zellulären und Ökosystem-Ebene (Abschnitte 6–9), während die Normalmoden-Analyse spezifisch für Energielandschaften ist. Die einheitliche Sprache ist der substantielle Beitrag.

Der genuin novel Gehalt der Nash-Frustration liegt somit nicht in der Eigenwertberechnung selbst, sondern im interpretativen Rahmen, der Rest-spezifischen Zerlegung und der Verbindung zur MFG-Existenztheorie. Zukünftige Arbeiten sollten diese Unterscheidung empirisch testbar machen, indem Nash-Frustrationskarten mit Standard- B -Faktor-Profilen verglichen werden (die ebenfalls aus Normalmoden abgeleitet sind): Die Vorhersage ist, dass Nash-Frustration eine teilweise distinkte Menge von Resten identifiziert—solche an spieltheoretischen Koordinationsgrenzen statt einfach flexible Regionen.

12.7 Konsolidierte Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen sollten bei der Bewertung des Frameworks berücksichtigt werden:

1. **Nash-Frustrations-Kalibrierung:** Während das Frustrations-*Ranking* strikt η -unabhängig ist (Abschnitt 4), hängen die absoluten Frustrationswerte und der globa-

le Spektralradius $\rho(J)$ von η ab. Die Kalibrierung gegen experimentelle Observablen (HDX-Schutzfaktoren, ϕ -Werte) bleibt eine offene Aufgabe.

2. **MEPP-Grundlagen:** MEPP fehlt eine rigorose Herleitung für biologische Systeme fern vom Gleichgewicht (Abschnitt 12).
3. **RG-Formalisierung:** Die Grobkörnungs-Interpretation der Hauptübergänge ist konzeptuell, nicht mathematisch rigoros (Abschnitt 8).
4. **FEP-MEPP-Brücke:** Die Dualitätskonjektur (Conjecture 1) bleibt unbewiesen; die Verbindung von FEP-Minimierung zu MEPP beruht auf dem kompetitiven Selektionsmechanismus, der plausibel, aber nicht formal abgeleitet ist.
5. **Empirische Validierung:** Keine der fünf testbaren Vorhersagen (Abschnitt 11) wurde empirisch getestet; das Framework ist derzeit im theoretischen Stadium.
6. **Geltungsbereich von “Nash-Gleichgewicht”:** Das Konzept wird über sehr verschiedene Domänen angewandt (molekular, zellulär, ökologisch), wo die Begriffe “Spieler”, “Strategie” und “Payoff” domänenspezifische Interpretation erfordern, mit dem Risiko der Inhaltsleere bei zu liberaler Anwendung.
7. **Potentialspiel-Einschränkung:** Die formale FEP-Nash-Brücke (Abschnitt 5) erfordert ein gemeinsames Kostenfunktional (Potentialspiel). Antagonistische Interaktionen (Räuber–Beute, Wirt–Parasit) erfüllen diese Bedingung nicht, was den formalen Geltungsbereich der Brücke auf kooperative oder intra-organismische Settings beschränkt. Die MFG-Einbettung (Abschnitt 5.4) verallgemeinert dies auf Systeme mit Lasry-Lions-Monotonie, aber stark attraktive (kooperative Fehlfaltungs-)Wechselwirkungen bleiben außerhalb der Konvergenzdomäne.

12.8 Status der Behauptungen

Tabelle 8 klassifiziert die zentralen Behauptungen dieses Papers nach epistemischem Status.

12.9 Falsifizierbare Vorhersagen und experimentelle Protokolle

Die Vorhersagen P1–P5 (Abschnitt 11) identifizieren testbare Hypothesen auf Framework-Ebene. Um dem Einwand zu begegnen, dass diese Vorhersagen für eine empirische Widerlegung nicht spezifisch genug sind, formulieren wir hier vier konkrete, falsifizierbare Vorhersagen mit detaillierten experimentellen Protokollen und expliziten Falsifikationskriterien. Jede Vorhersage ist mit existierenden Techniken und öffentlich zugänglichen Daten testbar.

PRED-BIO-1: Nash-Frustration korreliert mit HDX-Schutzfaktoren. *Vorhersage.* Reste mit hohen Nash-Frustrationswerten (oberes Quartil) weisen systematisch *niedrigere* Wasserstoff-Deuterium-Austausch-(HDX)-Schutzfaktoren auf als Reste mit niedriger Nash-Frustration (unteres Quartil). Die Begründung ist, dass Nash-frustrierte Reste Koordinationsversagen im Faltungsspiel repräsentieren: sie sind strukturell verspannt und daher lösungsmittelzugänglicher und konformationell dynamischer.

Tabelle 8: Status der Behauptungen. ETABLIERT: bewiesene oder weithin akzeptierte Ergebnisse, die hier zitiert werden; KONJEKTUR: neue, aber testbare Behauptungen; SPEKULATIV: Framework-Vorschläge ohne direkten empirischen Test.

Behauptung	Status	Evidenz / Referenz
Replikator–Nash–Äquivalenz	ETABLIERT	Hofbauer & Sigmund (1998)
ESS als Nash-Verfeinerung	ETABLIERT	Maynard Smith (1982)
MEPP als heuristisches Organisationsprinzip	ETABLIERT	Martyushev [2010]; Sawada et al. [2025]; Kleidon [2010]
Nash-Frustration als Stabilitätsprädiktor (P1)	KONJEKTUR	Testbar über ϕ -Wert-Korrelation
FEP–MEPP-Dualität über Markov-Blanket	KONJEKTUR	Conjecture 1; kein formaler Beweis
Hierarchische Spielstruktur über Skalen	KONJEKTUR	Abschn. 8; nur qualitativ
Boolesche Netzwerk-Attraktoren als Nash-Gleichgewichte	KONJEKTUR	Abschn. 6; formale Umformulierung, empirischer Test ausstehend
Nash-Gleichgewicht als MFG-Fixpunkt	KONJEKTUR	Abschn. 5.4; Lasry-Lions-Monotonie als Existenzbedingung
RG-Analogie für Hauptübergänge	SPEKULATIV	Konzeptuelle Parallele; kein RG-Fluss berechnet
Kosmologische Erweiterung der Spielstruktur	SPEKULATIV	Abschn. 12.11; ausgelagert in FST-Framework-Paper

Protokoll. (i) Berechne Rest-spezifische Nash-Frustrationswerte für HP35 (Villin-Headpiece, PDB: 1YRF) mit dem spieltheoretischen Potential aus Remark 3. (ii) Entnimm HDX-Schutzfaktoren aus McKnight et al. McKnight et al. [1996] oder führe HDX-MS an rekombinantem HP35 unter nativen Bedingungen durch (pH 7,0, 25 °C, D_2O -Austausch für 10 s bis 10 h). (iii) Berechne die Spearman-Rangkorrelation ρ_S zwischen Rest-spezifischer Nash-Frustration und $\log(P_f)$, wobei P_f der Schutzfaktor ist. (iv) Wiederhole für mindestens zwei weitere kleine Proteine mit publizierten HDX-Daten (z.B. Ubiquitin, BPTI) zur Bewertung der Generalisierbarkeit.

Falsifikationskriterium. Die Vorhersage ist falsifiziert, wenn $\rho_S > -0,15$ (keine bedeutende negative Korrelation) über alle drei Proteine. Eine positive Korrelation ($\rho_S > 0$) würde der Vorhersage direkt widersprechen. Erwartete Effektstärke: $\rho_S \in [-0,5, -0,25]$.

PRED-BIO-2: Globaler Spektralradius sagt Entfaltungskinetik vorher. *Vorhersage.* Proteine mit höherem globalen Spektralradius $\rho(J)$ des Best-Response-Jacobians entfalten sich schneller unter thermischer oder chemischer Denaturierung. Der Spektralradius quantifiziert die Gesamtabweichung von der Nash-Stabilität; ein höherer $\rho(J)$ zeigt stärkere destabilisierende Moden an, die sich als schnellere Entfaltungskinetik manifestieren sollten.

Protokoll. (i) Wähle ein Panel von 15–20 kleinen Einzeldomänen-Proteinen (< 100 Res-te) über diverse Faltungsklassen (α , β , α/β) mit experimentell bestimmten Entfaltungsraten k_u aus Temperatursprung- (T-Jump) oder Stopped-Flow-Experimenten (verfügbar in Datenbanken wie ACPro oder publizierten kinetischen Zusammenstellungen). (ii) Berechne für jedes Protein $\rho(J)$ aus der PDB-Struktur mit der Nash-Frustrations-Pipeline

(Remark 3). (iii) Berechne die Spearman-Rangkorrelation zwischen $\rho(J)$ und $\log(k_u)$.

Falsifikationskriterium. Die Vorhersage ist falsifiziert, wenn $\rho_S < 0,2$ (keine bedeutende positive Korrelation zwischen Spektralradius und Entfaltungsrates). Die Vorhersage behauptet *nicht*, dass $\rho(J)$ ein besserer Prädiktor als Contact Order oder andere etablierte Metriken ist, sondern dass er unabhängige Information trägt: eine Partialkorrelation $\rho_S(\rho(J), \log k_u \mid \text{CO}) > 0,15$ nach Kontrolle für Contact Order würde starke Evidenz darstellen.

PRED-BIO-3: Nash-Frustrations-Anreicherung an allosterischen Stellen und Bindungsinterfaces. *Vorhersage.* Reste, die als allosterisch klassifiziert sind oder an Protein-Protein-Bindungsinterfaces liegen, sind in hohen Nash-Frustrationswerten relativ zum Proteinmittelwert angereichert. Dies ergänzt die bekannte Anreicherung von *energetischer* Frustration an solchen Stellen [Ferreiro, 2014] und sagt vorher, dass spieltheoretisches Koordinationsversagen (Nash-Frustration) und energetische Suboptimalität (Ferreiro-Frustration) teilweise überlappende, aber distinkte Signale sind.

Protokoll. (i) Beschaffe einen Datensatz von Proteinen mit experimentell annotierten allosterischen Stellen aus der Allosteric Database (ASD, asd.pharm.umich.edu) oder CASBench; mindestens 30 Proteine für statistische Aussagekraft. (ii) Berechne für jedes Protein Rest-spezifische Nash-Frustrationswerte und klassifiziere Reste als allosterisch/Interface (aus ASD-Annotationen) oder nicht-funktionell. (iii) Führe einen Wilcoxon-Rangsummentest durch, der Nash-Frustrations-Verteilungen allosterischer vs. nicht-allosterischer Reste vergleicht, gepoolt über alle Proteine. (iv) Berechne die AUC der Nash-Frustration als binärer Klassifikator allosterischer Stellen.

Falsifikationskriterium. Die Vorhersage ist falsifiziert, wenn (a) der Wilcoxon-Test $p > 0,05$ ergibt (keine signifikante Anreicherung) *und* (b) $\text{AUC} < 0,55$ (Klassifikatorleistung nicht von Zufall unterscheidbar). Ein positives Ergebnis erfordert $\text{AUC} > 0,60$ und $p < 0,01$. Zusätzlich behauptet die Vorhersage partielle Unabhängigkeit von energetischer Frustration: die Korrelation zwischen Nash-Frustration und Ferreiro-Frustrationswerten sollte $r < 0,7$ betragen (d. h. sie teilen weniger als 50% Varianz).

PRED-BIO-4: Frustrationskarte sagt Helix-Schmelzreihenfolge vorher. *Vorhersage.* In Multi-Helix-Proteinen schmelzen (entfalten) Helices mit höherer mittlerer Nash-Frustration früher während der thermischen Denaturierung. Die Frustrationskarte sollte die zeitliche Reihenfolge des Sekundärstrukturverlusts vorhersagen.

Protokoll. (i) Wähle 3–5 Multi-Helix-Proteine mit experimentell bestimmter Helix-Schmelzreihenfolge aus NMR-Relaxationsdispersion (R_2 -Dispersion, CPMG-Experimente) oder Wasserstoffaustausch unter progressiv denaturierenden Bedingungen (z. B. HP35 mit drei Helices oder Apomyoglobin mit acht Helices). (ii) Berechne die mittlere Nash-Frustration pro Helix aus der PDB-Struktur. (iii) Ordne Helices nach mittlerer Frustration (höchste = vorhergesagt als erste zu schmelzen) und vergleiche mit der experimentell bestimmten Schmelzreihenfolge mittels Kendalls τ -Rangkorrelation.

Falsifikationskriterium. Die Vorhersage ist falsifiziert, wenn Kendalls $\tau < 0,2$ (keine bedeutsame Rangübereinstimmung) für die Mehrheit ($\geq 3/5$) der Testproteine. Für HP35 im Speziellen sagt die Vorhersage, dass die Helix mit Met11/Pro20 (höchste Frustration, vgl. Abschnitt 4) vor der Helix mit Trp22/Asn18 (niedrigste Frustration) schmilzt; eine Umkehrung dieser Reihenfolge würde die lokale Vorhersage falsifizieren.

Zusammenfassung. Diese vier Vorhersagen sind so konzipiert, dass sie mit existierenden experimentellen Techniken (HDX-MS, T-Jump-Kinetik, NMR-Relaxationsdispersion) und

öffentlich verfügbaren Datenbanken (ASD, ACPro, BMRB) testbar sind. Jede Vorhersage spezifiziert quantitative Schwellenwerte für die Falsifikation. Zusammen liefern sie eine konkrete empirische Agenda zur Validierung oder Widerlegung des Nash-Frustrations-Frameworks auf molekularer Ebene.

12.10 Ist Biologie “nur Physik”?

Die Antwort ist differenziert:

- **Ja:** Das gleiche Optimierungsprinzip (MEPP) und die gleiche mathematische Struktur (Nash-Gleichgewicht) gelten über Skalen hinweg
- **Nein:** Emergenz ist real—höhere Ebenen haben genuine kausale Mächte, die nicht allein aus niedrigeren Ebenen vorhersagbar sind

Der Rahmen ist nicht reduktionistisch im eliminativistischen Sinne. Er identifiziert eine gemeinsame logische Struktur, die auf jeder Skala unterschiedlich instanziiert wird.

12.11 Kosmologische Erweiterungen

Das biologisch-spieltheoretische Framework verbindet sich mit einem breiteren Forschungsprogramm, das skaleninvariante Optimierungsprinzipien über Physik und Kosmologie hinweg untersucht. Spekulative Erweiterungen – einschließlich Verbindungen zu modifizierter Gravitation (MOND) und kosmologischen Randbedingungen – werden separat im FST-Framework-Paper [Geiger, 2026d] entwickelt und sollten nicht als etablierte Bestandteile der hier präsentierten biologischen Theorie gelesen werden.

13 Schlussfolgerung

FST-III argumentiert, dass die Trennung zwischen physikalischen Gesetzen und den Strategien des Lebens weniger scharf ist als gemeinhin angenommen. Biologische Stabilität kann produktiv mit denselben spieltheoretischen und thermodynamischen Werkzeugen analysiert werden, die physikalische Systeme regieren. Das Maximum Entropy Production Principle liefert einen thermodynamischen Stabilitätsfilter, die dissipative Adaptation den Mechanismus der Formbildung, die spieltheoretische ESS die Kriterien für Langzeitstabilität und das Free Energy Principle die Grundlage für adaptives Verhalten.

Die primären Beiträge sind dreifach: (i) der Nash-Frustrations-Formalismus, der ein spieltheoretisches Komplement zur energetischen Frustration in Proteinstrukturen liefert und einem vorläufigen Test gegen NMR-Daten eines einzelnen Proteins unterzogen wurde (HP35, $\rho_S = 0,44$, $p = 0,033$, $n = 24$); (ii) die hierarchische Spielinterpretation evolutionärer Hauptübergänge als Grobkörnungsschritte; und (iii) das Koalitionszusammenbruch-Modell von Krebs, das den Rahmen von Aktipis et al. in die FST-Stabilitätshierarchie einbettet. Vier konkrete falsifizierbare Vorhersagen (PRED-BIO-1 bis PRED-BIO-4) mit expliziten Protokollen und Falsifikationskriterien liefern eine empirische Agenda für die Behauptungen auf molekularer Ebene.

Die zentralen offenen Herausforderungen sind die Kalibrierung der absoluten Nash-Frustrationsskala gegen experimentelle Observablen (HDX-Schutzfaktoren, ϕ -Werte), die Formalisierung der RG-artigen Grobkörnung als explizite Renormierungsflüsse und die rigorose Herleitung der FEP-MEPP-Kompatibilitätskonjektur. Von der Aminosäure bis

zum Ökosystem scheint die spieltheoretische Stabilitätslogik zu gelten; ihre Erweiterung auf kosmologische Skalen [Geiger, 2026d] bleibt spekulativ.

Literatur

- Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory I: A Game-Theoretic Framework for the Thermodynamic Stability of Fundamental Parameters. *Zenodo preprint*, v1.1. Concept DOI: 10.5281/zenodo.20130544.
- Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory II: Chemical Stability and Autocatalytic Selection. *Zenodo preprint*, v1.2. Concept DOI: 10.5281/zenodo.20130563.
- Aktipis, C. A. et al. (2015). Cancer across the tree of life: cooperation and cheating in multicellularity. *Phil. Trans. R. Soc. B*, 370, 20140219. DOI: 10.1098/rstb.2014.0219.
- Anfinsen, C. B. (1973). Principles that govern the folding of protein chains. *Science*, 181(4096), 223–230.
- Graudenzi, A., Serra, R., Villani, M., Damiani, C., Colacci, A. & Kauffman, S. A. (2011). Dynamical properties of a Boolean model of gene regulatory network with memory. *Journal of Computational Biology*, 18(10), 1291–1303. DOI: 10.1089/cmb.2010.0069.
- Müssel, C., Hopfensitz, M. & Kestler, H. A. (2010). BoolNet—an R package for generation, reconstruction and analysis of Boolean networks. *Bioinformatics*, 26(10), 1378–1380.
- Kauffman, S. A. (1969). Metabolic stability and epigenesis in randomly constructed genetic nets. *Journal of Theoretical Biology*, 22(3), 437–467.
- Kauffman, S. A. (1993). *The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution*. Oxford University Press.
- Hofbauer, J. & Sigmund, K. (1998). *Evolutionary Games and Population Dynamics*. Cambridge University Press. (Ch. 7: Lotka-Volterra and replicator equivalence).
- Jumper, J. et al. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature*, 596, 583–589. DOI: 10.1038/s41586-021-03819-2.
- Monderer, D. & Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1), 124–143.
- England, J. L. (2013). Statistical physics of self-replication. *Journal of Chemical Physics*, 139, 121923.
- England, J. L. (2015). Dissipative adaptation in driven self-assembly. *Nature Nanotechnology*, 10, 919–923.
- Kleidon, A. (2010). Life, hierarchy, and the thermodynamic machinery of planet Earth. *Physics of Life Reviews*, 7(4), 424–460.
- Bryngelson, J. D. & Wolynes, P. G. (1989). Intermediates and barrier crossing in a random energy model (with applications to protein folding). *The Journal of Physical Chemistry*, 93(19), 6902–6915.

- Friston, K. (2009). The free-energy principle: a rough guide to the brain? *Trends in Cognitive Sciences*, 13(7), 293–301.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 127–138.
- Hamilton, W. D. (1964). The genetical evolution of social behaviour. *Journal of Theoretical Biology*, 7(1), 1–16.
- Maynard Smith, J. & Price, G. R. (1973). The logic of animal conflict. *Nature*, 246, 15–18.
- Bohl, K., Hummert, S., Werner, S., Basanta, D., Deutsch, A., Schuster, S., Theissen, G. & Schroeter, A. (2014). Evolutionary game theory: molecules as players. *Molecular BioSystems*, 10(12), 3066–3074. DOI: 10.1039/C3MB70601J.
- Maynard Smith, J. *Evolution and the Theory of Games*. Cambridge UP, 1982.
- Holt, C. A. & Roth, A. E. (2004). The Nash equilibrium: A perspective. *PNAS*, 101(12), 3999–4002.
- Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n-person games. *PNAS*, 36(1), 48–49.
- Okasha, S. (2006). *Evolution and the Levels of Selection*. Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199267972.001.0001.
- Michod, R. E. (1999). *Darwinian Dynamics: Evolutionary Transitions in Fitness and Individuality*. Princeton University Press.
- Farzulla, M. (2026). The replicator-optimization mechanism: A scale-relative formalism for persistence-conditioned dynamics with application to consent-based metaethics. arXiv:2601.06363.
- Friston, K. et al. (2025). From pixels to planning: scale-free active inference. *Frontiers in Network Physiology*, 5, 1521963. DOI: 10.3389/fnetp.2025.1521963.
- Wilson, K. G. (1975). The renormalization group: critical phenomena and the Kondo problem. *Reviews of Modern Physics*, 47(4), 773–840.
- Schrödinger, E. (1944). *What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell*. Cambridge University Press.
- Sánchez-Cañizares, J. (2021). The Free Energy Principle: Good Science and Questionable Philosophy in a Grand Unifying Theory. *Entropy*, 23(2), 238. DOI: 10.3390/e23020238.
- Gallos, L. K., Makse, H. A. & Sigman, M. (2012). A small world of weak ties provides optimal global integration of self-similar modules in functional brain networks. *PNAS*, 109(8), 2825–2830. DOI: 10.1073/pnas.1106612109.
- Szathmáry, E. & Maynard Smith, J. (1995). The major evolutionary transitions. *Nature*, 374, 227–232. DOI: 10.1038/374227a0.
- Ferreiro, D.U., Hegler, J.A., Komives, E.A. & Wolynes, P.G. Localizing frustration in native proteins and protein assemblies. *PNAS*, 104, 19819–19824, 2007.

- Ferreiro, D.U., Komives, E.A. & Wolynes, P.G. Frustration in biomolecules. *Quarterly Reviews of Biophysics*, 47, 285–363, 2014.
- R. G. Parra, N. P. Schafer, L. G. Radusky, M.-Y. Tsai, A. B. Guzovsky, P. G. Wolynes, and D. U. Ferreiro (2016). Protein Frustratometer 2: a tool to localize energetic frustration in protein molecules, now with electrostatics. *Nucleic Acids Research*, 44(W1), W356–W360. DOI: 10.1093/nar/gkw304.
- Martyushev, L. M. (2010). The maximum entropy production principle: two basic questions. *Phil. Trans. R. Soc. B*, 365, 1333–1334.
- Gould, S. J. & Eldredge, N. (1977). Punctuated equilibria: the tempo and mode of evolution reconsidered. *Paleobiology*, 3(2), 115–151.
- Brown, J. H., Gillooly, J. F., Allen, A. P., Savage, V. M. & West, G. B. (2004). Toward a metabolic theory of ecology. *Ecology*, 85(7), 1771–1789.
- Geiger, L. (2026). From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis. *Zenodo preprint*, v2.1. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19035640.
- Geiger, L. (2026). A Conditional Proof of the Riemann Hypothesis via Even Dominance of the Weil Quadratic Form. *Zenodo preprint*, v1.2. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19764771.
- Geiger, L. (2026). FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory. *Zenodo preprint*, v1.7. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19036190.
- Sawada, Y., Daigaku, Y. & Toma, K. (2025). Maximum entropy production principle of thermodynamics for the birth and evolution of life. *Entropy*, 27(4), 449. DOI: 10.3390/e27040449.
- Alon, U. (2007). *An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL.
- Wagner, A. (2005). *Robustness and Evolvability in Living Systems*. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- M. Kjaergaard and F. M. Poulsen (2011). Sequence correction of random coil chemical shifts: correlation between neighbor correction factors and changes in the Ramachandran distribution. *Journal of Biomolecular NMR*, 50, 157–165. DOI: 10.1007/s10858-011-9508-2.
- J.-M. Lasry and P.-L. Lions (2007). Mean Field Games. *Japanese Journal of Mathematics*, 2, 229–260. DOI: 10.1007/s11537-007-0657-8.
- D. Vardar, D. A. Buckley, B. S. Frank, and C. J. McKnight (1999). NMR structure of an F-actin-binding “headpiece” motif from villin. *Journal of Molecular Biology*, 294, 1299–1310. DOI: 10.1006/jmbi.1999.3321. BMRB entry 4428; BMRB DOI: 10.13018/BMR4428.

- D. S. Wishart, C. G. Bigam, A. Holm, R. S. Hodges, and B. D. Sykes (1995). ^1H , ^{13}C and ^{15}N random coil NMR chemical shifts of the common amino acids. I. Investigations of nearest-neighbor effects. *Journal of Biomolecular NMR*, 5, 67–81. DOI: 10.1007/BF00227471.
- M. P. Williamson (2013). Using chemical shift perturbation to characterise ligand binding. *Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy*, 73, 1–16. DOI: 10.1016/j.pnmrs.2013.02.001.
- C. J. McKnight, D. S. Doering, P. T. Matsudaira, and P. S. Kim (1996). A thermostable 35-residue subdomain within villin headpiece. *Journal of Molecular Biology*, 260, 126–134. DOI: 10.1006/jmbi.1996.0387.

KI-Offenlegung

Diese Arbeit wurde von Claude (Anthropic) bei der Literatursynthese, mathematischen Verifikation und Texterstellung unterstützt. Alle wissenschaftlichen Behauptungen, originalen Argumente und theoretischen Beiträge liegen in der alleinigen Verantwortung des menschlichen Autors. Kein KI-System ist als Koautor gelistet.