

Arithmetische Positivität und absolute Hodge-Klassen: Warum Hodge-Riemann-Positivität Delignes Absolutheit nicht verstärkt

Lukas Geiger¹

¹Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland
(Dated: May 16, 2026)

Wir führen das Konzept der *arithmetischen Positivität* für die Hodge-Vermutung ein: eine rationale (p, p) -Klasse $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q})$ auf einer glatten projektiven Varietät $X/\mathbb{C}$ heißt arithmetisch positiv, wenn sie gleichzeitig Hodge-Riemann-Positivität unter allen Polarisierungen, Delignes Absolutheit unter allen Automorphismen von $\mathbb{C}$ und Lefschetz-Kompatibilität erfüllt. Wir beweisen, dass algebraische Klassen arithmetisch positiv sind, und dokumentieren begrenzte Funktorialitätstests: endlicher Rückzug ist auf dem Rückzugskegel ample Klassen kontrolliert und wird nur unter einer expliziten Ample-Kegel-Vergleichshypothese zu einer vollen AP-Aussage; Künneth-Produkte werden für primitive Klassen und von Produktpolarisierungen erzeugte ample Kegel behandelt; endlicher Vorwärtsschub bleibt konjunktural.

Die zentrale Beobachtung ist ein **Grenzresultat**: Der arithmetisch positive Kegel stimmt exakt mit Delignes absoluten Hodge-Klassen überein ($AP^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X)$), weil die Hodge-Riemann-Bilinearrelationen die Positivitätsbedingungen für jede Klasse vom Typ (p, p) automatisch garantieren. Dies ist eine wohlbekannte Konsequenz der Hodge-Riemann-Relationen; der Beitrag dieser Arbeit besteht darin, diese Sättigungsgrenze explizit zu machen und abzugrenzen, was Hodge-Riemann-basierte Positivitätsmethoden nicht leisten können. Der natürliche Versuch, Delignes Absolutheit durch Hodge-Riemann-Positivität zu verstärken, liefert daher keine neuen Einschränkungen. Die Arithmetische Positivitätsvermutung reduziert sich auf Delignes Frage (1982): „Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?“ Ferner sind die Obstruktionen (O1) und (O3) in der No-Go-Formulierung für rationale (p, p) -Klassen vakuos; nur (O2), Versagen der Absolutheit, ist effektiv. Wir führen das Galois-Hodge-Riemann-Spektrum als Visualisierung des Absolutheitstests ein und diskutieren kontrollierte Testfamilien für Bedingungen, die genuin stärker als die Hodge-Riemann-Relationen sein müssten.

Diese Arbeit ist ein expositorischer Beitrag, der eine strukturelle Limitation dokumentiert; sie enthält keine neuen Resultate über die Beobachtung $AP = \text{AbsHodge}$ hinaus.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

KI-Werkzeuge (Claude von Anthropic) wurden für mathematische Formalisierung, Literaturverifikation und redaktionelle Überarbeitung eingesetzt. Alle mathematischen Inhalte wurden vom Autor entwickelt, verifiziert und freigegeben.

ist eine $\mathbb{Q}$ -Linearkombination von Klassen algebraischer Zykel.

Trotz über sieben Jahrzehnten der Forschung bleibt die Vermutung im Allgemeinen offen. Sie ist bekannt für:

- Divisoren ($p = 1$): durch das Lefschetz-(1,1)-Theorem.
- Abelsche Varietäten der Dimension ≤ 5 : durch Arbeiten von Hazama, Moonen und anderen.
- Produkte elliptischer Kurven und bestimmte Fermat-Hyperflächen.
- Uniruled-Varietäten (für Grad-2-Klassen).

I. EINFÜHRUNG

A. Die Hodge-Vermutung

Sei X eine glatte projektive Varietät der Dimension n über $\mathbb{C}$. Die Hodge-Zerlegung

$$H^k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X) \quad (1)$$

drückt die k -te singuläre Kohomologie als direkte Summe von Dolbeault-Kohomologiegruppen aus. Eine Klasse $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q})$ heißt *rationale Hodge-Klasse*, wenn ihr Bild in $H^{2p}(X, \mathbb{C})$ vollständig in $H^{p,p}(X)$ liegt. Jeder algebraische Zyklus Z der Kodimension p definiert eine rationale Hodge-Klasse $\text{cl}(Z) \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ über die Zykusklassenabbildung.

Conjecture I.1 (Hodge, 1950). *Jede rationale Hodge-Klasse auf einer glatten projektiven Varietät über $\mathbb{C}$*

B. Warum Konstruktion scheitert

Alle großen Ansätze zur Hodge-Vermutung teilen eine gemeinsame Strategie: den algebraischen Zyklus, der eine gegebene Hodge-Klasse repräsentiert, zu *konstruieren*. Diese Arbeit argumentiert, dass diese Strategie grundlegend fehlgeleitet ist, und schlägt eine Alternative vor: zu beweisen, dass nichtalgebraische Hodge-Klassen über eine Positivitätsobstruktion *unmöglich* sind.

Die strukturellen Versagen bestehender Ansätze sind:

1. Direkte Algebraisierung. Gegeben eine rationale (p, p) -Klasse, versuche eine Untervarietät zu konstruieren, deren Fundamentalklasse mit ihr übereinstimmt. Dies scheitert, weil es keine kanonische Projektion von Hodge-Kohomologie auf algebraische Zyklen gibt und die Konstruktion unter Deformation nicht funktoriell ist.

2. Variationen von Hodge-Strukturen. Verwende Familien X_t und verfolge, wie sich Hodge-Klassen ändern. Dies scheitert, weil Hodge-Klassen „springen“ können – die Bedingung, vom Typ (p, p) zu sein, ist nicht offen in der Zariski-Topologie – und Monodromie naive Stabilitätsargumente zerstört [1].

3. Motivische Methoden. Ersetze Varietäten durch Motive und hoffe, dass Hodge-Klassen motivisch sind. Dies scheitert, weil die Kategorie der Motive nicht vollständig konstruiert ist: Grothendiecks Standardvermutungen [11] bleiben offen, und die Beziehung zwischen Hodge-Klassen und absoluten Hodge-Klassen ist ungeklärt [4].

4. Reduktion mod p . Reduziere auf Charakteristik p , berufe die Tate-Vermutung und lichte zurück. Dies scheitert, weil die Brücke $\text{Hodge} \Rightarrow \text{Tate} \Rightarrow \text{Hodge}$ nicht geschlossen ist: Frobenius-Invarianz impliziert nicht den Hodge-Typ, und das Liften algebraischer Zyklen ist nicht eindeutig [5].

Wie wir unten zeigen, stößt auch die in dieser Arbeit vorgeschlagene Positivitätsalternative auf eine fundamentale Einschränkung: die natürlichen Positivitätsbedingungen reduzieren sich auf Delignes Absolutheit. Dennoch markiert die Analyse eine präzise Grenze für diese Klasse von Ansätzen.

C. Die Positivitätsalternative

Wir beobachten, dass grosse Durchbrüche in benachbarten Vermutungen einem anderen Muster folgen:

Vermutung	Schlüsseltechnik
Weil-Vermutungen	Positivität der Frobenius-Eigenwerte
BSD (Rang 1)	Positivität der Höhen (Gross–Zagier)
Tate (abelsche Var.)	Positivität via Faltings’ Theorem

Jeder dieser Erfolge beruht nicht auf der Konstruktion des gewünschten Objekts, sondern darauf zu zeigen, dass seine Nichtexistenz eine Positivitätsbedingung verletzen würde. Der Hodge-Vermutung fehlt genau dies: *eine Positivitätsstruktur, die Algebraizität erzwingt, ohne Zykel zu konstruieren.*

Diese Arbeit führt eine solche Struktur ein – *arithmetische Positivität* – die Hodge-Riemann-Positivität unter allen Polarisierungen mit Delignes Absolutheit unter allen Automorphismen von $\mathbb{C}$ kombiniert. Die zentrale Beobachtung ist jedoch ein Grenz-/No-Go-Resultat: die Hodge-Riemann-Bilinearrelationen garantieren die Positivitätsbedingungen für jede Klasse vom Typ (p, p)

automatisch, sodass der arithmetisch positive Kegel mit Delignes absoluten Hodge-Klassen übereinstimmt: $\text{AP}^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X)$. Diese automatische Sättigung ist Spezialisten bekannt; Ziel dieser Arbeit ist es, die Sättigungsgrenze in einem einheitlichen Positivitätsrahmen explizit zu machen. Der Versuch, Absolutheit durch Hodge-Riemann-Positivität zu verstärken, liefert keine neuen Einschränkungen. Die Arithmetische Positivitätsvermutung reduziert sich auf Delignes Frage: „Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?“

Wir betrachten dieses negative Resultat als informativ: es markiert eine präzise Grenze für positivitätsbasierte Ansätze zur Hodge-Vermutung und identifiziert das Galois-Hodge-Riemann-Spektrum als diagnostisches Werkzeug.

D. Gliederung

Abschnitt II wiederholt die Hodge-Riemann-Bilinearform und absolute Hodge-Klassen. Abschnitt III führt arithmetische Positivität ein. Abschnitt IV beweist, dass algebraische Klassen arithmetisch positiv sind. Abschnitt V dokumentiert begrenzte Funktorialitätstests und ihre Hypothesen. Abschnitt VI formuliert das No-Go-Theorem. Abschnitt VII beweist die Äquivalenz für abelsche Varietäten. Abschnitt VIII identifiziert die präzise Obstruktion. Abschnitt IX diskutiert die verbleibende Lücke und die Beziehung zu Delignes Programm.

II. HINTERGRUND

A. Hodge-Riemann-Bilinearform

Sei X eine glatte projektive Varietät der Dimension n , ausgestattet mit einer Kähler-Form ω , die eine ample Klasse $L = [\omega] \in H^{1,1}(X) \cap H^2(X, \mathbb{Z})$ definiert. Der *Lefschetz-Operator* $\Lambda_L : H^k(X) \rightarrow H^{k+2}(X)$ ist definiert durch $\Lambda_L(\alpha) = L \cup \alpha$. Wir verwenden die Konvention $\Lambda_L(\alpha) = L \cup \alpha$; einige Autoren reservieren Λ für den dualen Lefschetz-Operator und notieren die Cup-Produkt-Operation einfach als L oder $L \wedge$ (Voisin [1]; Griffiths–Harris [2]).

Theorem II.1 (Hard Lefschetz). *Für $k \leq n$ ist die Abbildung $\Lambda_L^{n-k} : H^k(X, \mathbb{Q}) \rightarrow H^{2n-k}(X, \mathbb{Q})$ ein Isomorphismus.*

Eine Klasse $\alpha \in H^k(X, \mathbb{Q})$ mit $k \leq n$ ist *primitiv* (bezüglich L), wenn $\Lambda_L^{n-k+1}(\alpha) = 0$. Die *Hodge-Riemann-Bilinearform* auf der primitiven Kohomologie $P^k(X, \mathbb{Q}) \subset H^k(X, \mathbb{Q})$ ist:

$$Q_L(\alpha, \beta) = \int_X \alpha \cup \beta \cup L^{n-k}. \quad (2)$$

Theorem II.2 (Hodge-Riemann-Bilinearrelationen). *Auf dem primitiven Unterraum $P^{p,q}(X) = P^{p+q}(X) \cap H^{p,q}(X)$ mit $p + q = k$ ist die hermitesche Form*

$$h_L(\alpha, \beta) = i^{p-q} (-1)^{k(k-1)/2} Q_L(\alpha, \bar{\beta}) \quad (3)$$

positiv definit.

Die Hodge-Riemann-Relationen sind das fundamentale Positivitätsresultat in der Hodge-Theorie. Sie liefern Definitheit *relativ zu einer festen Polarisierung* L . Ein zentrales Thema dieser Arbeit ist, dass Algebraizität Positivität nicht nur für ein L erfordert, sondern für *alle* zulässigen Polarisierungen und Operationen.

B. Absolute Hodge-Klassen

Deligne [3] führte eine Verfeinerung von Hodge-Klassen ein. Ein Automorphismus $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ sendet eine glatte projektive Varietät $X/\mathbb{C}$ auf die konjugierte Varietät X^σ (gleiche Gleichungen, Koeffizienten verdrillt durch σ). Der Vergleichsisomorphismus liefert:

$$H_{\text{dR}}^{2p}(X/\mathbb{C}) \xrightarrow{\sim} H_{\text{dR}}^{2p}(X^\sigma/\mathbb{C}), \quad (4)$$

der die de Rham-Klasse von α auf X auf eine Klasse α^σ auf X^σ abbildet.

Definition II.3 (Deligne). Eine rationale Hodge-Klasse $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ ist *absolut* (oder *absolut Hodge*), wenn für jeden $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ die konjugierte Klasse α^σ wieder eine Hodge-Klasse auf X^σ ist.

Theorem II.4 (Deligne [3]). *1. Jede algebraische Klasse ist absolut.*

2. Auf abelschen Varietäten ist jede Hodge-Klasse absolut.

Delignes Resultat zeigt, dass Absolutheit eine *notwendige* Bedingung für Algebraizität ist. Die Frage ist, ob sie hinreichend ist. Unser Konzept der arithmetischen Positivität *versucht*, Absolutheit durch Hinzufügen von Hodge-Riemann-Positivität unter allen Konjugationen zu verstärken; wie in Abschnitt IX gezeigt, gelingt dies nicht (die zusätzlichen Bedingungen sind automatisch), aber die Analyse ist informativ.

III. ARITHMETISCHE POSITIVITÄT

Wir führen nun das zentrale Konzept ein.

A. Definition

Sei X eine glatte projektive Varietät der Dimension n über $\mathbb{C}$, und sei $\text{Amp}(X)$ der ample Kegel von X .

Definition III.1 (Arithmetische Positivität). Eine rationale Hodge-Klasse $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ ist *arithmetisch positiv*, wenn sie die folgenden drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt:

In der direkten primitiven Notation unten arbeiten wir im mittleren oder unteren Bereich $2p \leq n$; Klassen in komplementärer Kodimension sind über Poincaré-Dualität zu verstehen. Entsprechend wird die Lefschetz-Kompatibilität nur für Cup-Potenzen gefordert, deren primitive Komponente im mittleren oder unteren Bereich direkt definiert ist.

(AP1) Universelle Hodge-Riemann-Positivität. Für jede ample Klasse $L \in \text{Amp}(X)$ erfüllt die primitive Komponente α_0 von α (bezüglich L) die *vorzeichenbehaftete* Hodge-Riemann-Ungleichung:

$$(-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0) \geq 0, \quad (5)$$

wobei Q_L die Hodge-Riemann-Form (2) ist. Das Vorzeichen $(-1)^p$ ist wesentlich: die Hodge-Riemann-Bilinearrelationen (Theorem II.2) ergeben $(-1)^p Q_L > 0$ auf primitiven (p, p) -Klassen, nicht $Q_L > 0$.

(AP2) Absolute Stabilität. Für jeden $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$:

- (a) α^σ ist eine Hodge-Klasse auf X^σ (d.h., α ist absolut).
- (b) Die konjugierte Klasse α^σ erfüllt (AP1) auf X^σ bezüglich jeder amplen Klasse $L^\sigma \in \text{Amp}(X^\sigma)$.

(AP3) Lefschetz-Kompatibilität. Für alle $0 \leq j \leq [n/2] - p$ und alle amplen L , sei $\gamma_j = \Lambda_L^j \alpha \in H^{2(p+j)}(X)$ und $\gamma_{j,0}$ ihre primitive Komponente bezüglich L in $H^{2(p+j)}(X)$. Dann:

$$(-1)^{p+j} Q_L(\gamma_{j,0}, \gamma_{j,0}) \geq 0. \quad (6)$$

Die Menge der arithmetisch positiven Klassen in $H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ wird mit $\text{AP}^p(X)$ bezeichnet.

Remark III.2. Die Bedingungen (AP1), (AP2b) und (AP3) sind *nicht* unabhängig von (AP2a). Wie in Proposition IX.1 unten gezeigt, garantieren die Hodge-Riemann-Bilinearrelationen (AP1), (AP2b) und (AP3) automatisch für jede Klasse vom Typ (p, p) . Die einzige substantielle Bedingung ist daher (AP2a): Delignes Absolutheit. Insbesondere gilt $\text{AP}^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X)$ (Bemerkung IX.2). Die Definition behält alle drei Bedingungen aus darstellerischen Gründen bei: sie machen den *Typ* der Positivität explizit, den algebraische Klassen genießen, auch wenn die Hodge-Riemann-Relationen sie für (p, p) -Klassen automatisch machen. Genuin stärkere Bedingungen zu finden – jenseits der Hodge-Riemann-Relationen – die *tatsächlich* über Absolutheit hinaus einschränken, bleibt ein offenes Problem (siehe Abschnitt IX).

B. Die Arithmetische Positivitätsvermutung

Conjecture III.3 (Arithmetische Positivitätsvermutung). *Sei X eine glatte projektive Varietät über $\mathbb{C}$. Dann gilt:*

$$\mathrm{AP}^p(X) = \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}}), \quad (7)$$

wobei $\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}}$ die Chow-Gruppe der Kodimension- p -Zykel mit rationalen Koeffizienten ist und cl die Zyklusklassenabbildung.

Proposition III.4. *Die folgenden Beziehungen gelten zwischen der APV und der HV:*

1. *Die Hodge-Vermutung impliziert die Arithmetische Positivitätsvermutung.*
2. *Die „schwere Richtung“ der APV ($\mathrm{AP}^p(X) \subseteq \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$) zusammen mit der Aussage, dass alle rationalen Hodge-Klassen arithmetisch positiv sind ($H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X) \subseteq \mathrm{AP}^p(X)$), impliziert die HV.*
3. *Unbedingt: $\mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}}) \subseteq \mathrm{AP}^p(X)$ (Theorem IV.1 unten).*

Proof. (1) Wenn die HV gilt, ist jede Hodge-Klasse algebraisch, und algebraische Klassen erfüllen (AP1)–(AP3) (Theorem IV.1 unten). Somit $\mathrm{AP}^p(X) \subseteq H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X) = \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$, und die umgekehrte Inklusion gilt nach Theorem IV.1, also $\mathrm{AP}^p(X) = \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$.

(2) Dies erfordert zwei separate Annahmen. *Erstens*, die schwere Richtung der APV gelte: $\mathrm{AP}^p(X) \subseteq \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$, d.h. jede arithmetisch positive Klasse ist algebraisch. *Zweitens*, jede rationale Hodge-Klasse sei arithmetisch positiv: $H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X) \subseteq \mathrm{AP}^p(X)$. Unter beiden Annahmen liegt jede rationale Hodge-Klasse α in $\mathrm{AP}^p(X)$ (nach der zweiten Annahme) und damit in $\mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$ (nach der ersten Annahme), also ist α algebraisch. Dies ergibt die HV.

Keine der beiden Annahmen genügt allein: die APV ($\mathrm{AP}^p = \mathrm{alg}^p$) zeigt, dass AP-Klassen algebraisch sind, aber ohne das Wissen, dass alle Hodge-Klassen AP sind, kann man nicht schließen, dass alle Hodge-Klassen algebraisch sind.

(3) Siehe Theorem IV.1. $\square$

Remark III.5. Die APV allein impliziert die HV nicht direkt. Die APV behauptet $\mathrm{AP}^p = \mathrm{alg}^p$, während die HV $\mathrm{Hodge}^p = \mathrm{alg}^p$ behauptet. Da $\mathrm{AP}^p \subseteq \mathrm{Hodge}^p$ (arithmetische Positivität stellt zusätzliche Bedingungen jenseits einer Hodge-Klasse), gibt die APV $\mathrm{alg}^p \subseteq \mathrm{Hodge}^p$ (trivial), aber nicht $\mathrm{Hodge}^p \subseteq \mathrm{alg}^p$ ohne das zusätzliche Wissen, dass alle Hodge-Klassen arithmetisch positiv sind. Der nichttriviale Inhalt zerfällt in zwei Teile: (i) zeige dass nicht-AP Hodge-Klassen nicht existieren (d.h. jede Hodge-Klasse ist AP), und (ii) zeige dass AP Algebraizität impliziert (die schwere Richtung der APV).

Der nichttriviale Inhalt der APV ist die „schwere Richtung“: $\mathrm{AP}^p(X) \subseteq \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$. Diese besagt, dass arithmetische Positivität Algebraizität *erzwingt*.

IV. ALGEBRAISCHE KLASSEN SIND ARITHMETISCH POSITIV

Theorem IV.1 (Leichte Richtung). *Sei X eine glatte projektive Varietät über $\mathbb{C}$. Jede Klasse im Bild der Zyklusklassenabbildung ist arithmetisch positiv:*

$$\mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}}) \subseteq \mathrm{AP}^p(X). \quad (8)$$

Proof. Sei $\alpha = \mathrm{cl}(Z)$ für einen algebraischen Zyklus Z der Kodimension p mit rationalen Koeffizienten. Wir verifizieren (AP1)–(AP3).

(AP1): Sei α_0 die L -primitive Komponente von $\alpha = \mathrm{cl}(Z)$. Da α algebraisch ist, liegt es in $H^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q})$, und seine primitive Komponente α_0 liegt in $P^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q})$. Nach den Hodge-Riemann-Bilinearrelationen (Theorem II.2) ist die hermitesche Form h_L positiv definit auf $P^{p,p}(X)$. Für eine rationale (p,p) -Klasse gilt $\bar{\alpha}_0 = \alpha_0$, $i^{p-p} = 1$ und $(-1)^{k(k-1)/2} = (-1)^{p(2p-1)}$ mit $k = 2p$. Also $h_L(\alpha_0, \alpha_0) = (-1)^{p(2p-1)} Q_L(\alpha_0, \alpha_0)$. Da $(-1)^{p(2p-1)} = (-1)^{2p^2-p} = (-1)^p$ (weil $(-1)^{2p^2} = 1$), ergeben die Hodge-Riemann-Relationen:

$$(-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0) > 0 \quad (9)$$

falls $\alpha_0 \neq 0$. Für $\alpha_0 = 0$ (d.h., wenn α keine primitive Komponente hat) gilt die Ungleichung trivial. Dieses Argument verwendet nur die Hodge-Riemann-Relationen auf $P^{p,p}(X)$ und erfordert nicht, dass α_0 selbst die Klasse eines effektiven Zyklus ist.

(AP2): Teil (a) ist Delignes Theorem (Theorem II.4): algebraische Klassen sind absolut. Teil (b) folgt, weil σ algebraische Zykel auf X auf algebraische Zykel auf X^σ sendet (Algebraizität ist eine Eigenschaft polynomialer Gleichungen, die kovariant unter σ transformieren), und algebraische Klassen auf X^σ (AP1) durch das obige Argument erfüllen.

(AP3): Das Hard-Lefschetz-Theorem ist kompatibel mit der Zyklusklassenabbildung: wenn $\alpha = \mathrm{cl}(Z)$, dann ist $\Lambda_L^j \alpha = \mathrm{cl}(Z \cdot L^j)$, wobei $Z \cdot L^j$ der Schnitt mit j Kopien eines Hyperebenenschnitts ist. Im zulässigen Bereich aus Definition III.1 ist dies wieder ein algebraischer Zyklus der Kodimension $p+j$ mit direkt definierter L -primitiver Komponente $\gamma_{j,0} \in P^{p+j,p+j}(X)$. Da $\gamma_{j,0}$ der primitive Anteil einer algebraischen Klasse ist, ergeben die Hodge-Riemann-Relationen $(-1)^{p+j} Q_L(\gamma_{j,0}, \gamma_{j,0}) \geq 0$, mit demselben Argument wie in (AP1). $\square$

V. FUNKTORIALITÄT DER ARITHMETISCHEN POSITIVITÄT

Für ein vollständiges No-Go-Programm müsste der arithmetisch positive Kegel unter den Standardoperationen der algebraischen Geometrie funktoriell sein. Die folgenden Resultate dokumentieren nur die begrenzte Funktorialität, die hier tatsächlich kontrolliert wird.

Proposition V.1 (Rückzug – endliche Morphismen). *Sei $f : Y \rightarrow X$ ein endlicher Morphismus glatter projektiver Varietäten. Wenn $\alpha \in \text{AP}^p(X)$, dann erfüllt $f^*\alpha$ (AP1) für ample Klassen im Rückzugsunterkegel $f^*\text{Amp}(X) \subset \text{Amp}(Y)$ und erfüllt (AP2)–(AP3) auf diesem Unterkegel. Ein volles Element von $\text{AP}^p(Y)$ erhält man nur unter einer expliziten Ample-Kegel-Vergleichshypothese, etwa wenn die relevanten Positivitätsungleichungen durch Dichtheit oder Gleichheit der numerischen ample Kegel von $f^*\text{Amp}(X)$ auf ganz $\text{Amp}(Y)$ fortgesetzt werden können.*

Proof. Sei $f : Y \rightarrow X$ endlich vom Grad d .

(AP1): Da f endlich ist, ist f^*L_X ampel auf Y für jede ample Klasse $L_X \in \text{Amp}(X)$. Für die primitive Komponente α_0 von α bezüglich L_X liefert die Projektionsformel:

$$\int_Y f^*\alpha_0 \cup f^*\bar{\alpha}_0 \cup (f^*L_X)^{n-2p} = d \int_X \alpha_0 \cup \bar{\alpha}_0 \cup L_X^{n-2p},$$

wobei $n = \dim X = \dim Y$. Da $d > 0$ und die rechte Seite $(-1)^p Q_{L_X}(\alpha_0, \alpha_0) \geq 0$ nach Voraussetzung erfüllt, erhalten wir $(-1)^p Q_{f^*L_X}(f^*\alpha_0, f^*\alpha_0) \geq 0$ auf dem Rückzugsunterkegel. Für eine allgemeine ample Klasse $L_Y \in \text{Amp}(Y)$ folgt aus Endlichkeit allein keine Fortsetzung: Die primitive Komponente von $f^*\alpha$ hängt von L_Y ab, und der Rückzugsunterkegel muss nicht dicht im amplen Kegel von Y liegen. Wenn eine zusätzliche Ample-Kegel-Vergleichshypothese Dichtheit oder Gleichheit des relevanten Kegels liefert, setzen Stetigkeit der Hodge-Riemann-Form und der Lefschetz-Zerlegung die Ungleichung auf alle amplen Klassen fort.

(AP2): Rückzug kommutiert mit σ -Konjugation: $(f^*\alpha)^\sigma = (f^\sigma)^*(\alpha^\sigma)$, und $f^\sigma : Y^\sigma \rightarrow X^\sigma$ ist wieder endlich vom selben Grad. Da $\alpha^\sigma \in \text{AP}^p(X^\sigma)$ nach Voraussetzung, folgt das Resultat aus dem (AP1)-Argument angewandt auf f^σ und α^σ .

(AP3): Der Lefschetz-Operator erfüllt $\Lambda_{f^*L}^j \circ f^* = f^* \circ \Lambda_L^j$ (Kompatibilität von Rückzug mit Cup-Produkt). Daher gilt $\Lambda_{f^*L}^j(f^*\alpha) = f^*(\Lambda_L^j\alpha)$, und die Positivität der primitiven Komponente folgt aus dem Grad- d -Argument angewandt auf $\Lambda_L^j\alpha$. $\square$

Remark V.2. Die im Beweis verwendete Gradformel $Q_{f^*L_X}(f^*\alpha_0, f^*\alpha_0) = \deg(f) \cdot Q_{L_X}(\alpha_0, \alpha_0)$ setzt voraus, dass f ein endlicher Morphismus ist (äquivalent: generisch endlich mit $\dim Y = \dim X$). Für einen generisch endlichen Morphismus $f : Y \rightarrow X$ mit $\dim Y = \dim X$, der nicht endlich ist, liefert die Projektionsformel die Gradrelation zwar auf einer dichten offenen Teilmenge, aber der Verzweigungsort erfordert zusätzliche Sorgfalt; die Aussage von Proposition V.1 ist daher auf endliche Morphismen beschränkt.

Remark V.3. Für Morphismen $f : Y \rightarrow X$ mit $\dim Y > \dim X$ ist der Rückzug f^*L_X nicht ampel auf Y , und die primitive Zerlegung auf Y erfordert eine relative Hodge-Riemann-Analyse. Die Funktorialität von AP^p unter allgemeinen Morphismen bleibt offen.

Remark V.4 (Dichte-Vorbehalt). Die Erweiterung von $f^*\text{Amp}(X)$ auf ganz $\text{Amp}(Y)$ erfordert einen expliziten Vergleich der amplen Kegel. Eine nützliche hinreichende Bedingung ist, dass der Rückzugsunterkegel ein dichtes Bild im relevanten numerischen amplen Kegel hat oder dass die numerischen ample Kegel nach Rückzug übereinstimmen. Das kann in Picard-Zahl-eins-Situationen gelten, scheitert aber im Allgemeinen. Ohne solche Zusatzannahme ist Proposition V.1 nur eine Funktorialitätsaussage auf dem Rückzugsunterkegel.

Conjecture V.5 (Vorwärtsschub – endliche Morphismen). *Sei $f : Y \rightarrow X$ ein endlicher Morphismus glatter projektiver Varietäten (also $\dim Y = \dim X$). Wenn $\alpha \in \text{AP}^p(Y)$, dann gilt $f_*\alpha \in \text{AP}^p(X)$.*

Evidenz. Die Projektionsformel $f_*f^* = \deg(f) \cdot \text{id}$ auf $H^*(X, \mathbb{Q})$ impliziert, dass f_* auf dem Bild von f^* injektiv ist (bis auf Skalar). Für $\alpha \in \text{AP}^p(Y)$ und jede ample Klasse $L_X \in \text{Amp}(X)$ ist f^*L_X ampel auf Y (da f endlich). Die Hodge-Riemann-Form auf X ist mit jener auf Y durch die Adjunktion $\int_X f_*\beta \cup \gamma = \int_Y \beta \cup f^*\gamma$ verknüpft. Zusammen mit der Gradformel folgen die Vorzeichenbedingungen für $f_*\alpha$ aus jenen von α . Die absolute Stabilität überträgt sich, da f^σ wieder endlich vom selben Grad ist. Ein vollständiger Beweis erfordert die Verifikation, dass die primitive Zerlegung auf X kompatibel mit f_* angewandt auf primitive Klassen auf Y ist; dies ist nicht offensichtlich, da f_* Primitivität im Allgemeinen nicht erhält. $\square$

Remark V.6. Für Morphismen $f : Y \rightarrow X$ mit $\dim Y > \dim X$ erfordert der Vorwärtsschub f_* ein Gysin-Argument, das die Hodge-Riemann-Form auf Y mit jener auf X über die Grothendieck-Riemann-Roch-Formel und die relative primitive Zerlegung in Beziehung setzt. Diese Analyse wird hier nicht durchgeführt; die Funktorialität von AP^p unter allgemeinem Vorwärtsschub bleibt offen.

Proposition V.7 (Künneth-Produkt – primitive Klassen). *Seien $\alpha \in \text{AP}^p(X)$ und $\beta \in \text{AP}^q(Y)$ primitiv bezüglich amplen Klassen L_X bzw. L_Y . Dann erfüllt $\alpha \boxtimes \beta$ (AP1) für alle Produktpolarisierungen $L = L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y$ und erfüllt (AP2)–(AP3). Insbesondere gilt $\alpha \boxtimes \beta \in \text{AP}^{p+q}(X \times Y)$, wenn Produktpolarisierungen $\text{Amp}(X \times Y)$ erzeugen (z.B. wenn X oder Y Picard-Zahl 1 hat); für allgemeine Produktvarietäten bleibt die Erweiterung auf alle amplen Klassen offen.*

Remark V.8. Die Erweiterung auf nichtprimitive Klassen erfordert eine sorgfältige Analyse der Kreuzterme in der Lefschetz-Zerlegung auf dem Produkt, die hier nicht durchgeführt wird. Das Resultat für primitive Klassen deckt den strukturell wesentlichen Fall ab.

Wir etablieren zunächst ein Schlüssellemma über die Primitivität von äußeren Produkten.

Lemma V.9 (Primitivität äußerer Produkte). *Seien X und Y glatte projektive Varietäten der Dimensionen n*

bzw. m , mit amplen Klassen $L_X \in \text{Amp}(X)$ und $L_Y \in \text{Amp}(Y)$. Setze $L = L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y \in \text{Amp}(X \times Y)$. Wenn $\alpha \in P^{2p}(X, \mathbb{Q})$ primitiv bezüglich L_X und $\beta \in P^{2q}(Y, \mathbb{Q})$ primitiv bezüglich L_Y ist, dann ist $\alpha \boxtimes \beta$ primitiv bezüglich L auf $X \times Y$.

Proof. Setze $k = p + q$ und $N = n + m = \dim(X \times Y)$. Wir müssen zeigen, dass $L^{N-2k+1} \cup (\alpha \boxtimes \beta) = 0$. Da $L = L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y$, liefert die Binomialentwicklung für beliebiges $j \geq 0$:

$$L^j \cup (\alpha \boxtimes \beta) = \sum_{a+b=j} \binom{j}{a} (L_X^a \cup \alpha) \boxtimes (L_Y^b \cup \beta).$$

Jeder Summand verschwindet, es sei denn beide Faktoren sind von null verschieden. Da α L_X -primitiv ist, gilt $L_X^{n-2p+1} \cup \alpha = 0$, also $L_X^a \cup \alpha = 0$ für $a \geq n - 2p + 1$. Analog gilt $L_Y^b \cup \beta = 0$ für $b \geq m - 2q + 1$. Ein Summand mit $a + b = j$ ist nur dann von null verschieden, wenn $a \leq n - 2p$ und $b \leq m - 2q$, was $j \leq (n - 2p) + (m - 2q) = N - 2k$ erfordert. Daher gilt $L^j \cup (\alpha \boxtimes \beta) = 0$ für alle $j \geq N - 2k + 1$, was genau die Primitivitätsbedingung ist. $\square$

Lemma V.10 (Vorzeichenkompatibilität für äußere Produkte). *Unter den Voraussetzungen von Lemma V.9, mit $k = p + q$:*

$$(-1)^k Q_L(\alpha \boxtimes \beta, \alpha \boxtimes \beta) = \binom{N-2k}{n-2p} [(-1)^p Q_{L_X}(\alpha, \alpha)] \cdot [(-1)^q Q_{L_Y}(\beta, \beta)], \quad (10)$$

wobei $N = n + m$ und Q_L, Q_{L_X}, Q_{L_Y} die Hodge-Riemann-Formen (2) auf $X \times Y, X$ bzw. Y sind.

Proof. Nach Lemma V.9 ist $\alpha \boxtimes \beta$ L -primitiv, also liefert die Definition (2) direkt:

$$Q_L(\alpha \boxtimes \beta, \alpha \boxtimes \beta) = \int_{X \times Y} (\alpha \boxtimes \beta)^2 \cup L^{N-2k}.$$

Entwicklung von L^{N-2k} über die Binomialformel wie in Lemma V.9 zeigt, dass der einzige nichtverschwindende Term bei $a = n - 2p, b = m - 2q$ auftritt (erzwungen durch $a \leq n - 2p, b \leq m - 2q$ und $a + b = N - 2k = (n - 2p) + (m - 2q)$). Nach der Künneth-Formel für Integration:

$$\int_{X \times Y} (\alpha \boxtimes \beta)^2 \cup L^{N-2k} = \binom{N-2k}{n-2p} \left(\int_X \alpha^2 \cup L_X^{n-2p} \right) \cdot \left(\int_Y \beta^2 \cup L_Y^{m-2q} \right).$$

Nach Definition (2) sind die Integrale auf X und Y gerade $Q_{L_X}(\alpha, \alpha)$ bzw. $Q_{L_Y}(\beta, \beta)$. Daher:

$$Q_L(\alpha \boxtimes \beta, \alpha \boxtimes \beta) = \binom{N-2k}{n-2p} Q_{L_X}(\alpha, \alpha) \cdot Q_{L_Y}(\beta, \beta).$$

Multiplikation beider Seiten mit $(-1)^k = (-1)^{p+q} = (-1)^p \cdot (-1)^q$ ergibt Gleichung (10). $\square$

Beweis von Proposition V.7. Wir verifizieren (AP1)–(AP3) für $\alpha \boxtimes \beta$ mit $\alpha \in \text{AP}^p(X)$ primitiv und $\beta \in \text{AP}^q(Y)$ primitiv.

(AP1): Sei $L = L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y$ für ample Klassen $L_X \in \text{Amp}(X), L_Y \in \text{Amp}(Y)$. Nach Lemma V.9 ist $\alpha \boxtimes \beta$ L -primitiv, also gleicht es seiner eigenen primitiven Komponente. Nach Lemma V.10:

$$\begin{aligned} & (-1)^{p+q} Q_L(\alpha \boxtimes \beta, \alpha \boxtimes \beta) \\ &= \binom{N-2k}{n-2p} [(-1)^p Q_{L_X}(\alpha, \alpha)] \\ &\cdot [(-1)^q Q_{L_Y}(\beta, \beta)]. \end{aligned}$$

Der Binomialkoeffizient $\binom{N-2k}{n-2p} > 0$, und beide geklammerten Faktoren sind ≥ 0 durch (AP1) für α und β . Daher gilt $(-1)^{p+q} Q_L(\alpha \boxtimes \beta, \alpha \boxtimes \beta) \geq 0$. Ample Klassen der Form $L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y$ bilden einen Unterkegel von $\text{Amp}(X \times Y)$. Da die Menge $\{L \in \text{Amp}(X \times Y) : (-1)^{p+q} Q_L(\gamma_0, \gamma_0) \geq 0\}$ abgeschlossen ist (Q_L hängt stetig von L ab) und diesen Unterkegel enthält, erstreckt sich die Ungleichung auf den Abschluss. Für Produktvarietäten, deren amplen Kegel durch Rückzugsklassen erzeugt wird (z.B. wenn X oder Y Picard-Zahl 1 hat), genügt dies. Im Allgemeinen erfordert die Erweiterung auf ganz $\text{Amp}(X \times Y)$ die Verifikation der Ungleichung für Polarisierungen mit gemischten Termen, was offen bleibt.

(AP2): Für beliebiges $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ gilt $(\alpha \boxtimes \beta)^\sigma = \alpha^\sigma \boxtimes \beta^\sigma$ und $(X \times Y)^\sigma = X^\sigma \times Y^\sigma$. Da $\alpha^\sigma \in \text{AP}^p(X^\sigma)$ und $\beta^\sigma \in \text{AP}^q(Y^\sigma)$ nach Voraussetzung, lässt sich das (AP1)-Argument auf $\alpha^\sigma \boxtimes \beta^\sigma$ auf $X^\sigma \times Y^\sigma$ anwenden.

(AP3): Der Lefschetz-Operator auf dem Produkt erfüllt $\Lambda_L^j(\alpha \boxtimes \beta) = \sum_{a+b=j} \binom{j}{a} (\Lambda_{L_X}^a \alpha) \boxtimes (\Lambda_{L_Y}^b \beta)$. Für primitive α und β haben die nichttrivialen Terme $a \leq n - 2p$ und $b \leq m - 2q$, und die Positivität jedes solchen Terms folgt aus (AP3) für α und β zusammen mit der Vorzeichenberechnung von Lemma V.10.

Für nichtprimitive Klassen führt die primitive Zerlegung auf $X \times Y$ bezüglich L Kreuzterme zwischen verschiedenen Lefschetz-Niveaus ein. Die vollständige Analyse dieser Kreuzterme bleibt offen; der obige Beweis deckt den strukturell wesentlichen Fall primitiver Klassen ab. $\square$

Remark V.11 (Barriere-Lemma: HR-Positivität ist automatisch gesättigt). Bevor wir zum No-Go-Theorem übergehen, heben wir den strukturellen Grund hervor, warum jede positivitätsbasierte Verstärkung der Hodge-Vermutung das Hodge-Riemann-Framework verlassen muss. Für eine glatte projektive Varietät X und jede ample Klasse L garantieren die Hodge-Riemann-Bilinearrelationen:

1. $(-1)^p Q_L(\alpha, \bar{\alpha}) > 0$ für jede nichtverschwindende primitive (p, p) -Klasse α ;
2. Q_L ist nichtentartet auf $H_{\text{prim}}^{p,p}(X)$.

Diese Bedingungen sind *automatisch erfüllt* für alle rationalen (p, p) -Klassen – algebraische wie nichtalgebraische. Folglich kann keine Positivitätsbedingung, die durch die HR-Relationen impliziert wird, algebraische von nichtalgebraischen Klassen unterscheiden. Dies ist die Barriere: die „offensichtliche“ Verstärkung (Positivität unter allen Polarisierungen, allen Automorphismen, allen Lefschetz-Zerlegungen fordern) kollabiert zur Bedingung, eine absolute Hodge-Klasse zu sein (Theorem VI.1). Die einzigen Auswege erfordern *nichtbilineare* Positivitätsbedingungen (motivische Faltung, Galois-Mittelung, prismatische Einschränkungen) oder Informationen von *außerhalb* der Hodge-Riemann-Struktur (o-Minimalität, derivierte Kategorien).

VI. DAS NO-GO-THEOREM

Wir formulieren nun das zentrale Resultat: die Hodge-Vermutung, umformuliert als Positivitätsobstruktion.

Theorem VI.1 (Positivitätsobstruktion – Bedingt). *Es gelte die Arithmetische Positivitätsvermutung III.3. Sei X eine glatte projektive Varietät über $\mathbb{C}$, und sei $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ eine rationale Hodge-Klasse, die **keine** $\mathbb{Q}$ -Linearkombination algebraischer Zykel ist. Dann existiert mindestens eine der folgenden Obstruktionen:*

- (O1) **Polarisierungsinstabilität:** *Es existiert eine ample Klasse $L \in \text{Amp}(X)$, sodass die primitive Komponente α_0 von α die Bedingung $(-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0) < 0$ erfüllt.*
- (O2) **Galois-Instabilität:** *Es existiert $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$, sodass entweder α^σ keine Hodge-Klasse auf X^σ ist, oder α^σ (AP1) auf X^σ verletzt.*
- (O3) **Lefschetz-Instabilität:** *Es existieren ein zulässiges $j \geq 1$ im Bereich von (AP3) und $L \in \text{Amp}(X)$, sodass $(-1)^{p+j} Q_L(\gamma_{j,0}, \gamma_{j,0}) < 0$, wobei $\gamma_{j,0}$ die L -primitive Komponente von $\Lambda_L^j \alpha \in H^{2(p+j)}(X)$ ist.*

Proof. Durch Kontraposition: wenn α (AP1)–(AP3) erfüllt, dann gilt $\alpha \in \text{AP}^p(X) = \text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$ durch die APV, im Widerspruch zur Annahme, dass α nicht algebraisch ist. $\square$

Remark VI.2 (Struktur der Obstruktion). Die drei Obstruktionen müssen im Licht der Hodge-Riemann-Relationen interpretiert werden.

(O1) und (O3) sind für (p, p) -Klassen vakuos. Die Hodge-Riemann-Bilinearrelationen (Theorem II.2) garantieren $(-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0) \geq 0$ für jede rationale (p, p) -Klasse α , nicht nur für algebraische. Die primitive Komponente α_0 liegt in $P^{p,p}(X)$, und die Hodge-Riemann-Form ist dort positiv definit (mit dem Vorzeichen $(-1)^p$). Analog liegt für zulässige AP3-Potenzen

die primitive Komponente $\gamma_{j,0}$ von $\Lambda_L^j \alpha$ in $P^{p+j,p+j}(X)$, sodass $(-1)^{p+j} Q_L(\gamma_{j,0}, \gamma_{j,0}) \geq 0$ automatisch gilt. Daher können Obstruktionen (O1) und (O3) für rationale Hodge-Klassen im angegebenen AP-Bereich niemals eintreten.

(O2) ist die einzige effektive Obstruktion. Der einzige Weg, auf dem eine Hodge-Klasse arithmetische Positivität verletzen kann, ist über (O2a): Versagen der Absolutheit (α^σ ist keine Hodge-Klasse auf X^σ für ein σ). Teil (O2b) – Versagen der Hodge-Riemann-Positivität auf X^σ – ist ebenfalls vakuos, da $\alpha^\sigma \in H^{p,p}(X^\sigma)$ die Hodge-Riemann-Ungleichungen automatisch erfüllt.

Folglich reduziert sich das No-Go-Theorem auf Delignes Beobachtung: nichtabsolute Hodge-Klassen (falls sie existieren) können nicht algebraisch sein.

A. Die unbedingte Aussage

Während Theorem VI.1 von der APV abhängt, können wir ein unbedingtes Teilresultat formulieren:

Proposition VI.3 (Unbedingte Obstruktion). *Sei $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ eine rationale Hodge-Klasse. Wenn α (AP2a) nicht erfüllt – d.h., es existiert $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ mit $\alpha^\sigma \notin H^{p,p}(X^\sigma)$ – dann ist α nicht algebraisch.*

Proof. Dies ist Delignes Resultat (Theorem II.4, Teil 1, Kontraposition): algebraische Klassen sind absolut. $\square$

Wie in Abschnitt IX (Bemerkung IX.2) gezeigt, werden die Hodge-Riemann-Positivitätsbedingungen (AP1), (AP2b) und (AP3) von jeder absoluten Hodge-Klasse automatisch erfüllt. Der Inhalt der APV jenseits von Proposition VI.3 ist daher identisch mit Delignes Frage: Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch? Die „Lücke“ zwischen absoluten Hodge-Klassen und algebraischen Klassen wird durch die Positivitätsbedingungen dieser Arbeit nicht verkleinert.

VII. ABELSCHES VARIETÄTEN

Abelsche Varietäten bieten die günstigste Umgebung für den arithmetischen Positivitätsansatz, weil Delignes Theorem (alle Hodge-Klassen sind absolut) die Obstruktion (O2a) eliminiert.

Proposition VII.1 (Äquivalenz für abelsche Varietäten). *Für abelsche Varietäten ist die Arithmetische Positivitätsvermutung III.3 äquivalent zur Hodge-Vermutung.*

Proof. Sei A eine abelsche Varietät der Dimension g , und sei $\alpha \in H^{2p}(A, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(A)$.

Nach Delignes Theorem (Theorem II.4, Teil 2) ist jede Hodge-Klasse auf einer abelschen Varietät absolut. Proposition IX.1 liefert daher

$$H^{2p}(A, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(A) = \text{AbsHodge}^p(A) = \text{AP}^p(A).$$

Damit ist die APV für A ,

$$\mathrm{AP}^p(A) = \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(A)_{\mathbb{Q}}),$$

wortgleich die Hodge-Vermutung für A ,

$$H^{2p}(A, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(A) = \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(A)_{\mathbb{Q}}).$$

Dies beweist die Äquivalenz. Es beweist nicht die Hodge-Vermutung für allgemeine abelsche Varietäten; es zeigt nur, dass arithmetische Positivität keine zusätzliche Bedingung hinzufügt, sobald Delignes Absolutheitssatz verfügbar ist. $\square$

Remark VII.2 (Bekannte Positivfälle). Für abelsche Varietäten, bei denen alle Hodge-Klassen als algebraisch bekannt sind (etwa mehrere niedrigdimensionale, CM- oder Produktfälle in der Literatur), ist damit auch die äquivalente APV-Aussage verifiziert. Allgemein liefert Delignes Theorem jedoch Absolutheit, nicht Algebraizität; offen bleibt zu zeigen, dass absolute Hodge-Klassen durch algebraische Zyklen repräsentiert werden.

VIII. DIE PRÄZISE OBSTRUKTION

Wir identifizieren nun den exakten Mechanismus, durch den nichtalgebraische Hodge-Klassen arithmetische Positivität verletzen.

A. Die Galois-Hodge-Riemann-Form

Definition VIII.1 (Galois-Hodge-Riemann-Form). Für $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ und $L \in \mathrm{Amp}(X)$ definiere:

$$Q_L^\sigma(\alpha) := Q_{L^\sigma}(\alpha^\sigma, \alpha^\sigma). \quad (11)$$

Das *Galois-Hodge-Riemann-Spektrum* von α ist:

$$\mathrm{Spec}_{\mathrm{GHR}}(\alpha) := \{ (-1)^p Q_L^\sigma(\alpha) : \sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C}), L \in \mathrm{Amp}(X) \} \subset \mathbb{R}. \quad (12)$$

Proposition VIII.2 (Algebraische Klassen haben nichtnegatives GHR-Spektrum). *Wenn $\alpha = \mathrm{cl}(Z)$ für einen algebraischen Zyklus Z , dann gilt:*

$$\mathrm{Spec}_{\mathrm{GHR}}(\alpha) \subseteq [0, \infty). \quad (13)$$

Proof. Algebraische Zyklen transformieren kovariant unter σ : $\mathrm{cl}(Z)^\sigma = \mathrm{cl}(Z^\sigma)$, und Z^σ ist ein algebraischer Zyklus auf X^σ . Die primitive Komponente von $\mathrm{cl}(Z^\sigma)$ liegt in $P^{p,p}(X^\sigma)$, sodass die Hodge-Riemann-Relationen $(-1)^p Q_{L^\sigma}(\mathrm{cl}(Z^\sigma)_0, \mathrm{cl}(Z^\sigma)_0) \geq 0$ liefern, was die geforderte Nichtnegativität des GHR-Spektrums ergibt. $\square$

Conjecture VIII.3 (GHR-Obstruktionsvermutung). *Wenn α eine rationale Hodge-Klasse ist, die **nicht** algebraisch ist, dann gilt:*

$$\mathrm{Spec}_{\mathrm{GHR}}(\alpha) \cap (-\infty, 0) \neq \emptyset. \quad (14)$$

Das heißt, es existieren σ und L , sodass $Q_L^\sigma(\alpha) < 0$.

Dies ist eine präzisere Version der Arithmetischen Positivitätsvermutung: sie identifiziert die Obstruktion als das Versagen der Galois-Hodge-Riemann-Form, nichtnegativ zu bleiben.

Remark VIII.4 (Logischer Status der GHR-Obstruktionsvermutung). Die GHR-Obstruktionsvermutung muss im Licht von $\mathrm{AP}^p = \mathrm{AbsHodge}^p$ (Bemerkung IX.2) vorsichtig interpretiert werden. Wenn α eine absolute Hodge-Klasse ist, dann gilt $(-1)^p Q_L^\sigma(\alpha) \geq 0$ für alle σ und L nach Proposition IX.1. Daher kann die Vermutung nur für nichtalgebraische Hodge-Klassen „feuern“, die *nicht absolut* sind – in diesem Fall wird die Obstruktion bereits durch (AP2a) (Versagen der Absolutheit) bezeugt, nicht durch Negativität von Q_L^σ . Falls nichtalgebraische absolute Hodge-Klassen existieren (d.h., falls Delignes Frage eine negative Antwort hat), wäre die GHR-Obstruktionsvermutung für solche Klassen *falsch*, da ihr GHR-Spektrum automatisch nichtnegativ ist. Die Vermutung ist daher äquivalent zur Aussage, dass nichtalgebraische absolute Hodge-Klassen nicht existieren – was präzise Delignes Frage ist.

Remark VIII.5 (Falsifizierbarkeit der GHR-Diagnostik). Das GHR-Spektrum kann als diagnostisches Werkzeug mit klaren Falsifikationskriterien verwendet werden:

1. *Positiver Test:* Falls eine Klasse α die Eigenschaft $(-1)^p Q_L^\sigma(\alpha^\sigma) < 0$ für ein $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ und ein L besitzt, dann ist α beweisbar nichtalgebraisch (nach Theorem IV.1).
2. *Null-Test:* Falls $(-1)^p Q_L^\sigma(\alpha^\sigma) \geq 0$ für alle σ und alle L , dann ist α arithmetisch positiv – somit absolut Hodge – aber nicht notwendigerweise algebraisch. Dies ist der Bereich, in dem die GHR-Diagnostik *stumm* ist.
3. *Struktureller Test:* Das GHR-Spektrum detektiert Nichtalgebraizität nur für Klassen, die *nicht* absolut Hodge sind. Für absolute nichtalgebraische Klassen (falls sie existieren) wird eine strikt stärkere Diagnostik benötigt.

Das GHR-Spektrum fungiert somit als *notwendiger-Bedingung-Filter*: es kann Nichtalgebraizität zertifizieren, aber nicht Algebraizität. Diese Asymmetrie spiegelt die Pattern-A-Architektur im gesamten FST-Programm wider, wo Positivitätszertifikate Alternativen ausschließen, aber keine Lösungen konstruieren.

Example VIII.6 (GHR-Spektrum der Diagonalklasse). Sei $X = \mathbb{P}^n$ und betrachte die Diagonaleinbettung $\Delta : \mathbb{P}^n \hookrightarrow \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n$. Die Klasse $[\Delta] \in H^{2n}(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n, \mathbb{Q})$

ist algebraisch (sie ist die Zykusklasse der Diagonalen). Nach Theorem IV.1 ist $[\Delta]$ arithmetisch positiv. Ihre Künneth-Zerlegung ist $[\Delta] = \sum_{k=0}^n h^k \boxtimes h^{n-k}$, wobei h die Hyperebenenklasse ist. Da $\mathbb{P}^n$ keine nichttrivialen Automorphismen von $\mathbb{C}$ hat, die auf seiner Kohomologie wirken (die Hodge-Struktur ist rein Tate), fixiert jedes $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ die Klasse $[\Delta]^\sigma = [\Delta]$. Die Selbstschnittzahl ist $\int_{X \times X} [\Delta]^2 = \chi(\mathbb{P}^n) = n+1$ (die Euler-Charakteristik). Da $[\Delta]$ algebraisch ist, erfüllt ihre primitive Komponente $[\Delta]_0$ die Ungleichung $(-1)^n Q_L([\Delta]_0, [\Delta]_0) \geq 0$ nach den Hodge-Riemann-Relationen. Wir bemerken, dass $[\Delta]$ *nicht* primitiv ist: $L \cup [\Delta] \neq 0$ im Allgemeinen, also ist die primitive Zerlegung nichttrivial. Dieses Beispiel ist „trivial positiv“ weil algebraisch, aber es illustriert die Berechnung: für eine hypothetische nichtalgebraische Hodge-Klasse auf einer komplexeren Varietät würde man σ und L suchen, bei denen die GHR-Form negativ wird.

Example VIII.7 (Nichttriviales GHR-Spektrum: CM-Endomorphismenklasse). Betrachte die elliptische Kurve $E : y^2 = x^3 - x$ über $\mathbb{Q}(i)$, die komplexe Multiplikation durch $\mathbb{Z}[i]$ besitzt, mit $\text{End}(E) \otimes \mathbb{Q} = \mathbb{Q}(i)$. Der CM-Endomorphismus $\tau = i$ (Multiplikation mit i) hat einen Graphen $\Gamma_\tau \subset E \times E$, der eine algebraische Klasse $[\Gamma_\tau] \in H^2(E \times E, \mathbb{Q}) \cap H^{1,1}(E \times E)$ liefert. Diese Klasse liegt *außerhalb* des Lefschetz-Rings: der Lefschetz-Ring von $E \times E$ (erzeugt durch die beiden Faserklassen $[E \times \{0\}]$, $[\{0\} \times E]$ und die Diagonale $[\Delta]$) enthält $[\Gamma_\tau]$ nicht, da τ nichttrivial auf $H^{1,0}(E)$ wirkt.

Das GHR-Spektrum von $[\Gamma_\tau]$ ist nichttrivial. Sei $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ die auf $\mathbb{Q}(i)$ eingeschränkte komplexe Konjugation, also $\sigma(i) = -i$. Dann gilt $E^\sigma \cong E$ (da $y^2 = x^3 - x$ rationale Koeffizienten hat), aber der CM-Endomorphismus transformiert sich als $\tau^\sigma = \sigma(i) = -i$, also $[\Gamma_\tau]^\sigma = [\Gamma_{-\tau}]$. Sei $L = L_1 \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_1$ die Produktpolarisierung, wobei L_1 die Hauptpolarisierung auf E ist. Dann:

$$\begin{aligned} (-1)^1 Q_L^{\text{id}}([\Gamma_\tau]) &= (-1)^1 Q_L([\Gamma_i], [\Gamma_i]) \\ &= 1 + |\tau|^2 = 2, \end{aligned} \quad (15)$$

$$\begin{aligned} (-1)^1 Q_L^\sigma([\Gamma_\tau]) &= (-1)^1 Q_L([\Gamma_{-i}], [\Gamma_{-i}]) \\ &= 1 + |-\tau|^2 = 2. \end{aligned} \quad (16)$$

Beide Werte sind positiv, wie von Theorem IV.1 garantiert. Allerdings unterscheidet sich die *Zwischenberechnung*: die Klassen $[\Gamma_i]$ und $[\Gamma_{-i}]$ haben verschiedene Künneth-Zerlegungen in $H^1(E) \otimes H^1(E)$, was die Tatsache widerspiegelt, dass σ die Eigenräume der CM-Aktion auf $H^1(E, \mathbb{C}) = H^{1,0}(E) \oplus H^{0,1}(E)$ permutiert. Explizit wirkt τ^* auf $H^{1,0}(E)$ durch Multiplikation mit i und auf $H^{0,1}(E)$ durch $-i$; unter σ werden diese Eigenwerte vertauscht.

Der wesentliche Punkt ist, dass das GHR-Spektrum $\{(-1)^p Q_L^\sigma([\Gamma_\tau])\}_{\sigma, L}$ *verschiedene Werte für verschiedene σ annimmt* (aufgrund der variierenden Künneth-Struktur), aber gleichmäßig nichtnegativ bleibt. Dies illustriert die APV in einem nichttrivialen Fall: die

arithmetische Positivität von $[\Gamma_\tau]$ „sagt“ korrekt ihre Algebraizität „vorher“, obwohl die Klasse außerhalb des Lefschetz-Rings liegt und ihre Algebraizität eine Konsequenz der CM-Struktur ist, statt geometrisch offensichtlich zu sein.

B. Warum die Obstruktion natürlich ist

Die GHR-Obstruktion ist aus folgendem Grund natürlich. Die Hodge-Riemann-Form Q_L hängt von beidem ab:

- der *komplexen Struktur* von X (durch die Hodge-Zerlegung), und
- der *algebraischen Struktur* (durch die Polarisierung L).

Für algebraische Klassen sind die komplexe und die algebraische Struktur „ausgerichtet“: die Klasse stammt von einer Untervarietät, die gleichzeitig eine komplexe Untermannigfaltigkeit und ein algebraischer Zyklus ist. Die Galois-Aktion σ kann die komplexe und algebraische Struktur „fehlausrichten“, aber für algebraische Klassen „richtet“ der Zyklus Z^σ sie auf X^σ wieder aus.

Für eine *nichtalgebraische* Hodge-Klasse gibt es keinen Zyklus, der diese Neuausrichtung durchführt. Die Klasse existiert in der komplexen Struktur von X , hat aber keinen algebraischen Anker. Wenn σ die komplexe Struktur verdrillt, kann die Positivität der Hodge-Riemann-Form versagen, weil es nichts gibt, das die Verdrillung kompensiert.

Dies ist der präzise Mechanismus der Obstruktion: *algebraische Klassen sind starr genug, um alle Galois-Verdrillungen mit intakter Positivität zu überstehen, während transzendente Klassen es nicht sind.* Wir betonen jedoch, dass nach Bemerkung IX.2 und Bemerkung VI.2 die Hodge-Riemann-Positivität hier keine eigenständige Rolle spielt: die einzige effektive Obstruktion ist Versagen der Absolutheit (O2a). Die „Ausrichtungs“-Erzählung beschreibt den Mechanismus der Absolutheit, nicht der Hodge-Riemann-Positivität.

IX. DISKUSSION

A. Die verbleibende Lücke

Die Arbeit etabliert:

1. Algebraische Klassen $\Rightarrow$ arithmetisch positiv (Theorem IV.1, unbedingt).
2. $\text{AP}^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X)$ (Bemerkung IX.2, unbedingt).
3. Begrenzte Funktorialitätstests für Rückzugsunterkegel endlicher Morphismen und Künneth-Produkte primitiver Klassen unter Produktpolarisierungs-Hypothesen (Abschnitt V).

4. Identifikation des Galois-Hodge-Riemann-Spektrums als diagnostisches Werkzeug (Abschnitt VIII).

Als Konsequenz von Punkt 2 ist die verbleibende Lücke präzise Delignes Frage:

Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?

Dies ist ein langstehendes offenes Problem. Das Positivitäts-Framework löst es nicht, bietet aber einen neuen Blickwinkel: die No-Go-Formulierung und das GHR-Spektrum machen explizit, welche Galois-Operationen ein Versagen der Absolutheit bezeugen könnten. Sie unterscheiden algebraische Klassen nicht von nichtalgebraischen absoluten Hodge-Klassen, falls solche Klassen existieren.

B. Beziehung zu Delignes Programm

Delignes Framework absoluter Hodge-Klassen [3] liefert Bedingung (AP2a). Die vorliegende Arbeit beabsichtigt ursprünglich, Delignes Absolutheit durch Hinzufügen zu verstärken:

1. **Hodge-Riemann-Positivität unter Konjugation** (AP2b): Nicht nur der Hodge-Typ, sondern auch das Hodge-Riemann-Vorzeichen muss erhalten bleiben.
2. **Universelle Polarisierung** (AP1 für alle L): Alle amplen Klassen müssen nichtnegative Hodge-Riemann-Form ergeben.

Jedoch zeigen Proposition IX.1 und Bemerkung IX.2, dass diese Bedingungen für jede absolute Hodge-Klasse *automatisch* durch die Hodge-Riemann-Bilinearrelationen erfüllt sind. Die Bedingungen (AP1), (AP2b) und (AP3) schraenken daher nicht über Delignes Absolutheit hinaus ein. Die Frage „Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?“ bleibt präzise Delignes motivierendes Problem, und die APV ist äquivalent dazu.

Proposition IX.1. *Auf einer glatten projektiven Varietät $X/\mathbb{C}$ ist jede absolute Hodge-Klasse arithmetisch positiv: $\text{AbsHodge}^p(X) \subseteq \text{AP}^p(X)$.*

Proof. Sei α eine absolute Hodge-Klasse. (AP1): Die primitive Komponente α_0 bezüglich einer amplen Klasse L liegt in $P^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q})$. Für rationale (p, p) -Klassen gilt $\bar{\alpha}_0 = \alpha_0$ und $i^{p-p} = 1$, sodass $h_L(\alpha_0, \alpha_0) = (-1)^{p(2p-1)} Q_L(\alpha_0, \alpha_0) = (-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0)$. Die HR-Relationen geben $h_L > 0$, also $(-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0) > 0$ für $\alpha_0 \neq 0$. (AP2a) gilt nach Voraussetzung. (AP2b) folgt, da $\alpha^\sigma \in H^{p,p}(X^\sigma)$ für absolutes α , und das (AP1)-Argument auf X^σ anwendbar ist. (AP3) folgt für zulässige j im Bereich von Definition III.1 analog, da die primitive Komponente von $\Lambda_L^j \alpha$ in $P^{p+j,p+j}(X)$ liegt. $\square$

Remark IX.2 (Kritische Beobachtung). Proposition IX.1 zeigt $\text{AbsHodge}^p(X) \subseteq \text{AP}^p(X)$. Die umgekehrte Inklusion $\text{AP}^p(X) \subseteq \text{AbsHodge}^p(X)$ gilt nach Definition, da Bedingung (AP2a) Absolutheit fordert. Daher:

$$\text{AP}^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X). \quad (17)$$

Die Bedingungen (AP1), (AP2b) und (AP3) stellen *keine* zusätzliche Einschränkung jenseits von Delignes Absolutheit dar. Die Hodge-Riemann-Bilinearrelationen *garantieren* die Positivitätsbedingungen für jede Klasse vom Typ (p, p) automatisch.

Dies hat eine tiefgreifende Konsequenz für die APV: die Arithmetische Positivitätsvermutung $\text{AP}^p(X) = \text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$ ist **äquivalent** zur Aussage, dass jede absolute Hodge-Klasse algebraisch ist – was präzise Delignes ursprüngliche Frage [3] ist. Das in dieser Arbeit eingeführte Positivitäts-Framework liefert daher keine genuin neue Vermutung, sondern vielmehr eine neue *Perspektive* auf Delignes Frage durch die Sprache der Hodge-Riemann-Positivität und No-Go-Obstruktionen.

Die GHR-Obstruktion (Definition VIII.1) bleibt als diagnostisches Werkzeug sinnvoll: sie macht explizit, *welche* Galois-Konjugation für eine nichtalgebraische absolute Hodge-Klasse versagen müsste. Der mathematische Kerninhalt reduziert sich jedoch auf: *Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?*

Die unbedingte Kette lautet:

$$\begin{aligned} \text{Algebraisch} &\xrightarrow{\text{Thm. IV.1}} \text{AP} = \text{Absolut} \\ &\xrightarrow{\text{Definition}} \text{Hodge}, \end{aligned} \quad (18)$$

wobei die Gleichheit $\text{AP} = \text{Absolut}$ durch Bemerkung IX.2 gegeben ist. Die HV verlangt die zusammengesetzte Rückinklusion $\text{Hodge} \subseteq \text{Algebraisch}$; diese zerfällt in zwei logisch verschiedene Fragen: ob alle Hodge-Klassen absolut sind und ob alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch sind. Für abelsche Varietäten liefert Delignes Theorem die erste Rückinklusion, die zweite bleibt das eigentliche Algebraizitätsproblem.

C. Verbindung zum breiteren Programm

Dieser Ansatz fügt sich in ein breiteres Muster ein, das über fundamentale Mathematik und Physik beobachtet wird:

Problem	Positivitätskonzept	Resultat
Weil-Verm.	Frobenius-Eigenwert	Deligne 1974 [13]
BSD (Rang 1)	Néron-Tate-Höhe	Gross-Zagier 1986 [12]
Hodge	GHR-Spektrum	Diese Arbeit (bedingt)

In jedem Fall besteht die Strategie nicht darin, das gewünschte Objekt zu konstruieren, sondern zu zeigen, dass seine Nichtexistenz eine Positivitätsbedingung verletzen würde. Die vorliegende Arbeit wendet diese

Strategie auf die Hodge-Vermutung an. Frühere Arbeiten des Autors [14, 15] erforschten ähnliche positivitätsbasierte Ansätze in anderen Kontexten.

Remark IX.3 (Meta-Muster: versuchte Verstärkung kollabiert an der Sättigung). Die strukturelle Lektion dieser Arbeit geht über die Hodge-Vermutung hinaus. In jeder Pattern-A-Instanziierung im FST-Programm ist die „offensichtliche“ Verstärkung der Positivitätsbedingung automatisch durch das Strukturtheorem gesättigt:

- *Hodge*: HR-Positivität $\Rightarrow$ AP = AbsHodge (diese Arbeit).
- *NS-Skelett*: Lipschitz-Regularität der Attraktor-Projektion $\Rightarrow$ erfordert positive Reichweite $\Rightarrow$ äquivalent zur Existenz einer Inertialmannigfaltigkeit (No-Go-Zone, vgl. die Begleitarbeit zu NS).
- *BSD*: Höhenpositivität für Rang $\leq 1 \Rightarrow$ gesättigt durch Gross-Zagier + Kolyagin; die „nächste“ Positivität (Rang ≥ 2) erfordert Objekte, die noch nicht existieren.

In jedem Fall erfordert Fortschritt das *Verlassen* des gesättigten Positivitäts-Frameworks – entweder durch Einführung nichtlinearer/nichtbilinearier Bedingungen oder durch Import von Regularität aus einer anderen Quelle (z.B. die TLL/LDI-Maschinerie für NS oder prismatische Kohomologie für Hodge). Das Sättigungsphänomen ist kein Versagen der Methode, sondern eine *Diagnostik*: es identifiziert die präzise Grenze, an der die aktuellen Werkzeuge ihre Reichweite erschöpfen.

D. Einschränkungen

1. **Die schwere Richtung ist offen.** Diese Arbeit beweist nicht die Hodge-Vermutung. Sie formuliert sie als Positivitätsaussage um und identifiziert die präzise Obstruktion, aber der Beweis, dass arithmetische Positivität Algebraizität erzwingt, bleibt die zentrale Herausforderung. Ferner impliziert die APV ($AP^p = \text{alg}^p$) allein nicht die HV ($\text{Hodge}^p = \text{alg}^p$): man benötigt zusätzlich, dass alle Hodge-Klassen arithmetisch positiv sind (siehe Proposition III.4).
2. **Teilweise Skizzen verbleiben in Abschnitt V.** Die Künneth-Funktorialität ist vollständig bewiesen für primitive Klassen (Proposition V.7, Lemmas V.9–V.10), aber die Erweiterung auf nichtprimitive Klassen und der Vorwärtsschub für gefaserte Morphismen verbleiben als Skizzen, die sorgfältige Behandlung der Kreuzterme in der primitiven Zerlegung erfordern.
3. **Der AP-Kegel gleicht dem absoluten Hodge-Kegel.** Wie in Bemerkung IX.2 gezeigt, gilt $AP^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X)$, sodass die APV

auf Delignes Frage reduziert. Das Positivitäts-Framework liefert keinen neuen mathematischen Inhalt jenseits einer neuen Sprache und diagnostischer Werkzeuge (das GHR-Spektrum) für das bestehende Problem.

4. **Verbleibende Lücke bei abelschen Varietäten.** Für abelsche Varietäten identifiziert Delignes Theorem alle Hodge-Klassen mit absoluten Hodge-Klassen; AP fällt also mit dem ganzen Hodge-Klassenraum zusammen. Offen bleibt nicht Absolutheit, sondern Algebraizität dieser absoluten Klassen; dies ist nur in Spezialfamilien bekannt.

E. Ausblick

Vier Richtungen sind unmittelbar:

1. **Verifikation der GHR-Obstruktionsvermutung für bekannte nichtalgebraische Klassen.** Ein Testfall ist Voisins Gegenbeispiel zur Hodge-Vermutung für Kähler-Mannigfaltigkeiten [9]. Wie in Bemerkung VIII.4 festgestellt, kann die Vermutung allerdings nur Nichtabsolutheit detektieren; für absolute Hodge-Klassen, die möglicherweise nicht algebraisch sind, ist das GHR-Spektrum automatisch nichtnegativ.
2. **Verstärkung der AP-Bedingungen.** Da $AP^p = \text{AbsHodge}^p$ (Bemerkung IX.2), geht die aktuelle Definition arithmetischer Positivität nicht über Delignes Absolutheit hinaus. Man könnte *zusätzliche* Positivitätsbedingungen suchen – jenseits der durch die Hodge-Riemann-Relationen implizierten – die die Lücke zwischen absoluten Hodge-Klassen und algebraischen Klassen enger könnten. Kandidaten umfassen Bedingungen aus höheren Hodge-Riemann-Formen, p -adischer Hodge-Theorie oder motivischen Beschränkungen.
3. **Entwickle die Kategorie der arithmetisch positiven Klassen** als Substitut für (Teile der) Motivtheorie, mit funktoriellen Operationen und Kompatibilität mit den Standardvermutungen.
4. **Der diagnostische quadratische Locus.** Der Hodge-Riemann-Teil der AP-Definition ist durch *quadratische* Ungleichungen ausgedrückt (die Hodge-Riemann-Form ist bilinear, also sind die Positivitätsbedingungen quadratisch in α). Da der volle AP-Lokus nach Bemerkung IX.2 gleich $\text{AbsHodge}^p(X)$ ist, ist dieser quadratische Locus kein separates Algebraizitätskriterium. Er ist ein diagnostischer Schatten der Positivitätsbedingungen: abgeschlossen unter positiver Skalierung und symmetrisch, aber seine Randstruktur zeigt nur, wo die Hodge-Riemann-Visualisierung degeneriert.

Sie klärt die Grenzen HR-basierter Diagnostik, nicht die schwere Richtung der APV.

Remark IX.4 (Arakelov-Brücke zu BSD). Die Hodge-Riemann-Form $(-1)^p Q_L$ lässt sich als Positivität an der archimedischen (unendlichen) Primstelle in der Arakelov-Schnittpaarung interpretieren. Zusammen mit der Néron-Tate-Höhe (Positivität an endlichen Primstellen, vgl. das Begleitpaper zu BSD) legt dies ein vereinheitlichtes arithmetisches Positivitätsprinzip nahe.

Remark IX.5 (Komplexitätstheoretische Analogie). Das arithmetische Positivitäts-Framework besitzt ein komplexitätstheoretisches Analogon (vgl. das Begleitpaper zu P vs NP): Algebraische (Hodge-)Klassen entsprechen „uniformen Algorithmen“ (polynomialzeit-berechenbaren Zeugen), während transzendente Klassen „schweren Zeugen“ mit hoher Kolmogorov-Komplexität entsprechen. Das Versagen arithmetischer Positivität für eine transzendente Klasse ist analog zur Entropie-Separationsvermutung: Objekte, die sich strukturierter Beschreibung (algebraisch/algorithmisch) widersetzen, weisen eine Positivitäts-/Entropie-Lücke auf.

F. Richtungen für stärkere Positivität

Da $AP^p = \text{AbsHodge}^p$ (Bemerkung IX.2), gehen die aktuellen AP-Bedingungen nicht über Delignes Absolutheit hinaus. Dieser Abschnitt untersucht Kandidaten zur *Verschärfung*, die genuin neue Einschränkungen jenseits der Hodge-Riemann-Relationen liefern könnten.

1. p -adische Steigungs-Constraints

Remark IX.6 (p -adische Positivität: Newton- vs. Hodge-Polygon). Sei $X/\mathbb{Q}$ eine glatte projektive Varietät mit guter Reduktion bei einer Primzahl p . Die kristalline Kohomologie $H_{\text{cris}}^{2p}(X_p/\mathbb{Z}_p)$ trägt einen Frobenius-linearen Endomorphismus φ , dessen Eigenwert-Steigungen durch das Newton-Polygon beschränkt werden. Die Katz-Vermutung (bewiesen von Mazur [16] und Ogus) besagt, dass das Newton-Polygon auf oder über dem Hodge-Polygon liegt.

Man definiere eine p -adische Steigungs-Constraint (AP'): Eine rationale (p, p) -Klasse α ist p -adisch positiv, wenn für alle Primzahlen ℓ guter Reduktion die ℓ -adische Realisierung α_ℓ im „algebraischen Steigungsbereich“ liegt – d.h. ihre kristalline Frobenius-Steigung genau p (eine ganze Zahl) beträgt. Algebraische Klassen erfüllen dies automatisch. Für nicht-algebraische absolute Hodge-Klassen könnte die Steigung von p abweichen, was eine neue Obstruktion (O4) jenseits der Absolutheit liefert.

2. Arakelov-Positivität

Remark IX.7 (Arakelov-Positivität als globaler Verstärker). Die Arakelov-Schnittpaarung auf arithmetischen Varietäten kombiniert: (i) Schnittmultiplizitäten in den Fasern eines regulären Modells $\mathcal{X} \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$ (endliche Primstellen); (ii) den Green-Strom an der archimedischen Stelle, verwandt mit Q_L über die Hodge-Metrik. Eine *Arakelov-verstärkte AP-Bedingung* würde Positivität der globalen Arakelov-Höhenpaarung $\hat{h}(\alpha, \alpha) \geq 0$ für alle Modelle erfordern, nicht nur der archimedischen Komponente. Da algebraische Zyklen nicht-negativen Arakelov-Selbstschnitt haben (arithmetischer Hodge-Index-Satz von Moriwaki [17]), ist dies ein natürlicher Kandidat für AP'.

Remark IX.8 (Testfall für AP'). Jede verstärkte Bedingung AP' muss zwei Kriterien erfüllen: (1) *Nicht-Trivialität*: AP' darf nicht automatisch von jeder absoluten Hodge-Klasse erfüllt werden. (2) *Algebraische Sättigung*: Jede algebraische Klasse muss AP' erfüllen. Ein Testfall ist eine Varietät X mit einer absoluten Hodge-Klasse α , deren Algebraizität vermutet aber nicht bewiesen ist. Kandidat: die Hodge-Klasse auf einer allgemeinen abelschen Vierfalte ($g = 4, p = 2$), die außerhalb des Lefschetz-Rings liegt, aber nach Delignes Satz absolut ist.

3. Tannakische Perspektive

Remark IX.9 (Tannakische Rekonstruktion für CM-Fälle). Für eine abelsche Varietät A vom CM-Typ ist die Mumford-Tate-Gruppe $MT(A)$ ein Torus, und die Kategorie der von $H^1(A)$ erzeugten Hodge-Strukturen ist eine neutrale Tannakische Kategorie über $\mathbb{Q}$. Die Hodge-Klassen sind genau die $MT(A)$ -Invarianten. Die AP-Bedingungen lassen sich in der Sprache der Mumford-Tate-Gruppe umformulieren (vgl. Deligne-Milne [18]). Um über dies hinauszugehen, bräuchte man *motivische* Positivitäts-Constraints, die nicht von der Mumford-Tate-Gruppe allein erfasst werden.

Remark IX.10 (Mumford-Tate-Analyse für Vermutung VIII.3). Für abelsche Varietäten A liefert Delignes Theorem $H^{2p}(A, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(A) = \text{AbsHodge}^p(A) = AP^p(A)$. Die GHR-Obstruktion kann eine hypothetische nichtalgebraische Hodge-Klasse auf einer abelschen Varietät daher nicht unterscheiden: falls eine solche Klasse existiert, ist sie bereits absolut und ihr GHR-Spektrum ist durch die Hodge-Riemann-Relationen nichtnegativ. Als Beweiswerkzeug ist die Obstruktion auf abelschen Varietäten also vakuum; die Hodge-Vermutung für abelsche Varietäten ist genau die verbleibende Aussage, dass diese absoluten/AP-Klassen algebraisch sind. Fortschritt hängt von der Mumford-Tate-Vermutung ab: Falls $MT(A)$ treu auf $H^*(A, \mathbb{Q})$ wirkt und die $MT(A)$ -Invarianten algebraisch sind, folgt die Hodge-Vermutung.

für A . Dies ist bekannt für $\dim A \leq 5$ (Moonen [8]) und für CM-Typ (Abdulali [7]).

4. Prismatische und kategoriale Ansätze

Remark IX.11 (Prismatische Positivität (AP4)). Bhatt und Scholzes prismatische Kohomologie [19] – aufbauend auf der integralen p -adischen Hodge-Theorie von Bhatt–Morrow–Scholze [24] – liefert einen vereinheitlichten Rahmen für p -adische Kohomologietheorien. Eine hypothetische *prismatische Positivitätsbedingung* (AP4) würde erfordern, dass die prismatische Realisierung α_Δ in einem „positiven Kegel“ liegt, definiert durch Nygaard-Filtration und Frobenius-Aktion. Algebraische Klassen erfüllen dies automatisch. Nicht-algebraische absolute Hodge-Klassen könnten AP4 verletzen, was eine neue Obstruktion jenseits (O1)–(O3) liefert.

Remark IX.12 (Prismatische Kohomologie-Route). Nie [22] konstruierte absolute Hodge-Zykel in der prismatischen Kohomologie abelscher Varietäten über p -adischen Körpern unter Verwendung von André’s motivierten Zykeln im Bhatt–Scholze-Framework. Prismatische Kohomologie $R\Gamma_\Delta(X/S)$ interpoliert étale, de Rham- und kristalline Kohomologie integral und liefert einen universellen kohomologischen Rahmen. Die Verbindung zur Positivität über Bridgeland-Stabilitätsbedingungen auf derivierten Kategorien legt nahe, dass nichtlineare, derivierte Positivitätsbedingungen – die die rigide Galois-Struktur prismatischer Kristalle mit geometrischer Stabilität kombinieren – die Lücke zwischen Absolutheit und Algebraizität überbrücken könnten.

Schwellenaxiom: jenseits von Deligne

Axiom IX.13 (Sprachbrücke – JD-Hodge). *Es existiert eine Kategorie $\mathcal{C}$ von „Hodge-Trägern“ (Objekte, die kohomologische Daten repräsentieren), ausgestattet mit:*

- (JD1) **Funktorialität:** *Rückzug, Vorwärtsbild und Produkte wirken auf $\mathcal{C}$ ohne nicht-kanonische Wahlen.*
- (JD2) **Intrinsische Filtration:** *Eine funktorielle Hodge-Filtration $F^\bullet$ ist kanonisch definiert (nicht über eine Wahl von Einbettung oder Modell).*
- (JD3) **Kanonische Polarisation:** *Eine mit (JD1) und (JD2) kompatible Positivitätsstruktur existiert, die die Hodge–Riemann-Form verallgemeinert.*

In dieser Sprache wird die Hodge-Vermutung zu einer formalen Konsequenz: Positivität in $\mathcal{C}$ impliziert Algebraizität. Delignes Absolutheit ist dann ein Schatten (notwendige Bedingung) der reicheren Struktur in $\mathcal{C}$.

Remark IX.14 (Der Nicht-Kanonizitäts-Scanner). Um zu lokalisieren, wo die aktuelle Theorie hinter JD-Hodge zurückbleibt, suche nach drei Signaturen:

1. **Wahlabhängigkeit:** Wo treten Spaltungen oder Vergleichsisomorphismen (de Rham/Betti/ ℓ -adisch) auf, die „existieren“, aber keine natürlichen Transformationen sind?
2. **Inkompatible Operationen:** Welche geometrische Operation (Rückzug unter nicht-endlichen Morphismen, Gysin-Vorwärtsbild) zerstört die Polarisation oder destabilisiert die Filtration?
3. **Vergleichsbrüche:** Wo hängt die Aussage von einem Vergleich zwischen Realisierungen ab, der nicht strukturell kontrolliert ist?

Im aktuellen AP-Framework tritt der Bruch bei AP2a (Absolutheit) auf: Der Vergleichsisomorphismus $H_{\mathrm{dR}}^*(X) \otimes \mathbb{C} \cong H_{\mathrm{Betti}}^*(X^\sigma) \otimes \mathbb{C}$ ist *kein* Morphismus in einer natürlichen Kategorie – er erfordert die Wahl von $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})$.

Remark IX.15 (Kandidaten für $\mathcal{C}$). Drei Kandidaten für die Kategorie $\mathcal{C}$ werden derzeit untersucht:

1. **Prismatische Kohomologie** (Bhatt–Scholze, Nie [22]): $R\Gamma_\Delta(X/S)$ interpoliert alle klassischen Realisierungen integral, mit einer kanonischen Frobenius-Aktion für (JD2). Die Positivität (JD3) ist noch nicht formuliert, aber strukturell möglich via Bridgeland-Stabilität.
2. **Motivische Kohomologie** (Voevodsky): Die derivierte Kategorie der Motive $\mathrm{DM}(k)$ erfüllt (JD1) per Konstruktion. Die Standard-Vermutungen würden (JD2) und (JD3) liefern, sind aber unbewiesen.
3. **Gemischte Hodge-Moduln** (Saito): Erfüllen (JD1)–(JD2) für glatte projektive Varietäten, aber (JD3) ist auf die klassische HR-Form beschränkt – genau die AP=AbsHodge-Barriere dieses Papiers.

Lemma IX.16 (JD-Hodge impliziert die Hodge-Vermutung für abelsche Varietäten). *Wenn $\mathcal{C}$ (JD1)–(JD3) erfüllt und mit der Tannakian-Struktur der Kategorie abelscher Motive kompatibel ist, dann ist jede Hodge-Klasse auf einer abelschen Varietät algebraisch.*

Remark IX.17 (Die Deligne-Grenze als Sprachdefekt). Axiom IX.13 identifiziert die Obstruktion als *linguistisch*, nicht rechnerisch: Die Vergleichsisomorphismen $\mathrm{comp}_{\mathrm{dR} \leftrightarrow B}$ und $\mathrm{comp}_{\ell\text{-adic} \leftrightarrow B}$ existieren, sind aber nicht funktoriell in X . Absolute Hodge-Klassen sind genau diejenigen, die unter allen Realisierungen kompatibel sind – und Algebraizität wird zu $\mathrm{AH}(X) = \mathrm{Im}(\mathrm{CH}^*(X) \rightarrow H^*(X))$. Wären die Vergleiche natürliche Transformationen in einer Kategorie $\mathcal{C}_{\mathrm{abs}}$, wäre dies eine formale Konsequenz. Die Deligne-Grenze lautet daher: *Nicht-kanonische Spaltungen machen jeden Algebraizitätsbeweis instabil unter Funktoren.*

Remark IX.18 (Bridgeland-Stabilität und Positivität auf derivierten Kategorien). Bridgelands Stabilitätsbedingungen [20] auf der derivierten Kategorie $D^b(X)$ liefern einen Positivitätsbegriff für Objekte statt für Kohomologieklassen. Eine mögliche Verschärfung: Fordere, dass die Kohomologieklassse α als Chern-Charakter eines Bridgeland-stabilen Objekts entsteht. Dies ist strikt stärker als eine Hodge-Klasse zu sein.

Remark IX.19 (Spektrale Lücke auf Vektorbündeln). Man betrachte die „Spektraldaten“ eines geeigneten Differentialoperators (z.B. des Laplace-Operators auf $\bigwedge^p \Omega_X$). Algebraische Zyklen entsprechen Nullmoden (harmonischen Formen), während nicht-algebraische Hodge-Klassen „fast-Nullmoden“ mit einer kleinen, aber nicht-verschwindenden Spektrallücke entsprechen würden. Eine Positivitätsbedingung basierend auf dieser Spektrallücke könnte algebraische von nicht-algebraischen Klassen unterscheiden.

5. Geometrische und o-minimale Ansätze

Remark IX.20 (VHS-Familien und Monodromie). Für eine Variation von Hodge-Strukturen (VHS) über einer Basis S zeigt der Satz von Cattani–Deligne–Kaplan [10], dass der Locus algebraischer Klassen eine abzählbare Vereinigung geschlossener algebraischer Untervarietäten von S ist. Eine verstärkte AP-Bedingung könnte erfordern, dass α_s sich als *flacher Schnitt* über eine Zariskidichte Teilmenge von S fortsetzt. Dies hängt mit der Halbeinfachheit der Monodromie-Darstellung und der Algebraizität flacher Schnitte zusammen.

Remark IX.21 (p -adische Positivität via O-Minimalität). Die Theorie o-minimaler Strukturen (Bakker–Brunebarbe–Tsimmerman [21]) wurde angewendet, um Definierbarkeitsresultate für Periodenabbildungen und Hodge-Loki zu beweisen. Eine mögliche AP'-Bedingung: Fordere, dass die „Umlaufbahn“ von α unter der definierbaren Periodenabbildung algebraisch ist. Nach CDK gilt dies für algebraische Klassen. Für nicht-algebraische Hodge-Klassen könnte die Umlaufbahn „wild“ (transzendent) sein, was die Zahmheitsbedingung verletzt. Dies steht in Verbindung mit der Arbeit von Binyamini–Novikov [23] zum Zählen rationaler Punkte auf definierbaren Mengen.

Remark IX.22 (Galois-Defekte für transzendente Klassen). Wenn eine Hodge-Klasse α nicht absolut ist, existiert $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ mit $\alpha^\sigma \notin H^{p,p}(X^\sigma)$. Die „Größe“ dieses Defekts – gemessen etwa an der Komponente von α^σ in $H^{p-1,p+1}(X^\sigma) \oplus H^{p+1,p-1}(X^\sigma)$ – ist ein quantitatives Maß für Nicht-Algebraizität. Wächst dieser Defekt unter Iteration der Galois-Konjugation, würde das GHR-Spektrum negativ werden, was eine berechenbare Obstruktion liefert.

Remark IX.23 (Ricci-artiger Fluss auf (p,p) -Formen). In Analogie zum Ricci-Fluss betrachte man einen Fluss auf (p,p) -Formen: $\partial\alpha/\partial t = -\Delta_L \alpha + \lambda\alpha$, wobei Δ_L der

Lefschetz-Laplace-Operator ist. Algebraische Klassen – als harmonische Repräsentanten algebraischer Zyklen – sind Fixpunkte („thermodynamische Minima“) dieses Flusses. Nicht-algebraische Hodge-Klassen wären unter dem Fluss *instabil*. Dies interpretiert algebraische Zyklen als Attraktoren einer natürlichen geometrischen Evolution.

G. Jenseits bilinearer Positivität: nichtlineare und gemittelte Bedingungen

Die Hodge–Riemann-Relationen liefern *bilineare* Positivität: $(-1)^p Q_L(\alpha, \bar{\alpha}) > 0$ für primitive (p,q) -Klassen. Wie in den Einschränkungen (Abschnitt 9) angemerkt, genügt dies nicht für die volle Hodge-Vermutung. Wir identifizieren drei Richtungen für *nichtlineare* oder *gemittelte* Positivität, die über HR hinausgehen:

Remark IX.24 (Drei Wege zu nichtlinearer Positivität). **Rand-Positivität.** Für eine Familie ampler Klassen $L_t \rightarrow L_0$, wobei L_0 nef aber nicht ample ist, können die vorzeichenkorrigierten Werte $(-1)^p Q_{L_t}$ für $t \rightarrow 0$ nichtnegative Grenzwerte haben, selbst wenn Q_{L_0} nicht definiert ist. Diese „Rand-Positivität“ erfasst Klassen, die im Grenzwert algebraisch sind, aber von keiner einzelnen Polarisierung detektiert werden.

Positivität unter motivischer Faltung. Für eine Produktvarietät $X \times Y$ liefert die Künneth-Zerlegung $H^{p,p}(X \times Y) = \bigoplus_{a+b=p} H^{a,a}(X) \otimes H^{b,b}(Y)$. Die Positivitätsbedingung auf dem Produkt ist *multiplikativ*: $(-1)^{a+b} Q_{L_X \boxtimes L_Y} = (-1)^a Q_{L_X} \cdot (-1)^b Q_{L_Y}$. Dies ist stärker als Künneth-Positivität auf jedem Faktor und kann nichtalgebraische Klassen detektieren, die sich in den Kreuztermen „verstecken“.

Positivität nach Galois-Mittelung. Für eine absolute Hodge-Klasse α ist ein vorsichtig definierter endlicher Galois-Mittelwert $\bar{\alpha}$ (vgl. Bemerkung IX.25) wieder eine absolute Hodge-Klasse. Für $p = 1$ sind solche gemittelten Klassen nach dem Lefschetz-(1,1)-Theorem algebraisch. Für $p \geq 2$ ist die Algebraizität des Mittelwerts im Allgemeinen *nicht bekannt*; sie ist eine Spezialform von Delignes Frage. Die arithmetischen Positivitätsbedingungen AP1–AP3 lassen sich allenfalls als Nähe-Heuristik zu diesem Mittelwert in der Q_L -Metrik lesen. Diese Umformulierung ist nur dann nützlich, wenn der Mittelwert unabhängig von der Hodge-Vermutung als algebraisch gezeigt werden kann.

Remark IX.25 (Galois-Mittelung: profiniter Limes). Die naive Mittelung $\bar{\alpha} = \frac{1}{|\text{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})|} \sum_{\sigma} \sigma^* \alpha$ ist nicht wohldefiniert, da $\text{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})$ eine profinite Gruppe der Kardinalität 2^c ist. Eine vorsichtige Formulierung arbeitet nur auf endlicher Stufe: Für jede endliche Galois-Erweiterung $K/\mathbb{Q}$, über der Modell und Vergleichsdaten kontrolliert sind, bilde man

$$\bar{\alpha}_K = \frac{1}{|\text{Gal}(K/\mathbb{Q})|} \sum_{\sigma \in \text{Gal}(K/\mathbb{Q})} \sigma^* \alpha.$$

Jede projektive-Limes-Deutung braucht zusätzliche Abstiegs- und Kompatibilitätsdaten; sie darf nicht automatisch als algebraische Klasse behandelt werden.

Remark IX.26 (Universeller Selektionsmechanismus). Alle drei Wege teilen die in der Meta-Analyse des FST-Programms identifizierte Struktur: *lokale Positivität + Regularisierung/Mittelung $\Rightarrow$ globale Selektion*. Die „Regularisierung“ nimmt verschiedene Formen an:

- NS: Zeitmittelung der Nächstpunkt-Selektion,
- DE: RG-Fluss vom UV- zum IR-Fixpunkt,
- BSD: Scheibenmittelung von L -Funktionswerten,
- Hodge: Galois-Mittelung oder Polarisierungs-Degeneration.

Dieser strukturelle Isomorphismus legt nahe, dass ein einziges abstraktes Theorem – ein „Selektion durch Positivität“-Prinzip – allen Instanziierungen zugrunde liegt.

H. Numerische Illustration

Das Python-Skript `compute_ghr_spectrum.py` (dieser Arbeit beigelegt) verifiziert die AP-Bedingungen numerisch an 17 Testfällen:

- K3-Flächen (4 Polarisierungen), abelsche Flächen (5 Polarisierungen), abelsche Vierfache ($p = 2$), CM-Endomorphismenklassen auf $E \times E$;
- Voisin-artige Beispiele: Fermat-Quintik, $K3 \times K3$ -Tensorprodukte, Weil-Torus;
- Systematischer Polarisierungs-Scan: 500 zufällige ample Klassen auf einem $(1, 19)$ -Signatur-Modell;
- Simulierte Galois-Aktionen: 50 orthogonale Rotationen des negativen Eigenraums;
- SDP-Kegelstruktur: Eigenwert-Landschaft von $M(L) = (-1)^p Q_L|_{P^{p,p}}$ über dem amplen Kegel.

Da $AP^p = \text{AbsHodge}^p$ ein Theorem ist und keine empirische Vermutung, dienen die numerischen Rechnungen nur als pädagogische Illustration. Alle 17 Testkonfigurationen zeigen $(-1)^p Q_L \geq 0$ auf $P^{p,p}$, wie es die Hodge-Riemann-Relationen vorgeben.

Remark IX.27 (Voisin-GHR-Obstruktionstest). Die GHR-Obstruktion wurde an sechs Varietäten illustriert: generischer T^4 , Weil-Torus (CM durch $\mathbb{Z}[i]$), $K3 \times K3$, Fermat-Quintik X_5 , Voisin-Typ nicht-projektiver Torus und eine SDP-Relaxierung des AP-Kegels. Für alle projektiven Beispiele ist AP1 durch die Hodge-Riemann-Relationen garantiert. Der $K3 \times K3$ -Test mit Nicht-Tensorprodukt-Störungen erzeugt 3 negative Eigenwerte von $(-1)^p Q_L$; dies illustriert Detektion von Nichtabsolutheit bzw. von Modellklassen, die nach

Konjugation nicht im zulässigen (p, p) -/Primitivrahmen bleiben. Es ist kein Algebraizitätskriterium. Die AP-Kegel-Analyse zeigt alle zufälligen Klassen innerhalb des Kegels mit positiver Marge (0,24), was nur die Stabilität der Illustration anzeigt. Skript: `compute_voisin_test.py`.

I. Kontrollierte Testfamilien jenseits von $AP = \text{AbsHodge}$

Die Post-Zookeeper-Deutung dieses Papers ist bewusst bescheiden. Da arithmetische Positivität auf absolute Hodge-Klassen kollabiert, ist der nächste Schritt kein weiteres globales Positivitätsaxiom, sondern eine Testfamilien-Leiter für mögliche Verstärkungen jenseits von Delignes Absolutheit. Die Symbole AP' , AP'' und AP''' bezeichnen keine globalen Ersatzvermutungen für die Hodge-Vermutung. Sie bezeichnen zunehmend strengere Tests auf kontrollierten Spezialfamilien: AP' erfasst Provenienzdefekte, AP'' fordert ein beschränktes Orbit-Rigiditätszertifikat, und AP''' filtert Zertifikate aus, deren Zusatzwahlen lediglich die Zielklasse kodieren. Keine dieser Bedingungen wird als allgemeiner Beweis der Hodge-Vermutung behauptet.

Die Notation ist daher eine Claim-Status-Konvention, kein Theoremname. Jede Algebraizitätsaussage in diesem Abschnitt ist nur so stark wie die benannten Familienannahmen, die unabhängig von der Zielklasse α verifiziert werden. Werden die Zusatzdaten erst nach Kenntnis von α gewählt, gilt die Bedingung als gescheiterter Test und nicht als Evidenz.

Die aktuelle CORE-Schließung von Riemann- $C2/MS2$ verstärkt das Hodge-Resultat dieses Papers nicht. Hodge bleibt ein negativer Kontrollfall des Programms: Hodge-Riemann-Positivität saettigt zu breit, sodass jeder künftige Transfer wirklich neue arithmetische oder motivische Zusatzbedingungen braucht und nicht die Riemann-Kernel-Schließung wiederverwenden darf.

Die fünf Transferfelder lauten:

Operator/Form.: Hodge-Laplacian, Mumford-Tate- und Monodromieoperatoren sowie die Periodenabbildung.

Defekt.: Der transzendente Restanteil einer absoluten Hodge-Klasse nach Abzug der in der Familie bekannten algebraischen Zykelspanne.

Approximation.: Abelsche Vierfalten vom Weil-Typ, singuläre OG6-hyperkählersche Modelle, Potenzen bekannter Beispiele und Reduktionen in Charakteristik p .

Gap.: Zusatzbedingungen jenseits der Hodge-Riemann-Positivität: p -adische Slopes, Tate-Constraints, Mumford-Tate-Restriktionen und o-minimale Algebraizität.

Grenzübergang.: Deformation, Potenzen und Spezialisierung von kontrollierten Familien in einen breiteren motivischen Rahmen.

Eine nützliche nächste Version sollte deshalb eine Tabelle von Testfamilien enthalten. Für jede Familie werden festgehalten: bekannter Hodge-/Tate-Status, der in der Literatur verwendete Zykelmechanismus, die vorgeschlagene stärkere Bedingung AP' und ob der Defekt verschwindet. Weil-Vierfalten mit Diskriminante eins, OG6-Konstruktionen, abelsche Varietäten über endlichen Körpern mit Standardvermutung vom Hodge-Typ und Voisin-artige Stresstests bilden die natürliche erste Leiter. Wenn AP' auch in allen Negativkontrollen automatisch gilt, ist sie zu schwach; wenn sie eine bekannte positive Familie von einem Stresstest trennt, wird sie zu einem echten Kandidaten für weitere Formalisierung.

Hin zu AP' : Provenienzdefekte

Die erste Verschärfung ist als Provenienzscanner zu lesen, nicht als ein weiterer Positivitätskegel. Relativ zu einer benannten Testfamilie definiert man einen Defektvektor

$$D_{\text{prov}}(\alpha) = (D_{\text{slope}}, D_{\text{Tate}}, D_{\text{MT}}, D_{\text{mon}}, D_{\text{cycle}}),$$

dessen Einträge Steigungs-Kompatibilität an guten Reduktionen, Erklärung durch den Tate-/Galois-Fixteil, Mumford–Tate-Kompatibilität, monodromische oder o-minimale Persistenz und die nach Abzug der bekannten algebraischen Zykelspanne verbleibende Restklasse erfassen. Eine bedingte Fingerprint-Aussage würde besagen, dass in einer Testfamilie mit unabhängig verfügbaren Tate-/Standardvermutungsdaten und Vergleichsfunktorialität aus $D_{\text{prov}}(\alpha) = 0$ folgt, dass α in der bekannten algebraischen Zykelspanne liegt. Das ist eine Spezialfamilien-Diagnostik, kein globales Theorem.

Jede Komponente von D_{prov} muss mit dem Status *verifiziert*, *gescheitert* oder *unbekannt* geführt werden. Unbekannte Komponenten zählen nicht als verschwindende Defekte. Diese Konvention verhindert, dass der Provenienzscanner tautologisch wird: AP' gilt nur als bestanden, wenn alle erforderlichen Komponenten in der gewählten Testfamilie unabhängig verifiziert sind.

Hin zu AP'' : Bedingte Orbit-Rigidität

Die fünf Transferkanäle legen eine prototypische Verschärfung nahe. Sei $f: \mathcal{X}_S \rightarrow S$ ein Spread-out von X über einer glatten Basis S , sei $Z \subset S$ eine irreduzible algebraische Komponente des Hodge-Lokus von α , sei B die zugehörige relative Chow- oder Hilbert-Komponente, und sei $T \subset Z$ eine Zariski-dichte Teilmenge, an deren Punkten α_t relativ zu B algebraisch ist. Wir nennen α *orbit-rigide auf (f, Z, B)* , wenn:

- (i) *Properness.* Die relativen Chow-/Hilbert-Komponenten, die die relevanten Zykelklassen parametrisieren, sind proper über S .
- (ii) *Dichtheit.* T ist Zariski-dicht in Z .
- (iii) *Vergleichsfunktorialität.* Die Vergleichsisomorphismen zwischen Betti-, de Rham-, ℓ -adischer und kristalliner Realisierung sind funktoriell auf dem relevanten Quotienten; beim Liften von einer speziellen zur generischen Faser entstehen keine neuen Restklassen.
- (iv) *Spezialisierungsrigidität.* Basiswechsel entlang $Z \rightarrow S$ erzeugt keine neuen residualen Zykelklassen.

Lemma IX.28 (Bedingte Orbit-Rigidität). *Sei $\alpha \in \text{AbsHodge}^p(X)$ orbit-rigide auf (f, Z, B) im obigen Sinne. Dann liegt die Einschränkung α_η auf die generische Faser $\mathcal{X}_\eta$ über dem generischen Punkt η von Z im Bild der Zykelklassenabbildung $\text{cl}: \text{CH}^p(\mathcal{X}_\eta)_{\mathbb{Q}} \rightarrow H^{2p}(\mathcal{X}_\eta, \mathbb{Q}(p))$. Liegt der Basispunkt $0 \in S$ in derselben kontrollierten Komponente, so ist α algebraisch.*

Beweisidee. Properness von B (i) und Zariski-Dichtheit von T (ii) implizieren über das Bewertungskriterium, dass der Abschluss des algebraischen Locus in B den generischen Punkt η von Z enthält. Vergleichsfunktorialität (iii) stellt sicher, dass jede algebraische Klasse über $t \in T$ konsistent in allen kohomologischen Realisierungen liftet. Spezialisierungsrigidität (iv) verhindert die Akkumulation transzendenter Restklassen am Limes. Ein vollständiger Beweis erfordert das Cattani–Deligne–Kaplan-Prinzip für Hodge-Loki [10] zusammen mit einem Properness-Argument für das relative Hilbert-Schema; beide Schritte sind bedingt durch die Standardvermutungen in den relevanten Charakteristik- p -Reduktionen. $\square$

Remark IX.29. Lemma IX.28 beweist nicht die Hodge-Vermutung. Es ist als bedingtes Schließungsschema zu lesen, nicht als neues unbedingtes Algebraizitätstheorem. Seine Aussagekraft liegt vollständig in der unabhängigen Verifikation beschränkter relativer Chow-/Hilbert-Daten, der Vergleichsfunktorialität und der Spezialisierungsrigidität in einer benannten Testfamilie. Unter diesen separat geprüften Voraussetzungen propagiert Algebraizität von einer Zariski-dichten Menge zum generischen Punkt. Weil-abelsche Vierfalten mit Diskriminante eins sind ein natürlicher erster Kandidat für einen Positivtest; $K3 \times K3$ -Störungen außerhalb des Tensorprodukt-Lokus dienen als erste Negativkontrolle. Ob AP'' diese beiden Familien trennt, entscheidet darüber, ob es eine echte Verschärfung jenseits von AbsHodge darstellt.

Hin zu AP''' : Uniformität und Anti-Advice

Das Orbit-Rigiditätszertifikat besitzt weiterhin einen Fehlermodus: Die Familie f , die Hodge-Lokus-Komponente Z , die Chow-/Hilbert-Komponente B oder

die dichte Menge T könnten erst nach Kenntnis der Zielklasse α gewählt werden. Dann kann das Zertifikat α kodieren, statt es zu erklären. Wir verwenden daher

$$\text{AP}_{\text{unif}}'''(\alpha; R, C)$$

als Anti-Tautologie-Filter für ein AP'' -Zertifikat C . Gefordert ist, dass die Zusatzdaten aus einer vorregistrierten Regelklasse R erzeugt werden, die nur von den ambienten Daten (X, p) oder von einer festen Testfamilienleiter abhängt, mit beschränktem Advice, Erosionsstabilität nach Entfernen einer α -spezifischen Inzidenzbedingung, Träger auf einer Nachbarfamilie oder Zariskidichten Menge und Scheitern auf Negativkontrollen, die nur durch Hodge-Riemann-Formstabilität getrieben sind. Diese Bedingung fügt keine neue globale Hodge-Vermutung hinzu; sie sagt, wann ein Spezialfamilien-Zertifikat nicht tautologisch ist.

Operativ scheitert ein Zertifikat am AP''' -Filter, sobald einer der folgenden Tests scheitert:

1. *Vorregistrierung:* Die Regelklasse R wurde nicht vor der Zielklasse fixiert oder folgt nicht aus ambienten Daten.
2. *Beschränktes Advice:* Die Wahlen von f, Z, B, T tragen genug Information, um α zu rekonstruieren.
3. *Erosionsstabilität:* Das Entfernen einer α -spezifischen Inzidenzbedingung zerstört das Zertifikat.
4. *Nachbarschaftsschwarm:* Dieselbe Regel trägt keine Nachbarfamilie und keine Zariski-dichte Menge.
5. *Negativkontrollen:* Voisin-/ $K3 \times K3$ -Stressfamilien bestehen nur wegen Hodge-Riemann-Formstabilität.

Familie	Zykelmechanismus	AP'	AP''	AP'''	Status
CM-/Weil-Vierfalten	Endomorphismuszyklen	Slope/Tate/MT	Kandidat	Regel aus Endomorphismen	Positivkontrolle
Abelsche Vierfalten	bekannte Zykelpanne	Tate/MT	Kandidat	ambiente Familienregel	Positivkontrolle
OG6-Typ-Familien	hyperkühlersche Zykel	Monodromie/Zykel	offen	Registry nötig	Testfall
Char- φ -Tate-Fälle	Tate-Klassen	Slope/Tate	bedingt	Reduktionsregel	arithmetischer Test
Voisin-/ $K3 \times K3$ -Stress	nicht fixiert	Restklasse	soil scheitern	Post-hoc-Risiko	Negativkontrolle

Ergebnisklassifikation

Diese Arbeit ist ein **Grenzresultat**: Sie bestimmt präzise, was positivitätsbasierte Methoden für die Hodge-Vermutung leisten können und was nicht.

Ergebnis	Typ	Verwendung im Paper
<i>No-Go-/Grenzresultat at:</i>		
$\text{AP} = \text{AbsHodge}$ (HR liefert nichts Neues)	Theorem	bewiesene Grenze
HC reduziert sich auf Delignes Frage	Korollar	Scope-Begrenzung
<i>Konstruktive Werkzeuge:</i>		
GHR-Spektrum-Definition	Definition	nur Visualisierung
Endlicher Rückzug / primitive Künneth	Partiell, bedingt	begrenzte Tests
Voisin-Typ-GHR-Detektion	Numerisch	Illustration, kein Kriterium
Bedingte Orbit-Rigidität (AP'')	Lemma (bedingt)	Template
Uniformer Anti-Advice-Filter (AP''')	Methodisches Kriterium	Zulässigkeitsfilter
<i>Offen (äquivalent zu Deligne 1982):</i>		
$\text{AbsHodge} \stackrel{?}{=} \text{Algebraisch}$	Offen	nicht gelöst
Stärkere Positivität jenseits HR	Forschungsrichtung	Folgearbeit

X. SCHLUSSFOLGERUNG

Wir haben eine Umformulierung der Hodge-Vermutung durch die Perspektive von Positivität und No-Go-Obstruktionen vorgeschlagen. Das Schlüsselkonzept – *arithmetische Positivität* – kombiniert Hodge-Riemann-Positivität, absolute Stabilität unter $\text{Aut}(\mathbb{C})$ und Lefschetz-Kompatibilität in eine einzige Bedingung.

Ein zentrales Ergebnis dieser Arbeit (Bemerkung IX.2) ist, dass der arithmetisch positive Kegel mit Delignes absoluten Hodge-Klassen übereinstimmt: $\text{AP}^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X)$. Die Arithmetische Positivitätsvermutung ist daher äquivalent zu Delignes Frage „Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?“ Die Positivitätsbedingungen (AP1), (AP2b) und (AP3) werden für jede absolute Hodge-Klasse automatisch durch die Hodge-Riemann-Bilinearrelationen garantiert.

Obwohl die Arbeit keine genuin neue Vermutung einführt, bietet sie:

1. **Eine neue Perspektive:** Die No-Go-Formulierung verwandelt die Hodge-Vermutung von einem Konstruktionsproblem in eine Unmöglichkeitssaussage.
2. **Ein diagnostisches Werkzeug:** Das Galois-Hodge-Riemann-Spektrum macht explizit, welche Galois-Konjugation Nichtalgebraizität bezeugen könnte.
3. **Partielle Funktorialitätstests:** Die Arbeit dokumentiert partielle Funktorialitätstests, keine vollständige Funktorialitätstheorie: endlicher Rückzug ist an den Vergleich der amplen Kegel gebunden, primitive Künneth-Produkte sind für Produktpolarisierungen kontrolliert, und endlicher Vorwärtsschub bleibt offen.

Die verbleibende Herausforderung ist Delignes Frage: zu beweisen, dass absolute Hodge-Klassen algebraisch sind. Künftige Arbeit sollte stärkere Positivitätsbedingungen suchen – jenseits der Hodge-Riemann-Relationen – die die Lücke zwischen absoluten Hodge-Klassen und algebraischen Klassen weiter einengen könnten.

„Die Hodge-Vermutung verlangt nicht von uns, algebraische Zyklen zu bauen. Sie verlangt von uns zu zeigen, dass die Geometrie keinen Raum für etwas anderes hat.“

ACKNOWLEDGMENTS

Diese Arbeit wurde als unabhängige Forschung ohne institutionelle Förderung durchgeführt.

KI-Werkzeuge. KI-basierte Werkzeuge (Claude, Anthropic) wurden für mathematische Formalisierung und Texterstellung verwendet. Alle mathematischen Inhalte,

Vermutungen und die Verantwortung für die Korrektheit liegen ausschliesslich beim Autor.

Förderinformation. Diese Forschung erhielt keine externe Förderung.

-
- [1] C. Voisin (2002). *Hodge Theory and Complex Algebraic Geometry I, II*. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511615344.
 - [2] P. Griffiths, J. Harris (1978). *Principles of Algebraic Geometry*. John Wiley & Sons, New York.
 - [3] P. Deligne (1982). Hodge cycles on abelian varieties (Notes by J. S. Milne). In *Hodge Cycles, Motives, and Shimura Varieties*, Lecture Notes in Mathematics 900, pp. 9–100. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-38955-2_3.
 - [4] Y. André (1996). Pour une théorie inconditionnelle des motifs. *Publications Mathématiques de l’IHÉS*, 83, 5–49. DOI: 10.1007/BF02698643.
 - [5] F. Charles (2013). The Tate conjecture for K3 surfaces over finite fields. *Inventiones Mathematicae*, 194(1), 119–145. DOI: 10.1007/s00222-012-0443-y.
 - [6] G. Faltings (1983). Endlichkeitssätze für abelsche Varietäten über Zahlkörpern. *Inventiones Mathematicae*, 73, 349–366. DOI: 10.1007/BF01388432.
 - [7] S. Abdulali (1994). Algebraic cycles in families of abelian varieties. *Canadian Journal of Mathematics*, 46(6), 1121–1134. DOI: 10.4153/CJM-1994-063-0.
 - [8] B. Moonen (1999). Notes on Mumford-Tate groups. Preprint, University of Amsterdam.
 - [9] C. Voisin (2002). A counterexample to the Hodge conjecture extended to Kähler varieties. *International Mathematics Research Notices*, 2002(20), 1057–1075. DOI: 10.1155/S1073792802111135.
 - [10] E. Cattani, P. Deligne & S. Kaplan (1995). On the locus of Hodge classes. *Journal of the American Mathematical Society*, 8(2), 483–506. DOI: 10.2307/2152824.
 - [11] A. Grothendieck (1969). Standard conjectures on algebraic cycles. In *Algebraic Geometry (Bombay, 1968)*, pp. 193–199. Oxford University Press.
 - [12] B. Gross & D. Zagier (1986). Heegner points and derivatives of L -series. *Inventiones Mathematicae*, 84, 225–320. DOI: 10.1007/BF01388809.
 - [13] P. Deligne (1974). La conjecture de Weil: I. *Publications Mathématiques de l’IHÉS*, 43, 273–307. DOI: 10.1007/BF02684373.
 - [14] L. Geiger (2026). FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory. Zenodo preprint, Version 1.7. [doi:10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).
 - [15] L. Geiger (2026). From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis. Zenodo preprint, Version 2.3. [doi:10.5281/zenodo.19035640](https://doi.org/10.5281/zenodo.19035640).
 - [16] B. Mazur (1972). Frobenius and the Hodge filtration. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 78(5), 653–667. DOI: 10.1090/S0002-9904-1972-12976-8.
 - [17] A. Moriawaki (2000). Arithmetic height functions over finitely generated fields. *Inventiones Mathematicae*, 140(1), 101–142. DOI: 10.1007/s002220050358.
 - [18] P. Deligne & J. S. Milne (1982). Tannakian categories. In *Hodge Cycles, Motives, and Shimura Varieties*, Lecture Notes in Mathematics 900, pp. 101–228. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-38955-2_4.
 - [19] B. Bhatt & P. Scholze (2022). Prisms and prismatic cohomology. *Annals of Mathematics*, 196(3), 1135–1275. DOI: 10.4007/annals.2022.196.3.5.
 - [20] T. Bridgeland (2007). Stability conditions on triangulated categories. *Annals of Mathematics*, 166(2), 317–345. DOI: 10.4007/annals.2007.166.317.
 - [21] B. Bakker, B. Brunebarbe & J. Tsimerman (2023). o-minimal GAGA and a conjecture of Griffiths. *Inventiones Mathematicae*, 232(1), 163–228. DOI: 10.1007/s00222-022-01166-1.
 - [22] T. Nie, *Absolute Hodge Cycles in Prismatic Cohomology*, PhD Thesis, Harvard University, 2021.
 - [23] G. Binyamini & D. Novikov (2017). Wilkie’s conjecture for restricted elementary functions. *Annals of Mathematics*, 186(1), 237–275. DOI: 10.4007/annals.2017.186.1.6.
 - [24] B. Bhatt, M. Morrow & P. Scholze (2018). Integral p -adic Hodge theory. *Publications Mathématiques de l’IHÉS*, 128, 219–397. DOI: 10.1007/s10240-019-00102-z.