| Study | Non-responder | Responder | Standardised Mean Difference | SMD | 95%-CI | Weight (fixed) | Weight (random) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaput 2017 | 17 | 9 | | −0.49 | [−1.31; 0.33] | 8.2% | 8.6% |
| Frankel 2017 | 15 | 24 | | −0.65 | [−1.31; 0.01] | 12.6% | 13.0% |
| Gopalakrishnan 2017 | 13 | 30 | | 0.05 | [−0.60; 0.70] | 13.1% | 13.5% |
| Matson 2018 | 26 | 16 | | 0.29 | [−0.34; 0.91] | 14.2% | 14.5% |
| Routy NSCLC 2017 | 46 | 41 | | −0.07 | [−0.49; 0.35] | 31.3% | 29.9% |
| Routy RCC 2017 | 21 | 45 | | −0.24 | [−0.76; 0.28] | 20.6% | 20.5% |
| | | | | | | | |
| **Fixed effect model** | **138** | **165** | | **−0.15** | **[−0.38; 0.09]** | **100.0%** | **−−** |
| **Random effects model** | | | | **−0.15** | **[−0.39; 0.10]** | **−−** | **100.0%** |

Heterogeneity: $I^2 = 6\%$, $\tau^2 = 0.0062$, $p = 0.38$